



Anais de Evento

V Edição

**CONGRESSO
INTERNACIONAL EM
CIÊNCIAS DA SAÚDE ÚNICA**

Resumos Expandidos

ORGANIZADORES

**Alejandro Pereira Fernandes
Fernando Pereira Dos Santos Barbosa
Antonio Alves de Fontes-Junior**



Anais do V Congresso Internacional em Ciências da Saúde Única

V EDIÇÃO

ORGANIZADORES

Alejandro Pereira Fernandes
Fernando Pereira dos Santos Barbosa
Antonio Alves de Fontes-Junior

**ANAIS DO V CONGRESSO INTERNACIONAL EM CIÊNCIAS DA
SAÚDE ÚNICA**



2025 - Thesis Editora Científica

Copyright © Thesis Editora Científica

Open access publication by Thesis Editora Científica

Editor Chefe: Felipe Cardoso Rodrigues Vieira

Diagramação, Projeto Gráfico e Design da Capa: Thesis Editora Científica

Revisão: Organização do evento e os autores



Licença Creative Commons

Anais do V Congresso Internacional em Ciências da Saúde Única – V CICISU está licenciado com uma Licença Creative Commons 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Esta licença exige que as reutilizações deem crédito ao criador. Ele permite que os reutilizadores distribuam, remixem, adaptem e construam o material em qualquer meio ou formato, mesmo para fins comerciais.

O conteúdo da obra e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de responsabilidade exclusiva dos autores, não representando a posição oficial da Thesis Editora Científica. É permitido o download da obra e o compartilhamento desde que sejam atribuídos créditos aos autores. Todos os direitos para esta edição foram cedidos à Thesis Editora Científica.

ISBN: 978-65-83199-24-9

Thesis Editora Científica
Teresina – PI – Brasil
contato@thesiseditora.com.br
www.thesiseditora.com.br





2025 - Thesis Editora Científica

Copyright © Thesis Editora Científica

Open access publication by Thesis Editora Científica

Editor Chefe: Felipe Cardoso Rodrigues Vieira

Diagramação, Projeto Gráfico e Design da Capa: Thesis Editora Científica

Revisão: Organização do evento e os autores

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Congresso Internacional em Ciências da Saúde (8. : 2025 : on-line)
Anais do V Congresso Internacional em Ciências da Saúde
Única [livro eletrônico] : V CICISU / organizadores Alejandro
Pereira Fernandes, Fernando Pereira dos Santos Barbosa,
Antonio Alves de Fontes-Junior. -- 1. ed. -- Teresina, PI : Thesis
Editora Científica, 2025.
PDF

Bibliografia
ISBN 978-65-83199-24-9

1. Ciências da saúde 2. Medicina - Congressos 3. Saúde I.
Fernandes, Alejandro Pereira. II. Barbosa, Fernando Pereira dos
Santos. III. Fontes-Junior, Antonio Alves de. IV. Título.

25-294209.0

CDD-610.6

Índices para catálogo sistemático:

1. Medicina : Congressos 610.6

Maria Alice Ferreira - Bibliotecária - CRB-8/7964

Thesis Editora Científica
Teresina – PI – Brasil
contato@thesiseditora.com.br
www.thesiseditora.com.br





CONSELHO EDITORIAL

Aldemir Branco de Oliveira Filho
<http://lattes.cnpq.br/7475600234195238>

Alejandro Pereira Fernandes
<http://lattes.cnpq.br/7455224953747361>

Alexandre Junior de Souza Menezes
<http://lattes.cnpq.br/8868298636511416>

Amilton de Lima Barbosa
<https://lattes.cnpq.br/0769978530413941>

Ana Gonçalves Lima Neta
<http://lattes.cnpq.br/0712553846341458>

Anderson Nascimento de Andrade
<http://lattes.cnpq.br/0703187155412121>

Anicheriene Gomes de Oliveira Garbuggio
<http://lattes.cnpq.br/8925455831282853>

Antonio Alves de Fontes-Junior
<http://lattes.cnpq.br/3152503794328624>

Bárbara Juliana Pinheiro Borges
<http://lattes.cnpq.br/3318249404836724>

Beatriz de Carvalho Oliveira
<http://lattes.cnpq.br/1382552132805674>

Brenda Santos Fontes
<http://lattes.cnpq.br/2916550534264875>

Bruno Rogério Ferreira
<http://lattes.cnpq.br/3606603905122267>

Caroline Sousa Truta Ramalho
<http://lattes.cnpq.br/5807671616995976>

Cristiano da Silveira Colombo
<http://lattes.cnpq.br/0066476351599948>

Edna Carla da Silva
<http://lattes.cnpq.br/7246764400389361>

Erida Aparecida José da Silva
<http://lattes.cnpq.br/8342469414951510>

Érique Ricardo Alves
<http://lattes.cnpq.br/6892417222004207>

Fernando Pereira Dos Santos Barbosa
<http://lattes.cnpq.br/2760923476829236>

Gabriela de Vilhena Muraca
<https://lattes.cnpq.br/4848115437267367>

George Luiz Neris Caetano
<http://lattes.cnpq.br/0598052051026256>

Inaldo kley do Nascimento Moraes
<http://lattes.cnpq.br/2438275221125662>

Jalison Figueredo do Rêgo
<http://lattes.cnpq.br/9232537793301668>

João Cristovão de Melo Neto
<http://lattes.cnpq.br/6347935233698093>

Juliana de Fatima da Conceição Veríssimo
Lopes <http://lattes.cnpq.br/5416673741358741>

Larissa Domingos Nóbrega
<http://lattes.cnpq.br/6080027512095889>

Larissa Silva Souza
<https://lattes.cnpq.br/5672997433203664>

Mateus Feitosa Santos
<http://lattes.cnpq.br/8469840253245347>

Mauro Vinicius Dutra Girão
<http://lattes.cnpq.br/7216235007953327>

Nahide Pinto Rodrigues
<http://lattes.cnpq.br/7762043927114186>

Paulo Vitor Santos da Silva
<http://lattes.cnpq.br/1324750711915585>



Pedro Paulo Rodrigues
<http://lattes.cnpq.br/4343525359438002>

Rejane Louise de Lima Bastos
<http://lattes.cnpq.br/2625519584014831>

Ricardo Silva Tavares
<http://lattes.cnpq.br/0689388714375395>

Vinícius Batista Lima
<http://lattes.cnpq.br/3559301823598081>

Waldenilson Teixeira Ramos
<http://lattes.cnpq.br/2268223482149159>



MONITORES

Ailton Zacarias dos Santos

Ana Maria Lima Dourado

Ana Maria Nascimento Marques Amorim

Anderson da Silva Basilio

Anália Ribeiro Batista

Beatriz do Carmo Rodrigues de Abrantes

Gabrielle Sousa de Oliveira

Gustavo Iltemberg Sousa Silva

Iasmine Almeida Alencar de Castro

José Adeilson da Silva

Júlia Cambraia Mendonça

Keytiane Kássia de Araújo Ferreira

Kleyverson Feliciano dos Santos

Lavínia da Cunha Pinho

Luiz Antônio da Silva Fernandes

Maria Eduarda Cabral Mergulhão de
Souza

Maria Eduarda Haga Matiussi

Marlon Araújo dos Santos

Thayslane de Oliveira Brandão

Vitória Gomes Rodrigues



APRESENTAÇÃO

O V Congresso Internacional em Ciências da Saúde Única (CICISU) foi um evento científico de grande importância, direcionado a estudantes, pesquisadores e demais membros da comunidade científica, bem como aos interessados nos diversos campos das ciências da saúde. O principal objetivo do congresso foi incentivar o compartilhamento e a troca de conhecimentos e experiências adquiridos por meio de pesquisas já realizadas.

Realizado inteiramente de forma online, o evento possibilitou a participação de profissionais de todo o mundo. As atividades do congresso foram compostas por palestras e apresentações de trabalhos científicos, abordando uma ampla variedade de temas, incluindo: Políticas Públicas de Saúde, Biologia, Biotecnologia, Bromatologia, Clínica Médica, Cuidados Paliativos, Educação em Saúde, Educação Física, Enfermagem, Epidemiologia, Estética e Cosmética, Farmácia, Farmacologia, Farmacotécnica, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Impactos Ambientais na Saúde, Medicina, Nutrição, Odontologia, Plantas Medicinais, Psicologia, Química de Produtos Naturais, Saúde Animal, Saúde Coletiva, Saúde do Idoso, Saúde e Ciências Sociais, Saúde Mental, Saúde Pública, Sistema Único de Saúde, Terapia Ocupacional, Terapias Alternativas e Complementares, Toxicologia Ambiental, Vigilância em Saúde, Virologia, Zoologia, entre outras áreas. O congresso destacou-se como um espaço para a promoção da interdisciplinaridade e multidisciplinaridade, aspectos essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população. As pesquisas apresentadas estavam comprometidas com o bem-estar humano, ambiental e animal, e mostraram um forte potencial para contribuir para o avanço da ciência.

Além de promover a disseminação de novos conhecimentos e boas práticas na área da saúde, o CICISU proporcionou uma experiência enriquecedora para os participantes. O evento ofereceu a oportunidade de ampliar horizontes, explorar as últimas tendências e avanços na saúde pública, e fortalecer os diferentes saberes e disciplinas.


O CICISU é um evento que enfatiza a colaboração e a sinergia entre profissionais, acadêmicos e a sociedade em geral. Promovendo o diálogo e o aprendizado, o congresso busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida e para a construção de um sistema de saúde mais eficiente, equitativo e universal.

Desejamos a todos uma excelente e boa leitura!



SUMÁRIO

A IMPORTÂNCIA DO PSICOPEDAGOGO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): CONTRIBUIÇÕES PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL E O DESENVOLVIMENTO CLÍNICO	15
ARMADILHAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA DOPPLERVELOCIMETRIA	18
CONTRIBUIÇÃO DA ECOGRAFIA NA AVALIAÇÃO DA PLACENTA.....	24
IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACOGENÔMICOS LIDERADOS POR FARMACÊUTICOS: SÍNTESE GLOBAL DE EVIDÊNCIAS, BENEFÍCIOS CLÍNICOS E LACUNAS REGIONAIS	30
PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ENVELHECIMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM GRUPOS DE IDOSOS EM IGREJAS PRESBITERIANAS.....	34
PREVALÊNCIA DE LESÕES AUTOPROVOCADAS E SUICÍDIO ENTRE A CLASSE INFANTO-JUVENIL DE 10 A 19 ANOS NO BRASIL	38
USO EXCESSIVO DAS BEBIDAS ENERGÉTICAS E O DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM JOVENS.....	42
EFICÁCIA E SEGURANÇA DA INSULINA ICODEC EM COMPARAÇÃO COM INSULINAS BASAIS DIÁRIAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.....	47
PROJETO ANCESTRALIDADE QUE ALIMENTA: RESGATANDO RAÍZES E FORTALECENDO A CONSCIÊNCIA NEGRA – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	51
INVESTIGAÇÃO DA DIVERSIDADE ALIMENTAR E CONSUMO DE ULTRAPROCESSADOS: UMA FERRAMENTA PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NO BRASIL	56
CORPO, AFETO E SUBJETIVIDADE	62
ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO E INTERVENÇÃO NO RISCO DE SUICÍDIO	66
ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE NANOPARTÍCULAS DE SELÊNIO NO COMBATE AO ESTRESSE OXIDATIVO.....	71
ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO A PACIENTES NEUROLÓGICOS NA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DA UENP: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA	75
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA RAIVA HUMANA NO NORTE DO BRASIL: O QUE HOUE NO PERÍODO DE 2001 A 2021?.....	80
DAS CASAS GRANDES AOS APLICATIVOS: A NOVA COLONIALIDADE DO TRABALHO PRECARIZADO RACIALIZADO E O ADOECIMENTO MENTAL SILENCIADO	85
DO GRITO AO SILÊNCIO: A SAÚDE MENTAL COMO CUSTO DO TRABALHO MODERNO	90
ANÁLISE DA APLICABILIDADE DA CIRURGIA ROBÓTICA NO TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES.....	95
AUTOMAÇÃO DA TÉCNICA DE MICRONÚCLEO COM BLOQUEIO DE CITOCINESE (CBMN): UMA NOVA PERSPECTIVA PARA DOSIMETRIA BIOLÓGICA	101
ÚLCERA GÁSTRICA E SULFETO DE HIDROGÊNIO (H ₂ S): UMA MOLÉCULA PROMISSORA NO TRATAMENTO DE LESÕES GASTROINTESTINAIS?.....	105
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA	110
INFLUÊNCIA DA PERDA DE PESO NA REDUÇÃO DOS SINTOMAS DE DEPRESSÃO EM PESSOAS COM OBESIDADE	114
A IMPORTÂNCIA DO RASTREIO ATIVO DA TUBERCULOSE NA USF EM REGIÕES DO INTERIOR: ESTRATÉGIAS, DESAFIOS E IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA	118
ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES COM CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIAS .	122
VALIDAÇÃO DE UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL AUDIOVISUAL EM QUADRINHOS ACERCA DA DOENÇA DE CHAGAS	127



IMPACTOS DO ESTRESSE NO SISTEMA IMUNOLÓGICO.....	132
INDUÇÃO DA HEMOGLOBINA FETAL VIA CRISPR-CAS9 EM PACIENTES BETA TALASSÊMICOS COMO ALTERNATIVA TERAPÊUTICA AO TRATAMENTO CONVENCIONAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	137
ATUALIZAÇÃO SOBRE A ESPOROTRICOSE FELINA NO BRASIL: DESAFIOS E A IMPORTÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA.....	142
SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL E EIXO INTESTINO-CÉREBRO: NOVAS PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS.....	147
AUTISMO, VACINAÇÃO E ATENDIMENTO HUMANIZADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	152
IMPACTO DO USO DE PROBIÓTICOS EM PACIENTES COM SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL (SII)	155
PANCREATITE AGUDA GRAVE: DESAFIOS NA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E ENDOSCÓPICA.....	160
FATORES DESENCADEANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA DEPRESSÃO PÓS PARTO E SUAS PREVENÇÕES	165
IMPACTOS DA OBESIDADE NA SARCOPENIA: DESAFIOS ATUAIS E AVANÇOS.....	170
O PAPEL DA ENFERMAGEM NA REABILITAÇÃO PULMONAR DE PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA.....	174
ENFRENTAMENTO FAMILIAR NO CÂNCER PEDIÁTRICO EM ESTÁGIO TERMINAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA	180
AVALIAÇÃO BROMATOLÓGICA COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO FARMACÊUTICA	185
IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA RADIOLOGIA	188
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS ÓBITOS POR EXPOSIÇÃO À FUMAÇA, AO FOGO E ÀS CHAMAS NA DÉCADA DE 2013 A 2023.....	191
RETRATO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE ENVENENAMENTO NO BRASIL: IDENTIFICAÇÃO DE FATORES DE RISCO E NECESSIDADES DE INTERVENÇÕES	196
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PERMANENTE PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA RENAL EM HIPERTENSOS E DIABÉTICOS	202
EFEITOS DOS INIBIDORES DE SGLT2 NA PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA.....	207
ESTRESSE OXIDATIVO E DISFUNÇÃO MITOCONDRIAL EM NEFROPATIAS: IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS.....	213
DISTÚRBIOS ENDÓCRINOS E SAÚDE MENTAL: A RELAÇÃO ENTRE HIPOTIREOIDISMO E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS	219
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APLICATIVOS MÓVEIS NO RASTREIO DE DOENÇAS OCULARES: POTENCIAL, LIMITAÇÕES E DESAFIOS ÉTICOS.....	224
BURNOUT EM TRABALHADORES DA SAÚDE: QUANDO O CUIDAR ADOECE.....	228
ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA COMUNIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	232
REPOSIÇÃO HORMONAL NA MENOPAUSA E SEUS EFEITOS NO METABOLISMO ÓSSEO.....	237
EFEITOS DO USO DE SEMAGLUTIDA PARA EMAGRECIMENTO ESTÉTICO: UMA REVISÃO DA LITERATURA	241
FORMAÇÃO MÉDICA INCLUSIVA ATRAVÉS DE EXPERIÊNCIAS LÚDICAS: EXTENSÃO PARA CRIANÇAS COM DOENÇAS RARAS E CUIDADORES.....	250
ASSOCIAÇÃO ENTRE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS	254
A UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS TRONCO PARA O TRATAMENTO DO ALZHEIMER	258
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM GRUPO PARA PORTADORES DE DOR LOMBAR	



CRÔNICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO AFID-JR.....	262
TRANSTORNOS DE ESTRESSE RELACIONADOS AOS DESASTRES AMBIENTAIS DO RIO GRANDE DO SUL/RS.....	266
AVALIAÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE EM ANIMAIS SÉPTICOS TRATADOS COM BETA-MIRCENO NA CONCENTRAÇÃO DE 200 MG/KG	271
EFEITO DO TRATAMENTO COM B-MIRCENO NA CONCENTRAÇÃO DE 100 MG/KG NA TAXA DE MORTALIDADE EM UM MODELO DE SEPSE EXPERIMENTAL	276
ÍNDICE DE MORTALIDADE EM ANIMAIS SÉPTICOS TRATADOS COM β - MIRCENO NA DOSE DE 50 MG/KG.....	281
ÁGUA CONSUMIDA EM ESCOLAS PÚBLICAS: DETECÇÃO DE <i>Enterobacter</i> spp.....	286
PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO EXCESSO DE PESO EM ADULTOS QUE RESIDEM NO LITORAL DA AMAZÔNIA BRASILEIRA	291
RENAME, RESME E REMUME: A IMPORTÂNCIA DOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DO PACIENTE IDOSO	295
ANÁLISE DA IMUNOGENICIDADE GERADA PELAS PRINCIPAIS VACINAS DO COVID 19	299
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM FÁRMACOS UTILIZADOS POR IDOSOS: RISCOS E CONSEQUÊNCIAS	304
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSE NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ, PARÁ, NORTE DO BRASIL.....	307
APLICAÇÃO DA FARMACOGENÉTICA NO TRATAMENTO PERSONALIZADO DO TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR.....	311
TUBERCULOSE HUMANA NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO PARALELISMO EPIDEMIOLÓGICO E SEUS IMPACTOS PARA A SAÚDE PÚBLICA	316
AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DO DISSULFIRAM, UM INIBIDOR DA GASDERMINA D, NA SEPSE EXPERIMENTAL	322
ORIENTAÇÕES PARA O MANEJO NÃO-FARMACOLÓGICO DA DOR CRÔNICA EM SALA DE ESPERA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	328
SAÚDE ÚNICA: A POLUIÇÃO COMBINADA POR MICROPLÁSTICOS E METILMERCÚRIO COMO EXPRESSÃO DE INJUSTIÇA AMBIENTAL, RISCO SISTÊMICO E AMEAÇA À SUSTENTABILIDADE	332
RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE <i>Escherichia coli</i> ISOLADAS DA PELE E RETO DE TILÁPIAS EM TANQUES EM INACIOLÂNDIA - GO	336
PRESENÇA DE <i>Klebsiella pneumoniae</i> EM AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JATAÍ.....	340
EFEITOS SISTÊMICOS DA ANSIEDADE SOBRE O CORPO HUMANO: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR.....	344
RNAi NA AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA: APLICAÇÕES EM TOXICOGENÔMICA, HEPATOTOXICIDADE E NEUROTOXICIDADE COMO ALTERNATIVA AOS TESTES EM ANIMAIS	349
A ESCUTA QUALIFICADA E O ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO COMO ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA	355
VIVÊNCIA DISCENTE EM TRAQUEOSTOMIA À BEIRA-LEITO: RELATO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.....	359
BEBIDAS ENERGÉTICAS E MARKETING: NECESSIDADE DE REGULAÇÃO E POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS SOBRE O TEMA.....	363
EXAME DE VIDEOENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO (VED) NA DISFAGIA PEDIÁTRICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	369
MONITORAMENTO DE <i>Salmonella</i> spp. EM ÁGUA DE ESCOLAS PÚBLICAS DE JATAÍ (GO): AVALIAÇÃO DE RISCOS SANITÁRIOS.....	373



ANÁLISE ECOLÓGICA DA PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E SEUS FATORES ASSOCIADOS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE: Uma perspectiva em determinantes sociais da saúde.....	377
PROMOÇÃO DE SAÚDE, INCLUSÃO E AUTOCUIDADO JUNTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	382
ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO TERPÊNICA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE <i>CITRUS RETICULATA</i> : UMA REVISÃO.....	386
SORRISOS E ATITUDES BRILHANTES: PROMOÇÃO DE SAÚDE E BEM-ESTAR NA INFÂNCIA E NA FAMÍLIA ATRAVÉS DE PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE EXTENSÃO.....	391
INTERVENÇÃO EDUCATIVA MULTIDISCIPLINAR SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	394
MICROVESÍCULAS E EXOSSOMOS NA HEMOSTASIA: DA FISIOLÓGIA AO POTENCIAL LABORATORIAL E CLÍNICO - REVISÃO INTEGRATIVA.....	399
NEOANTÍGENOS EM DOENÇAS AUTOIMUNES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE O PAPEL DAS MODIFICAÇÕES PÓS-TRADUCIONAIS DE PROTEÍNAS.....	404
EFEITO DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA NA ÁREA ESPORTIVA: ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM.....	409
ATIVIDADE ANTIPARASITÁRIA DO GÊNERO <i>EUTERPE</i> : POTENCIAL TERAPÊUTICO E APLICAÇÕES.....	414
TUBERCULOSE NO ÂMBITO HOSPITALAR: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO RETROSPECTIVO (2018–2024).....	418
CONSIDERAÇÕES SOBRE ALVEOLITE SECA NOS TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS - UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	422
RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE <i>Serratia marcescens</i> ISOLADA EM TILÁPIAS CULTIVADAS EM TANQUES EM INACIOLÂNDIA-GO.....	426
A ERGONOMIA NO TRABALHO DOS TRADUTORES E INTÉRPRETES DE LÍNGUA DE SINAIS/LÍNGUA PORTUGUESA.....	431
AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PREVENÇÃO EM SAÚDE: O Papel da Inteligência Artificial no Diagnóstico Mamográfico.....	435
EXPERIÊNCIAS LÚDICAS E INCLUSIVAS VOLTADAS PARA CRIANÇAS COM DOENÇAS RARAS.....	439
ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.....	444
CONECTANDO CUIDADOS EM CONTEXTOS DE ESCASSEZ: POTENCIAL DAS INTERVENÇÕES DIGITAIS PARA DETECÇÃO PRECOCE DA PRÉ- ECLÂMPSIA/ ECLÂMPSIA.....	448
SEDE DE SUCESSO: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE O IMPACTO DO CONSUMO DAS BEBIDAS ENERGÉTICAS ENTRE ACADÊMICOS DE MEDICINA.....	453
PAPANICOLAU: UMA ANÁLISE DO ÍNDICE DE REALIZAÇÃO E OS DESAFIOS DA PREVENÇÃO AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO.....	459
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MORTES POR ACIDENTES DE TRÂNSITO NO BRASIL ENTRE 2014 E 2024.....	464
FORTELECIMENTO DA ADESÃO AOS TESTES NEONATAIS POR MEIO DE AÇÃO EDUCATIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	468
O IMPACTO DA TECNOLOGIA NA PRÁTICA DA ENFERMAGEM: AVANÇOS, DESAFIOS E POSSIBILIDADES.....	472
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS INTERNAÇÕES E ÓBITOS NO BRASIL DURANTE UMA DÉCADA.....	478
MORTALIDADE POR CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIIS NO BRASIL EM DUAS DÉCADAS: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E ECOLÓGICO.....	482
TAXAS DE CESARIANA ENTRE NASCIDOS VIVOS NO BRASIL: ANÁLISE COMPARATIVA	



REGIONAL DE UMA DÉCADA.....	486
QUANDO O CUIDAR ADOECE: REPERCUSSÕES PSICOSSOCIAIS DA PANDEMIA NOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	492
PROMOÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA COM A ENTREGA DE KITS DE HIGIENE E ALIMENTOS: EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA	498
AQUECENDO VIDAS: PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEU IMPACTO NA FORMAÇÃO MÉDICA.....	501
CUIDADOS DE ENFERMAGEM QUE TRASCENDEM CONHECIMENTOS TÉCNICOS: ESPIRITUALIDADE, FÉ, CARIDADE, HUMANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL E LOCAL	505
EVIDÊNCIAS DA ATIVIDADE FÍSICA NOS SINTOMAS PSICOLÓGICOS DE SOBREVIVENTES DO CÂNCER DE MAMA: UMA UMBRELLA REVIEW	510
TECNOLOGIAS MÓVEIS NO MANEJO DO DIABETES GESTACIONAL: DESAFIOS NA ALFABETIZAÇÃO DIGITAL	514
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS: OS IMPACTOS DA DIETA SEM GLÚTEN E SEM CASEÍNA	519
PREVENÇÃO À DOENÇA DE CHAGAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA RIBEIRINHA DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, PARÁ	525
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E RASTREABILIDADE: A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GARANTIA DA QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	529
MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A SAÚDE DA PESSOA IDOSA: UMA PERSPECTIVA INTEGRATIVA ENTRE A VIDA HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL.....	534
FEIRA DE SAÚDE POTENCIALIZANDO AÇÕES EDUCATIVAS COM AVALIAÇÃO DE RISCO PARA CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	540
PANORAMA CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL: UMA REVISÃO DA INTEGRATIVA	545
AVALIAÇÃO DA IDADE VASCULAR EM ADULTOS COM HISTÓRICO DE COVID LONGA SUBMETIDOS A TESTE DE EXERCÍCIO INCREMENTAL MÁXIMO	549
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COMO FERRAMENTA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL: EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA EM CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	554
EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE MANOBRAS DE DESENGASGO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA USF NA CIDADE DE CABEDELO - PB	559
ALÉM DO ESTETOSCÓPIO: DESAFIOS DA CONDUTA MÉDICA DIANTE DA VIOLÊNCIA INFANTIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.....	562
INTEROPERABILIDADE DE DADOS EM SAÚDE: DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS NO SUS.....	566
CUIDADO, ESCUTA E ESPIRITUALIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM CUIDADORES DE CRIANÇAS COM DOENÇAS RARAS	570
TELEMEDICINA NA GESTÃO DE PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA.....	573
RISCOS EM QUEIJOS MATURADOS: ANÁLISE INTEGRATIVA DOS PERIGOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS E SUAS IMPLICAÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA.....	577
A EFICÁCIA DO PILATES NO EQUILÍBRIO E NA MOBILIDADE DE PESSOAS COM PARKINSON: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE	583
UTILIZAÇÃO DE SIMULADORES DE AMAMENTAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	587
NEFROTOXICIDADE INDUZIDA POR FÁRMACOS	590
EFEITOS DE DOZE SEMANAS DE PILATES E TREINAMENTO FUNCIONAL NOS ASPECTOS MOTORES DE PESSOAS COM PARKINSON: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO	595
NEFRITE LÚPICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO	600



PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO USO DE <i>Viscum album</i> L. COMO ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PARA DOENÇAS NEOPLÁSICAS NA MEDICINA VETERINÁRIA	604
IMPACTOS NO ESTILO DE VIDA NA RECORRÊNCIA DE LITÍASE URINÁRIA	609
AÇÃO SOCIAL JUNTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: UMA EXPERIÊNCIA ACADÊMICA EM JOÃO PESSOA - PB.....	613
INVESTIGAÇÃO DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS EM <i>Agapornis</i> (PSITTACIDAE) CRIADOS COMO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO EM FORTALEZA, CEARÁ	617
ENDOPARASITAS ZOONÓTICOS EM CÃES: PREVALÊNCIA E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE PÚBLICA NO CONTEXTO BRASILEIRO	622
CONTROLE DE HELMINTOS EM AVICULTURA SEMI-INTENSIVA: ESTRATÉGIAS INTEGRADAS COM FITOTERÁPICOS, ANTI-HELMÍNTICOS SINTÉTICOS E MANEJO SUSTENTÁVEL	627
CONTROLE BIOLÓGICO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS POR FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS: IMPACTOS POSITIVOS E BENEFÍCIOS À SAÚDE	631
DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DE AVES E ENSINO PRÁTICO DE EMBRIOLOGIA	635
ASPECTOS PSICOSSOCIAIS ASSOCIADOS A TERAPIAS DE SUBSTITUIÇÃO RENAL	639
SÍNDROME DA LISE TUMORAL E LESÃO RENAL AGUDA: ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA.....	644
RELATOS DE OCORRÊNCIAS DE <i>SCHINUS TEREBINTHIFOLIA</i> RADDI NA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA.....	647
OS EFEITOS DO USO CONTÍNUO DE CLONAZEPAM: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	650
DESCOBERTA TARDIA DE SÍFILIS EM PUÉRPERA: VIVÊNCIA ACADÊMICA NO ACOMPANHAMENTO PÓS-NATAL E SUAS IMPLICAÇÕES CLÍNICAS E SOCIAIS	653
O DESENVOLVIMENTO DE SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON NOS PACIENTES EM USO DE LAMOTRIGINA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.....	657
ENTRE A CLÍNICA E A MULTIDÃO: POTÊNCIAS PARA UMA PSICOLOGIA INVENTIVA	661
IMPACTO DAS INFECÇÕES RECORRENTES POR SARS-COV-2 NA PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA	664
A EFICÁCIA DA TELEMEDICINA NO TRATAMENTO DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO: UMA COMPARAÇÃO COM O MODELO TRADICIONAL	669
ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE SÍFILIS ADQUIRIDA NO MARANHÃO EM 2024....	673
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PARASITOLÓGICA DA <i>Solanum capsicoides</i>	678
O PAPEL DA FOTOBIMODULAÇÃO NA REGENERAÇÃO TECIDUAL, NA ANALGESIA E NA PREVENÇÃO DA MUCOSITE ORAL	682
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DA <i>Solanum capsicoides</i>	685
AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA DA <i>Solanum capsicoides</i>	689
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: FATORES DE RISCO, IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO	694
DESCOLAMENTO PREMATURO DA PLACENTA: FATORES DE RISCO, IMPACTOS MATERNO-FETAIS E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO	697
USO DE FÓRCEPS NO TRABALHO DE PARTO: INDICAÇÕES, RISCOS E BENEFÍCIOS	700



A IMPORTÂNCIA DO PSICOPEDAGOGO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS): CONTRIBUIÇÕES PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL E O DESENVOLVIMENTO CLÍNICO

¹Fernando Pereira Dos Santos Barbosa

¹Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo, Brasil

Área temática: Saúde Pública

Resumo: A atuação do psicopedagogo no Sistema Único de Saúde (SUS) é essencial para garantir um atendimento integral aos pacientes, abordando não só as dificuldades de aprendizagem, mas também os aspectos emocionais e sociais que afetam o desenvolvimento global dos indivíduos. Este estudo analisa as contribuições do psicopedagogo no SUS, destacando as práticas multidisciplinares que envolvem a integração da psicopedagogia com outras áreas da saúde, como saúde mental, psicanálise e análise do comportamento aplicada (ABA). Além disso, enfatiza a importância da atuação preventiva e educativa do psicopedagogo, que visa a promoção da saúde integral e a inclusão social, fundamental para a construção de um sistema de saúde mais inclusivo e acessível.

INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como princípios fundamentais a universalidade, a integralidade e a equidade no acesso aos serviços de saúde. O atendimento psicopedagógico no SUS, embora inicialmente voltado para as dificuldades de aprendizagem, tem se expandido para abranger uma gama de questões relacionadas ao desenvolvimento psicoemocional e comportamental. O psicopedagogo, ao integrar equipes multidisciplinares, desempenha um papel crucial na abordagem de distúrbios de aprendizagem, transtornos emocionais e comportamentais, visando promover uma saúde integral. A atuação do psicopedagogo no SUS não se limita a práticas clínicas, mas também envolve ações educativas e preventivas, sendo essencial para o desenvolvimento de intervenções que promovem o bem-estar emocional e social dos pacientes. Esse profissional atua em conjunto com outras áreas da saúde, como a neurologia, a psicanálise e a ABA, ampliando as possibilidades de tratamento e promoção de saúde.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo é analisar a contribuição do psicopedagogo no SUS, destacando sua importância para o atendimento integral dos pacientes. O artigo investiga a integração da psicopedagogia com outras áreas do SUS, como a saúde mental e a ABA, e como essas práticas podem colaborar para melhorar a qualidade do atendimento, além de destacar a importância da atuação preventiva.

METODOLOGIA

Este trabalho é uma revisão bibliográfica da literatura sobre a psicopedagogia no SUS,



com base em artigos acadêmicos, livros e publicações em periódicos especializados. Foram selecionados estudos que abordam a prática psicopedagógica em contextos clínicos e educacionais dentro do SUS, focando especialmente nas contribuições do psicopedagogo para a saúde mental, a inclusão social e as intervenções preventivas. A análise das fontes visa compreender o papel do psicopedagogo na promoção de uma saúde integral e acessível à população atendida pelo SUS. Para a seleção dos artigos, foram utilizadas as bases de dados PubMed, SciELO e Google Scholar, com o descritor "psicopedagogia SUS". Os critérios de inclusão foram: artigos publicados nos últimos 10 anos, que abordassem a atuação do psicopedagogo no SUS e suas contribuições para o atendimento integral. Os critérios de exclusão foram: artigos que não abordassem a temática central do estudo e artigos publicados em idiomas diferentes de português e inglês. Foram analisados 20 artigos que atenderam aos critérios de seleção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A psicopedagogia no SUS adota uma abordagem holística, considerando não apenas dificuldades de aprendizagem, mas também aspectos emocionais, sociais e comportamentais. O psicopedagogo trabalha em equipe multidisciplinar, colaborando com profissionais como psicólogos, psiquiatras e neurologistas, o que favorece diagnósticos precisos e tratamentos eficazes. Essa colaboração amplia a intervenção e garante um atendimento mais abrangente, especialmente em casos complexos. A psicopedagogia no SUS também desempenha papel crucial em transtornos emocionais que afetam a aprendizagem. A identificação precoce de dificuldades emocionais e cognitivas é fundamental para o tratamento adequado. O psicopedagogo, por meio de escuta qualificada e intervenções psicoterapêuticas, contribui para o bem-estar psicológico e para a construção de planos terapêuticos eficazes. A ABA é essencial no tratamento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e os psicopedagogos utilizam essa abordagem para promover a inclusão e melhorar habilidades cognitivas e sociais, em colaboração com outros profissionais. A psicopedagogia psicanalítica, que integra os princípios da psicanálise, é importante para compreender distúrbios de aprendizagem relacionados a questões inconscientes. O inconsciente influencia o comportamento e o aprendizado, e a integração dessa abordagem oferece soluções mais eficazes. A psicopedagogia no SUS também tem um papel preventivo fundamental. A formação psicopedagógica deve integrar novas abordagens, não apenas metodologias tradicionais, para reduzir a exclusão social e escolar, promovendo a inclusão e melhoria da qualidade de vida dos atendidos.

CONCLUSÃO

A atuação do psicopedagogo no SUS é crucial para a promoção de uma saúde integral, que vai além do tratamento de dificuldades de aprendizagem, incluindo o cuidado com o bem-estar emocional e social dos pacientes. A colaboração com outras áreas da saúde, como a saúde mental, a psicanálise e a ABA, amplia as possibilidades de tratamento, garantindo um atendimento mais eficaz. Além disso, a atuação preventiva e educativa desempenha um papel fundamental na inclusão social e escolar, contribuindo para a construção de um sistema de saúde mais acessível e humanizado.



Palavras-chave: Inclusão Social; Intervenção Terapêutica; Psicopedagogia; Saúde Mental; Sistema Único de Saúde (SUS).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Ana Lúcia S. de. **Psicopedagogia e Saúde Pública**. Revista Brasileira de Psicopedagogia, 2014.

BARBOSA, F. P. **Formação Psicopedagógica Para o Século XXI: Facilitando o Acesso à Aprendizagem**. Epitaya E-Books, v. 1, n. 10, p. 34-38, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.47879/ed.ep.2022519p34>. Acesso em: 20 de outubro de 2023.

FREITAS, E. L. **Psicopedagogia e sua interface com a saúde mental**. Revista Brasileira de Psicopedagogia, 2012.

FREUD, Sigmund. **O ego e o id**. 1923.

SILVA, Maria Alice de Almeida. **A prática psicopedagógica em contextos educacionais e clínicos: desafios e perspectivas**. Revista Brasileira de Psicopedagogia, 2015.

SKINNER, B. F. **The Behavior of Organisms**. 1953.



ARMADILHAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA DOPPLERVELOCIMETRIA

¹Antonio Gadelha da Costa ²Rafaela Quinto da Costa Melo ³Simon de Lima Silva

⁴Ana Cecília Falcão Victor

⁵Patricia Spara Gadelha

¹Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, Paraíba, Brasil; ² Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, Paraíba, Brasil; ³ Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, Paraíba, Brasil, ⁴ Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, Paraíba, Brasil, ⁵ Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, Paraíba, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo: A aplicabilidade da dopplervelocimetria já está bem estabelecida em todas as especialidades da medicina. Este método é utilizado, dentre várias aplicações, para avaliar a vitalidade e a anemia fetal, estenoses arteriais e insuficiência venosa. A fim de se evitar erros nos resultados dos parâmetros dopplervelocimétricos, é necessário utilizar metodologia correta. Neste contexto, a presente revisão enfatiza as principais ferramentas utilizadas nas avaliações dopplervelocimétricas: o ângulo de insonação, a frequência de repetição do pulso, o volume de amostra e o filtro de parede. Além disso, esse artigo revisa os principais parâmetros dopplervelocimétricos utilizados durante os exames Doppler: Pico de velocidade sistólica, velocidade diastólica final, índice de resistência, índice de pulsatilidade e tempo de aceleração.

INTRODUÇÃO

A dopplervelocimetria é método com grande aplicabilidade em todas as especialidades médicas. Na obstetrícia esta metodologia tem sido empregada na restrição de crescimento intra-uterino (RCIU) e hipertensão arterial materna, fatores relacionados aos estados hipóxicos fetais, com modificações importantes no fluxo sanguíneo cerebral do feto, traduzidos por modificações nos parâmetros dopplervelocimétricos (Baschat *et al.*, 2000; Dubiel; Gunnarsson; Gudmundsson, 2002)

Na anemia fetal, observa-se aumento de pico de velocidade sistólica na artéria cerebral média do feto quando o hematócrito fetal está baixo e, ao contrário, hematócrito acima do normal relaciona-se à sua redução (Mari *et al.*, 1997). Vários são os trabalhos que relatam aplicabilidade da dopplervelocimetria na artéria cerebral média em fetos anêmicos para indicação de cordocentese e transfusão fetal (Zimmerman *et al.*, 2002; Sheier *et al.*, 2004; Mari *et al.*, 2005)

Em ginecologia, a metodologia Doppler é utilizada no diagnóstico e acompanhamento clínico de leiomiomas, torção de ovário, anormalidades vasculares, como avaliação de aneurismas de artérias uterinas, além de massas ovarianas e hiperplasia endometrial (Bhatt; Dogra, 2006). Alcázar *et al.* (2003), analisaram o uso do power Doppler endovaginal na diferenciação entre condições endometriais malignas e benignas, na vigência de hemorragia uterina pós-menopausa e constataram que esse método é útil na diferenciação entre massas endometriais malignas e benignas.

Nas estenoses da artéria renal, a ultrassonografia Doppler é método não invasivo de



escolha nas avaliações iniciais, sendo útil nos pacientes hipertensos refratários à terapia medicamentosa. Os critérios diretos dos exames dopplervelocimétricos para o diagnóstico da hipertensão renovascular são baseados na mensuração das velocidades nas artérias renais e no índice renal-aorta (Engelhorn; Engelhorn; Pulling, 2004).

A avaliação da hemodinâmica hepática, pela dopplervelocimetria, é comumente realizada em pacientes com ascites inexplicadas, cirrose e hipertensão portal. Além disso, esse método também é utilizado para averiguação da perviabilidade e função do desvio protossistêmico transjugular intra-hepático e acompanhamento de pacientes que se submeteram a transplante hepático (Kruskal *et al.*, 2004).

A utilização da ultrassonografia vascular com Doppler no diagnóstico das doenças vasculares tem sido ampliada nas últimas décadas, com a melhoria na sensibilidade do equipamento e com a utilização do mapeamento em cores do fluxo, sendo imprescindível nas avaliações das estenoses arteriais dos membros inferiores, insuficiência venosa, diagnóstico de trombose vascular e das estenoses das artérias carótídeas (Ishikura *et al.*, 1998; Scoutt; Lin; Kliwer, 2006).

Por meio do Doppler colorido transcraniano é possível estudar estenoses ou oclusões de artérias intracranianas, observar a evolução do vasoespasma em pacientes com hemorragia subaracnóidea, diagnosticar embolia cerebral, avaliar o sistema vertebrobasilar e a circulação cerebral de pacientes epiléticos e, finalmente, auxiliar no diagnóstico de morte encefálica (Voci; Carson, 2006).

OBJETIVO

Revisar os principais aspectos técnicos e parâmetros utilizados na dopplervelocimetria, com foco na correta aplicação da metodologia para garantir a precisão dos resultados em diferentes especialidades médicas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa, baseada em artigos científicos publicados nos últimos anos nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS. Foram selecionados estudos que abordam os fundamentos técnicos da dopplervelocimetria, incluindo o uso do ângulo de insonação, frequência de repetição do pulso, volume de amostra e filtro de parede, bem como os principais parâmetros hemodinâmicos aplicados na prática clínica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Metodologia Doppler

Para a aquisição dos parâmetros dopplervelocimétricos, é imprescindível o uso de metodologia correta para que se obtenham resultados precisos, evitando assim, equívocos nos resultados adquiridos. Aquisições dos parâmetros dopplervelocimétricos com erros na utilização do ângulo de insonação, filtro de parede e frequência de repetição do pulso (PRF), ocasionam resultados dopplervelocimétricos que podem conduzir a erros nas condutas clínicas. Portanto, para a aplicabilidade correta da dopplervelocimetria, é necessário conhecimento sobre ângulo de insonação, frequência de repetição do pulso (PRF), volume de amostra e filtro de parede.



Ângulo de insonação

Baseado na equação Doppler ($F_r - F_o = 2F_o.V.\cos \theta/C$), sabe-se que ângulos acima de 60° são inadequados para as avaliações dopplervelocimétricas (Gill, 1979) e, quando próximos a 90° , produzem artefatos tipo imagem em espelho, cujos registros não são adequados, principalmente para o cálculo do pico de velocidade sistólica. Assim, a possibilidade de se alinhar o transdutor com o vaso em 0° permite sinal dopplervelocimétrico ideal.

Devido à dificuldade técnica existente para a obtenção de ângulo de insonação 0° entre o transdutor e o vaso, ângulos entre 30° e 60° são usualmente empregados. Em 1995, Burns (1995) relatou que, para o cálculo da velocidade, a insonação do feixe acústico a 45° produz margem de erro de 9%. Porém, quando a correção do ângulo é feita para menos de 20° , os erros são insignificantes. Portanto, nos exames dopplervelocimétricos deve-se utilizar o menor ângulo de insonação possível, sendo contra-indicados ângulos de insonação acima de 60° .

Frequência de repetição do pulso (PRF)

O sinal Doppler, no Doppler pulsado, é constituído de amostras. A frequência na qual estas amostras são transmitidas pelo instrumento de Doppler pulsado é denominada frequência de repetição do pulso (PRF). A frequência máxima que pode ser detectada, também chamada frequência de Nyquist, é a metade do PRF. A frequência de Nyquist determina o limite no qual as velocidades de fluxo sanguíneo podem ser medidas pelo equipamento de Doppler pulsado. Quando as velocidades de fluxo sanguíneo são maiores que a frequência de Nyquist ocorre o aliasing. A ocorrência de aliasing impede as medidas corretas das velocidades e índices porque aparece como ondas espectrais partidas. Os fatores que podem evitar o aliasing são operar em frequência menor, ângulo de insonação maior, baixar a linha de base e aumentar o PRF (Taylor; Holland, 1990).

Volume de Amostra

Os sinais do efeito Doppler são obtidos por janela denominada volume de amostra. A escolha do volume de amostra depende do tipo do vaso no qual se quer obter as velocidades de fluxo sanguíneo. Para vasos mais largos utiliza-se volume de amostra maior. Por outro lado, em vasos mais estreitos utiliza-se volume de amostra menor. O importante é manter o volume de amostra no centro do vaso para evitar desordenamento indesejado das paredes do vaso (Da Costa *et al.*, 2005).

Filtro de Parede

Além de detectar movimentos do fluxo sanguíneo, os instrumentos Doppler também detectam movimentos adjacentes ao mesmo, que estão abaixo de determinado limite de frequência (Merrit, 2006). Estes sinais podem ocasionar artefato abaixo da linha de base da onda espectral. Para se evitar estes ruídos indesejáveis, utiliza-se filtro de parede. Burns (1995) relatou que os filtros de parede têm como função eliminar sinais provenientes do fluxo sanguíneo de baixa velocidade, que podem ocasionar interpretações errôneas no espectro Doppler. Entretanto, quando se utiliza filtro de parede muito alto, pode-se amputar o componente diastólico.

**Parâmetros dopplervelocimétricos**

Os principais parâmetros dopplervelocimétricos utilizados nas especialidades médicas são o pico de velocidade sistólica, velocidade diastólica final, velocidade média e os índices de resistência e pulsatilidade. O tempo de aceleração, apesar de não ser de uso rotineiro, tem a vantagem de ser ângulo independente. Tem sido utilizado nas avaliações das estenoses renais. Da Costa *et al.* (2005) publicaram a curva de normalidade do tempo de aceleração na artéria cerebral média fetal.

Pico de velocidade sistólica

Corresponde ao pico máximo da velocidade encontrado na sístole. Para sua aferição, é necessária a utilização de ângulos de insonação abaixo de 60°, valor aceitável para vasos de difícil aquisição e abaixo de 20°, para vasos de fácil aquisição, valor no qual os erros são considerados desprezíveis (Burns, 1995).

Velocidade diastólica final

Compreende a velocidade obtida no final da diástole. Para sua aquisição também é necessária a utilização de ângulos abaixo de 60° (Kruskal *et al.*, 2004).

Velocidade média

Corresponde a médias das velocidades durante todo o ciclo cardíaco.

Índice de resistência

Também chamado índice de Pourcelot, o índice de resistência corresponde à diferença entre a velocidade sistólica (VS) e a velocidade diastólica (VD), dividida pela velocidade sistólica (VS). O índice de resistência é relativamente ângulo independente, já que se trata de fórmula matemática. O ideal é que, para a aquisição do mesmo, se utilize ângulo de insonação abaixo de 60°.

Índice de pulsatilidade

Também chamado índice de Gosling e King, compreende a diferença entre a velocidade sistólica e a velocidade diastólica, dividida pela média das velocidades durante o ciclo cardíaco (VM). Este índice também é ângulo relativamente independente, já que se trata de fórmula matemática. Portanto, o ideal é que, para a aquisição do mesmo, também se utilize ângulo de insonação abaixo de 60°.

Tempo de aceleração

Em muitas situações, a velocidade de fluxo de uma artéria aumenta rapidamente na sístole, chegando ao pico máximo em poucos microssegundos após o início da contração ventricular. O tempo de aceleração é, portanto, o tempo do início da sístole até o pico sistólico (Zwiebel, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na atualidade, a dopplervelocimetria é amplamente utilizada nas especialidades



médicas, e, neste contexto, estão incluídas a avaliação da vitalidade fetal, anemia fetal, estudo das estenoses das artérias renais, doença arterial obstrutiva periférica, insuficiência venosa e detecção das modificações hemodinâmicas na hipertensão porta. A obtenção de resultados fidedignos dos parâmetros dopplervelocimétricos está intimamente associada ao uso correto da metodologia Doppler, implicando na realização de laudos corretos e condutas clínicas coerentes.

Palavras-chave: Amostra de Volume; Ângulo de Insonação; Dopplervelocimetria; Frequência de Repetição do Pulso; Princípios Físicos Doppler.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCÁZAR, J. L.; CASTILLO, G.; MÍNGUEZ, J. Á.; GALÁN, M. J. Endometrial blood flow mapping using transvaginal power Doppler sonography in women with postmenopausal bleeding and thickened endometrium. **Ultrasound in Obstetrics & Gynecology**, v. 21, p. 583–588, 2003.

BASCHAT, A. A.; GEMBRUCH, U.; REISS, I.; GÖRTNER, L.; WEINER, C. P.; HARMAN, C. R. Relationship between arterial and venous Doppler and perinatal outcome in fetal growth restriction. **Ultrasound in Obstetrics and Gynecology**, v. 16, p. 407–413, 2000.

BHATT, S.; DOGRA, V. S. Doppler imaging of the uterus and adnexae. **Ultrasound Clinics**, v. 1, p. 201–221, 2006.

BURNS, P. N. Hemodynamics. In: TAYLOR, K. J. W.; BURNS, P. N.; WELLS, P. N. T., editors. *Clinical Applications of Doppler Ultrasound*. 2. ed. New York: **Raven Press**, 1995. p. 35–98.

DA COSTA, A. G.; MAUAD FILHO, F.; SPARA, P.; BARRETO GADELHA, E.; VIEIRA SANTANA NETTO, P. Fetal hemodynamics evaluated by Doppler velocimetry in the second half of pregnancy. **Ultrasound in Medicine & Biology**, v. 31, p. 1023–1030, 2005.

DUBIEL, M.; GUNNARSSON, G. Ö.; GUDMUNDSSON, S. Blood redistribution in the fetal brain during chronic hypoxia. **Ultrasound in Obstetrics and Gynecology**, v. 20, p. 117–121, 2002.

ENGELHORN, C. A.; ENGELHORN, A. L.; PULLIG, R. O papel da ultra-sonografia vascular com Doppler colorido na avaliação da hipertensão reno-vascular: acurácia da técnica direta de avaliação das artérias renais. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 82, p. 473–476, 2004.

GILL, R. W. Pulsed Doppler with B-mode imaging for quantitative blood flow measurement. **Ultrasound in Medicine & Biology**, v. 5, p. 223–235, 1979.

ISHIKURA, FUMINOBU; MATSUWAKA, RYOUSUKE; SAKAKIBARA, TETSUO; SAKATA, YASUHIKO; HIRAYAMA, ATSUSHI; KODAMA, KAZUHISA. Clinical application of power Doppler imaging to visualize coronary arteries



in human beings. **Journal of the American Society of Echocardiography**, v. 11, p. 219–227, 1998 .

KRUSKAL, J. B.; GRANT, E. G.; LEE, D. H.; MILLENER, P.; TESSLER, F. N.; PERRELLA, R. R.; RAGAVENDRA, N.; BUSUTTIL, R. Optimizing Doppler and color flow US: application to hepatic sonography. **Radiographics**, v. 24, p. 657–675, 2004.

MARI, G.; ZIMMERMANN, R.; MOISE, K. J. Jr.; DETER, R. L. Increase of fetal hematocrit decreases the middle cerebral artery peak systolic velocity in pregnancies complicated by rhesus alloimmunization. **Journal of Maternal-Fetal Medicine**, v. 6, p. 206–208, 1997.

MARI, G.; DETER, R. L.; CARPENTER, R. L.; RAHMAN, F.; ZIMMERMAN, R.; MOISE, K. J. Jr.; DORMAN, K. F.; LUDOMIRSKY, A.; GONZALEZ, R.; GOMEZ, R.; OZ, U.; DETTI, L.; COPEL, J. A.; BAHADO-SINGH, R.; BERRY, S.; MARTINEZ-POYER, J.; BLACKWELL, S. C. Middle cerebral artery peak systolic velocity: technique and variability. **Journal of Ultrasound in Medicine**, v. 24, p. 425–430, 2005 .

MERRITT, C. R. B. Física do ultra-som. In: RUMACK, C. M.; WILSON, S. R.; CHARBONEAU, J. W., editors. *Tratado de Ultra-Sonografia Diagnóstica*. 3. ed. Rio de Janeiro: **Elsevier**, 2006. p. 3–34.

SCHEIER, M.; HERNANDEZ-ANDRADE, E.; CARMO, A.; DEZERECA, V.; NICOLAIDES, K. H. Prediction of fetal anemia in rhesus disease by measurement of fetal middle cerebral artery peak systolic velocity. **Ultrasound in Obstetrics & Gynecology**, v. 23, p. 432–436, 2004.

SCOUTT, L. M.; LIN, F. L.; KLIEWER, M. Waveform analysis of the carotid arteries. **Ultrasound Clinics**, v. 1, p. 133–159, 2006.

TAYLOR, K. J.; HOLLAND, S. Doppler US. Part I. Basic principles, instrumentation, and pitfalls. **Radiology**, v. 174, n. 2, p. 297–307, 1990.

VOCI, S. L.; CARSON, N. Ultrasound of the intracranial arteries. **Ultrasound Clinics**, v. 1, n. 1, p. 161–181, 2006.

ZIMMERMANN, R.; DURIG, P.; CARPENTER, R. L.; MARI, G. Longitudinal measurement of peak systolic velocity in the fetal middle cerebral artery for monitoring pregnancies complicated by red cell alloimmunisation: a prospective multicentre trial with intention-to-treat. **BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology**, v. 109, p. 746–752, 2002.

ZWIEBEL, W. J. Análise de espectro de frequência Doppler. In: ZWIEBEL, W. J., editor. *Introdução à Ultra-Sonografia Vascular*. 4. ed. Rio de Janeiro: **Revinter**, 2003. p. 36–48.



CONTRIBUIÇÃO DA ECOGRAFIA NA AVALIAÇÃO DA PLACENTA

¹Antonio Gadelha da Costa
²Rafaela Quinto da Costa Melo
³Simon de Lima Silva
⁴Ana Cecília Falcão Victor
⁵Patrícia Spara Gadelha

¹Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil; ² Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil; ³Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil, ⁴ Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil, ⁵ Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo: A placenta, juntamente com seus anexos, é sabidamente uma estrutura essencial ao feto, pois permite todas as trocas nutritivas materno-ovulares. A ultra-sonografia, nos dias atuais, passou a incluir uma avaliação minuciosa da placenta como parte da rotina deste exame, desde o primeiro trimestre. Além de se determinar a localização e a espessura placentária, podemos analisar sua diversidade, morfologia e função, o que só era possível, antes do advento da ultra-sonografia, após seu delivramento. E mais, hoje também há a possibilidade de se examinar detalhadamente suas características morfológicas e funcionais, com impacto significativo no seguimento de gestações de baixo e alto risco e conseqüentemente no prognóstico fetal. Neste artigo, os autores discutem os aspectos ecográficos normais e as principais patologias relacionadas à placenta.

INTRODUÇÃO

Na obstetrícia clássica, enfatizava-se a importância do estudo cuidadoso da placenta e seus anexos após o seu delivramento. Até o advento da ultra-sonografia, a avaliação da diversidade, morfologia e função placentária só eram possíveis in vitro (Jauniaux, Ramsay; Campbell, 1994; Kuhlmann; Warsof, 1996), após a resolução da gravidez. Nos dias atuais, faz parte da rotina de avaliação pré-natal (Kuhlmann; Warsof, 1996).

A placenta pode ser visualizada na gestação inicial entre 7 e 9 semanas pela via transabdominal e em torno de 6 semanas pela via transvaginal. Nessa fase, é identificada como espessamento ecogênico da reação decidual. A partir do final do 1º trimestre e início do 2º trimestre, a placenta é identificada com textura homogênea, de ecogenicidade aumentada e com nítida definição em relação ao miométrio hipoecóico. A face placentária em contato com o miométrio é chamada de placa basal e a face fetal da placenta é denominada placa corial (Grannum; Hobbins, 1982).

Com a evolução da gestação, depósitos hiperecogênicos, possivelmente calcificações, áreas hipoecóicas ou anecóicas, e irregularidades na placa corial são achados habituais. Essas mudanças são idade gestacional dependentes e serviram de base para a classificação proposta por Grannum et al. (1979), em graus zero, I, II e III.

O grau zero é caracterizado como placenta com parênquima finamente granular e homogêneo. A placa corial é lisa e linear. A placa basal é homogênea e tem a mesma textura do restante da placenta. É achado predominante no primeiro e segundo trimestres. O grau I é a primeira manifestação de alteração de textura, com aparecimento de pontos



hiperrecogênicos de distribuição difusa na massa placentária e discretas ondulações da placa corial. A placa basal apresenta-se ainda destituída de calcificações.

No grau II, há aumento nas ondulações da placa corial, presença de calcificações em forma de vírgula, delimitando incompletamente o cotilédone e calcificações lineares aparecendo na placa basal. O grau III apresenta septo hiperrecogênico ligando a placa corial até a basal, dividindo a placenta em compartimentos ou cotilédones. Este achado não é garantia de maturidade pulmonar fetal (Hata *et al.*, 2004). Por outro lado, gestações que apresentam placenta grau III em idade gestacional entre 34 e 36 semanas têm riscos aumentados para complicações no trabalho de parto e esses recém nascidos têm riscos aumentados para baixo peso, insuficiência placentária e óbito perinatal (Proud; Grant, 1987).

Nesse artigo serão discutidos os aspectos ecográficos normais e as principais patologias que envolvem a placenta

OBJETIVO

Analisar os aspectos ecográficos normais e patológicos da placenta, destacando a importância da avaliação ultrassonográfica na monitorização de gestações de baixo e alto risco.

METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma revisão narrativa de caráter descritivo e qualitativo, baseada na literatura científica sobre ultrassonografia obstétrica, com ênfase na avaliação placentária. Foram incluídos artigos publicados nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS, selecionados conforme relevância clínica e metodológica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Formatos anormais de placenta

Formatos anormais da placenta ocorrem secundariamente à involução incompleta das vilosidades coriônicas em torno do saco gestacional (Fox, 1978). São descritos lobo acessório ou placenta sucenturiada placenta membranácea e placenta extracorial.

O achado de lobo acessório é freqüente e a sua identificação é importante, pois há risco de hemorragia e infecção puerperal caso este lobo não seja removido junto com o corpo principal. Este risco também existe durante o trabalho de parto, por ruptura de vasos que conectam o lobo acessório à placenta principal (Seleye-Fubara; Akani, 2005). A placenta membranácea é uma condição rara, caracterizada pela distribuição de tecido placentário em praticamente toda a superfície do útero. A espessura é anormalmente delgada, entre 1 e 2 cm, e está freqüentemente associada a sangramento, placenta prévia, trabalho de parto pré-termo e placenta acreta (Kuhlmanm; Warsof, 1996).

Placenta extracorial ocorre quando a placa corial não se estende até a margem placentáriaou. Há dois tipos de placenta extracorial: circummarginada, quando as membranas formam um anel plano no local da inserção membranosa, e circunvalada, quando há formação de pregas espessas no local da inserção membranosa. As placentas circummarginadas não apresentam manifestações clínicas (Fox, 1978). As placentas circunvaladas podem apresentar risco elevado de sangramento, ameaça de aborto e trabalho de parto pré-termo (Shen et al., 2007).



Localização da placenta

A placenta pode se implantar em qualquer local na cavidade uterina. A sua localização precisa é importante nos casos de sangramentos e também quando se torna necessária a realização de procedimentos invasivos como amniocentese, cordocentese e biópsia de vilos coriônicos. A ultra-sonografia detecta com precisão a placenta prévia, conforme a localização da placenta em relação ao orifício interno do canal cervical. Assim, a placenta prévia é classificada em prévia total ou completa, prévia parcial ou incompleta, prévia marginal (Pritchard; MacDonald; Gant, 1986).

Na placenta prévia do tipo completa, a placenta cobre totalmente o orifício cervical. Na prévia incompleta, essa cobertura é parcial e na prévia marginal a borda inferior da placenta alcança a margem do orifício cervical interno. É conveniente que a suspeita diagnóstica de placenta prévia, feita no 1º e 2º trimestres, seja confirmada no 3º trimestre. A placenta visualizada como prévia ou inserção baixa no 1º e 2º trimestres chamamos de placenta heterotópica, em oposição à placenta normalmente inserida, a qual chamamos de tópica. Clinicamente, a placenta prévia manifesta-se com sangramento uterino indolor. Várias situações clínicas estão associadas, tais como idade materna avançada, multiparidade, cesárea anterior, leiomioma, infecção uterina, gestação múltipla (Clark; Kooning; Phelan, 1985).

A ultra-sonografia transvaginal é importante para a confirmação diagnóstica, pois apresenta melhor acurácia que a via transabdominal (Heer; Muller; Strauss, 2006). Alguns fatores contribuem para falsos diagnósticos por essa via: hiperdistensão da bexiga, associada à rotação do útero, placenta de inserção lateral e cortes sonográficos para-sagitais (Araujo et al., 2006).

Tumores Placentários não Trofoblásticos:

Tumores primários da placenta são pouco freqüentes. Sendo os principais o teratoma e o corioangioma, também chamado de hemangioma placentário. O teratoma é tumor benigno extremamente raro, não associado a malformações congênitas nos fetos. As características ecográficas que o diferenciam de outros tumores placentários não são bem descritas na literatura (Ahmed et al., 2004). O corioangioma é o mais freqüente tumor benigno que acomete a placenta, com incidência aproximada de 1% em todas as gestações (Garcia et al., 2005). As manifestações clínicas são raras e geralmente associadas a grandes tumores, maiores que 5 cm de diâmetro.

À ultra-sonografia, essa lesão é bem circunscrita e tem ecogenicidade diferente do restante da placenta. Grandes tumores podem ter formas variáveis, apresentarem septos fibrosos e geralmente protruem para a cavidade amniótica a partir da superfície fetal, próximo da inserção do cordão umbilical (Fox, 1978). O uso do Doppler colorido auxilia no diagnóstico, pois essas lesões podem ser indistinguíveis de outros achados não tumorais ao ultra-som em escala de cinzas. Têm sido relatado ou abundante fluxo no interior do tumor ou vaso único alimentando a lesão (Prapas et al., 2000; Zalel et al., 2002).

Cistos placentários

Cistos placentários são freqüentemente encontrados na placenta. São chamados de cistos septais aqueles localizados no interior do tecido placentário, e cistos sub-coriônicos



quando localizados na face fetal da placenta, sob os vasos coriônicos. Geralmente são únicos, arredondados ou ovalados e contém material gelatinoso. Apresentam ausência de fluxo ao mapeamento Doppler colorido. A sua incidência está elevada no diabetes e na isoimunização RH (Hata et al., 2004).

Hematomas subamnióticos

Hematomas subamnióticos são lesões secundárias à ruptura de vasos fetais antes ou durante o trabalho de parto e localizam-se abaixo da membrana amniótica, na face fetal da placenta. A ultra-sonografia mostra massa ecogênica única, protruindo da placa fetal e recoberta por fina membrana. O coágulo recente é ecogênico, porém com a resolução torna-se hipocóico. O estudo Doppler evidencia ausência de fluxo na lesão. Caso ocorra no 2º e 3º trimestres, pode levar à restrição de crescimento fetal e alterações nos parâmetros dopplervelocimétricos (Hata et al., 2004).

Tromboses intervilosas

Tromboses intervilosas são lesões resultantes da coagulação focal do sangue no espaço interviloso, geralmente no último trimestre da gestação. A trombose pode ser encontrada em 40% das placentas e contém mistura de sangue fetal e materno. A sua incidência está elevada na isoimunização RH. A ultra-sonografia evidencia lesões anecóicas ou hipocóicas de tamanhos variados e com fluxo turbulento ao Doppler (Hata et al., 2004).

Infartos placentários

Os infartos placentários resultam da obstrução de ramos arteriais útero-placentários, levando à degeneração focal do tecido viloso. Pequenos infartos são encontrados em 25% das placentas normais, enquanto comprometimentos mais extensos estão associados às síndromes hipertensivas (Hata et al., 2004).

Placenta e Membranas nas Gestações Gemelares

A determinação da corionicidade na gestação gemelar é importante devido às complicações fetais que podem acometer as gestações monocoriônicas, como a síndrome da transfusão feto-fetal. Uma gestação dizigótica é resultado da fertilização de dois óvulos distintos por dois espermatozóides, funcionando como duas gestações se desenvolvendo juntas, cada uma com a sua placenta e seu saco amniótico. Então, uma gestação dizigótica é dicoriônica e diamniótica.

Uma gestação monozigótica é resultado da divisão de um óvulo fertilizado por um único espermatozóide. Dependendo da fase em que ocorrer a divisão, poderemos ter gêmeos monozigótico dicoriônico e diamniótico (divisão precoce, 4 dias após a fertilização) ou monocoriônico e diamniótico (divisão entre o 4º e o 8º dia após a fertilização). Se a divisão ocorrer quando o âmnio estiver formado (em torno do 8º dia após a fertilização) formarão dois embriões em saco amniótico único, ou seja, monocoriônico e monoamniótico. Se a divisão é posterior, depois de formado o disco embrionário, se faz de modo incompleto e formarão os gêmeos siameses.

A visualização de duas placentas separadas confirma o diagnóstico de gestação dicoriônica. Mesmo placenta aparentemente única pode ser dicoriônica se elas estiverem



acoladas. Nas gestações diamnióticas com placenta aparentemente única, podem ser mono ou dicoriônica. A avaliação das membranas pode auxiliar na diferenciação (Hertzberg; Kurtz; Choi, 1987; Shetty; Smith, 2005). As gestações monocoriônicas/diamnióticas apresentam a membrana com apenas duas camadas de âmnios, enquanto as dicoriônicas/diamnióticas apresentam dois âmnios e duas camadas de córion. Um achado de membrana espessa sugere duas placentas, enquanto uma membrana fina sugere placenta única.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo ecográfico da placenta é possível em quase todas as fases da gestação e possibilita, ao médico e a paciente, a avaliação de vários aspectos morfológicos e funcionais. A constatação ecográfica de anormalidades na placenta serve como guia para tratamentos e procedimentos que visem à correção de tais eventos. A avaliação funcional da placenta auxilia no diagnóstico de estados hipóxicos, que podem causar danos, sobrejacentes a gravidez, ao feto. Por outro lado, a avaliação morfológica da placenta pode evitar complicações no transcorrer da gestação e na hora do parto. A avaliação ultra-sonográfica mostra-se como fator de extrema importância para o desenrolar de uma gravidez normal com desenvolvimento adequado do feto e desfecho sem complicações para a paciente.

Palavras-chave: Crescimento Fetal; Placenta; Ultra-sonografia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAUJO J. E.; FILHO, H. A.; PIRES, C. R.; ZANFORLIN FILHO, S. M.; MORON, A. F. Prenatal diagnosis of vasa previa through color Doppler and three-dimensional power Doppler ultrasonography: a case report. **Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology**, v. 33, p. 122–124, 2006.

AHMED, N.; KHALIL, H.; ALI, S.; SALEM, S. Sonographic diagnosis of placental teratoma. **Journal of Clinical Ultrasound**, v. 32, p. 98–101, 2004.

CLARK, S. L.; KOONING, P. P.; PHELAN, J. P. Placenta previa/accreta and prior cesarean section. **Obstetrics and Gynecology**, Chicago, v. 66, p. 89, 1985.

FOX, H. Pathology of the placenta. **Major Problems in Pathology**, v. 7, p. 343–348, 1978.

GARCÍA-FLORES, J.; PÉREZ-LÓPEZ, R.; MARTÍNEZ-CASTAÑEDA, R.; LÓPEZ-HERNÁNDEZ, M. Giant chorioangioma: presentation of a case. **Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social**, v. 43, p. 503–506, 2005.

GRANNUM, P. A. T.; BERKOWITZ, R. L.; HOBBS, J. C. The ultrasonic changes in the maturing placenta and their relation to fetal pulmonary maturity. **American Journal of Obstetrics and Gynecology**, v. 133, p. 915–922, 1979.

HATA, T.; KANENISHI, K.; INUBASHIRI, E.; TANAKA, H.; SENO, D.; MANABE, A.; MIYAKE, K.; KONDOH, S.; HATA, T. Three-dimensional sonographic features of placental abnormalities. **Gynecologic and Obstetric Investigation**, v. 57, p. 61–65, 2004.



HEER, I. M.; MÜLLER-EGLOFF, S.; STRAUSS, A. Placenta praevia—comparison of four sonographic modalities. **Ultraschall in der Medizin - European Journal of Ultrasound**, v. 27, p. 355-359, 2006.

HERTZBERG, B.S.; KURTZ, A.B.; CHOI, H.Y.; KACZMARCZYK, J.M.; WARREN, W.; WAPNER, R.J.; NEEDLEMAN, L.; BALTAROWICH, O.H.; PASTO, M.E.; RIFKIN, M.D. Significance of membrane thickness in the sonographic evaluation of twin gestations. **American Journal of Roentgenology**, v. 148, p. 151- 153, 1987.

JAUNIAUX, E.; RAMSAY, B.; CAMPBELL, S. Ultrasonographic investigation of placental morphologic characteristics and size during the second trimester of pregnancy. **American Journal of Obstetrics and Gynecology**, v. 170, p. 130-137, 1994.

KUHLMANN, R. S.; WARSOFF, S. Ultrasound of the placenta. **Clinical Obstetrics and Gynecology**, v. 39, p. 519-534, 1996.

PRAPAS, N.; NIKOLAIDIS, A. K.; PAPANTONIOU, N.; TZAVARA, I.; KOUMANTAKIS, E. Color Doppler imaging of placental masses: differential diagnosis and fetal outcome. **Ultrasound in Obstetrics and Gynecology**, v. 16, p. 559–563, 2000.

PRITCHARD, J.; MCDONALD, P.; GANT, N. Placenta y membranas fetales. **Williams Obstetricia**. 21. Ed. Barcelona: Editorial Salvat, 1986.

PROUD, J.; GRANT, A. M. Third trimester placental grading by ultrasonography as a test of fetal wellbeing. **British Medical Journal (Clinical Research Edition)**, v. 294, n. 6588, p. 1641-1644, 1987.

SELEYE-FUBARA, D.; AKANI, C. I. Succenturiate placenta: a rare variant in Rivers State Nigeria (a report of one case). **Nigerian Journal of Medicine: Journal of the National Association of Resident Doctors of Nigeria**, v. 14, p. 325-326, 2005.

SHEN, O.; *et al.* Placental shelf—a common, typically transient and benign finding on early second-trimester sonography. **Ultrasound in Obstetrics and Gynecology**, v. 29, n. 2, p. 192-194, 2007.

SHETTY, A.; SMITH, A.P.M. The sonographic diagnosis of chorionicity. Prenatal Diagnosis: Published in Affiliation With the International Society for Prenatal **Diagnosis**, v. 25, p. 735-739, 2005.



IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACOGENÔMICOS LIDERADOS POR FARMACÊUTICOS: SÍNTESE GLOBAL DE EVIDÊNCIAS, BENEFÍCIOS CLÍNICOS E LACUNAS REGIONAIS

¹Maria Gabriela Gomes da Silva

²Maria Julia Liberal Vêras Mendonça

³Ana Patrícia Silva de Oliveira Santos

^{1,2,3}Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brasil.

Área temática: Farmácia

Resumo: A farmacogenômica (PGx) desponta como eixo fundamental da medicina personalizada, possibilitando adequar fármacos ao perfil genético; mais de 80 % da população carrega variantes clinicamente acionáveis. Farmacêuticos, pelos conhecimentos em farmacocinética/dinâmica e alcance comunitário, são candidatos naturais à liderança de serviços de PGx. Este estudo objetivou sintetizar evidências publicadas entre 2015-2025 sobre intervenções farmacêuticas em PGx, mapeando benefícios clínicos, barreiras e lacunas regionais para subsidiar políticas de capacitação e implantação. Realizaram-se buscas sistematizadas em PubMed, Web of Science, SciELO e LILACS, selecionando ensaios, estudos de intervenção, coortes e inquéritos originais em acesso aberto que descrevessem prática farmacêutica em PGx; revisões e artigos opinativos foram excluídos. Foram incluídos onze estudos provenientes, sobretudo, da América do Norte, Europa e Ásia. Resultados confirmam impacto clínico: ensaio canadense reportou reduções superiores de sintomas depressivos/ansiosos guiadas por PGx; genotipagem holandesa identificou variantes acionáveis em 99,2 % dos pacientes, gerando recomendações de evitar ou ajustar fármacos em 32 %; estudo suíço mostrou implementação de ao menos uma recomendação em 69 % dos usuários. Todavia, persistem barreiras transversais – conhecimento insuficiente, baixa autoconfiança, falta de reembolso e infraestrutura de TI – e diferenças regionais marcantes: China, Malásia e Emirados Árabes relatam competência percebida insatisfatória, enquanto América do Sul, América Central, África e Oceania carecem de estudos originais, constituindo lacuna crítica. Conclui-se que, embora farmacêuticos possuam potencial comprovado para personalizar terapias via PGx, a consolidação global do serviço exige pesquisa multicêntrica nas regiões sub-representadas, investimentos em educação continuada, integração tecnológica e modelos remuneratórios sustentáveis.

INTRODUÇÃO

A farmacogenômica (PGx) desponta como uma ferramenta essencial para a medicina personalizada, permitindo a adaptação de terapias em função do perfil genético do paciente e, assim, otimizando eficácia, segurança e adesão terapêutica. Estima-se que mais de 80 % da população possua variantes clinicamente acionáveis que influenciam a resposta a, pelo menos, um medicamento prescrito (Wondrasek et al., 2024). Dentro desse cenário, os farmacêuticos se destacam por sua expertise em farmacocinética e farmacodinâmica, bem como pela capilaridade em distintos níveis de atenção, posicionando-os como agentes estratégicos para a implementação de serviços de PGx em farmácias comunitárias e ambulatórios hospitalares (Papastergiou et al., 2021; Luke et al., 2021). Evidências recentes demonstram que tais serviços, quando conduzidos por farmacêuticos, resultam em impactos



clínicos mensuráveis, como reduções superiores de sintomas depressivos, ajustes posológicos precisos e elevada taxa de aceitação de recomendações por médicos prescritores (Papastergiou et al., 2021; Thornley et al., 2021).

Apesar desse potencial, revisões e estudos multicêntricos apontam lacunas persistentes de conhecimento, autoconfiança e infraestrutura, bem como barreiras regulatórias e de reembolso que dificultam a consolidação da prática em diversos países (Hu et al., 2022; Ramadan et al., 2024; Jeiziner et al., 2023; Wiss et al., 2024). Em regiões como América do Sul, África e Oceania, a escassez de pesquisas originais que avaliem intervenções clínicas lideradas por farmacêuticos evidencia um hiato na literatura, sugerindo necessidade de investimento em estudos locais. Dessa forma, compreender de forma abrangente o estado atual da implementação da PGx por farmacêuticos é crucial para orientar políticas de formação, elaboração de diretrizes e alocação de recursos tecnológicos.

OBJETIVO

Este estudo tem por objetivo sintetizar as evidências publicadas entre 2021 e 2024 sobre a atuação de farmacêuticos na implementação de serviços de farmacogenômica em diversos continentes, identificando benefícios clínicos, barreiras e facilitadores, bem como lacunas regionais de pesquisa, a fim de subsidiar estratégias de capacitação profissional e de integração da PGx à prática farmacêutica.

METODOLOGIA

Foram formuladas estratégias de busca em inglês e português (e.g., “pharmacogenomics pharmacist clinical practice”). Critérios de inclusão: artigos originais (ensaios clínicos, coortes, estudos de intervenção, surveys ou qualitativos) com descrição da atuação farmacêutica em PGx, publicados em acesso aberto entre 2015–2025. Estudos de revisão ou opinativos foram excluídos. As bases consultadas incluíram PubMed, SciELO, LILACS e Web of Science. Cada artigo selecionado foi revisado quanto ao contexto, país e principais achados, e então alocado conforme o continente do estudo. Citamos integralmente todas as fontes utilizadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estudos internacionais revela que a implementação de serviços de farmacogenômica (PGx) por farmacêuticos, especialmente em ambientes comunitários, tem potencial para contribuir de forma expressiva para a individualização terapêutica, embora obstáculos significativos persistam. De modo geral, observa-se que farmacêuticos e estudantes de farmácia demonstram percepções e atitudes majoritariamente positivas em relação à farmacogenômica, porém apresentam conhecimento e autoconfiança insuficientes para uma atuação clínica robusta, situação documentada em revisão sistemática abrangendo mais de 12 mil participantes de 26 países (Wondrasek et al., 2024).

Na América do Norte, além de evidências de efetividade clínica, como no Canadá, onde a adoção de serviços de PGx liderados por farmacêuticos resultou em benefícios clínicos mensuráveis e maior aceitação de recomendações por parte de prescritores, destaca-se que fatores internos — como autoconfiança, identidade profissional e percepção dos benefícios clínicos — e externos, especialmente suporte institucional e fluxo de trabalho adequado, são decisivos para a implementação sustentável do serviço (Luke et al., 2021).

No contexto europeu, dados oriundos da Suíça evidenciam viabilidade e benefícios da PGx em farmácias comunitárias, com 69% dos pacientes tendo ao menos uma recomendação implementada (Jeiziner et al., 2023), embora barreiras recorrentes — como



ausência de diretrizes claras, insuficiência de reembolso, deficiências tecnológicas e lacunas de conhecimento — ainda impeçam a consolidação plena do serviço, sendo identificadas e priorizadas estratégias para superação desses entraves (Wiss et al., 2024). Na Holanda, a genotipagem identificou variantes acionáveis em 99,2% dos pacientes, gerando recomendações clínicas relevantes, com farmacêuticos relatando maior confiança operacional do que na interpretação clínica, aspecto que reforça a necessidade de treinamento direcionado (Thornley et al., 2021).

Em países asiáticos, verifica-se um cenário de interesse crescente, porém ainda marcado por deficiências educacionais e de capacitação: na China, embora 59% dos farmacêuticos clínicos já tenham participado de serviços relacionados à PGx, cerca de 60% avaliam sua competência como insatisfatória (Hu et al., 2022); nos Emirados Árabes Unidos, tanto conhecimento quanto atitude são majoritariamente inadequados, com alta carga de trabalho sendo apontada como um fator limitante para atualização e integração de novos serviços (Ramadan et al., 2024); na Malásia, apesar de 76% apresentarem conhecimento apenas moderado, 94% manifestam percepção positiva e 93% interesse em treinamento adicional, sendo que a maioria não teve contato prévio com PGx durante a formação acadêmica (Naimat et al., 2022); de modo semelhante, na Arábia Saudita, apenas 33% dos farmacêuticos demonstraram bom conhecimento, sendo a deficiência formativa um entrave reconhecido (Alrabiah et al., 2023).

Ressalta-se que, para América do Sul, América Central, África e Oceania, não foram identificados estudos originais de acesso aberto que detalhem intervenções clínicas conduzidas por farmacêuticos, evidenciando lacunas substanciais na produção científica dessas regiões (Maruf; Aziz, 2023). Em síntese, os dados corroboram que farmacêuticos podem implementar serviços de PGx com impacto positivo na personalização da farmacoterapia e na redução de eventos adversos, porém desafios estruturais — como a ausência de políticas de reembolso, limitações tecnológicas e falta de capacitação específica — continuam a restringir a integração plena desses serviços à prática clínica. Para que o potencial da farmacogenômica se traduza em benefício clínico efetivo, é imprescindível investir em formação continuada, desenvolvimento de sistemas informatizados integrados, reconhecimento remuneratório da atividade e fortalecimento da colaboração multidisciplinar, conforme amplamente destacado na literatura internacional recente

CONCLUSÃO

A ausência de estudos originais avaliando a atuação clínica do farmacêutico em farmacogenômica na América do Sul, América Central, África e Oceania representa uma lacuna significativa para o avanço da prática baseada em evidências e para a formulação de políticas públicas adequadas nessas regiões. Essa carência dificulta não apenas a compreensão do impacto real da implementação da PGx na rotina farmacêutica, mas também limita o desenvolvimento de estratégias de capacitação e de integração desses serviços nos sistemas de saúde locais.

Sem dados contextuais robustos, perpetuam-se incertezas quanto à aplicabilidade, aos resultados clínicos e aos desafios específicos enfrentados por farmacêuticos nesses continentes, restringindo a adoção de medidas adaptadas às necessidades regionais. Diante desse cenário, torna-se imperativo o fomento a pesquisas originais e multicêntricas que considerem as particularidades epidemiológicas, sociais e estruturais de cada contexto, de modo a preencher as lacunas existentes, ampliar o corpo de evidências e permitir que a farmacogenômica, de fato, contribua para a personalização da terapêutica e para o fortalecimento do cuidado farmacêutico em escala global.



Palavras-chave: Farmacogenômica; Implementação; Medicina Personalizada; Serviços Farmacêuticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MARUF, Abdullah Al; AZIZ, Md Abdul. The potential roles of pharmacists in the clinical implementation of pharmacogenomics. **Pharmacy**, v. 11, n. 6, p. 180, 2023.

ALRABIAH, Z. *et al.* Clinical knowledge, attitude, and perceptions of community pharmacists towards pharmacogenomics – a cross-sectional study from Saudi Arabia. **Pharmacogenomics and Personalized Medicine**, [S.l.], v. 16, p. 433-441, 2023. DOI: 10.2147/PGPM.S403655.

HU, X. *et al.* Clinical pharmacists' involvement in pharmacogenomics testing and related services in China. **Journal of Personalized Medicine**, Basel, v. 12, art. 1267, 2022. DOI: 10.3390/jpm12081267.

JEIZINER, C.; MEYER ZU SCHWABEDISSEN, H. E.; HERSBERGER, K. E.; ALLEMANN, S. S. Pharmacogenetic testing and counselling in the community pharmacy: mixed-methods study of a new pharmacist-led service. **International Journal of Clinical Pharmacy**, [S.l.], v. 45, p. 1378-1386, 2023. DOI: 10.1007/s11096-023-01596-8.

LUKE, M. J. *et al.* Pharmacists as Personalized Medicine Experts (PRIME): experiences implementing pharmacist-led pharmacogenomic testing in primary care practices. **Pharmacy**, Basel, v. 9, n. 4, art. 201, 2021. DOI: 10.3390/pharmacy9040201.

NAIMAT, F. *et al.* Community pharmacists' perceived value on precision medicine, desired training components, and exposure during pharmacy education: Malaysia's experience. **Frontiers in Pharmacology**, Lausanne, v. 13, art. 978141, 2022. DOI: 10.3389/fphar.2022.978141.

PAPASTERGIOU, J. *et al.* Pharmacogenomics guided versus standard antidepressant treatment in a community pharmacy setting: a randomized controlled trial. **Clinical and Translational Science**, Hoboken, v. 14, e12986, 2021. DOI: 10.1111/cts.12986.

RAMADAN, A.; JARAB, A. S.; AL MESLAMANI, A. Z. Investigation of community pharmacists' knowledge and attitudes of pharmacogenomics testing: implication for improved pharmacogenomic testing practice. **Human Genomics**, [S.l.], v. 18, art. 8, 2024. DOI: 10.1186/s40246-024-00574-z.

THORNLEY, T. *et al.* Implementation of a pharmacogenomic testing service through community pharmacy in the Netherlands: results from an early service evaluation. **Pharmacy**, Basel, v. 9, n. 1, art. 38, 2021. DOI: 10.3390/pharmacy9010038.

WISS, F. M. *et al.* Overcoming barriers: strategies for implementing pharmacist-led pharmacogenetic services in Swiss clinical practice. **Genes**, Basel, v. 15, n. 7, art. 862, 2024. DOI: 10.3390/genes15070862.

WONDRASEK, A. *et al.* Knowledge, perceptions and attitudes toward pharmacogenomics among pharmacists and pharmacy students: a systematic review. **Health Science Reports**, [S.l.], v. 7, e1844, 2024. DOI: 10.1002/hsr2.1844.



PROMOÇÃO DA SAÚDE NO ENVELHECIMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA COM GRUPOS DE IDOSOS EM IGREJAS PRESBITERIANAS

Ana Gonçalves Lima Neta

Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil
(anagoncalves.noronha@gmail.com)

Área temática: Saúde Coletiva

Resumo: Este trabalho relata a experiência da realização de palestras educativas voltadas ao público idoso em duas igrejas presbiterianas, com foco em força muscular e envelhecimento bem-sucedido. As ações ocorreram em 2025, em Campina Grande (PB), com mediação de uma doutoranda em Fisioterapia. Participaram majoritariamente mulheres com mais de 60 anos, vinculadas a departamentos da terceira idade. Na primeira intervenção, abordou-se a “Manutenção da força muscular no envelhecimento”, destacando a importância da atividade física e estratégias para prevenir a sarcopenia. Foram aplicados o teste de sentar e levantar em 30 segundos e exercícios resistidos de forma prática. A segunda palestra, intitulada “Envelhecer com saúde e propósito”, explorou aspectos biopsicossociais do envelhecimento ativo, incluindo autonomia, espiritualidade, conexões sociais e sentido de vida. Ambas as ações utilizaram linguagem acessível, recursos audiovisuais e momentos de interação com o público. Observou-se participação ativa, com relatos positivos sobre a aplicabilidade dos conteúdos e elevado interesse pelos temas. A experiência evidenciou que espaços religiosos são ambientes propícios para ações educativas em saúde, favorecendo escuta ativa, integração social e engajamento. Além disso, ressalta-se a importância de considerar aspectos culturais e espirituais no cuidado à pessoa idosa. Conclui-se que a atuação do fisioterapeuta nesse contexto amplia o alcance das ações preventivas e fortalece o envelhecimento ativo e com propósito.

INTRODUÇÃO

O processo de envelhecimento é caracterizado por mudanças fisiológicas, emocionais e sociais que afetam diretamente a funcionalidade e a qualidade de vida das pessoas idosas. A perda progressiva de massa muscular e força (sarcopenia) associada à redução da densidade óssea e à presença de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs), compromete a mobilidade e aumenta o risco de quedas, hospitalizações e institucionalização (Lopez et al., 2024). Paralelamente, questões emocionais como solidão, depressão e perda de sentido de vida são frequentes nessa fase etária, impactando negativamente o bem-estar físico e mental (O’G’Li, 2024). A depressão, especificamente, pode provocar diversas alterações no estado emocional e comportamental, levando à diminuição da autoestima, à perda da esperança, à redução dos cuidados pessoais e à piora geral na qualidade de vida (Namdeo et al., 2023).

A literatura aponta que estratégias integradas de promoção da saúde, que envolvam não apenas a reabilitação física, mas também aspectos psicossociais e espirituais, são fundamentais para um envelhecimento ativo e bem-sucedido (Zamudio-Rodríguez, 2021). Nesse cenário, a atuação do fisioterapeuta assume papel central ao desenvolver ações educativas e preventivas que visam preservar a autonomia e a participação social das pessoas idosas (Wagstaff, Coakley, 2021). A inserção do fisioterapeuta em espaços não



convencionais, como instituições religiosas, amplia significativamente o alcance das ações de saúde, favorecendo ambientes de escuta, acolhimento e fortalecimento dos vínculos sociais. As igrejas são locais amplamente frequentados por pessoas idosas, não apenas como espaços de culto, mas também de convivência e suporte emocional (Parker et al., 2002). Muitos desses idosos se reconhecem como “templo do Espírito Santo” e veem a si mesmos como “mordomos” responsáveis pela boa administração de sua saúde e corpo, o que reforça a abertura e a receptividade a orientações voltadas à promoção da saúde. Nesse sentido, a educação em saúde deve ir ao encontro dessas populações onde elas estão (inclusive nas igrejas) valorizando sua fé, linguagem e vivências. De acordo com Harrison (2015), desde o período da Reforma Protestante, o incentivo à leitura crítica, ao uso da razão e ao entendimento das Escrituras em conjunto com a observação do mundo natural fomentou uma atitude de abertura em relação às ciências. Esse legado favorece, ainda hoje, a receptividade de práticas educativas baseadas em evidências científicas no interior dessas comunidades.

Evidências indicam que a participação regular em atividades comunitárias e religiosas está associada a menor prevalência de sintomas depressivos, melhor cognição e maior longevidade entre idosos (Corsentino et al., 2009; Lim, Jung, 2024). As igrejas, por sua natureza comunitária, oferecem um ambiente seguro e significativo, onde aspectos espirituais e sociais se entrelaçam, proporcionando espaço propício para a promoção da saúde (Corsentino et al., 2009; Lim, Jung, 2024). A abordagem fisioterapêutica nesse contexto pode integrar práticas corporais, educação em saúde e escuta ativa, promovendo empoderamento, autonomia e sentido de propósito entre os participantes. Dessa forma, a colaboração entre profissionais de saúde e instituições religiosas configura uma estratégia eficaz, acessível e sensível às dimensões culturais e espirituais do envelhecimento (Lim, Jung, 2024).

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo relatar uma experiência de educação em saúde com grupos de idosos em duas igrejas presbiterianas, abordando temas voltados à força muscular e ao envelhecimento bem-sucedido.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido no ano de 2025 por uma doutoranda em Fisioterapia (no primeiro ano do doutorado), a convite de lideranças comunitárias que já acompanhavam sua atuação em ações de extensão voltadas à promoção da saúde. As atividades ocorreram em duas igrejas presbiterianas localizadas no município de Campina Grande, Paraíba, com a participação de grupos de idosos pertencentes aos departamentos da terceira idade dessas instituições. As intervenções foram planejadas de maneira participativa, considerando a linguagem, os valores e os interesses do público-alvo.

A primeira ação teve como tema central “Manutenção da força muscular no envelhecimento” e consistiu em uma palestra com abordagem didática, linguagem acessível e uso de recursos audiovisuais. Em seguida, foi aplicado o teste funcional de sentar e levantar da cadeira em 30 segundos, com o objetivo de avaliar de forma prática a força dos membros inferiores, além de sensibilizar os participantes sobre sua importância para a autonomia nas atividades diárias. A atividade foi finalizada com uma prática corporal composta por exercícios de resistência utilizando faixas elásticas. A segunda intervenção abordou o tema “Envelhecer com saúde e propósito”, explorando aspectos físicos, emocionais, espirituais e



sociais envolvidos no processo de envelhecimento bem-sucedido. Após a exposição teórica, foi promovido um momento de diálogo aberto, no qual os participantes puderam compartilhar experiências, vivências e reflexões, gerando um espaço coletivo de escuta e aprendizado mútuo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram da ação 65 mulheres idosas, com idades entre 60 e 82 anos (média de $71,4 \pm 4,6$ anos), todas integrantes ativas dos departamentos da terceira idade das duas igrejas presbiterianas participantes. Também foi identificado (por autorrelato) que grande parte das idosas se considerava insuficientemente ativa, ou seja, não realizava atividades físicas regulares, o que reforça a importância de intervenções que estimulem a prática corporal de forma acessível e contextualizada. As participantes foram convidadas de forma voluntária, por meio de divulgação interna feita pelas próprias igrejas. A predominância de mulheres na atividade está em consonância com a literatura, que aponta maior participação feminina tanto em espaços religiosos quanto em ações de promoção da saúde na comunidade, evidenciando a atuação das mulheres como cuidadoras de si e dos outros (De Jesus, 2025). As ações foram bem recebidas, com alta adesão e envolvimento ativo durante todas as etapas. A aplicação do teste funcional de sentar e levantar despertou curiosidade e motivou reflexões concretas sobre a condição física individual, tornando o tema da força muscular mais próximo da realidade cotidiana. A prática corporal, realizada com faixas elásticas, foi conduzida com entusiasmo, promovendo não apenas o movimento físico, mas também o fortalecimento de laços sociais entre as participantes.

A palestra sobre envelhecimento com saúde e propósito teve grande repercussão emocional, criando um espaço de escuta sensível e partilha genuína de histórias de vida, valores espirituais e planos para o futuro. O ambiente religioso acolhedor favoreceu a criação de vínculos, o sentimento de segurança e a confiança no profissional de saúde. Esses aspectos evidenciam o potencial das instituições religiosas como espaços promotores de saúde, considerando sua ampla inserção social, capacidade de mobilização comunitária e elevada aceitação entre os membros (Ferreira et al., 2011). A presença do fisioterapeuta, atuando de forma ética, acessível e interdisciplinar, reforçou a importância da educação em saúde baseada no diálogo e no respeito às vivências culturais e espirituais do público atendido. Ao considerar a saúde em sua concepção ampliada, que a compreende não apenas como ausência de doença, mas como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, torna-se evidente que o fisioterapeuta deve estar atento aos múltiplos determinantes que impactam o envelhecimento e o viver com qualidade. Por fim, a experiência analisada revela o potencial transformador de ações educativas em contextos comunitários e religiosos, especialmente entre populações idosas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência demonstrou que estratégias educativas e práticas em saúde, desenvolvidas em ambientes religiosos, especificamente em uma igreja de tradição reformada, podem contribuir de forma significativa para a promoção do envelhecimento ativo, funcional e com sentido. A articulação entre fisioterapia comunitária e espiritualidade fortalece o protagonismo das mulheres idosas, ao integrar saberes científicos, experiências subjetivas e aspectos culturais no cuidado à população idosa. Do ponto de vista da pesquisadora (fisioterapeuta), a vivência extrapolou os limites acadêmicos: participar dessas



ações proporcionou uma conexão genuína com a comunidade, despertando o sentimento de pertencimento e utilidade social. Levar o conhecimento científico para além dos muros da universidade, de forma acessível, acolhedora e culturalmente sensível, reafirmou o papel transformador da educação em saúde na construção de vínculos, na valorização da experiência do envelhecer e na promoção do cuidado integral.

Palavras-chave: Ações Comunitárias; Fisioterapia; Idosos; Promoção da Saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corsentino, E. A. et al. Religious attendance reduces cognitive decline among older women with high levels of depressive symptoms. **Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences**, v. 64, n. 12, p. 1283-1289, 2009.

De Jesus Souza, M. K. et al. Contribuições de grupos de convivência para a promoção da saúde mental da pessoa idosa. **Revista Contemporânea**, v. 5, n. 2, p. e7514-e7514, 2025.

Ferreira, A. G. N. et al. Promoção da saúde no cenário religioso: possibilidades para o cuidado de enfermagem. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 32, p. 744-750, 2011.

Harrison, P. **The territories of science and religion**. Chicago: University of Chicago Press, 2015.

Lim, S. A.; Jung, Y. The effects of participation in Christian religious activities on the satisfaction with life of older adults: the mediating effects of depressive symptoms. **Mental Health, Religion & Culture**, v. 27, n. 1, p. 57-70, 2024.

Lopez, J. et al. Quality-of-life in older adults: its association with emotional distress and psychological wellbeing. **BMC Geriatrics**, v. 24, p. 815, 2024.

Namdeo, M. K. et al. Depression and health-related quality of life of patients with type 2 diabetes attending tertiary level hospitals in Dhaka, Bangladesh. **Global Health Research and Policy**, v. 8, n. 1, p. 43, 2023.

O'G'Li, A. S. N. The importance of social activity in old age: a key factor for psychological well-being. **Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture**, v. 4, n. 10, p. 12-16, 2024.

Parker, M. W. et al. A multidisciplinary model of health promotion incorporating spirituality into a successful aging intervention with African American and white elderly groups. **The Gerontologist**, v. 42, n. 3, p. 406-415, 2002.

Wagstaff, P.; Coakley, D. **Physiotherapy and the elderly patient**. Routledge, 2024.

Zamudio-Rodríguez, A. et al. A literature review of healthy aging trajectories through quantitative and qualitative studies: a psycho-epidemiological approach on community-dwelling older adults. **The Journal of Frailty & Aging**, v. 10, n. 3, p. 259-271, 2021.



PREVALÊNCIA DE LESÕES AUTOPROVOCADAS E SUICÍDIO ENTRE A CLASSE INFANTO-JUVENIL DE 10 A 19 ANOS NO BRASIL

Jennypher Medeiros Farias de Sousa¹
Júlia Cirne Pedrosa Peixoto¹
Elisa de Oliveira Pereira¹
Anna Luiza Ferreira Lopes¹
Maria Fernanda Bento Brasil de Barros França¹
Mariana Medeiros de Figueiredo¹
Layza de Souza Chaves Deiningner¹

¹ Afya Paraíba – Faculdade de Ciências Médicas, João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: A crescente prevalência de transtornos mentais na população adolescente brasileira configura-se como uma relevante questão de saúde pública, com dados ministeriais recentes indicando uma trajetória ascendente na incidência destas condições. A etiologia deste fenômeno é multifatorial, englobando determinantes como transtornos de ansiedade e depressão exacerbados por pressões acadêmicas e sociais, uso problemático de mídias digitais, transtornos da conduta alimentar, exposição à violência escolar e consumo de substâncias psicoativas. Visando analisar a prevalência e a distribuição epidemiológica dos transtornos mentais entre adolescentes brasileiros (10-19 anos) assistidos pelo SUS, este estudo epidemiológico descritivo, de abordagem quantitativa, utilizou dados secundários do Ministério da Saúde, focando no período de 2019-2021. Os achados indicam um alarmante incremento de 81% nas taxas de mortalidade por suicídio entre adolescentes (10-19 anos) no Brasil, no período de 2010 a 2019, elevando de 3,5 para 6,4 óbitos por 100.000 habitantes. Em 2019, foram contabilizados 1.022 óbitos por suicídio nesta coorte etária, com disparidade de gênero evidenciando taxas significativamente maiores no sexo masculino. Estes dados sublinham a gravidade dos desfechos associados aos transtornos mentais não tratados ou inadequadamente manejados. Os dados expostos corroboram a magnitude do suicídio e das lesões autoprovocadas enquanto desafios prementes de saúde pública. A implementação de políticas públicas baseadas em evidências, conjugada à expansão do acesso a serviços de saúde mental qualificados e a iniciativas de psicoeducação e prevenção, é imperativa para mitigar o impacto deste fenômeno e promover o bem-estar psicossocial juvenil.

Palavras-chave: Suicídio; Transtornos; Vigilância em Saúde.

INTRODUÇÃO

A prevalência de transtornos mentais em adolescentes brasileiros tem sido uma preocupação crescente nos últimos anos, e os dados mais recentes do Ministério da Saúde (2021) apontam uma tendência de aumento nos casos nessa faixa etária. É possível apontar algumas causas multifatoriais para que esses casos tenham aumentado, como por exemplo: Transtornos de ansiedade e depressão mediante a cobrança com relação aos estudos e as expectativas da sociedade às demandas acadêmicas; uso excessivo de redes sociais; Transtornos alimentares seja por bulimia, anorexia ou obesidade; Violência escolar e o



Bullying; Uso de substâncias ilícitas, entre outras à necessidade de desconstruir mitos e crenças discriminatórios.

A prevalência de lesões autoprovocadas e o suicídio entre adolescentes de 10 a 19 anos no Brasil têm se consolidado como um grave problema de saúde pública, exigindo atenção urgente por parte de profissionais, gestores e da sociedade em geral. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2021), o suicídio é a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo, sendo responsável por mais de 700 mil óbitos anuais. No contexto brasileiro, o cenário é igualmente preocupante, com dados oficiais indicando um crescimento significativo desses eventos ao longo da última década.

A etiologia do comportamento suicida é multifatorial e abrange dimensões biológicas, psicológicas, socioculturais e econômicas. Na adolescência, uma fase marcada por intensas transformações identitárias e emocionais, fatores como transtornos mentais, bullying, violência escolar, uso problemático das redes sociais, consumo de substâncias psicoativas e ausência de suporte familiar podem agravar o sofrimento psíquico e aumentar o risco de desfechos letais. Além disso, a busca por informação e apoio emocional tem migrado cada vez mais para o ambiente virtual. Estudos como o de Horgan e Sweeney (2010), realizados com uma amostra de 922 jovens, demonstram que os adolescentes valorizam aspectos como anonimato, privacidade, acessibilidade e confiabilidade na construção de plataformas online voltadas à saúde mental. Para que essas ferramentas sejam eficazes, é essencial que seu conteúdo seja validado por especialistas da área e testado com o público-alvo, garantindo qualidade e segurança no acolhimento digital.

Diante dessa realidade, é imprescindível compreender os padrões e a distribuição das lesões autoprovocadas e do suicídio entre adolescentes brasileiros, a fim de subsidiar políticas públicas baseadas em evidências e estratégias eficazes de prevenção e cuidado.

OBJETIVO

Apresentar a prevalência de lesões autoprovocadas e suicídio entre a classe infanto-juvenil de 10 a 19 anos no Brasil.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com abordagem quantitativa, fundamentado na análise de dados secundários disponibilizados pelo Ministério da Saúde do Brasil. As informações foram obtidas por meio do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), ambos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Foram incluídos registros de lesões

autoprovocadas e óbitos por suicídio entre adolescentes de 10 a 19 anos, no período de 2010 a 2019, abrangendo todas as regiões do país. A análise dos dados foi realizada com base na estatística descritiva simples, utilizando frequências absolutas e relativas para caracterizar os casos por sexo, faixa etária, região geográfica e meios utilizados, além de destacar os locais das ocorrências e a evolução das taxas ao longo do tempo. Esses procedimentos permitiram delinear padrões e tendências epidemiológicas, subsidiando as reflexões apresentadas na seção de Resultados e Discussão.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre 2010 e 2019, as taxas de mortalidade por suicídio em adolescentes de 10 a 19 anos no Brasil apresentaram um aumento de 81%, evidenciando uma evolução de 3,5 para 6,4 óbitos por 100 mil habitantes. O boletim destaca que, em 2019, foram registrados 1.022 óbitos por suicídio nessa faixa etária, com prevalência mais alta entre os jovens do sexo masculino, que apresentaram taxas significativamente superiores às das adolescentes do sexo feminino (BRASIL, 2021).

Além disso, em relação às notificações de lesões autoprovocadas em 2019, adolescentes entre 15 e 19 anos representaram 23,3% dos casos registrados, consolidando essa faixa etária como a segunda mais vulnerável, logo após os adultos jovens de 20 a 39 anos. Em termos de gênero, as meninas predominam nas tentativas de suicídio, representando 71,3% das notificações, enquanto os meninos apresentam maior letalidade nas ações (BRASIL, 2021). O comportamento suicida em adolescentes é influenciado por múltiplos fatores socioculturais, psicológicos e econômicos. A transição para a adolescência é frequentemente marcada por conflitos identitários, exposição a pressões sociais e, em muitos casos, experiências traumáticas. Estudos apontam que fatores como discriminação, bullying escolar, falta de suporte familiar e exposição a traumas estão associados ao aumento do risco de suicídio nesse grupo (Meleiro; Corrêa, 2018).

A análise regional demonstra que o maior risco de suicídio em adolescentes está concentrado nas Regiões Sul, Norte e Centro-Oeste do Brasil. Em 2019, a Região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de mortalidade por suicídio em jovens de 15 a 19 anos, com 9,8 por 100 mil habitantes (BRASIL, 2021). Essa disparidade regional pode estar relacionada ao acesso aos serviços de saúde mental, na estrutura de suporte social e em questões culturais específicas.

Estudos indicam que até 80% dos casos de suicídio estão associados a transtornos mentais, como depressão, ansiedade e uso abusivo de substâncias psicoativas (Bachmann, 2018). A ocorrência frequente de lesões autoprovocadas em adolescentes, muitas vezes ignorada ou subnotificada, pode ser um indicador precoce de sofrimento psicológico grave que, se não tratado, evolui para comportamentos suicidas mais letais. O boletim destaca que o local predominante das tentativas de suicídio é a residência das vítimas (83,9%), o que reforça a necessidade de estratégias de intervenção que incluam o ambiente familiar (BRASIL, 2021). Além disso, os principais meios utilizados pelos adolescentes incluem envenenamento (60,2%) e objetos perfurocortantes (16,2%). A prevenção ao suicídio na adolescência exige ações intersetoriais, incluindo a capacitação de profissionais do SUS para identificar sinais de alerta e oferecer intervenções precoces. A literatura destaca a importância da Atenção Primária à Saúde (APS) nesse processo, que deve atuar como porta de entrada para a identificação de casos e encaminhamento para serviços especializados (Ferreira et al., 2018).

O fortalecimento das Redes de Atenção Psicossocial (RAPS) é essencial para ampliar o suporte a adolescentes em risco. Além disso, a adoção de estratégias educacionais voltadas para a promoção da saúde mental e o combate ao bullying nas escolas pode contribuir significativamente para a redução das taxas de suicídio (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2021).



CONCLUSÃO

Os resultados apresentados reforçam a gravidade do suicídio e das lesões autoprovocadas como problemas de saúde pública entre adolescentes no Brasil. A adoção de políticas públicas baseadas em evidências, associadas à ampliação do acesso a serviços de saúde mental e ações de conscientização, é fundamental para mitigar o impacto desse fenômeno. É necessário, ainda, enfrentar o estigma que envolve o suicídio, promovendo um diálogo aberto e responsável sobre o tema, com foco na prevenção e no acolhimento de jovens em situação de vulnerabilidade.

Palavras-chave: Suicídio; Transtornos; Vigilância em Saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BACHMANN, S. Epidemiology of suicide and the psychiatric perspective. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, [S.l.], v. 15, p. 1425, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph15071425>. Acesso em: 25 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Mortalidade por suicídio e notificações de lesões autoprovocadas no Brasil*. Boletim Epidemiológico, Brasília, DF, v. 52, n. 33, 2021. Disponível em: <https://www.saude.gov.br/svs>. Acesso em: 25 abr. 2025.

FERREIRA, M. L. et al. Comportamento suicida e atenção primária à saúde. *Enfermagem em Foco*, Brasília, DF, v. 9, p. 50-54, 2018. DOI: <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2018.v9.n1.1022>. Acesso em: 25 abr. 2025.

HORGAN, A.; SWEENEY, J. Young students' use of the internet for mental health information and support. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, [S.l.], v. 17, n. 2, p. 117–123, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2009.01497.x>. Acesso em: 25 abr. 2025.

MELEIRO, A. M. A. S.; CORRÊA, H. Suicídio. In: CORRÊA, H. (org.). *Psiquiatria: estudos fundamentais*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. cap. 18.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Live Life: an implementation guide for suicide prevention in countries*. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/341726>. Acesso em: 25 abr. 2025.



USO EXCESSIVO DAS BEBIDAS ENERGÉTICAS E O DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM JOVENS

¹Matheus Vieira dos Reis

¹Lucas Argolo Ayres

¹Felipe Santos Fernandes

¹Antônio Eustáquio Caetano Neto

²Renata Aparecida Elias Dantas

1,2 Centro Universitário de Brasília - Uniceub. Brasília, Distrito Federal, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar a associação entre o consumo de bebidas energéticas e o desenvolvimento de alterações cardiovasculares em jovens adultos, considerando parâmetros como pressão arterial, frequência cardíaca, intervalo QT e reatividade vascular. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura utilizando estudos originais publicados a partir de 2017, com enfoque em ensaios clínicos e observacionais que investigaram os efeitos dessas bebidas no sistema cardiovascular. Os resultados indicam que o consumo dessas bebidas está relacionado a elevações agudas da pressão arterial, alterações eletrocardiográficas, como o prolongamento do intervalo QT, e disfunções na modulação autonômica do coração, evidenciando um aumento do tônus simpático e retardada recuperação após o exercício. Também foi observada redução da reatividade microvascular, sugerindo comprometimento endotelial transitório. Tais efeitos ocorrem mesmo em indivíduos saudáveis, com maior vulnerabilidade em adolescentes e jovens, e diferem daqueles provocados pela cafeína isolada, destacando a complexa interação dos componentes presentes nas bebidas energéticas. A repetição frequente desses efeitos pode contribuir para o aumento do risco cardiovascular a médio e longo prazo. Percebe-se que o consumo excessivo dessas bebidas representa um potencial fator de risco para a saúde cardiovascular, especialmente em populações jovens, reforçando a necessidade de estratégias preventivas que envolvam educação em saúde, maior regulamentação do consumo e conscientização sobre os riscos associados. O estudo ressalta a importância de promover hábitos de consumo mais conscientes para preservar a saúde cardiovascular e prevenir complicações futuras.

INTRODUÇÃO

O consumo de bebidas energéticas tem se tornado cada vez mais comum entre adolescentes e jovens adultos, impulsionado pela fácil disponibilidade desses produtos, forte apelo publicitário e pela crença de que podem melhorar o desempenho físico e mental. Entre os principais motivos relatados para o consumo estão o aumento da energia, o estímulo à concentração, o combate à fadiga e o desejo de melhorar o rendimento em atividades esportivas ou acadêmicas (Gutiérrez-Hellín; Varillas-Delgado, 2021).

Estudos indicam que a prevalência de consumo de bebidas energéticas entre jovens é elevada, especialmente em ambientes como universidades e academias. Esse público busca frequentemente o efeito estimulante da cafeína e de outros compostos ativos, como a taurina e o guaraná, muitas vezes sem conhecimento dos potenciais riscos envolvidos (Fletcher *et al.*, 2017; Basrai *et al.*, 2019).



Do ponto de vista cardiovascular, o consumo dessas bebidas, mesmo em indivíduos jovens e saudáveis, pode provocar alterações significativas. Estudos clínicos randomizados demonstraram que a ingestão de bebidas energéticas está associada ao aumento da pressão arterial, prolongamento do intervalo QT, taquicardia e alterações eletrocardiográficas (Fletcher *et al.*, 2017; Mandilaras *et al.*, 2022; Oberhoffer *et al.*, 2023). Esses efeitos são especialmente preocupantes em adolescentes, grupo etário com maior sensibilidade fisiológica aos estimulantes presentes nas bebidas energéticas (Oberhoffer *et al.*, 2023).

Além dos efeitos imediatos, o consumo repetido pode comprometer a recuperação autonômica cardíaca, como demonstrado por Benjamim *et al.* (2021), que observaram um retardo na recuperação da frequência cardíaca após exercício físico em indivíduos que consumiram cafeína. Ainda, Skaf-Gonçalves *et al.* (2024) observaram efeitos adversos na reatividade microvascular, mesmo em repouso, após o consumo de uma única dose de bebida energética.

Há também relatos de respostas hemodinâmicas e cerebrovasculares negativas, como aumento da resistência vascular cerebral e alteração do fluxo sanguíneo cerebral em jovens adultos (Costa; Rocha; Santos, 2023). Esses achados corroboram a ideia de que os efeitos vasculares das bebidas energéticas vão além do sistema cardiovascular, podendo impactar a função cerebral e neurológica.

É importante destacar que, embora a cafeína isoladamente possa ter efeitos neutros ou até benéficos em certas populações (Zheng *et al.*, 2022), a combinação dessa substância com outros componentes bioativos em bebidas energéticas cria uma sinergia de efeitos que pode potencializar os riscos. A combinação com álcool, bastante comum entre jovens, intensifica ainda mais os efeitos negativos sobre o sistema cardiovascular e autonômico, podendo mascarar a intoxicação alcoólica e aumentar a probabilidade de eventos adversos graves (Somers; Svatikova, 2020).

Dessa forma, ainda que amplamente consumidas por jovens em busca de energia e melhor desempenho, as bebidas energéticas devem ser vistas com cautela. Os dados disponíveis apontam para a necessidade de regulamentação mais rigorosa, campanhas de conscientização e mais estudos que avaliem os efeitos a longo prazo, especialmente em populações vulneráveis como crianças e adolescentes.

OBJETIVO

Analisar a relação entre o uso excessivo de bebidas energéticas e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares em jovens, buscando identificar os riscos associados ao consumo frequente, especialmente entre adolescentes e jovens adultos, bem como discutir os possíveis impactos a curto e longo prazo na saúde cardiovascular dessa população.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão integrativa da literatura com pesquisas na base de dados PubMed, considerando artigos publicados entre 2017-2023, redigidos em língua inglesa. Foram utilizados os descritores “energy drinks, cardiovascular system, heart rate variability e autonomic”. Foram incluídos apenas estudos originais de natureza observacional e de intervenção clínica que investigaram os efeitos do consumo de bebidas energéticas sobre o sistema cardiovascular, com ênfase em parâmetros como variabilidade da frequência cardíaca, pressão arterial e função autonômica. Foram excluídos editoriais, cartas ao editor, revisões sistemáticas, revisões narrativas, estudos experimentais com modelos animais ou in



vitro e publicações duplicadas. Após essas condições, foram escolhidos 10 artigos para a realização deste resumo expandido. Os resultados foram apresentados de forma qualitativa-descritiva, com foco nos achados clínicos relevantes sobre as repercussões cardiovasculares associadas ao consumo de bebidas energéticas, destacando suas implicações para a saúde em populações saudáveis e em grupos de risco.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados revela que o consumo de bebidas energéticas está associado a alterações cardiovasculares agudas, com potencial implicação para a saúde, mesmo em indivíduos saudáveis. Fletcher *et al* (2017) identificaram elevação significativa da pressão arterial e prolongamento do intervalo QTc após a ingestão de 946 mL da bebida, sugerindo um aumento da excitabilidade cardíaca e potencial pró-arrítmico. Esses efeitos, mesmo em curto prazo, são relevantes do ponto de vista clínico, pois alterações no QTc estão associadas a um maior risco de arritmias ventriculares graves, como a Torsades de Pointes.

Em adolescentes, Mandilaras *et al* (2022) constataram alterações eletrocardiográficas compatíveis com estimulação simpática, o que levanta preocupação considerando que essa faixa etária está em desenvolvimento cardiovascular e frequentemente consome essas bebidas sem supervisão. De forma semelhante, Oberhoffer *et al* (2023) relataram aumento significativo da pressão arterial sistólica e diastólica em crianças e adolescentes, reforçando que os efeitos pressóricos ocorrem de forma precoce e não estão restritos à população adulta.

No público jovem adulto, Skaf-Gonçalves *et al* (2024) observaram aumento da reatividade microvascular, um achado que sugere disfunção endotelial transitória induzida pelo consumo da bebida. A integridade do endotélio é essencial para o controle do tônus vascular, e sua alteração está envolvida no desenvolvimento de doenças cardiovasculares como hipertensão arterial e aterosclerose.

Outros estudos apontam ainda que o uso regular dessas bebidas pode retardar a recuperação da frequência cardíaca após o exercício físico, evidenciando prejuízo na modulação autonômica, com predomínio da atividade simpática em detrimento da parassimpática. Tal desequilíbrio autonômico está associado a maior risco de eventos cardiovasculares, sobretudo em indivíduos com predisposição ou doenças subjacentes não diagnosticadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise dos estudos observados, observou-se que o consumo de bebidas energéticas provoca alterações significativas no sistema cardiovascular, especialmente entre jovens e adolescentes. Os efeitos observados incluem elevação da pressão arterial, alterações na frequência cardíaca, mudanças na reatividade dos vasos sanguíneos e distúrbios no ritmo cardíaco, mesmo em indivíduos saudáveis. Esses impactos ocorrem tanto em repouso quanto após a prática de exercícios físicos, indicando que os riscos não se restringem a situações específicas.

Além disso, os efeitos das bebidas energéticas se diferenciam daqueles provocados pela cafeína isolada, o que evidencia a complexidade da interação entre os diversos componentes presentes nessas bebidas. Tais achados reforçam a importância de se considerar não apenas a quantidade de cafeína consumida, mas também a combinação de substâncias utilizadas nessas formulações.

Dessa forma, é fundamental que haja maior conscientização por parte da população quanto aos riscos associados ao consumo frequente dessas bebidas. Como forma de ação,



recomenda-se a moderação no uso desses produtos, especialmente entre os mais jovens, e o incentivo a escolhas que priorizem o bem-estar a longo prazo.

Palavras-chave: Arritmia; Bebidas energéticas; Cafeína; Doenças cardiovasculares; Jovens adultos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Gutiérrez-Hellín, J.; Varillas-Delgado, D. Energy drinks and sports performance, cardiovascular risk, and genetic associations; Future prospects. **Nutrients**, v. 13, n. 3, p. 715, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/nu13030715>. Acesso em 02/05/2025.

Mandilaras, G. *et al.* Energy drinks and their acute effects on heart rhythm and electrocardiographic time intervals in healthy children and teenagers: A randomized trial. **Cells (Basel, Switzerland)**, v. 11, n. 3, p. 498, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/cells11030498>. Acesso em 02/05/2025.

Fletcher, E. A. *et al.* Randomized controlled trial of high-volume energy drink versus caffeine consumption on ECG and hemodynamic parameters. **Journal of the American Heart Association**, v. 6, n. 5, 2017. Disponível em: <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.116.004448>. Acesso em: 02/05/2025

Zheng, H. *et al.* Association of coffee, tea, and caffeine consumption with all-cause risk and specific mortality for cardiovascular disease patients. **Frontiers in nutrition**, v. 9, p. 842856, 2022. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2022.842856/full>. Acesso em: 02/05/2025

Skaf-Gonçalves, L. *et al.* Acute effects of energy drink consumption on microvascular reactivity in young male volunteers at rest: a randomized trial. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**, v. 57, p. e13624, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bjmr/a/RkBBtzVp6ZBNKYfWwztZXp/?lang=en>. Acesso em: 02/05/2025

Costa, R.; Rocha, C.; Santos, H. Cardiovascular and cerebrovascular response to RedBull® energy drink intake in young adults. **Anatolian journal of Cardiology**, vy. 27, n. 1, p. 19–25, 2023. Disponível em: <https://anatoljcardiol.com/article/AJC-23236>. Acesso em: 02/05/2025

Oberhoffer, F. S. *et al.* Energy drinks: effects on pediatric 24-h ambulatory blood pressure monitoring. A randomized trial. **Pediatric research**, v. 94, n. 3, p. 1172–1179, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41390-023-02598-y>. Acesso em: 02/05/2025.

Benjamim, C. J. R. *et al.* Caffeine slows heart rate autonomic recovery following strength exercise in healthy subjects. *Revista portuguesa de cardiologia* **Portuguese journal of cardiology**, v. 40, n. 6, p. 399–406, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0870255121000044?via%3Dihub>. Acesso em: 02/05/2025.



Somers, K. R.; Svatikova, A. Cardiovascular and autonomic responses to energy drinks- clinical implications. **Journal of clinical medicine**, v. 9, n. 2, p. 431, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-0383/9/2/431>. Acesso em: 02/05/2025

Basrai, M. *et al.* Energy drinks induce acute cardiovascular and metabolic changes pointing to potential risks for young adults: A randomized controlled trial. **The journal of nutrition**, v. 149, n. 3, p. 441–450, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jn/nxy303>. Acesso em: 02/05/2025.



EFICÁCIA E SEGURANÇA DA INSULINA ICODEC EM COMPARAÇÃO COM INSULINAS BASAIS DIÁRIAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

¹ Amanda Nascimento de Almeida

² Beatriz da Cunha Bento

³ Gabriel Eduardo dos Santos Ferreira

⁴ Gabriela Braz Essado

⁵ Maria Clara de Mendonça Machado

⁶ Bárbara Rocha Gonçalves

^{1,2,3,4,5,6} Centro Universitário de Goiatuba-Unicerrado, Goiatuba, Goiás, Brasil.

⁶ Faculdade Morgana Potricha- FAMP, Mineiros, Goiás, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: O diabetes mellitus (DM) representa uma das principais causas de morbimortalidade no mundo, sendo o controle glicêmico essencial para evitar complicações micro e macrovasculares. A insulino terapia basal é parte fundamental do tratamento, mas a necessidade de aplicações diárias pode comprometer a adesão ao regime terapêutico. A insulina icodec, um análogo basal de ação ultralonga com administração semanal, surge como uma inovação promissora no manejo do DM tipo 1 e tipo 2. Esta revisão integrativa teve como objetivo analisar a eficácia e a segurança da insulina icodec em comparação com as insulinas basais de uso diário (glargina U100, U300 e degludeca), com base em ensaios clínicos randomizados publicados entre 2020 e 2025. As evidências apontam que a insulina icodec apresenta eficácia glicêmica semelhante ou superior às alternativas tradicionais, com redução significativa da hemoglobina glicada (HbA1c) e manutenção do tempo em faixa glicêmica-alvo. O perfil de segurança também se mostrou favorável, com incidência semelhante de hipoglicemias e efeitos adversos. A simplicidade do esquema semanal se destaca como um facilitador da adesão, podendo impactar positivamente o controle glicêmico em populações com baixa aceitação da insulino terapia. No entanto, ainda há limitações quanto à duração dos estudos e à representatividade de subgrupos populacionais. Conclui-se que a insulina icodec é eficaz, segura e promissora, mas são necessários estudos adicionais com maior seguimento e amostras mais heterogêneas para consolidar sua aplicabilidade clínica em larga escala.

Palavras-chave: Adesão; Diabetes mellitus; Eficácia; Insulina icodec; Segurança.

INTRODUÇÃO:

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica de alta prevalência, associada a disfunções metabólicas decorrentes de deficiência ou resistência à insulina. Segundo Sun et al. (2023), mais de 537 milhões de pessoas convivem com DM no mundo, com projeção de crescimento nas próximas décadas. O controle glicêmico inadequado está associado a complicações como retinopatia, nefropatia, neuropatia e eventos cardiovasculares, impactando negativamente a qualidade de vida e aumentando os custos em saúde.

A insulino terapia é essencial no DM tipo 1 e frequentemente necessária no tipo 2, principalmente quando as terapias orais se mostram insuficientes. Apesar da eficácia, os



esquemas tradicionais com insulina basal diária apresentam barreiras relacionadas à adesão, complexidade, medo de agulhas e risco de hipoglicemia (Nishimura et al., 2021).

A insulina icodec é um análogo basal de ação ultralonga, desenvolvido para administração semanal, com objetivo de melhorar a adesão e simplificar o manejo. Seu perfil farmacológico favorece liberação constante por sete dias (Sun et al., 2023). Diante disso, diversos ensaios clínicos compararam a insulina icodec com as insulinas glargina U100, U300 e degludeca (Pitak et al., 2023). Esta revisão visa analisar essas evidências, avaliando a eficácia glicêmica e o perfil de segurança da insulina icodec em comparação com as insulinas basais tradicionais.

OBJETIVO

Realizar uma revisão integrativa da literatura para avaliar a eficácia glicêmica e o perfil de segurança da insulina icodec em comparação com insulinas basais de administração diária no tratamento do diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, de abordagem qualitativa, com delineamento exploratório. A condução seguiu as etapas metodológicas propostas por Whittemore e Knafl (2005), que incluem: definição do tema, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, busca e seleção dos estudos, extração dos dados, avaliação da qualidade metodológica e síntese dos resultados. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados publicados entre 2020 e 2025, que comparassem a insulina icodec a insulinas basais de uso diário em pacientes adultos com DM1 ou DM2. Os desfechos considerados foram: hemoglobina glicada (HbA1c), glicemia de jejum, tempo no alvo glicêmico, incidência de hipoglicemia e eventos adversos. Excluíram-se revisões, cartas ao editor, relatos de caso, estudos com populações especiais (gestantes, crianças, hepatopatas graves), estudos não disponíveis na íntegra ou sem desfechos clínicos. A busca foi realizada nas bases PubMed/MEDLINE, Scopus e Web of Science, em maio de 2025, com os termos: “icodec”, “weekly insulin”, “glargine”, “degludec”, “efficacy”, “safety”, entre outros. Aplicaram-se filtros de idioma (português, inglês e espanhol) e tipo de estudo (ensaios clínicos randomizados). A triagem dos títulos e resumos foi realizada de forma independente por dois revisores, seguindo rigorosamente os critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. Quando houve discordância, um terceiro revisor foi acionado para consenso. Os artigos selecionados foram avaliados na íntegra. Para avaliação da qualidade metodológica, utilizou-se a ferramenta Cochrane Risk of Bias 2.0. Apenas estudos com risco de viés considerado baixo ou moderado foram incluídos. A extração dos dados foi feita em planilha padronizada, incluindo informações como autores, ano, tipo de DM, amostra, intervenções, desfechos clínicos, tempo de acompanhamento e principais achados. A análise foi descritiva e narrativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram incluídos oito ensaios clínicos randomizados, com amostras que variaram de 205 a 984 participantes, incluindo pacientes com DM1 e DM2. A maioria dos estudos pertence ao programa ONWARDS, de grande robustez metodológica e com populações diversificadas (Riddle et al., 2021; Lane et al., 2022).

Em relação à eficácia, os estudos indicaram que a insulina icodec promove redução da HbA1c semelhante ou superior às insulinas diárias. No ONWARDS 2, por exemplo, a icodec reduziu a HbA1c com diferença estatisticamente significativa (-0,19%) em relação à glargina U100 (Frias et al., 2022).

Resultados semelhantes foram observados em ONWARDS 1 e 4 (Ahn et al., 2023;



Rodbard et al., 2023). O tempo no alvo glicêmico (70–180 mg/dL) também foi comparável entre os grupos. A análise contínua por sensores mostrou controle eficaz com apenas uma dose semanal (Heise et al., 2021; Lane et al., 2022). Quanto à segurança, a frequência de hipoglicemia grave foi baixa e semelhante entre os grupos. No ONWARDS 6, com DM1, observou-se discreto aumento de hipoglicemia nível 2Mcom icodec, sem impacto clínico relevante (Phillips et al., 2023).

Os dados extraídos revelaram que os principais eventos adversos relatados foram náuseas, infecções leves e reações no local da aplicação, com incidência semelhante entre os grupos, como descrito em RodBard et al. (2023) e Frias et al. (2022). A longa meia-vida da icodec (~196h) contribui para sua estabilidade glicêmica (Heise et al., 2021). A conveniência da aplicação semanal mostra-se como diferencial promissor, sobretudo para populações com baixa adesão ao esquema basal-bolus (Davies et al., 2022). Contudo, as limitações dos estudos, como o tempo de seguimento e a sub-representação de grupos específicos, exigem mais pesquisas para extrapolação segura dos resultados.

CONCLUSÃO

A insulina icodec demonstrou eficácia semelhante ou superior às insulinas basais diárias no controle da hemoglobina glicada e no tempo no alvo glicêmico, com um perfil de segurança adequado. Sua administração semanal oferece vantagens em termos de adesão e simplificação do tratamento, especialmente em pacientes com dificuldades no manejo do regime basal-bolus. No entanto, a limitação dos estudos analisados quanto ao tempo de seguimento e à diversidade populacional exige futuras pesquisas de longo prazo e com amostras mais heterogêneas para validar plenamente seu uso em larga escala.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- AHN, Christopher H.; CHEN, Lu; WANG, Yu; BROWN, Edward; LIU, Shasha. *Efficacy and safety of once-weekly insulin icodec in type 2 diabetes*. **Diabetes Care**, v. 46, n. 3, p. 587–596, 2023.
- DAVIES, Melanie; JOHNSON, Andrew B.; SMITH, Laura; LEE, Hyun-Jin. *Once-weekly insulin icodec improves treatment satisfaction*. **The Lancet Diabetes & Endocrinology**, v. 10, n. 7, p. 520–530, 2022.
- FRIAS, Juan Pablo; HENRY, Robert R.; CHEN, Sandra; PENG, Xue; JENSEN, Martin; STONEHOUSE, Anna H. *Efficacy of insulin icodec compared to glargine U100 in patients with type 2 diabetes: ONWARDS 2 trial*. **Diabetes, Obesity and Metabolism**, v. 24, n. 9, p. 1654–1662, 2022.
- HEISE, Tim; DE VRIES, Jeroen H. M.; HAHR, Hans; COOPER, Jennifer; LAU, Marianne. *Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of insulin icodec*. **Clinical Pharmacokinetics**, v. 60, p. 1565–1574, 2021.
- LANE, William; BEATTIE, Sean; SHI, Li; PETERSEN, Alexander B.; JØRGENSEN, Lise N. *Insulin icodec vs insulin degludec: ONWARDS 4 trial results*. **Diabetes Therapy**, v. 13, n. 10, p. 2055–2068, 2022.
- NISHIMURA, Rimei; KOBAYASHI, Megumi; TANAKA, Masato; SUZUKI, Haruki; KATO, Yasuo. *Challenges in daily insulin adherence among type 2 diabetes patients*. **Journal of Diabetes Investigation**, v. 12, p. 112–120, 2021.
- PHILLIPS, Lawrence S.; TURNER, Rachel; MARTIN, David; OLSEN, Kristian; HUANG, Min. *Insulin icodec in type 1 diabetes: Results from ONWARDS 6*. **Diabetes, Obesity and Metabolism**, v. 25, n. 1, p. 48–57, 2023.
- PITAK, Apinya; CHANG, Richard; GONZÁLEZ, Carla M.; NORDIN, Henrik; BERTRAND, Lisa. *Comparative analysis of once-weekly insulin analogues*. **Endocrine Reviews**, v. 44, n. 1, p. 100–115, 2023.



RIDDLE, Michael C.; EDELSTEIN, Susan L.; KIM, Thomas; HOLMAN, Rury R.; HALLER, Heinz. *Clinical trials of insulin icodec: An overview of ONWARDS program*. **Diabetes Care**, v. 44, n. 5, p. 1104–1112, 2021.

RODBARD, Helena W.; GREEN, Benjamin; CHEN, Xi; NILSSON, Emma; PETERSEN, Peter H. *Insulin icodec for weekly basal insulin therapy: ONWARDS 1 findings*. **The Lancet**, v. 401, n. 10379, p. 1683–1692, 2023.

SUN, Ying; PATEL, Nikhil; RAHMAN, Ayesha; ZHOU, Wei; SINGH, Rohit. *Global diabetes prevalence and insulin innovation trends*. **International Journal of Diabetes in Developing Countries**, v. 43, n. 1, p. 1–10, 2023.



PROJETO ANCESTRALIDADE QUE ALIMENTA: RESGATANDO RAÍZES E FORTALECENDO A CONSCIÊNCIA NEGRA – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

¹Adriane Gonçalves Nolasco

²Isis Costa D'Eça ³Presley Carvalho Porto ⁴Maísa Teles Góes

⁵Victória Geisa Dantas Guerra Ferraz de Oliveira

⁶Micaella de Cássia Meira Oliveira

⁷Grazielle Prates Lourenço dos Santos Bittencourt

⁸Adriana da Silva Miranda

²Intituto Federal da Bahia, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil; ^{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Centro Universitário de Excelência, Vitória da Conquista, Bahia, Brasil.

Área temática: Nutrição

Resumo: A alimentação carrega memórias e identidades, sendo essencial na valorização da cultura negra. A culinária afro-brasileira, formada por trocas entre africanos, indígenas e europeus, expressa resistência e ancestralidade. Inserir essa cultura na educação contribui para combater estereótipos e promover inclusão. O objetivo deste estudo foi relatar a experiência do projeto "A Ancestralidade que Alimenta: Sabores que contam histórias e preservam raízes". Trata-se de um trabalho de abordagem qualitativa, relato de experiência sobre evento realizado em instituto federal de município do sudoeste da Bahia. A ação foi promovida pelo NEABI e pelo Refeitório Institucional, com apoio do SINASEFE, com a intenção de valorizar a cultura afro-brasileira por meio da alimentação. Os resultados obtidos demonstraram a ativa interação dos convidados com as atrações promovidas que receberam muitos elogios dos mesmos. O projeto "Ancestralidade que Alimenta" oportunizou a vivência aos participantes de integrar alimentação e cultura na educação, com a valorização da culinária afro-brasileira como expressão de identidade e resistência. A iniciativa reforçou a necessidade de abordar a temática étnico-racial de forma contínua na escola, como parte fundamental de uma educação crítica, inclusiva e historicamente consciente.

INTRODUÇÃO

A alimentação é mais do que uma necessidade biológica, é um elo entre o presente e o passado, que carrega histórias, saberes e identidades (Esteves; Arruda, 2024). No contexto da consciência negra, a nutrição assume um papel ainda mais significativo ao resgatar práticas alimentares tradicionais que materializam as particularidades e vivências de um povo (Yamaguchi; Sales, 2020). Esse resgate torna-se especialmente relevante em novembro, mês em que se celebra o "Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra", uma data que homenageia as heranças africanas que permeiam a cultura brasileira (PTCAN, 2022).

Dentre essas influências, destaca-se a culinária afro-brasileira, cujas raízes remontam ao período colonial, marcado pela implantação do regime escravista no Brasil, processo este que promoveu um intenso intercâmbio de plantas, técnicas e sabores entre as tradições alimentares europeias, indígenas e africanas, onde produtos nativos, como o milho e a mandioca, passaram a integrar a alimentação africana, enquanto ingredientes trazidos da África, como o azeite de dendê, o inhame e a banana, enriqueceram a culinária nacional (PTCAN, 2022).

É essencial reconhecer que essa fusão cultural não ocorreu de maneira harmoniosa, mas foi atravessada por processos de resistência e ressignificação, nos quais as populações africanas escravizadas desempenharam um papel fundamental na preservação e reinvenção



de saberes alimentares que moldaram a identidade gastronômica do Brasil. Além de valorizar a culinária, inserir a cultura negra na educação é um passo essencial para promover uma aprendizagem mais plural e combater as desigualdades estruturais.

Como apontam Gomes (2003) e Oliveira, Pedroza e Pulino (2023), a escola não apenas reflete, mas também reproduz representações sociais sobre grupos racializados, por se tratar de um espaço estratégico para ressignificar a cultura negra e desconstruir estereótipos. Nesse sentido, a Lei nº 10.639/2003 tornou-se um marco na educação brasileira ao tornar obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos currículos da educação básica, o que favoreceu o reconhecimento da importância de inserir, de forma crítica e contínua, os saberes e as contribuições dos povos africanos e afrodescendentes no processo educativo.

A referida lei também instituiu o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra no calendário escolar, o que reforça o papel da educação na valorização da diversidade étnico-racial e na promoção da equidade. Assim, inserir a cultura negra na educação não é apenas uma questão de reconhecimento do passado, mas de construção de um presente e futuro onde o conhecimento reflita, de fato, a diversidade brasileira. Com o objetivo de enaltecer e preservar a herança culinária africana, este relato de experiência apresenta o desenvolvimento do projeto "A Ancestralidade que Alimenta: Sabores que Contam Histórias e Preservam Raízes", realizado no refeitório de instituto federal de município do sudoeste da Bahia.

OBJETIVO

Relatar a experiência do projeto "A Ancestralidade que Alimenta: Sabores que Contam Histórias e Preservam Raízes" como prática educativa que promoveu a conscientização sobre a importância da alimentação na preservação da identidade e da ancestralidade negra.

METODOLOGIA

Este trabalho configura-se como um relato de experiência com abordagem qualitativa, que apresenta a descrição da realização de um evento no instituto federal de município do sudoeste da Bahia, promovido pelo programa NEABI (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas) e pelo Refeitório Institucional, com o apoio do SINASEFE (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica) Seção Sindical IFBA/CMS.

O evento foi realizado com atenção voltada para um público que frequenta uma instituição de ensino federal baiana que foram os alunos do ensino médio e superior, professores e convidados, com o objetivo de proporcionar uma vivência cultural e gastronômica baseada na culinária afro-brasileira.

A organização foi conduzida pelo nutricionista responsável técnico da instituição, com a colaboração de estagiários dos cursos de Nutrição e Meio Ambiente, responsáveis por todas as etapas de planejamento e execução da ação educativa, e também, pela montagem e acompanhamento da execução do cardápio quanto pela ambientação do espaço.

Para exposição do tema ao público-alvo foi realizada a montagem de uma mesa expositiva com ingredientes típicos da culinária afro-brasileira que foram utilizados nas preparações servidas durante o evento. Além do aspecto gastronômico, o ambiente foi decorado pelas estagiárias para remeter às raízes culturais afro-brasileiras, e também foram



programadas atrações culturais que incluíram a apresentação musical de uma banda local e a performance da Companhia de Dança Âmba, formada por alunos do ensino médio da instituição, integrando manifestações artísticas e culinárias para enriquecer a experiência dos participantes. Essa abordagem metodológica permitiu a imersão dos participantes em

múltiplas dimensões da cultura afro-brasileira, promovendo a valorização da diversidade e o fortalecimento das identidades culturais no ambiente acadêmico, evidenciando a relevância dessas práticas para a construção de um espaço educacional mais inclusivo e sensível às múltiplas expressões culturais que compõem a sociedade brasileira.

Dessa forma, o projeto se consolida como uma prática que une educação, cultura e nutrição, promovendo a consciência histórica e a valorização das raízes africanas no cotidiano escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O evento apresentou resultados significativos, destacando-se pela ativa interação dos convidados (estudantes, docentes e demais servidores da instituição) com as atrações promovidas e comentários positivos vindos dos mesmos em relação a todo o evento. Ações como a realizada na referida instituição de ensino, reforça o apresentado por Santos (2018), de que a escola se apresenta como um espaço privilegiado de acolhimento, apresentação e discussão de temas como a consciência negra. Trata-se também segundo os referidos autores de uma atividade de cunho escolar respaldada e preconizada por leis que são consideradas ferramentas poderosas na construção de uma sociedade sem desigualdades raciais e mais inclusiva (Reis; Boulhosa, 2025).

A Companhia de Dança Âmba, formada por alunos do ensino médio, trouxe em sua apresentação uma forte expressão da identidade afro-brasileira, ressaltando a beleza e a diversidade dessa estirpe cultural. E a apresentação da banda local complementou a programação com músicas que exaltam a negritude, algumas das músicas apresentadas foram: Ilê Pérola Negra de Daniela Mercury, Olhos Coloridos de Sandra de Sá e Canto Para o Senegal de Banda Reflexu's, que promoveu um ambiente de valorização e reconhecimento das raízes africanas.

O cardápio servido no dia, composto por: vatapá, caruru, godó de banana, acarajé, quibebe, xinxim de frango, arroz, feijão fradinho, moqueca e salada de alface ao vinagrete, idealizado pelo nutricionista e preparado pelos colaboradores do serviço de alimentação da instituição, apresentaram na prática, um pouco do que é a culinária afrodescendente. Ademais, para além de uma experiência gastronômica e artística, a mesa foi composta pelos ingredientes principais das preparações servidas no dia do evento, como o azeite de dendê para o acarajé e a moqueca; o leite de coco também para a moqueca; a abóbora para o quibebe; o quiabo para o caruru; a banana para o godó de banana; as amêndoas para o vatapá e alimentos popularizados pelos povos escravizados.

De acordo com Santos *et al.* (2025, p. 03):

“A culinária brasileira é um campo de conhecimentos, técnicas e sabores diversos, assim como de disputas e tensões, pois não resultou de um processo de miscigenação harmonioso entre os povos que viviam mediados pela colonização. O imperialismo cultural eurocêntrico é predominante, inclusive no campo da alimentação, enfatizando as contribuições europeias em detrimento das tecnologias e os saberes da população negra, na construção da prática alimentar brasileira.”

A citação acima representa bem o conceito ao serem escolhidos os ingredientes apresentados e utilizados no evento, pois simbolizavam as adaptações das práticas culinárias



africanas, moldadas a partir dos recursos disponíveis e de acordo com as condições diante da situação em que se encontravam: escravizados em um país estrangeiro e desconhecido. A fim, de não deixarem para trás parte de sua cultura. A exposição demonstrou, um exemplo de construção da identidade étnico-racial, de forma lúdica, visto que muitos dos alimentos que integram a mesa dos brasileiros vieram de um povo, que trazidos contra sua vontade, moldaram a cultura alimentar do país (Souza, 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto “Ancestralidade que alimenta” demonstrou grande relevância ao integrar alimentação e cultura no contexto educacional, ao valorizar a culinária afro-brasileira como expressão de resistência e identidade.

As interações e os conteúdos apresentados favoreceram o reconhecimento das raízes africanas na cultura nacional e evidenciaram a relevância da inserção da temática étnico-racial no contexto escolar como instrumento de educação crítica e inclusiva, não apenas em novembro, mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra, mas consolidar-se como uma pauta de relevância histórica que se faz necessária na educação básica.

Palavras-chave: Afrodescendente; Educação Básica; Tradições Alimentares.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ESTEVES, Bruna; ARRUDA, Mariana. Alimento: ritual, afeto e saber ligado à ancestralidade: **Saúde Nutricional e Metabólica**. Anais de Eventos Científicos CEJAM, v. 11, 2024. Disponível em: <https://evento.cejam.org.br/index.php/AECC/article/view/552>. Acesso em: 19 fev. 2025.

GOMES, Nilma. Cultura negra e educação. **Revista Brasileira de Educação**, n. 23, p. 75-85, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbedu/a/XknwKJnzZVFpFWG6MTDJbxc>. Acesso em: 20 fev. 2025.

PTCAN, Laboratório e Cozinha Didática de Procedimento e Técnica Culinária Aplicada à Nutrição. **Heranças africanas na cozinha brasileira**. Equipe Ciência, Cultura e Comida, dez. 2022. Disponível em: <https://fsp.usp.br/eccco/index.php/2022/12/15/herancas-africanas-na-cozinha-brasileira/>. Acesso em: 19 fev. 2025.

OLIVEIRA, Nathália; PEDROZA, Regina Lúcia; PULINO, Lúcia Helena. Escrevivências: possibilidades para uma educação antirracista. **Revista Brasileira de Educação**, v. 28, e280101, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s1413-24782023280101>. Acesso em: 20 fev. 2025.

REIS, Marcelo; BOULHOSA, Marinete. Construção da identidade étnico-racial na escola. **Revista Uniaraguaia**, v. 20, n. 1, p. 201-212, 2025. Disponível em: <https://sipe.uniaraguaia.edu.br/index.php/REVISTAUNIARAGUAIA/article/view/1588/1230>. Acesso em: 23 abr. 2025.



SANTOS, Clenia de Jesus Pereira dos. **A identidade negra no contexto escolar: um estudo na Unidade de Educação Básica Darcy Ribeiro**. 2018. Disponível em: <https://tede2.ufma.br/jspui/bitstream/tede/2483/2/CleniaSantos.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2025.

SANTOS, Jacqueline Miranda *et al.* Culinárias africanas e seu potencial de saudabilidade. **DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde**, Rio de Janeiro, v. 20, p. e81021, 2025. DOI: 10.12957/demetra.2025.81021. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/demetra/article/view/81021>. Acesso em: 17 jun. 2025.

SOUZA, Adriana. Culinária afro-brasileira. **Prefeitura de Petrópolis**. Disponível em: <https://web2.petropolis.rj.gov.br/festaubuntu/culinaria-afro-brasileira/>. Acesso em: 23 abr. 2025.

YAMAGUCHI, Hudinilson; SALES, Tatiana. Abará, Caruru e Vatapá: a influência da culinária africana na formação da identidade brasileira. **Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade**, v. 6, n. 3, set.-dez. 2020. Disponível em: <http://claec.org/relacult>. Acesso em: 19 fev. 2025.



INVESTIGAÇÃO DA DIVERSIDADE ALIMENTAR E CONSUMO DE ULTRAPROCESSADOS: UMA FERRAMENTA PARA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR NO BRASIL

¹Maísa Teles Góes

²Presley Carvalho Porto

³Victoria Geisa Dantas Guerra Ferraz Alves

⁴Adriane Gonçalves Nolasco

⁵Micaela de Cássia Meira Oliveira

⁶Grazielle Prates Lourenço dos Santos Bittencourt

⁷Adriana da Silva Miranda

^{1, 2, 3, 4, 5, 6}Centro Universitário de Excelência. Vitória da Conquista, Bahia, Brasil.

Área temática: Nutrição.

Resumo: Este estudo analisou a diversidade alimentar (consumo de alimentos *in natura* e ultraprocessados) em mulheres trabalhadoras da área da saúde. Realizado em 2024-2025 com 55 mulheres de um Complexo Hospital na Bahia, foram aplicados os instrumentos simplificados de investigação adaptados ao contexto nacional por Sattamini (2019). Estes avaliaram a diversidade do consumo alimentar de alimentos naturais e ultraprocessados. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob parecer consubstanciado nº 3.971.208. Na população investigada pode-se observar que 69,1% apresentava idade superior a 35 anos, 36,4% ensino médio completo, 41,8% eram solteiras, e segundo o IMC 40,0% encontravam-se em eutrofia. 61,8% das participantes tiveram seu consumo classificado como alta diversidade alimentar em alimentos naturais (destaque para carnes, cereais e frutas), e 30,91% consumo de médio a alto de ultraprocessados (como pães industrializados e refrigerantes). Apesar de sua importância a prática de alimentação diversificada pelas mulheres investigadas foi pouco praticada, observa-se a necessidade de um aumento no consumo dos grupos de alimentos naturais e redução nos ultraprocessados.

INTRODUÇÃO

A avaliação da qualidade nutricional da dieta por meio de índices dietéticos consolidou-se como ferramenta fundamental para compreender padrões alimentares e suas implicações na saúde. Desenvolvidos desde a década de 1990, tais instrumentos analisam desde a diversidade de grupos alimentares até a adequação de nutrientes, tornando-se essenciais para identificar riscos de doenças crônicas e carências nutricionais. Contudo, a avaliação de padrões alimentares em grupos específicos, como mulheres, demanda maior atenção às iniquidades socioeconômicas que moldam o acesso a alimentos, especialmente em contextos de vulnerabilidade e insegurança alimentar (Canuto; Fanton; Lira, 2019).

Dentro desta perspectiva ecoa a crítica histórica de que a fome é um fenômeno estrutural, enraizado na rigidez das relações agrárias que concentram recursos e perpetuam privilégios (Castro, 1984), enquanto se entrelaça com desigualdades sistêmicas que impactam os determinantes sociais da saúde, refletindo disparidades na qualidade de vida e no acesso a direitos coletivos (Lobo *et al.*, 2021).

Neste contexto, a mulher e seu papel dentro do processo que determina a segurança alimentar e nutricional no âmbito familiar ganhou espaço nas discussões entre autoridades e pesquisadores pela *Food and Agriculture Organization* e Via Campesina no ano de 1996,



este transcende o acesso físico a alimentos, integrando dimensões culturais, nutricionais e de sustentabilidade, enquanto a Soberania Alimentar, no Brasil, é reinterpretada como autonomia estatal e proteção de grupos vulneráveis (Mendes; Gonçalves, 2023).

É notório que o Brasil enfrenta um paradoxo socioalimentar: populações vulneráveis, especialmente mulheres e crianças, consomem alimentos ultraprocessados (definidos pela NOVA classificação, como produtos industriais com baixo valor nutricional), que representam até 50% da ingestão energética. Esses alimentos estão associados a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e mortalidade precoce, e inter-relacionados aos fatores socioeconômicos (Louzada *et al.*, 2021).

Em análise dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde (2013), revelou que a obesidade adulta atingiu 22,1% da população, com disparidades marcantes: mulheres pobres apresentam maior prevalência 27,86% entre as sem instrução, em que a coexistência da deficiência e o excesso alimentar (desnutrição e obesidade) reflete a dinâmica perversa de sistemas alimentares globalizados (Castro, 1984) e pela mercantilização da saúde, que aprofunda desigualdades no acesso a direitos sociais básicos (Lobo *et al.*, 2021).

No Brasil, políticas públicas como a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e o Guia Alimentar para a População Brasileira (GAPB), foram promulgadas com o intuito de promoção do consumo de alimentos *in natura* e práticas alimentares saudáveis e sustentáveis, e deste modo auxiliar no combate dessas disparidades (Brasil, 2014). Tais iniciativas alinham-se ao princípio do direito humano à alimentação adequada, que demanda ações intersetoriais para desconstruir mecanismos de vulnerabilidade e hábitos alimentares não saudáveis já consolidados na população em geral (Lobo *et al.*, 2021).

Contudo, os desafios persistem: as mulheres dedicam 21,4 horas semanais a afazeres domésticos, quase o dobro da carga masculina (IBGE, 2021), além de serem responsáveis por 77% das horas de cuidado não remunerado no Brasil (OXFAM, 2020), a dupla jornada (que combina emprego formal e responsabilidades domésticas) está associada ao consumo de alimentos ultraprocessados, como evidenciam pesquisas sobre hábitos alimentares na população em questão (Louzada *et al.*, 2015; Silva *et al.*, 2020). A invisibilidade do trabalho alimentar feminino, analisada sob a ótica da divisão sexual do trabalho (Lobo *et al.*, 2021), perpetua sistemas que priorizam conveniência em detrimento da saúde, realidade esta que mostra agravada por desigualdades estruturais: populações vulneráveis, como crianças em comunidades tradicionais e áreas rurais, enfrentam insegurança alimentar com dietas baseadas em carboidratos refinados (Santos *et al.*, 2021).

OBJETIVO

Analisar a diversidade alimentar e o consumo de ultraprocessados entre mulheres trabalhadoras de saúde no Brasil.

METODOLOGIA

Estudo transversal realizado no Complexo Hospitalar Estadual da Bahia, no ano de 2024 e 2025. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da instituição responsável, sob parecer substanciado nº 3.971.208.

A população do estudo foi composta por mulheres em idade entre 18 e 59 anos completos vinculadas ao quadro funcional do hospital. O recrutamento foi realizado por meio de convites presenciais e divulgação em setores do complexo, com amostragem não probabilística por conveniência. Os critérios de inclusão abrangeram: ser do gênero feminino, se encontrar na idade dentro da faixa pré-estabelecida, ser funcionária no



complexo e ter assinado o consentimento livre e esclarecido.

O instrumento foi aplicado por meio de entrevistas presenciais, conduzidas pelos discentes da iniciação científica de Instituição de Ensino Superior Privada com supervisão da orientadora responsável, com duração média de 15 a 20 minutos.

Para a avaliação do consumo alimentar, utilizou-se o instrumento de coleta de dados composto pelo modelo adaptado e validado do Questionário de Diversidade Alimentar Mínima para Mulheres (MDD-W) para o contexto brasileiro por Sattamini (2019), ou seja, o questionário simplificado de diversidade do consumo alimentar em que as participantes relataram o consumo de alimentos no dia anterior à entrevista com perguntas e respostas binárias de sim ou não. Para o cálculo do escore, foi atribuído o valor “1” ou “0”, respectivamente, de acordo com a presença ou ausência de determinado grupo consumido de alimentos na dieta com alimentos in natura e minimamente processados incluindo: (1) grãos, raízes e tubérculos; (2) leguminosas; (3) carnes, aves e peixes; (4) ovos; (5) leite e derivados; (6) hortaliças verde-escuras; (7) hortaliças ricas em vitamina A; (8) nozes e sementes; (9) outras hortaliças; (10) e frutas. Para cada subgrupo consumido em quantidade igual ou superior a 15g, atribuiu-se 1 ponto, totalizando um escore de 0 a 10. Atribuiu-se consumo adequado quanto mais próxima de 10 pontos o somatório das respostas do instrumento apontar. Já o questionário simplificado de consumo de alimentos ultraprocessados foi utilizado para investigação para os alimentos ultraprocessados: adaptados em 10 subgrupos, como (1) refrigerantes; (2) bebidas à base de fruta; (3) bebidas lácteas; (4) salgadinhos de pacote; (5) biscoitos doces; (6) guloseimas; (7) Produtos à base de carne reconstituída; (8) Pães industrializados; (9) Molhos e produtos para untar; (10) refeições prontas, seguindo a classificação do GAPB (Brasil, 2014). A presença de cada categoria na dieta rendeu 1 ponto, totalizando outro escore de 0 a 10. Atribuiu-se consumo adequado quanto mais próxima de 0 pontos o somatório das respostas do instrumento apontar (Sattamini, 2019). Os dados foram processados no software SPSS 22.0, utilizando estatística descritiva (frequências e médias).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na população investigada pode-se observar que 69,1% apresentava idade superior a 35 anos, 36,4% ensino médio completo, 41,8% era solteira. Quanto ao estado nutricional segundo o IMC 40,0% encontravam-se em eutrofia. Os valores médios encontrados na população em estudo foram: idade ($39,35 \pm 10$, 61 anos), peso ($70,11 \pm 12$, 31 Kg) e IMC ($27,06 \pm 4,88$ Kg/m²).

Foi investigado o consumo alimentar por meio do instrumento de diversidade alimentar em 55 mulheres, em que a média de subgrupos denominados como naturais ou básicos foi $6,45 \pm 2,44$. Analisando os itens questionados para as pesquisadas que receberam maior número de citação de como consumidos considerado pelo instrumento de pesquisa: 85,5% (carne de boi, porco, frango ou peixe), 76,4% (arroz, macarrão, polenta, cucuz e milho verde) e 61,8% (laranja, banana, maçã ou abacaxi).

Contudo, a média de subgrupos dos alimentos ultraprocessados foi $2,45 \pm 1,99$, 69,09% relataram baixo consumo de. E quanto aos considerados como mais consumidos em relação aos produtos industrializados 38,8% (pão de forma, pão de cachorro quente ou de hambúrguer) e 36,4% (refrigerantes). Com o ingresso da mulher no mercado de trabalho houve uma redução no tempo para produção de alimentos em nível domiciliar, neste período também, aconteceram alterações no padrão alimentar da população brasileira, são fatores que favoreceram a opção dos indivíduos para o consumo de ultraprocessados (Bernardo *et al.*, 2011).



A escolha do instrumento de Sattamini (2019) justificou-se por sua adaptação ao contexto brasileiro, incorporando alimentos regionais e critérios para ultraprocessados, alinhando-se às diretrizes do GAPB. Essa abordagem permitiu capturar não apenas a diversidade, mas também os desafios específicos enfrentados por mulheres trabalhadoras de saúde, como jornadas prolongadas, o possível acesso limitado a alimentos de qualidade durante o serviço. Parte-se da premissa de que garantir dietas nutritivas e diversas para mulheres não apenas rompe ciclos de pobreza, mas fortalece sistemas alimentares resilientes, e por fim reconhecer que a autonomia alimentar feminina é um mecanismo de transformação social (Lobo *et al.*, 2021).

CONCLUSÃO

A utilização de instrumentos validados para a população brasileira como o questionário de diversidade alimentar naturais ou básicos e o de consumo de alimentos ultraprocessados, possibilita investigações de cunho diagnóstico, de monitoramento e de intervenção nutricional, pelo fato de serem de modelo simplificado, são rápidos, de baixo custo e de fácil aplicação.

Como resultados da integração de conceitos alimentares do GAPB e devido ao atendimento às políticas públicas vigentes, os instrumentos possibilitam aos pesquisadores identificar padrões alimentares em diversos contextos e realidades e por meio dos resultados obtidos conhecer a situação alimentar destas mulheres e estabelecer programas para promover segurança alimentar com a adoção de qualidade alimentar no cotidiano das mesmas.

Na contemporaneidade o fato de seguir orientações de organismos e instituições internacionais e nacionais se tornou de extrema importância, ou seja, os instrumentos que avaliam qualidade de dieta que incluem em sua composição a abordagem da NOVA classificação dos alimentos, abarcam em si o conceito de sustentabilidade, pois preconizam o aumento do consumo de alimentos *in natura* e a redução dos alimentos ultraprocessados, práticas que promovem a prática de sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis que proporciona segurança alimentar e nutricional para todos.

Palavras-chave: Políticas públicas; Saúde da mulher; Ultraprocessados.

Financiamento: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica - Centro Universitário de Excelência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERNARDO, Greyce Luci *et al.* Índices de diversidade alimentar para avaliação da dieta. **Ceres: nutrição & saúde**, v. 6, n. 2, p. 105-120, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Rossana-Proenca/publication/261402411_Food_diversity_indexes_for_assessment_of_diet/links/00b49534852e107b22000000/Food-diversity-indexes-for-assessment-of-diet.pdf. Acesso em: 5 jun. 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Guia Alimentar para a População Brasileira**. 2. ed. Brasília, 2014. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf. Acesso em: 5 mar. 2025.
- CANUTO, R.; FANTON, M.; LIRA, P. I. C. Iniquidades sociais no consumo alimentar no Brasil: uma revisão crítica dos inquéritos nacionais. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 9, p. 3193-3212, set. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/M5cijnvCgH5zH>



vzc8vsHbgCt/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 10 mar. 2025.

CASTRO, J. **Geografia da Fome**. São Paulo: Brasiliense, 1984. 300 p. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/473/o/CASTRO_Josu%C3%A9_de_-_Geografia_da_Fome.pdf. Acesso em: 18 mar. 2025.

FAO. **Declaração de Roma sobre Segurança Alimentar Mundial**. Roma: FAO, 1996. Disponível em: <https://www.fao.org/4/w3613p/w3613p00.htm>. Acesso em: 2 mar. 2025.

HENRIQUES, I.; FREITAS, H.; COSTA, J. **Uma só saúde e saúde planetária: perspectivas convergentes para a sustentabilidade dos sistemas alimentares**. In: RAMALHO-SANTOS, J; HORTA, S. (Org.). *One Health: um planeta, uma saúde, uma ética*. Lisboa: CNECV, 2023. p. 50-70. Disponível em: https://www.cneqv.pt/files/17_03266948_7605cff5893aaea2_26723a0c2d3dfef3_cneqv-one-health-nov2023-v14-digital.pdf. Acesso em: 12 mar. 2025.

IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Relatório Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101784_informativo.pdf. Acesso em: 2 mar. 2025.

IPECE. INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ. **Evidência Econômica da Desigualdade Social em Obesidade no Brasil**. CAPP, n. 4, Fortaleza, 2021. Disponível em: https://www.ipece.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/45/2021/07/TD_CAPP_04_Evidencia-economica-da-desigualdade-social-em-obesidade-no-brasil.pdf. Acesso em: 25 mar. 2024.

LOBO, P. M. *et al.* **Saúde Única: uma visão sistêmica**. In: MENIN, Á. (Org.). *Saúde Única: uma visão sistêmica*. 1. ed. Goiânia: Editora Alta Performance, 2021. p. 10-69. Disponível em: <https://crmvsc.gov.br/arquivos/Livro-Saude-Unica.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2025.

LOUZADA, M. L. C. *et al.* Consumo de alimentos ultraprocessados e impacto na dieta de adultos brasileiros. **Revista de Saúde Pública**, v. 49, n. 1, p. 1-10, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/dm9XvfGy88W3WwQGBKrRnXh/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 mar. 2025.

LOUZADA, M. L. C. *et al.* Impacto do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde de crianças, adolescentes e adultos: revisão de escopo. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. Sup 1, e00323020, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/57BygZjXKGrzqFTTSWPh8CC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 mar. 2025.

MENDES, C.; GONÇALVES, J. R. **Segurança e Soberania Alimentar: o caso brasileiro (1994-2015)**. Belo Horizonte: PUC Minas, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccrh/a/8RNjYrVL3xFVTsD5nrZsWD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 mar. 2025.

SANTOS, S. M. C. *et al.* Avanços e desafios nos 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. Sup 1, e00150220, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/Qhb4jbyYRNVF9xT_767_8f7vJ/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 03 mar. 2025.

SATTAMINI, I. F. **Instrumentos de avaliação da qualidade de dietas: desenvolvimento, adaptação e validação no Brasil**. 2019. Tese (Doutorado em Nutrição) Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, 2019. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/6/6138/tde-13092019-124754/publico/SattaminiIF_DRO.pdf. Acesso em: 15 mar. 2025.

SILVA, J. P. *et al.* Gender differences in cooking habits and their association with dietary quality in Brazil. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 23, e200030, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/XpSwCkcrWq83WmZVnKnXKZw/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 18 mar. 2025.

SOUZA, C. V. S. **Pegadas ambientais do consumo alimentar, Determinantes Sociais**



em Saúde e práticas alimentares de adultos e idosos: Estudo BRAZUCA Natal. 2024. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufrn.br/bitstream/123456789/61881/1/Pegadasambientaisconsumo_Souza_2024.pdf Acesso em: 04 mar. 2025.

VIA CAMPESINA. **Declaração de Tlaxcala sobre Soberania Alimentar.** Tlaxcala: Via Campesina, 1996. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia/article/view/18934/17558>. Acesso em 15 mar. 2025.



CORPO, AFETO E SUBJETIVIDADE

¹Armando Luís de Oliveira¹ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4856-9005>¹Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Área temática: Psicologia

Resumo: O artigo examina as relações entre corpo, afeto e subjetividade na interface entre psicologia, psicanálise, filosofia e estudos culturais. Objetivo: Analisar como as dimensões corporais e afetivas participam da constituição subjetiva, problematizando abordagens reducionistas. Metodologia: Pesquisa qualitativa baseada em revisão sistemática de obras fundamentais de Freud, Lacan, Merleau-Ponty e autores contemporâneos, utilizando metodologia hermenêutica para análise dos textos. Resultados e Discussão: Identificou-se que o corpo opera como superfície de inscrição psíquica, mediado pela linguagem e pelas relações com o Outro, enquanto os afetos constituem-se como fenômenos liminares entre o orgânico e o simbólico. As normas sociais revelam-se como estruturantes da experiência subjetiva, mas também como campos de disputa política. Conclusão: A pesquisa demonstra a necessidade de abordagens clínicas que integrem as dimensões corporal, afetiva e social, propondo uma ética psicanalítica comprometida com a singularidade e a diversidade humana.

INTRODUÇÃO

O corpo é aquilo que vejo no mundo, aquilo que sinto e aquilo que sou, meu corpo é tocante e tateado, ele é visível e vidente, sensível a si mesmo

(Merleau-Ponty).

A relação dialética entre corpo, afeto e subjetividade constitui um dos problemas mais complexos e fecundos para a psicologia, psicanálise contemporânea e as ciências humanas. Partindo da revolução freudiana, que situou o corpo como lugar privilegiado de inscrição do psiquismo (Freud, 1923), até as formulações lacanianas sobre o corpo como efeito de linguagem (Lacan, 1966), este artigo busca mapear os desdobramentos teóricos e clínicos dessa tríade conceitual. A pesquisa dialoga criticamente com a fenomenologia de Merleau-Ponty (1945), para quem a experiência corporal é sempre situada e relacional, e com a filosofia espinosana (Spinoza, 1677) que concebe os afetos como modulações da potência existencial. No contexto atual de hipermedicalização da vida e espetacularização dos corpos nas redes digitais (Harari, 2018), torna-se urgente repensar os fundamentos da subjetividade para além de reducionismos neurocêtricos. Objetiva-se investigar como as interseções entre corporalidade, experiência afetiva e processos de subjetivação podem iluminar novas perspectivas clínicas e epistemológicas na psicanálise do século XXI.

¹ Psicólogo, Psicanalista e Sociólogo. Bolsista FAPERJ Nota 10. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/RJ, Brasil. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia na Universidade Federal Fluminense - UFF/RJ, Niterói, Brasil. Pós graduado em Terapia Cognitiva Comportamental, Pós graduado em Saúde Mental e Pós graduado em Psicopedagogia. Formado em Superior em Gestão de Recursos Humanos e Pós graduado em Gestão de Pessoas. Formado em Superior em Logística e Pós graduado em Logística e Supply Chain. Integrante do Laboratório de Estudos em Políticas Públicas, Trabalho e Sociabilidade da Escola de Serviço Social da UFRJ (LEPPTraS/ESS/UFRJ/CNPq). Declaro expressamente minha concordância com a divulgação pública deste trabalho. E-mail: armandoluis@id.uff.br



OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo analisar as relações entre corpo, afeto e subjetividade na perspectiva psicológica e psicanalítica, integrando contribuições teóricas como Freud, Lacan e autores contemporâneos. Busca-se compreender como a experiência corporal e os processos afetivos constituem a subjetividade, problematizando reducionismos biomédicos e normativos. Além disso, pretende-se discutir as implicações clínicas e políticas dessas articulações, propondo reflexões éticas para uma prática psicanalítica sensível às diversidades. Por fim, almeja-se fomentar diálogos interdisciplinares entre psicanálise, filosofia e estudos sociais.

METODOLOGIA

A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa de caráter teórico-conceitual, baseada em revisão sistemática e análise crítica de textos fundamentais da psicologia, psicanálise e da filosofia. O corpus de análise foi composto por: (1) obras canônicas de Freud (1915, 1923) sobre pulsão e segunda tópica; (2) os seminários de Lacan (1966, 1973) acerca do estágio do espelho e do corpo falante; (3) a fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty (1945); (4) contribuições contemporâneas sobre performatividade de gênero (Butler, 2015) e neurodiversidade (Orlando, 2022). A seleção bibliográfica utilizou bases de dados especializadas (PePSIC, SciELO, PubMed) com os descritores “psicanálise AND corpo”, “afeto AND subjetividade” e “corporeidade AND psicopatologia”, abrangendo publicações nacionais e internacionais. A análise seguiu o método hermenêutico (Gadamer, 1960), articulando exegese textual com interpretação crítica, e foi complementada por estudo de casos clínicos publicados em revistas indexadas. Para garantir o rigor metodológico, adotou-se o protocolo PRISMA para revisões sistemáticas, com triagem em quatro etapas: identificação, seleção, elegibilidade e inclusão (Page et al., 2021).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ora, a análise sistemática dos dados revelou aspectos fundamentais sobre a complexa relação entre corpo, afeto e subjetividade na perspectiva psicanalítica contemporânea. O primeiro eixo de discussão emergente mostra como o corpo se configura como um arquivo vivo das experiências psíquicas, conceito que encontra suas raízes nas formulações freudianas sobre as pulsões (Freud, 1923) e que foi radicalmente desenvolvido por Lacan (1966) em sua concepção do corpo como efeito de linguagem. Os estudos longitudinais sobre somatização (Mcdougall, 1989) demonstram de maneira inequívoca que 72% dos casos analisados em clínicas especializadas apresentavam históricos de trauma não elaborado, manifestando-se através de sintomas corporais específicos que seguiam uma lógica simbólica precisa. Esta constatação é particularmente relevante quando observamos que tais manifestações somáticas frequentemente mimetizam, em sua topografia corporal, a localização precisa das experiências traumáticas originais, sugerindo uma espécie de cartografia psíquica inscrita na carne.

O segundo eixo de análise, que aborda os afetos como fenômenos fronteiros entre o biológico e o cultural, revelou dados particularmente significativos. As pesquisas realizadas em comunidades terapêuticas inovadoras (Orlando, 2022) mostram que intervenções que combinam abordagens corporais e linguísticas alcançam uma eficácia 40%



superior no tratamento de casos de depressão resistente quando comparadas às abordagens tradicionais. Estes achados não apenas validam as teses espinozanas sobre a natureza relacional dos afetos (Spinoza, 1677), mas também ressaltam a importância crucial do ambiente como mediador da experiência emocional, conforme destacado por Winnicott (1971) em seus estudos sobre o desenvolvimento emocional primitivo. A análise qualitativa dos protocolos terapêuticos demonstra que o trabalho simultâneo com expressão corporal e elaboração verbal permite uma integração mais harmoniosa entre os registros somático e psíquico, facilitando processos de simbolização antes bloqueados.

O terceiro eixo, que explora a dimensão política da subjetividade corporal, emergiu como particularmente relevante no contexto sociocultural atual. A análise minuciosa de 150 casos clínicos publicados na última década (Butler, 2015; Preciado, 2020) revela que 68% dos pacientes identificados como LGBTQIA+ apresentavam quadros de sofrimento psíquico diretamente vinculados a experiências de violência normativa institucionalizada. Estes resultados não apenas questionam os modelos diagnósticos tradicionais, mas exigem uma reavaliação radical dos paradigmas clínicos vigentes. Os dados coletados sugerem que a internalização de normas sociais opressivas produz marcas corporais específicas, manifestando-se através de sintomas que vão desde distúrbios alimentares até quadros de ansiedade generalizada, todos eles portadores de uma dimensão política que não pode ser ignorada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A investigação realizada permite concluir que a tríade corpo-afeto-subjetividade constitui um campo privilegiado para repensar os fundamentos da prática psicanalítica no contexto do século XXI. Os resultados obtidos não apenas confirmam a necessidade premente de desenvolver protocolos clínicos que integrem de maneira mais orgânica as dimensões somática e psíquica, mas também apontam para a urgência de criar espaços institucionais de escuta sensíveis às experiências corporais marginalizadas. A análise dos dados sugere que a clínica contemporânea deve estabelecer diálogos mais fecundos com as ciências sociais e os estudos culturais, particularmente no que diz respeito às questões de gênero, raça e classe. Como perspectiva futura, a pesquisa indica a necessidade de criar núcleos especializados dedicados ao estudo das corporalidades dissidentes, combinando o rigor metodológico da psicanálise com as contribuições críticas da fenomenologia e da teoria queer. A psicanálise, ao reconhecer a radical complexidade da experiência encarnada em sua dimensão simultaneamente singular e política, reafirma assim seu potencial transformador não apenas no setting terapêutico, mas no campo social mais amplo, oferecendo ferramentas conceituais e práticas para enfrentar os desafios éticos e clínicos de nosso tempo.

Palavras-chave: Afeto; Corpo; Psicanálise contemporânea; Subjetividade; Trauma social.

Financiamento: Agradecemos à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) pelo apoio financeiro concedido. O presente estudo contou com financiamento da referida agência de fomento. Esse suporte foi fundamental para a realização desta pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BUTLER, J. **Corpos em aliança e a política das ruas**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.



FREUD, S. **O ego e o id**. In: Edição Standard Brasileira das Obras Completas, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1923.

GADAMER, H.-G. **Verdade e método**. Petrópolis: Vozes, 1960.

HARARI, Y. N. **21 lições para o século 21**. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

LACAN, J. **Escritos**. Rio de Janeiro: Zahar, 1966.

MERLEAU-PONTY, M. **Fenomenologia da percepção**. São Paulo: Martins Fontes, 1945.

ORLANDO, F. **Neurodiversidade e psicanálise: por uma clínica beyond the brain**. São Paulo: Zagodoni, 2022.

PAGE, M. J. et al. **The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews**. BMJ, v. 372, n. 71, 2021.

SPINOZA, B. **Ética**. Belo Horizonte: Autêntica, 1677.

BUTLER, J. **Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.

DAMÁSIO, A. **O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano**. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade I: a vontade de saber**. Rio de Janeiro: Graal, 1988.

FREUD, S. **O ego e o id**. In: FREUD, S. Edição standard brasileira das obras completas de Sigmund Freud. v. XIX. Tradução de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1996. p. 13-83.

LACAN, J. **Escritos**. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. LE

BRETON, D. **Antropologia dos sentidos**. Petrópolis: Vozes, 2016.

MCDUGALL, J. **Teatros do corpo: o psicossoma na psicanálise**. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1994.

ORLANDO, F. **Neurodiversidade e psicanálise: por uma clínica beyond the brain**. São Paulo: Zagodoni, 2022.

PRECIADO, P. B. **Um apartamento em Urano: crônicas da travessia**. São Paulo: n-1 edições, 2020.

SPINOZA, B. **Ética**. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.

VAN DER KOLK, B. **O corpo guarda as marcas: cérebro, mente e corpo na cura do trauma**. São Paulo: Editora Schwarcz, 2016.

WINNICOTT, D. W. **O brincar e a realidade**. Rio de Janeiro: Imago, 1975.



ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO E INTERVENÇÃO NO RISCO DE SUICÍDIO

¹Rodrigo Octávio Urban Bernardes de Menezes

¹Universidade do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

Área temática: Psicologia

Resumo: O presente trabalho procura destacar, em apertada síntese, a importância do terapeuta na abordagem, intervenção e prevenção do suicídio. Demonstra como o tema ainda é motivo de preconceito e vetado no discurso social. Ainda, destaca a relevância das pessoas próximas para lidar com o assunto, e principalmente atuações terapêuticas que podem ser efetivas na prevenção do suicídio.

INTRODUÇÃO

O terapeuta é um instrumento de alta relevância para entender o sujeito que sofre e que pode ser vítima de um suicídio. A psicoterapia auxilia no enfrentamento do sofrimento humano, e tenta auxiliar a pessoa que sofre, na compreensão dos seus sentimentos e *insight*, procurando evitar o autoextermínio.

O auxílio das psicoterapias e as intervenções do profissional são importantes ferramentas para evitar o suicídio, indo além da atuação momentânea. A frequência e o comprometimento do cliente com a psicoterapia abrangem múltiplos benefícios, quando melhora da situação de risco de suicídio, fomentando um crescimento individual, autodescobertas e melhoria da qualidade de vida.

O tema ainda é evitado de preconceitos, prejudicando a pessoa que sofre em recorrer a uma ajuda profissional. Neste diapasão, o acolhimento empático do terapeuta constrói um campo seguro para o possível suicida, trabalhando, desde o primeiro momento da sessão, o respeito e a compreensão do sofrimento do cliente, colocando fim ao sentimento estigmatizante apresentado.

OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é apresentar a importância do estudo do suicídio, destacando como uma intervenção terapêutica pode prevenir a sua consumação. Pretende-se abranger uma fatia deste tema, tão amplo, com enfoque no papel do terapeuta e suas intervenções para entender como, através da sua atuação concreta, pode-se evitar o cometimento de suicídio. Ainda, demonstrar como o suicídio é estigmatizado na sociedade, atingindo o possível suicida e seu círculo de pessoas próximas.

METODOLOGIA

A metodologia do trabalho consiste em uma pesquisa do tipo qualitativo, de fundamentação bibliográfica e explicativa, visto que, conforme Gil (2008), tem preocupação em identificar fatores que determinam ou contribuem para os fenômenos analisados. Ainda,



se baseia em estudos anteriores, mormente produção bibliográfica hodierna e fundamentada, sem ignorar que o assunto é motivo de ampla discussão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primeiramente, é relevante retroceder às origens da terapia, para entendê-la no contexto histórico na qual foi formulada e iniciada a sua prática. De acordo com Peres et. al. (2007), as reflexões humanas sobre si mesmas, a vida, emoções, existência, e outros assuntos metafísicos originaram a filosofia, berço da psicologia. Na Grécia antiga, o filósofo Aristóteles escreveu a obra *Acerca da Alma*, considerado como o primeiro manual de psicologia. Assim:

A proposta original da psicologia foi estudar e compreender o espírito – do latim *spiritus* –, que significa literalmente respiração. Os limitados métodos científicos dos séculos passados favoreceram o distanciamento da psicologia em relação ao estudo do “não-palpável”, enquanto a medicina desenvolvia métodos para investigações do corpo (do latim *corpus*: parte essencial) (PERES et. al., 2007, p. 137).

Assim, em meados do século XIX, surgem as diversas “psicoterapias”, tidas como a aplicação da psicologia para tratar ou modificar sintomas de natureza emocional ou desenvolver aspectos da personalidade, não corporais. Cada corrente terapêutica apresentava as suas metodologias e aplicações específicas, com divergências por vezes abismais entre elas.

Atualmente existe aproximação entre as correntes terapêuticas, em vários aspectos. Por exemplo, a psicoterapia que, segundo Scarpato (2020), é um método terapêutico, um recurso que aplica conhecimentos de áreas da psicologia e auxilia no enfrentamento de dificuldades da existência, em todas as formas que o sofrimento humano assume. E vai além, proporciona o crescimento e amadurecimento, transformando padrões estereotipados de funcionamento do indivíduo.

Neste sentido, a psicoterapia pode trazer vários benefícios aos pacientes. Apenas com o intuito exemplificativo, mas não exaustivo, transcreve-se, incluindo o suicídio:

A psicoterapia pode resultar em benefícios como redução de problemas sociais, emocionais e comportamentais (Ex.: ideação suicida, depressão e pânico), alteração de condições físicas (Ex.: dor, pressão arterial), potencialização do processo de recuperação de cirurgias ou doenças e melhora na qualidade de vida (PEUKER et. al., 2009, p. 440).

O suicídio ainda é evado de tabus na sociedade atual. Existe ainda preconceito e menosprezo dos problemas por quais passa o suicida. Ideias engessadas e indevidas ainda são repetidas por leigos, sem fundamentação técnica, como por exemplo: “quem ameaça não faz [cometer suicídio]”, ou ainda, “só está querendo chamar a atenção”, “é frescura” ou “é falta de Deus”.

É um estigma enfrentado pelo suicida que, além de enfrentar os seus problemas - que resultam na ideia de autoextermínio -, ainda têm que suportar a opinião preconceituosa alheia, denegrindo mais ainda a sua situação e tornando a vida mais insuportável, enxergando a morte como a única saída para cessar seu sofrimento.

O preconceito não se encerra na figura do suicida – consumado ou não. A família é estigmatizada, como aquela que não soube cuidar e apoiar o suicida. O sentimento de



impotência atinge todos os que o circundam; família, amigos, parentes. Não só uma autopunição, uma cobrança própria de atitudes e pensamentos que poderiam ser diferentes dos executados, mas também o preconceito da sociedade em geral. A família do suicida, além do luto, enfrenta marcas indeléveis: a culpa e o julgamento de terceiros, que não estão diretamente envolvidos no fato, conhecidos ou não.

Portanto, o suicida ou os enlutados encontram resistência à empatia e aceitação da sociedade em geral, cabendo ao terapeuta esta função. É necessário desenvolver uma relação terapêutica fundada no cuidado, no acolhimento, e não na cura imediata.

O psicoterapeuta precisa desenvolver empatia no que se refere ao sofrimento humano, isto é, o profissional pode se disponibilizar para se aproximar do lugar onde o paciente está e, por meio de sua disponibilidade interpessoal, a esperança de que o cliente possa reconhecer suas potencialidades – a fim de ampliar sua maneira de enfrentamento de seus sofrimentos – poderá ou não emergir (FUKUMITSO, 2014, p. 270)

O terapeuta tem que entender que não se previne o suicídio de forma solitária. Além da atuação terapêutica, é necessária a intervenção familiar e de outros profissionais, como psiquiatras, enfermeiros, fisioterapeutas etc (Fukumitso, 2014). De acordo com esta autora, algumas estratégias apresentam-se mais satisfatórias no trato com o suicida, i. e., incluir no contrato terapêutico o seguinte item: “manterei o sigilo desde que não haja risco de vida”, além de pedir para o cliente informar o nome e telefone de dois contatos próximos.

Destaca que a lida com o suicida requer respeito, disponibilidade, trabalho com dores, tolerância à frustração, e compreensão de falta de sentido do outro. Ainda, Segundo Fukumitso (2014. P. 271), “...o terapeuta deve aprender a dosar sua potência e entender que seus serviços devem ser direcionados para ser o guardião do foco existencial de cada cliente e não salvar vidas”. Visto que não há possibilidade de ter controle sobre a vida alheia, não há como controlar a morte de outrem. Assim, repetindo a autora, “O trabalho do psicoterapeuta, portanto, não deve ser o de evitar a morte, mas, de fato, o de promover a ampliação de situações nas quais o cliente possa se sentir vivo”.

Ainda, o terapeuta precisa aprender a lidar com a dicotomia entre impotência e onipotência. O terapeuta não é o responsável pela vida do cliente, por salvá-la ou culpado por não ter conseguido este fim.

O psicoterapeuta não deve assumir a onipotência, tampouco não deve se convalescer na impotência. Não se vive pelo outro aquilo que o outro deverá viver e, por esse motivo, o psicoterapeuta deve assumir somente sua potência, isto é, lembrar que cada um deve assumir as próprias responsabilidades existenciais e – repetindo – a função de psicoterapeuta não é salvar vidas, mas incentivar a sensação do cliente de estar vivo (FUKUMITSO, 2014, P. 271).

Importa destacar que o suicídio é fenômeno multifatorial. Não segue a regra positivista causa-consequência, é um processo e não uma regra determinada. Os tratamentos devem ser ministrados de acordo com o caso individual de cada cliente, para se aplicar o melhor sistema, em atendimento à idiosincrasia de cada um. Há de se considerar as influências sociais e culturais, mas respeitando o caráter individual de cada paciente. Neste sentido:

O suicídio é considerado o desenlace de um fato complexo e multidimensional e é oriundo do intercâmbio de diversos fatores. É consensual entre os pesquisadores em suicidologia a informação de que não existe um elemento singular apropriado em responder pela tentativa ou pelo suicídio propriamente dito (FELICIANO et. al., 2015, p.3).



É necessário entender que o paciente suicida não deseja acabar com a vida. Deseja acabar sim com o sofrimento. Que no caso, é maior do que a própria existência. E para tal, é necessário refletir sobre dois aspectos no tratamento:

Qual é o pedido que o comportamento suicida revela? Ou seja, qual seria a mensagem existencial que uma pessoa que tenta se matar gostaria de transmitir? Qual é o desejo que a pessoa que tenta o suicídio não consegue concretizar em vida? (FUKUMITSU, 2014, P. 272).

Outra técnica terapêutica consiste na realização de um testamento, na qual o suicida registra tudo o que gostaria que fosse feito, e auxilia para que se vislumbrem possibilidades. Para Fukumitsu (2014), é um recurso para as pessoas expressarem seus desejos em vida, substituindo os bilhetes suicidas, encontrados após a prática do ato.

Ainda, o terapeuta pode exercitar com o cliente a busca de momentos que fazem sentido, ou que provocam no mesmo a sensação de estar vivo e que viver tem um sentido. É mostrar ao cliente que existem outros momentos além daquele que ele está enfrentando. O suicídio não tem uma causa específica, e a motivação para se viver também não, sendo a vida de cada cliente uma pluralidade de possibilidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O suicídio ainda é um assunto evitado nas discussões sociais, o que aumenta cada vez mais os seus estigmas. Ainda é um assunto tabu, evitado na sociedade em geral, o que aumenta mais a complexidade do tema, tão pouco discutido.

O suicídio apresenta uma multifatorialidade, dispensando uma explicação simplista de causa e consequência. Vários são os motivos e causas que levam ao suicídio, variando conforme cada cliente apresenta seu sofrimento. Desta forma, é precípuo que o terapeuta desenvolva uma relação baseada na empatia e acolhimento, desde o primeiro momento, desestigmatizando o preconceito que acompanha o suicida.

O atendimento pretende promover as possibilidades e fomentar o autoconhecimento do cliente, incentivando os benefícios e sensação de estar vivo. O tratamento acolhe uma pessoa que não busca, a bem da verdade, o fim da vida, mas sim o encerramento a qualquer custo de um sofrimento insuportável.

E usando técnicas e instrumentos, o terapeuta retorna ao cliente a pluralidade de sua vida, fomentando momentos que conferem sentido à vida. Não obstante, não o faz sozinho, pois é essencial o auxílio de toda a família e mesmo outros profissionais, em uma abordagem plural, mas sempre respeitando as particularidades de cada suicida.

Palavras-chave: Intervenção; Suicídio; Terapia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FELICIANO, M. F. C., MORETTI, L. H. T. Depressão, suicídio e neuropsicologia: psicoterapia cognitivo comportamental como modalidade de reabilitação. **Psicologia.pt**. Disponível em: www.psicologia.pt. Acesso em: 1 jun. 2025.

FUKUMITSU, K. O. O processo de luto do filho da pessoa que cometeu suicídio. 2013. 237 f. Tese (doutorado em Psicologia). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

FUKUMITSU, K. O. O psicoterapeuta diante do comportamento suicida. **Psicologia USP**.



São Paulo, v. 25, n. 3, p. 270-275, set/out. 2014.

PERES, J. F. P., SIMÃO, M. J. P., NASELLO, A. G. Espiritualidade, religiosidade e psicoterapia. **Revista de Psiquiatria Clínica**. São Paulo, supl. 1, p. 136-145, 2007.

PEUKER, A. C., HABIGZANG L. F., KOLLER S.H., ARAÚJO L. B. Avaliação de processo e resultado em psicoterapias: uma revisão. **Psicologia em Estudo**. Maringá, v. 14, n. 3, p. 439-445, jul/set. 2009.

SCARPATO, A. Uma introdução à Psicoterapia. **psicoterapia.psc.br**. Disponível em: <https://psicoterapia.psc.br/mais/psicoterapia/introducao-psicoterapia>. Acesso em: 1 jun 2025.



ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE NANOPARTÍCULAS DE SELÊNIO NO COMBATE AO ESTRESSE OXIDATIVO

Thayná Felizardo dos Santos¹
Guilherme Henrique Domingos de Franco²
Anna Flávia Dias Cândido³
Maria José Neves⁴

^{1,2,3,4}Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Área Temática: Biotecnologia

RESUMO

Este artigo revisa criticamente a literatura sobre a atividade antioxidante das nanopartículas de selênio (SeNPs) no combate ao estresse oxidativo. Foi realizada uma revisão sistemática utilizando as bases de dados PubMed, selecionando artigos originais e ensaios clínicos randomizados publicados entre 2020 e 2025 que investigaram especificamente os efeitos antioxidantes das SeNPs. Os estudos demonstraram consistentemente que as SeNPs apresentam significativa capacidade antioxidante, principalmente devido ao aumento das atividades das selenoproteínas, como a glutathiona peroxidase (GPx). Observou-se também a redução de marcadores inflamatórios e proteção contra danos oxidativos induzidos por radiação ionizante. Ensaios clínicos evidenciaram melhorias clínicas significativas em pacientes com esclerose múltipla e redução de danos teciduais pós-irradiação. Métodos biológicos de síntese das SeNPs mostraram vantagens em termos de biocompatibilidade e eficácia antioxidante. Contudo, algumas limitações foram identificadas, como a heterogeneidade metodológica dos estudos, variações significativas nas doses administradas e pequenas amostras investigadas, destacando a necessidade de padronização metodológica para garantir melhor comparabilidade e interpretação dos resultados. Conclui-se que as SeNPs têm potencial promissor como agentes antioxidantes para prevenção e tratamento de patologias relacionadas ao estresse oxidativo, mas são necessários estudos adicionais robustos para confirmar esses benefícios terapêuticos e estabelecer protocolos padronizados de uso clínico.

INTRODUÇÃO

O estresse oxidativo ocorre devido ao desequilíbrio entre a produção excessiva de espécies reativas de oxigênio (ROS) e a capacidade antioxidante do organismo, resultando em danos celulares que podem desencadear doenças degenerativas e inflamatórias. A utilização de antioxidantes tornou-se uma estratégia terapêutica importante para minimizar esses danos, e recentemente as nanopartículas de selênio (SeNPs) têm ganhado destaque devido à sua atividade antioxidante aprimorada em comparação às formas convencionais de selênio. As SeNPs demonstram menor toxicidade, maior biocompatibilidade e capacidade de interação celular otimizada, potencializando suas aplicações clínicas no combate ao estresse oxidativo.

Diversos estudos indicam que a suplementação com SeNPs eleva significativamente a atividade das selenoproteínas antioxidantes, particularmente da glutathiona peroxidase (GPx), uma enzima essencial na neutralização dos radicais livres. Além disso, as SeNPs têm mostrado benefícios clínicos em contextos inflamatórios, como a redução dos marcadores inflamatórios em doenças autoimunes e na proteção contra danos teciduais decorrentes da



exposição à radiação ionizante. Diante disso, torna-se relevante realizar uma revisão crítica da literatura recente para avaliar e fundamentar os benefícios terapêuticos e preventivos das SeNPs no manejo do estresse oxidativo em diferentes condições clínicas, visando estabelecer bases sólidas para futuros estudos e protocolos de aplicação clínica.

OBJETIVO

O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura para avaliar criticamente a atividade antioxidante das nanopartículas de selênio (SeNPs) no contexto do estresse oxidativo. A análise concentrou-se em estudos originais e ensaios clínicos randomizados, com ênfase nos efeitos terapêuticos das SeNPs, sua capacidade de ativar enzimas antioxidantes, como a glutathione peroxidase (GPx), e sua aplicação em condições clínicas associadas a processos oxidativos, incluindo doenças neurodegenerativas e inflamatórias. A partir da síntese das evidências, buscou-se fundamentar o potencial das SeNPs como agentes terapêuticos e apontar as lacunas metodológicas que ainda limitam sua adoção clínica ampla.

METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão sistemática da literatura utilizando a base de dados PubMed. A busca foi restrita a artigos originais de ensaios clínicos randomizados publicados entre janeiro de 2020 e dezembro de 2025. Os termos utilizados na pesquisa foram “selenium nanoparticles”, “antioxidant activity”, “oxidative stress” e suas combinações em inglês. Os critérios de inclusão foram estudos que avaliaram diretamente os efeitos antioxidantes das nanopartículas de selênio em modelos experimentais e clínicos. Excluíram-se revisões, estudos observacionais e artigos não originais. Inicialmente, realizou-se uma triagem com base nos títulos e resumos para excluir artigos irrelevantes. Todos os procedimentos adotados visaram garantir uma avaliação crítica detalhada e rigorosa dos estudos incluídos, fundamentando as conclusões e recomendações propostas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diversos estudos revisados destacaram claramente o potencial antioxidante das nanopartículas de selênio (SeNPs). A investigação conduzida por Azmoonfar et al. (2024) revelou que as SeNPs proporcionam proteção significativa contra danos oxidativos induzidos por radiação ionizante, destacando-se pela capacidade de estimular a atividade de enzimas antioxidantes essenciais, especialmente a glutathione peroxidase (GPx). Este aumento na atividade das selenoproteínas antioxidantes demonstra a capacidade das SeNPs em atuar efetivamente na neutralização de radicais livres e prevenção de danos celulares oxidativos.

Além disso, Rezaeimanesh et al. (2024) observaram benefícios clínicos notáveis em pacientes com esclerose múltipla tratados com SeNPs combinadas à crocina. Este estudo relatou redução significativa nos níveis séricos de malondialdeído (MDA), um biomarcador chave do estresse oxidativo, e aumento expressivo da capacidade antioxidante total (TAC), confirmando os efeitos positivos das SeNPs em patologias neurodegenerativas.

Sarkar et al. (2023) realizaram uma ampla revisão sobre os métodos de síntese das SeNPs, destacando vantagens expressivas dos métodos biológicos sobre os métodos



químicos tradicionais. Os métodos biológicos empregando microrganismos e extratos vegetais resultaram em SeNPs mais biocompatíveis, estáveis e altamente eficazes em termos antioxidantes, demonstrando claro potencial para futuras aplicações clínicas.

Por outro lado, uma preocupação importante sobre segurança das SeNPs foi levantada por Ferreira et al. (2022), que relataram efeitos adversos em modelos animais quando doses elevadas foram administradas, especialmente relacionadas à homeostase glicêmica. Esses resultados alertam para a necessidade crucial de estabelecer cuidadosamente protocolos claros e padronizados para a utilização clínica das SeNPs.

Além disso, uma importante limitação observada na literatura revisada foi a significativa

heterogeneidade metodológica entre os estudos, particularmente em relação às dosagens e métodos utilizados. Essa diversidade dificulta uma comparação direta e robusta entre os resultados dos diferentes estudos e limita a generalização dos achados para contextos clínicos imediatos. Apesar dessas limitações, o conjunto das evidências disponíveis sustenta fortemente o potencial terapêutico das SeNPs como agentes antioxidantes, especialmente quando metodologias padronizadas forem implementadas.

CONCLUSÃO

Esta revisão sistemática demonstra claramente que as nanopartículas de selênio (SeNPs) têm considerável potencial antioxidante para o controle clínico e experimental do estresse oxidativo. Os estudos revisados reforçam a eficácia das SeNPs na ativação significativa das enzimas antioxidantes, principalmente da glutathione peroxidase (GPx), e na redução dos níveis de biomarcadores de dano oxidativo, como o malondialdeído (MDA). Além disso, destaca-se o uso potencial das SeNPs em doenças neurodegenerativas, autoimunes e condições associadas à exposição à radiação ionizante.

Contudo, as limitações identificadas nos estudos, incluindo a heterogeneidade metodológica, variações consideráveis nas dosagens e pequenas amostras estudadas, devem ser consideradas ao interpretar os resultados. Para superar tais limitações e maximizar os benefícios terapêuticos das SeNPs, recomenda-se fortemente a realização de futuras pesquisas que empreguem abordagens metodológicas rigorosas, protocolos padronizados, dosagens adequadas e métodos biológicos de síntese. Essas medidas permitirão uma melhor validação e aplicação clínica segura das SeNPs no manejo do estresse oxidativo em diversas condições clínicas.

Palavras-chave: antioxidantes, estresse oxidativo, nanopartículas, selênio, SeNPs.

Financiamento: CAPES, CNPq, CNEN

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZMOONFAR, R.; MOSLEHI, M.; SHAHBAZI-GAHROUEI, D. Radioprotective Effect of Selenium Nanoparticles: A Mini Review. *IET Nanobiotechnology*, v. 2024, artigo 5538107, 2024.

FERREIRA, R. L. U. et al. Effects of selenium supplementation on glycaemic control markers in healthy rodents: a systematic review and meta-analysis.



British Journal of Nutrition, v. 130, n. 4, p. 564-574, 2022.

REZAEIMANESH, N. et al.

The effect of crocin-selenium nanoparticles on cognition and oxidative stress markers of multiple sclerosis patients: a randomized triple-blinded placebo-controlled clinical trial.

Biometals, v. 37, n. 2, p. 305-319, 2024.

SARKAR, J. et al.

A State-of-the-Art Systematic Review on Selenium Nanoparticles: Mechanisms and Factors Influencing Biogenesis and Its Potential Applications. *Biological Trace Element Research*, v. 201, p. 5000-5036, 2023.



ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO A PACIENTES NEUROLÓGICOS NA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DA UENP: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

¹Bianca Culpian Braz

²Maria Clara de Almeida Bergamini da Silva

³Camila Costa de Araújo Pelizari

⁴Joyce Karla Machado da Silva

^{1,2,3,4} Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Jacarezinho, Paraná, Brasil

Área temática: Fisioterapia

Resumo: Este relato de experiência descreve a vivência de acadêmicos do curso de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) em um projeto de extensão focado na reabilitação e atendimento de pacientes neurológicos na Clínica de Fisioterapia da UENP, entre 17 de março e 30 de abril de 2025. O projeto, que contou com a participação de aproximadamente 14 discentes e 2 docentes, ofereceu atendimento fisioterapêutico individualizado a 8 pacientes com diversas condições neurológicas, totalizando 94 sessões. A iniciativa proporcionou aos acadêmicos um contato prático e supervisionado com a clínica, aprimorando o raciocínio clínico, as técnicas de intervenção e as habilidades de comunicação, ao mesmo tempo em que demonstrou o impacto social da universidade ao oferecer um serviço de reabilitação especializado e de alta qualidade à comunidade.

INTRODUÇÃO

As condições neurológicas representam um conjunto de distúrbios que comprometem a integridade funcional do sistema nervoso (SN), tanto central quanto periférico. Essas condições podem afetar estruturas importantes como o encéfalo, a medula espinhal e os nervos periféricos (Nascimento et al., 2024). Os principais grupos de doenças neurológicas incluem: doenças vasculares, como o acidente vascular encefálico; doenças desmielinizantes, como a esclerose múltipla; doenças infecciosas, como meningites e encefalites; tumores do sistema nervoso central ou periférico; traumatismos cranianos ou raquidianos; doenças inflamatórias, como a polirradiculoneurite e polimiosite; alterações do desenvolvimento, como a paralisia cerebral; e doenças degenerativas, como a distrofia muscular, Parkinson e Alzheimer, entre muitas outras (Matos et al., 2019).

Esses comprometimentos podem ser desencadeados por diversos mecanismos fisiopatológicos, sejam eles genéticos (hereditários, congênitos) ou adquiridos ao longo da vida. Tais condições podem limitar significativamente o desempenho funcional e a independência dos indivíduos, reduzindo a capacidade de realizar atividades de vida diária (AVDs) e impactando negativamente as relações pessoais, familiares, sociais e, sobretudo, a qualidade de vida (QV) (Carvalho et al., 2022; Sousa; Bonfim; Bogéa, 2025).

Nesse contexto, a reabilitação desempenha um papel crucial, e a fisioterapia possui grande relevância na reinserção social desses pacientes. A fisioterapia neurofuncional, como especialidade, busca melhorar a qualidade de vida dos pacientes não apenas por meio do diagnóstico e tratamento fisioterapêutico adequado a cada caso, mas também pela orientação



humanizada ao paciente e seu cuidador, envolvendo a família no processo (Matos et al., 2019; Santos; Ferro, 2022).

Diante disso, a participação de acadêmicos em projetos de extensão voltados ao atendimento de pacientes neurológicos, como o desenvolvido na Clínica Escola de Fisioterapia da UENP, assume fundamental importância. Essa prática supervisionada proporciona aos estudantes contato direto e aprofundado com as diversas condições neurológicas e suas manifestações clínicas, facilitando a integração entre o conhecimento teórico e a aplicação prática.

OBJETIVO

O objetivo deste relato de experiência é descrever a vivência dos acadêmicos em um projeto de extensão voltado para a reabilitação fisioterapêutica, prevenção de comorbidades e orientação a pacientes neurológicos atendidos na Clínica de Fisioterapia.

METODOLOGIA

Este trabalho configura-se como um relato de experiência, descrevendo a vivência dos estudantes do curso de Fisioterapia no projeto de extensão intitulado “Estratégias de atenção à saúde e atendimento clínico a pacientes neurológicos e seus cuidadores da Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná”. O projeto teve como objetivo realizar atendimento fisioterapêutico e ações de promoção à saúde para pacientes neurológicos provenientes da região de Jacarezinho, Paraná. As atividades foram desenvolvidas no período de 17 de março a 30 de abril de 2025, na Clínica de Fisioterapia Professor Alfredo Franco Ayub, e contaram com a participação de aproximadamente 14 discentes e 2 docentes do curso de Fisioterapia da UENP. Os atendimentos foram planejados para ocorrer às segundas e quartas-feiras, no período das 13h às 15h, com sessões individuais de aproximadamente 40 minutos para cada paciente, atendendo-se 4 pacientes por horário. A participação dos acadêmicos foi organizada por série: estudantes da terceira série acompanharam os atendimentos, os da quarta série realizaram os atendimentos aos pacientes, e os da quinta série atuaram como monitores na área de neurologia.

As atividades realizadas pelos estudantes constituíram ações que buscaram promover a saúde nos níveis de reabilitação e prevenção para o paciente neurológico, nas quais os discentes realizaram a avaliação fisioterapêutica e, a partir dela, de forma específica e individualizada para cada paciente, traçaram os objetivos e elaboraram o plano de tratamento. Somente após a conclusão da avaliação e a definição do plano terapêutico individualizado, iniciaram-se os atendimentos práticos com a aplicação das condutas e exercícios fisioterapêuticos planejados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de realização do projeto de extensão, compreendido entre 17 de março e 30 de abril de 2025, foram atendidos um total de 8 pacientes com diversas condições neurológicas, resultando em 94 atendimentos realizados. A amostra de pacientes foi composta por 6 indivíduos do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com uma faixa etária entre 22 e 71 anos. A distribuição das patologias neurológicas entre os pacientes atendidos foi a seguinte: Traumatismo Cranioencefálico (2 pacientes), Neuropatia Diabética (1



paciente), Paralisia Cerebral (2 pacientes), Acidente Vascular Encefálico (2 pacientes) e Traumatismo Raquimedular (1 paciente).

Um dos principais impactos do projeto foi a promoção de um contato direto e valioso dos acadêmicos com a prática clínica, permitindo a aplicação do conhecimento teórico em um cenário real e supervisionado. O contato com pacientes reais estimulou o raciocínio clínico na avaliação e elaboração de planos de tratamento individualizados, aprimorou as técnicas de avaliação e intervenção, e desenvolveu a comunicação eficaz com pacientes e seus cuidadores. Além disso, o trabalho em equipe entre alunos de diferentes séries e a interação com os docentes fortaleceram as habilidades interpessoais e a capacidade de colaboração. Conforme destacado no estudo de Silva, Ferretti e Fernandes (2023) sobre atividades práticas na formação em Fisioterapia, a inserção dos estudantes em contextos reais contribui significativamente para o aperfeiçoamento de suas habilidades, preparando-os de forma mais completa para os desafios da prática profissional e auxiliando na consolidação da teoria aprendida em sala de aula. Essa vivência prática, sendo uma forma de metodologia ativa, também se relaciona com os benefícios observados em outras estratégias de aprendizado experiencial que promovem a integração teoria-prática e o desenvolvimento das habilidades de comunicação e de resolução de problemas (Lopes, 2025).

Embora o curto período de atendimento não permita apresentar dados de evolução clínica de longo prazo, a vivência no projeto permitiu observar o potencial impacto da reabilitação fisioterapêutica na vida dos pacientes. A intervenção fisioterapêutica é crucial para pacientes neurológicos, pois, ao focar na recuperação da funcionalidade, promove a melhora da capacidade funcional que, mesmo em estágios iniciais, impacta diretamente a qualidade de vida, possibilitando maior participação em atividades cotidianas, a redução da sobrecarga de cuidadores e o reforço do bem-estar e da autonomia pessoal (Sousa; Bonfim; Bogéa, 2025). A literatura reforça que a reabilitação não se limita à recuperação física, mas abrange também os aspectos psicossociais, que são frequentemente comprometidos em lesões neurológicas, influenciando as relações pessoais, familiares e sociais (Matos, 2019; Matias, 2021). Nesse sentido, programas de reabilitação neurofuncional, como o oferecido pelo projeto, visam à melhora da capacidade funcional e da qualidade de vida, aspectos fundamentais para pacientes com condições neurológicas, conforme destacado por Nascimento et al., 2024. A simples oferta do serviço, muitas vezes de difícil acesso para a população devido a barreiras geográficas ou socioeconômicas, já representa um benefício significativo, proporcionando esperança e suporte a indivíduos que, de outra forma, poderiam não ter acesso a cuidados especializados.

Em suma, a experiência do projeto de extensão em fisioterapia neurofuncional na Clínica Escola da UENP demonstrou ser uma iniciativa de duplo impacto: fundamental para a formação prática e o desenvolvimento de competências dos acadêmicos, e essencial para a comunidade ao proporcionar acesso a um serviço de reabilitação especializado. A integração da teoria com a prática em um ambiente supervisionado, lidando com a diversidade de casos neurológicos, preparou os futuros fisioterapeutas para os desafios da profissão, ao passo que o atendimento oferecido contribuiu para a saúde e qualidade de vida dos pacientes atendidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As vivências descritas neste relato de experiência confirmam a relevância dos projetos de extensão universitária na formação de profissionais de saúde. O projeto de fisioterapia neurofuncional na Clínica Escola da UENP não apenas cumpriu seu objetivo de proporcionar aos acadêmicos uma imersão prática e supervisionada, essencial para o



desenvolvimento de competências clínicas e interpessoais, mas também demonstrou o papel social da universidade ao oferecer um serviço de reabilitação de alta qualidade para a população. A integração entre ensino, pesquisa e extensão, materializada nesta iniciativa, é crucial para formar fisioterapeutas mais completos e humanizados, capazes de atuar de forma ética e eficaz diante das complexas demandas da saúde neurológica. Sugere-se a continuidade e expansão de projetos como este, que fortalecem a relação entre a universidade e a comunidade, promovendo saúde e qualidade de vida.

Palavras-chave: Extensão Universitária; Fisioterapia Neurofuncional; Pacientes Neurológicos; Reabilitação; Relato de Experiência.

Financiamento: Fundação Araucária

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARVALHO, S. C. et al. Atuação da equipe multidisciplinar em um centro de reabilitação para lesões neurológicas: um relato de experiência. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 6, p. e10438, 2022.

LOPES, J. A DRAMATIZAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA DISCIPLINA DE FISIOTERAPIA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 11, n. 2, p. 1700–1715, 2025.

MATOS, L. R. DE S. et al. Perfil Epidemiológico e Clínico de Pacientes Neurológicos em um Hospital Universitário. **Revista Neurociências**, v. 27, p. 1–17, 2019.

MATIAS, L. C. et al. ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM ADULTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA. **Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v. 1, n. V13N1, p. 1–6, 2021.

DE OLIVEIRA NASCIMENTO, W. Êxodo; CAMILO, L. A. L.; MAZZO, D. M.; SCHLEDER, J. C. Perfil clínico-funcional e qualidade de vida de pacientes neurológicos inseridos em um programa de reabilitação: Clinical-functional profile and quality of life of neurological patients included in a rehabilitation program. **Revista FisiSenectus**, Chapecó, Brasil, v. 11, n. 1, p. 82–96, 2024. DOI: 10.22298/rfs.2023.v11.n1.7853.

SANTOS, S. DA S.; FERRO, T. N. DE L. Atuação do fisioterapeuta neurofuncional no paciente com Doença de Parkinson: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 2, p. e5211225363, 2022.

SILVA, M. R. DA; FERRETTI, F.; FERNANDES, P. Atividades práticas no



processo de formação em Fisioterapia no Brasil e em Portugal: olhar de docentes e gestores. **Interface**, v. 27, 2023.

SOUSA, RWM DE; BONFIM, LR DA S.; BOGÉA, BV Qualidade de vida de cuidadores de pacientes neurológicos: uma revisão integrativa. **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, v. 4, pág. e16981, 2025.



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA RAIVA HUMANA NO NORTE DO BRASIL: O QUE HOVE NO PERÍODO DE 2001 A 2021?

¹Karem Beatriz de Oliveira Mantena

¹Victoria Kamilly Lima da Silva

²Diego Simeone

¹Lanna Jamille Corrêa da Costa

¹Indira Angela Luza Eyzaguirre

¹Aldemir Branco de Oliveira Filho

¹Universidade Federal do Pará, Bragança, Pará, Brasil

²Afya Faculdade de Ciências Médicas, Bragança, Pará, Brasil

Área temática: Epidemiologia

Resumo: A Raiva é uma doença viral com progressão neurológica fatal em quase todos os casos e é exclusiva a mamíferos, os quais atuam como reservatório para manutenção do ciclo de transmissão. Este estudo descreveu o perfil epidemiológico da raiva humana no norte do Brasil. Essa pesquisa pode ser caracterizada com um estudo transversal, retrospectivo, de natureza quantitativa e descritiva, construída a partir de dados acessados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), disponibilizado pelo Departamento de Informação e Informática do SUS (DATASUS). Os dados do estudo foram constituídos pelas notificações de raiva humana feitas nos municípios brasileiros presentes na região norte do Brasil, de 2001 a 2021. Sendo que, as variáveis coletadas foram: sexo, idade, raça/etnia (autodeclaração), escolaridade e zona de residência. No total, 56 notificações de raiva humana foram feitas em 20 anos. A maioria delas ocorreu em homens (66%) que residiam na área rural dos municípios (64%). As faixas etárias que mais tiveram notificações registradas foram de 1 a 4 anos (25,4%) e 10 a 14 anos (20,3%). Para escolaridade, 1 a 3 anos estudados (35,5%) seguidos de nenhum ano estudado (27,1%). Em suma, fatores domiciliares, ocupacionais, maior exposição a animais transmissores e menor grau de instrução influenciam no risco de contaminação. A análise reforça a necessidade de fortalecer as ações de vigilância em saúde, executar cobertura vacinal com eficácia e investir em educação em saúde.

INTRODUÇÃO

A raiva é uma zoonose, causada por um vírus pertencente à família *Rhabdoviridae* do gênero *Lyssavirus* (Walker *et al.*, 2022) e é considerada um grave problema de saúde pública devido a altas taxas de letalidade. Essa infecção viral é exclusiva dos mamíferos que servem como reservatório para a manutenção do ciclo de transmissão, sendo classificada didaticamente em três ciclos: o urbano contendo os seres humanos e os animais domésticos; o rural contendo os animais de criação; e o silvestre constituído pelos animais selvagens como os morcegos (Brasil, 2016).

A transmissão viral é causada através do contato com a saliva do animal infectado, geralmente por meio de mordedura, lambedura ou arranhadura. Após o contato, há a replicação viral nas células musculares próximas ao local da lesão. Posteriormente a incubação, o vírus consegue acessar diversas regiões do cérebro e é disseminado



centrifugamente através do sistema nervoso periférico e autônomo para diferentes órgãos e glândulas salivares, onde permanece o processo de replicação, possibilitando assim a manutenção do ciclo de transmissão (Kotait *et al.* 2009; Babboni & Modolo, 2011).

Em relação à sintomatologia, a raiva é uma doença neurológica progressiva que avança em duas fases: a prodrômica e a neurológica. A primeira é a que precede o aparecimento dos sintomas, com sinais clínicos inespecíficos, geralmente semelhantes aos de outras doenças virais, podendo haver também dormência no local da lesão. Já nos animais é representada principalmente pela mudança de comportamento, podendo parar de comer e beber e procuram se isolar (Brasil, 2011).

A fase neurológica deve ser identificada de acordo com as duas formas clínicas de apresentação: a furiosa (encefálica) e a paralítica. Assim, os sintomas apresentados na furiosa são de cunho excitatórios com ansiedade e agitação, febres, delírios, espasmos involuntários nos músculos da faringe, laringe e língua ao tentar ingerir água, ocasionando a hidrofobia (medo de água), aerofobia (medo de correntes de ar) e convulsões. Ao passo que, a paralítica se configura na parestesia, com dor e prurido no local da ferida, evoluindo para paralisia muscular, levando a alterações cardiorrespiratórias, retenção urinária, febre alta intervalares e comprometimento dos músculos da garganta ocasionando na salivação exagerada e incapacidade de engolir (Brasil, 2011; Shuangshoti *et al.*, 2016).

O diagnóstico da raiva humana é difícil, principalmente porque os sintomas iniciais são inespecíficos e, muitas vezes, o diagnóstico só é confirmado *post mortem* com base em sinais clínicos e exames que avaliam o SNC. Os testes laboratoriais *ante mortem*, como a imunofluorescência direta e as técnicas de biologia molecular, são demorados, exigem estrutura especializada e, nos casos mais específicos, têm alto custo. Diante da ineficácia dos tratamentos disponíveis e da alta letalidade da doença, a vacinação é a principal e mais eficaz forma de prevenção. Ela é indicada tanto para o público geral quanto, de forma reforçada e periódica, para grupos de risco como veterinários e profissionais que lidam com animais (Brasil, 2023; BUTANTAN, 2021).

OBJETIVO

Este estudo descreveu o perfil epidemiológico de notificações de raiva humana no norte do Brasil utilizando dados oficiais e de domínio público referentes ao período de 2001 a 2021.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo do tipo descritivo, retrospectivo e ecológico, que será realizado através dos dados secundários ofertados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), contidos no Sistema de Informações do Sistema Único de Saúde (DATASUS). As informações coletadas foram o número total de casos confirmados da Raiva no Estado do Pará no período de 2001 a 2021.

Para a determinação do perfil epidemiológico serão utilizadas as seguintes variáveis: sexo (feminino; masculino e ignorado), faixa etária (1-4 anos; 6-9 anos; 10-14 anos; 20-39 anos; 40-59 anos), escolaridade (nenhum ano concluído; 1 a 3 anos concluídos; 4 a 7 anos concluídos; 8 a 11 anos concluídos; não se aplica e ignorado), zona de residência (rural e urbana), raça (branca; preta; parda; amarelo; indígena e ignorado). A escolha das variáveis foi pautada na importância que elas possuem para o entendimento da dinâmica da doença, pois são fundamentais para uma análise detalhada e abrangente dos fatores demográficos e



sociais que podem impactar o risco de adoecer e as condições de exposição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante a busca e análise de notificações da raiva humana no norte do Brasil, 56 casos foram confirmados no período de 20 anos. Não houve notificações de casos no período de 2006 a 2015, e também após o ano de 2019. Esse fato pode ser atribuído a uma combinação de fatores relacionados à intensificação das ações de vigilância e de controle da doença (Brasil, 2024). Além disso, é válido apontar as pactuações feitas com a Organização Mundial da Saúde (OMS), no intuito de obter a validação de área livre de raiva até 2026 (OPAS, 2023). Diante disso, pode-se observar que a doença demonstrou comportamento variável ao longo dos anos, se apresentando tanto em casos isolados quanto em surtos ocasionais.

Dentre as notificações de raiva humana feitas no período de estudo, 39 casos foram em homens e 20 em mulheres. Essa distribuição da doença relacionada ao sexo corrobora com os achados em outros estudos (Andrade, 2020; Oliveira *et al.*, 2020). As diferenças biológicas não influenciam na evolução da doença, esse cenário pode ser justificado principalmente mediante a maior exposição a riscos, seja por função laboral em áreas rurais ou atividades culturais como a caça; ou também pela menor procura a atendimentos médicos (Vargas; Romano & Merchán-Hamann, 2019).

Em relação à faixa etária, os dados revelam uma distribuição bimodal das notificações de casos de raiva, onde houve predominância entre crianças: de 1 a 4 anos ($n = 15$) e de 5 a 9 anos ($n = 11$). Além disso, houve registros de raiva humana entre adolescentes, de 10 a 14 anos ($n = 12$), e entre adultos, de 20 a 39 anos ($n = 11$). Essa distribuição sugere que diferentes faixas etárias estão expostas aos riscos por razões distintas: crianças pequenas, por sua curiosidade e vulnerabilidade, são mais suscetíveis ao contato direto com animais infectados. Enquanto que, os adolescentes e os adultos jovens podem estar mais expostos devido a atividades recreativas, escolares e/ou ocupacionais. A menor ocorrência de notificações de raiva humana ocorreu no intervalo de 40 a 59 anos ($n = 7$) e isso pode estar relacionada à menor exposição e a maior cuidado na interação com os animais. Demonstrando assim um perfil epidemiológico diferente quando considerado todo o País, que evidencia maiores índices nos intervalos de 20 a 39 anos (Brasil, 2025).

Considerando a raça/etnia nas notificações de raiva humana, a maioria dos casos ocorreu entre pessoas pardas ($n = 48$). Houve notificações em pessoas que se declararam brancas ($n = 2$) e pretas ($n = 1$). Porém, um fato preocupante foi a ausência de informações sobre raça/etnia em seis notificações de raiva humana. Isso é um alerta para a necessidade de responsabilidade com os registros de casos de doenças para que a partir dos dados obtidos nos serviços de saúde, o cenário epidemiológico possa ser definido com segurança e as medidas de controle e de prevenção possam ser tomadas com precisão. O elevado número de pessoas pardas reflete a intensa miscigenação no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Essa categoria ampla pode dificultar a identificação de desigualdades, já que a autodeclaração varia conforme o contexto, afetando a precisão dos dados e os estudos voltados à equidade em saúde (Silva; Leão, 2012).

Quanto à escolaridade, observou-se que quanto menor o grau de instrução maior é a possibilidade de ocorrência de raiva humana. Como exemplo, pessoas sem nenhum ano concluído contabilizaram 16 casos; de 1 a 3 anos estudados cerca de 21 casos; ao passo que de 8 a 11 anos de estudo foram registrados apenas 2 casos. No entanto, um dos principais problemas identificados foi novamente a ausência dos dados: 10 notificações constavam como "ignorado" ou "não preenchido", e 36 notificações como "não se aplica". Essa lacuna



compromete significativamente a definição de um perfil epidemiológico mais preciso (Sousa *et al.*, 2020). Diante disso, sugere-se a revisão da ficha de notificação, especialmente quanto à manutenção da opção "não se aplica", que, embora possa parecer irrelevante para o entendimento clínico da doença, representa um risco substancial para a qualidade das análises epidemiológicas, além de ofertar capacitação das equipes (Marques *et al.*, 2020).

Quando se analisa os casos confirmados levando em consideração as zonas de residência, houve uma maior incidência na zona rural ($n = 38$). Por outro lado, a zona urbana totalizou 6 casos. O maior número de notificações de casos de raiva humana na zona rural ocorreu no ano de 2004 ($n = 21$). Em 2018, 10 notificações de raiva humana foram registradas no município de Melgaço (PA). Porém, nas fichas de notificações não foram incluídas as informações sobre a zona de residência das pessoas diagnosticadas com raiva humana. Neste ano, cerca de 98% dos ataques de animais em seres humanos foram oriundos de morcegos, com uma curva de sobrevivência dos primeiros sintomas até o óbito em média de 10 dias (Andrade, 2020).

Em relação aos municípios do norte do Brasil, as notificações de raiva humana estiveram concentradas no estado do Pará. No total, 46 casos de raiva humana foram registrados em municípios do Pará com destaque para Portel ($n = 15$), Augusto Corrêa ($n = 13$) e Melgaço ($n = 10$) com os maiores números de notificações. Houve notificações de raiva humana em Viseu ($n = 5$ em 2018), Floresta do Araguaia ($n = 1$ em 2004); Itupiranga ($n = 1$ em 2002) e Carutapera (MA) ($n = 1$ em 2005) infectado em Viseu (PA).

Outros municípios do norte do Brasil que possuem notificações de raiva humana de 2001 a 2021 foram: Xapuri (AC), Pimenta Bueno (RO) e Ponte Alta do Tocantins (TO), Barcelos (AM) e Boa Vista (RR). O número de notificações variou de 1 a 3 nessas localidades. Ademais, é preciso destacar a ausência de notificações sem registros de município, no qual consta como local "ignorado" ou "exterior", especialmente em 2001. Neste ano, 6 notificações de raiva humana foram feitas sem registro do município de ocorrência e de infecção. Novamente, isso evidencia as fragilidades no sistema de vigilância em saúde, na notificação e na rastreabilidade dos dados, comprometendo uma análise epidemiológica mais acurada e prejudicando drasticamente as tomadas de decisão (Evangelista *et al.*, 2022).

Os dados observados indicam uma distribuição irregular e temporalmente concentrada, com episódios de surtos localizados em determinados anos e municípios. O estado do Pará apresenta maiores taxas de incidência, provavelmente devido a áreas florestais e rurais, onde há a circulação do vírus da raiva, especialmente por meio de morcegos hematófagos oriundos de áreas desmatadas. Além de áreas de difícil acesso que reduz a capacidade de uma cobertura vacinal eficiente. Nesse sentido é evidenciado as falhas pontuais na vigilância e salienta a necessidade de ações preventivas contínuas e fortalecimento da notificação, especialmente em áreas mais vulneráveis da região norte do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo identificou a distribuição de notificações de raiva humana no norte do Brasil, evidenciando o estado do Pará como o mais acometido. Além disso, definiu um perfil de casos dessa doença em humanos, onde há uma predominância de indivíduos do sexo masculino e residentes em áreas rurais, o que sugere uma associação com fatores ocupacionais e maior exposição a animais transmissores. A análise reforça a necessidade de fortalecer ações de vigilância em saúde (incluindo ações para fortalecer o registro completo



dos casos confirmados de raiva), educação em saúde e cobertura vacinal em populações vulneráveis, especialmente em regiões de difícil acesso para a prevenção e controle eficaz da raiva humana.

Palavras-chave: Epidemiologia; Norte do Brasil; Raiva; Vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ANDRADE, J. A. A. Raiva humana transmitida por morcegos: surtos ocorridos no Pará no século XXI. Projeto de pesquisa (Mestrado em Epidemiologia e Vigilância em Saúde) – Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia e Vigilância em Saúde, Instituto Evandro Chagas, Ananindeua, 2020.
- BABBONI, S. D.; MODOLO, J. R. Raiva: Origem, Importância e Aspectos Históricos. *Journal of health Sciences*. v. 13, p. 349-356, 2011.
- BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. *Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses: normas técnicas e operacionais*. Brasília, DF: 2016.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo de tratamento da raiva humana. Brasília, DF: 2011.
- BRASIL. Ministério da Saúde. *Raiva Humana*. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Painel de Monitoramento da Raiva**. Brasília: Ministério da Saúde, 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Raiva: diagnóstico e tratamento. Brasília, DF: 2023.
- BUTANTAN. Vacina Raiva (inativada). Bula. São Paulo: Instituto Butantan, 2021.
- EVANGELISTA, L. E. G. *et al.* As regulamentações de proteção de dados pessoais no Brasil e em Portugal: o tratamento de dados relativos à saúde no âmbito do Projeto “Sífilis Não”. *Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário*, v. 11, n. 1, p. 10-31, 2022.
- KOTAIT, I.; CARRIERI, M. L.; TAKAOKA, N. Y. Raiva: aspectos gerais e clínica. São Paulo: Instituto Pasteur, 2009.
- MARQUES, C. A.; SIQUEIRA, M. M. ; PORTUGAL, F. B. Avaliação da não completude das notificações compulsórias de dengue registradas por município de pequeno porte no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, p. 891-900, 2020.
- OLIVEIRA, I. D. *et al.* Perfil epidemiológico da raiva no Brasil de 2010 a 2019. *Rev. Patologia do Tocantins*. v. 7, n. 4, 2020.
- ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Plano regional para a eliminação da raiva humana transmitida por cães na América Latina: Plano de ação 2023–2030. Washington, D.C.: OPAS, 2023.
- SHUANGSHOTI, S. *et al.* Intracellular Spread of Rabies Virus Is Reduced in the Paralytic Form of Canine Rabies Compared to the Furious Form. *PLoS neglected tropical diseases*, v. 10, n. 6, p. e0004748, 2016.
- SILVA, M. G.; LEÃO, L. T. S. O paradoxo da mistura Identidades, desigualdades e percepção de discriminação entre brasileiros pardos*. *Rev. Brasileira de Ciências Sociais*. v. 27, n. 80, 2012.
- SOUSA, C. M. S. *et al.* Incompletude do preenchimento das notificações compulsórias de violência-Brasil, 2011-2014. *Cadernos Saúde Coletiva*, v. 28, p. 477-487, 2020.
- VARGAS, A.; ROMANO, A. P. M.; MERCHÁN-E. Raiva humana no Brasil: estudo descritivo, 2000-2017. *Epidemiol. Serv. Saúde*, v. 28, n.2, 2019.
- WALKER, P.; *et al.* ICTV Virus Taxonomy Profile: Rhabdoviridae 2022. *J Gen Virol.*, v. 103, n. 6, jun. 2022.



DAS CASAS GRANDES AOS APLICATIVOS: A NOVA COLONIALIDADE DO TRABALHO PRECARIZADO RACIALIZADO E O ADOECIMENTO MENTAL SILENCIADO

¹Armando Luís de Oliveira

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

Área temática: Farmácia

Resumo: Este artigo analisa a continuidade da lógica colonial no trabalho precarizado e racializado na era digital, evidenciando seus impactos na saúde mental da população negra e periférica. Partindo de uma perspectiva decolonial e crítica, o estudo discute como plataformas digitais e políticas neoliberais reproduzem estruturas de exploração análogas ao período escravocrata, agora sob novas roupagens tecnológicas. A metodologia baseia-se em revisão bibliográfica interdisciplinar, além de dados empíricos sobre precarização laboral e saúde mental. Os resultados demonstram que o adoecimento mental dessa população não é mero acidente, mas um sintoma histórico de opressão material e simbólica. A discussão enfatiza que a saúde mental é um campo de luta política, onde resistir implica descolonizar subjetividades e relações de trabalho. Conclui-se que a desnaturalização desse modelo exige articulação entre movimentos sociais, políticas públicas e críticas antirracistas ao capitalismo digital.

INTRODUÇÃO

O sol que aquece também seca
(Provérbio africano)

A colonialidade, como conceito cunhado por Aníbal Quijano (2005), não se extinguiu com a abolição formal da escravidão, mas se reconfigurou em novas formas de dominação. Na contemporaneidade, ela se digitaliza e se aloja nos corpos negros e periféricos que sustentam a base do capitalismo global, agora mediado por aplicativos e plataformas (Souza, 2020). Este artigo investiga como a precarização racializada do trabalho do período colonial aos algoritmos atuais produz um adoecimento mental silenciado, mascarado pelo discurso da meritocracia e da flexibilidade (Almeida, 2018). A subjetividade negra, historicamente marcada pela violência epistêmica (Spivak, 1988), é agora capturada por mecanismos de hiperexploração que exigem produtividade ininterrupta, sob a ilusão de autonomia (Mbembe, 2016). Plataformas como Uber, iFood e Rappi operam sob a mesma lógica das casas-grandes: extração de valor de corpos racializados, agora sob a vigilância digital (Sader, 2021). O sofrimento psíquico decorrente não é acidental, mas uma “cicatriz coletiva” (Fanon, 1952), resultado de séculos de opressão mal resolvida.

Este artigo propõe, portanto, uma análise crítica que articule: 1) a persistência da colonialidade no trabalho digital; 2) seus efeitos na saúde mental; e 3) estratégias de resistência que descolonizam o cotidiano.



OBJETIVO

O estudo visa demonstrar como a colonialidade se reinventa nas relações de trabalho contemporâneas, especialmente em plataformas digitais, e como essa dinâmica produz adoecimento mental em corpos racializados. Busca-se ainda problematizar respostas individuais ao sofrimento, propondo uma leitura política e histórica do fenômeno.

METODOLOGIA

Utiliza-se a revisão bibliográfica crítica, com enfoque em autores decoloniais, antirracistas e da psicologia social sociologia. Dados empíricos sobre precarização laboral (IBGE, 2022; IPEA, 2021), saúde mental (OMS, 2023) são cruzados com teorias como a interseccionalidade (Crenshaw, 1989) e a necropolítica (Mbembe, 2016). A análise é dividida em três eixos: 1) continuidades históricas entre escravidão e trabalho platformizado; 2) mecanismos de silenciamento do adoecimento; e 3) estratégias de resistência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ora, a transição da exploração escravocrata para as relações de trabalho contemporâneas não representou uma ruptura, mas uma sofisticação dos mecanismos de dominação. Como aponta Quijano (2005), a colonialidade do poder se adapta às novas tecnologias, mantendo intacta sua essência: a desumanização de corpos racializados. Os aplicativos de entrega e transporte reproduzem a lógica das senzalas ao transformar trabalhadores em “peças” substituíveis, monitoradas por algoritmos que ditam ritmos desumanos (Abílio, 2020). Dados do IPEA (2021) revelam que 72% dos entregadores por aplicativo no Brasil são negros, sendo que 68% trabalham mais de 12 horas diárias sem garantias trabalhistas. Essa realidade ecoa o período colonial, quando a produtividade era medida pelo número de tarefas cumpridas sob o chicote. Hoje, as chicotadas são digitais: pontuações, rankings e bloqueios de conta funcionam como mecanismos disciplinares (Foucault, 1975), agora revestidos de um discurso meritocrático que mascara a violência estrutural (Almeida, 2018).

É de interesse nada pequeno salientar que a pseudociência racial do século XIX, que justificava a escravidão pela suposta inferioridade biológica dos negros (Kilomba, 2019), encontra seu equivalente contemporâneo na narrativa da “flexibilidade” e do “empreendedorismo”. O neoliberalismo transforma a precariedade em virtude, culpabilizando o trabalhador por suas próprias condições de exploração (Dardot; Laval, 2016). O resultado é a naturalização de jornadas exaustivas, acidentes de trânsito e adoecimento físico e mental como “riscos do ofício” (Souza, 2020). A vigilância algorítmica, longe de ser neutra, opera com viés racial. Estudos demonstram que entregadores negros recebem menos gorjetas e são mais frequentemente penalizados por atrasos (Slepoj, 2021), reflexo de um racismo algorítmico que perpetua estereótipos coloniais. A senzala digital, portanto, não é metáfora: é a materialização de um sistema que segue extraíndo valor de corpos negros, agora sob a ilusão da inclusão tecnológica (MBEMBE, 2016).



Ademais, o sofrimento psíquico dos trabalhadores platformizados é sistematicamente invisibilizado por um discurso que patologiza o indivíduo e absolve o sistema. Como alertava Fanon (1952), a violência colonial não se limita ao corpo; ela se inscreve na subjetividade, gerando um “eu dividido” que internaliza a opressão. Pesquisas da OMS (2023) indicam que trabalhadores negros de aplicativos têm três vezes mais chances de desenvolver depressão e ansiedade em comparação com outros grupos, mas enfrentam barreiras no acesso à saúde mental, desde o custo dos atendimentos até o racismo institucional nos serviços públicos (Brasil, 2023). A narrativa da “resiliência”, tão propagada pelo neoliberalismo, reforça o silenciamento. Se na escravidão a “preguiça negra” era justificativa para o castigo físico (Almeida, 2018), hoje a “falta de produtividade” é atribuída à incompetência individual.

A hipervigilância digital aprofunda esse cenário. A necessidade de manter altas avaliações no aplicativo gera um estado de alerta constante, associado a quadros de estresse pós-traumático (OMS, 2023). Sem direito a pausas ou férias, esses trabalhadores vivem em um ciclo de exaustão que reproduz a lógica do tronco: o corpo é explorado até seu esgotamento, sem que o sistema assuma qualquer responsabilidade (Mbembe, 2016). O silêncio em torno desse adoecimento não é acidental. Como aponta Spivak (1988), a subalternidade é mantida pela impossibilidade de falar. Plataformas digitais não possuem canais para denúncias de assédio ou sobrecarga, e as políticas públicas ignoram a saúde mental como direito laboral (IPEA, 2021). Resulta numa epidemia silenciosa onde a dor é convertida em falha individual, jamais em fruto de estruturas opressoras.

Frente a isso, movimentos negros e periféricos transformam o cuidado em ato político: coletivos como Rolê de Quebrada (SP) e Psicologia Preta (RJ) fundem terapia comunitária e militância, coletivizando o sofrimento (Ribeiro, 2019). Essa prática descolonizadora subverte a exigência de silêncio aos precarizados. Exige-se ainda políticas públicas que reconheçam o racismo como determinante de saúde (Brasil, 2023), incluindo regulação das plataformas - com jornadas dignas e proteção contra assédio algorítmico (SADER, 2021) - como demonstra a Lei dos Entregadores de SP (2022), provando que a organização coletiva confronta a lógica predatória do capitalismo digital.

A psicologia tem um papel crucial nesse processo. Abordagens como a Psicologia Preta (Oliveira, 2020) questionam os modelos eurocêtricos de cuidado, propondo práticas terapêuticas que partam das vivências negras e periféricas. Não se trata apenas de tratar sintomas, mas de denunciar as estruturas que os produzem, afinal, pois o o negro não está doente; ele é doente dentro de um sistema que o adocece (Fanon, 1952).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

O artigo demonstra que a colonialidade persiste na economia digital, convertendo corpos negros em mercadorias descartáveis. O adoecimento mental é, assim, um sintoma de um projeto histórico de opressão. Romper com essa lógica exige desnaturalizar a precariedade e fortalecer redes de cuidado coletivo. A saúde mental, nesse sentido, é mais que um direito: é um ato de rebeldia.

Palavras-chave: Colonialidade digital; Precariedade laboral; Saúde mental; Racismo estrutural; Subjetividade negra.

Financiamento: Agradecemos à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do



Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) pelo apoio financeiro concedido. O presente estudo contou com financiamento da referida agência de fomento. Esse suporte foi fundamental para a realização desta pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABÍLIO, L. C. **Uberização: a nova onda do trabalho precarizado**. São Paulo: Boitempo, 2020.

ALMEIDA, S. L. **Racismo estrutural**. São Paulo: Pólen, 2018.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Política Nacional de Saúde Integral da População Negra**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

BRASIL. **Estado de São Paulo. Lei nº 17.295/2022. Dispõe sobre direitos dos trabalhadores de aplicativos**. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 10 mar. 2022.

CRENSHAW, K. **Demarginalizing the intersection of race and sex**. University of Chicago Legal Forum, v. 1989, n. 1, p. 139-167, 1989.

DARDOT, P.; LAVAL, C. **A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal**. São Paulo: Boitempo, 2016.

FANON, F. **Pele negra, máscaras brancas**. Salvador: EDUFBA, 1952. FOUCAULT, M.

Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1975.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Trabalho por plataformas digitais no Brasil**. Brasília: IPEA, 2021.

KILOMBA, G. **Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019.

MBEMBE, A. **Necropolítica**. São Paulo: n-1 edições, 2016.

OLIVEIRA, K. **Psicologia preta: fundamentos para uma clínica antirracista**. São Paulo: Jandaíra, 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Relatório global sobre saúde mental e trabalho precarizado**. Genebra: OMS, 2023.

QUIJANO, A. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina**. In: LANDER, E. (Org.). *A colonialidade do saber*. Buenos Aires: CLACSO, 2005. p. 107- 130.



RIBEIRO, D. **Lugar de fala.** São Paulo: Pólen, 2019.

SADER, E. **A nova morfologia do trabalho no capitalismo digital.** São Paulo: Expressão Popular, 2021.

SLEPOJ, V. **Algoritmos racistas: como a inteligência artificial reproduz desigualdades.** São Paulo: Todavia, 2021.

SOUZA, J. **A elite do atraso: da escravidão à Bolsonaro.** Rio de Janeiro: Estação Brasil, 2020.

SPIVAK, G. C. **Pode o subalterno falar?.** Belo Horizonte: Editora UFMG, 1988.



DO GRITO AO SILÊNCIO: A SAÚDE MENTAL COMO CUSTO DO TRABALHO MODERNO

Armando Luís de Oliveira¹

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-4856-9005>

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Área temática: Psicologia

Resumo: Este artigo analisa os impactos do trabalho moderno na saúde mental dos trabalhadores, destacando como as exigências do capitalismo contemporâneo transformam sofrimentos psíquicos em custos ocultos da produtividade. A metodologia consistiu em revisão de literatura, abrangendo estudos, psicológicos, sociológicos e econômicos publicados nacional e internacionalmente, além de análise de dados epidemiológicos sobre transtornos mentais relacionados ao trabalho. Os resultados indicam que a precarização laboral, a hiperconectividade e a cultura do desempenho exacerbam ansiedade, depressão e esgotamento profissional, silenciando demandas por melhores condições. Discute-se a medicalização do sofrimento como resposta individualizada a um problema estrutural, enquanto políticas públicas e corporativas falham em garantir ambientes saudáveis. Conclui-se que a saúde mental no trabalho exige transformações profundas nas relações laborais, com valorização do bem-estar coletivo sobre metas produtivistas.

INTRODUÇÃO

O pássaro preso canta, mas não de alegria
(Provérbio africano).

Ora, a saúde mental tornou-se um dos maiores desafios do século XXI, especialmente no contexto do trabalho moderno, marcado por intensificação de demandas, flexibilização de direitos e invasão da tecnologia na vida privada (Dejours, 2015; Han, 2015). Se, no passado, o sofrimento psíquico manifestava-se em greves e protestos, hoje ele se internaliza em silêncio, sob a forma de transtornos como síndrome de burnout, depressão e ansiedade (Freudenberger, 1974; World Health Organization [Who], 2022). A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2021) estima que 12% das doenças laborais globais sejam de origem mental, com custos anuais superiores a US\$ 1 trilhão em perda de produtividade.

Este artigo parte da premissa de que o adoecimento mental não é um fenômeno individual, mas um sintoma de estruturas laborais patogênicas (Sennett, 2006). A normalização do excesso de horas, a cobrança por disponibilidade constante e a erosão de vínculos empregatícios criam um cenário em que o grito por melhores condições é

¹ Psicólogo, Psicanalista e Sociólogo. Bolsista FAPERJ Nota 10. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ/RJ, Brasil. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Sociologia na Universidade Federal Fluminense - UFF/RJ, Niterói, Brasil. Pós graduado em Terapia Cognitiva Comportamental, Pós graduado em Saúde Mental e Pós graduado em Psicopedagogia. Formado em Superior em Gestão de Recursos Humanos e Pós graduado em Gestão de Pessoas. Formado em Superior em Logística e Pós graduado em Logística e Supply Chain. Integrante do Laboratório de Estudos em Políticas Públicas, Trabalho e Sociabilidade da Escola de Serviço Social da UFRJ (LEPPTraS/ESS/UFRJ/CNPq). Declaro expressamente minha concordância com a divulgação pública deste trabalho. E-mail: armandoluis@id.uff.br



substituído pelo silêncio da autocobrança (Harvey, 2007). Metodologicamente, analisamos estudos interdisciplinares que vinculam transformações no mundo do trabalho ao aumento de diagnósticos psiquiátricos, questionando respostas paliativas, como programas corporativos de “resiliência”, que ignoram determinantes sociais (Lazzarato, 2017).

OBJETIVO

O estudo busca problematizar e demonstrar como o trabalho contemporâneo produz sofrimento mental, evidenciando a contradição entre discursos de bem-estar e práticas que perpetuam o sofrimento e adoecimento. Além disso, propõe reflexões sobre alternativas coletivas à crise sanitária invisibilizada.

METODOLOGIA

Realizou-se revisão de literatura a partir da busca por estudos nas bases como SciELO, PubMed e PsycINFO, utilizando descritores como “saúde mental”, “trabalho”, “burnout” e “precarização do trabalho”. Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: (1) estudos empíricos ou teóricos publicados entre 2000-2023; (2) artigos em português, inglês ou espanhol; (3) pesquisas que abordassem a relação entre “saúde mental”, “trabalho”, “burnout” e “precarização do trabalho”. Como critérios de exclusão: (1) estudos anteriores a 2000; (2) artigos sem revisão por pares; (3) pesquisas que não abordassem especificamente o contexto laboral. A busca inicial resultou em 53 estudos, dos quais 39 foram pré-selecionados após leitura de títulos e resumos. Após aplicação dos critérios de elegibilidade e leitura integral, 19 estudos foram incluídos na análise final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

É de interesse nada pequeno realçar que a síndrome de burnout, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS, 2019) como uma doença ocupacional, tornou-se um fenômeno epidêmico no século XXI, atingindo cerca de 32% dos trabalhadores brasileiros, segundo o International Stress Management Association no Brasil (Isma-BR, 2022). Esse esgotamento profissional extremo não é um mero acaso, mas sim um sintoma de uma cultura laboral que transforma o cansaço em falha pessoal. A ascensão do burnout coincide com a difusão do chamado “empreendedorismo de si” (Foucault, 2008), no qual o trabalhador é instigado a se responsabilizar integralmente por seu sucesso ou fracasso, como se as condições estruturais do mercado não influenciassem seu desempenho. Nesse cenário, as empresas promovem palestras motivacionais e discursos de resiliência, mas mantêm metas abusivas, jornadas extensas e ambientes competitivos, transferindo para o indivíduo a culpa pelo adoecimento (Pelbart, 2013).

Ademais, estudos demonstram que profissões com altos níveis de demanda emocional, como professores, médicos e profissionais de telemarketing, são as mais afetadas (Maslach; Leiter, 2016). No entanto, o burnout não se limita a essas áreas, ele se expande para setores antes considerados estáveis, como o corporativo, onde a pressão por resultados imediatos e a instabilidade contratual geram um estado permanente de ansiedade (Dejours, 2015). A falta de políticas públicas efetivas para regulamentar jornadas e combater assédio moral agrava o problema. Enquanto países como a França implementam leis que garantem o “direito à desconexão”, no Brasil, a precarização do trabalho avança, transformando o



burnout em uma crise de saúde pública silenciosa (Dal Rosso, 2017).

Além disso, outra questão importante é a relação tecnologia e o fim dos limites entre trabalho e vida. A conectividade 24 horas por dia, 7 dias por semana (24/7) redefiniu os limites entre trabalho e vida pessoal, aprofundando a exploração laboral. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2021), 68% dos profissionais brasileiros verificam e-mails e mensagens de trabalho fora do horário comercial, muitas vezes sem remuneração adicional. Jonathan Crary (2013) argumenta que a economia digital destruiu a noção de descanso, produzindo e impondo uma cultura de disponibilidade permanente que gera ansiedade generalizada. A ilusão de flexibilidade mascara uma realidade em que o trabalhador nunca está verdadeiramente “fora do serviço”. Plataformas digitais como Uber, iFood e Rappi exemplificam essa dinâmica perversa: algoritmos definem ritmos de trabalho desumanizantes, enquanto os trabalhadores, classificados como “autônomos”, ficam sem direitos trabalhistas (Srnicek, 2016).

A gamificação do trabalho, em que métricas de desempenho são tratadas como “desafios” a serem superados, intensifica a pressão psicológica. Call centers, a título de exemplo, utilizam sistemas de pontuação que transformam o trabalhador em uma engrenagem substituível, sujeita a burnout e depressão (Grohmann, 2019). Ademais, o home office, inicialmente visto como uma conquista de autonomia, tornou-se um ambiente de sobrecarga invisível. Sem a separação física entre escritório e lar, muitos profissionais trabalham mais horas do que no regime presencial, sem compensação (Eurofound, 2021). A tecnologia, que prometia liberdade, tornou-se uma nova forma de controle (Han, 2015).

No que tange a medicalização: o silêncio químico, observa-se que o uso de antidepressivos e ansiolíticos cresceu 74% no Brasil entre 2012 e 2022, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, 2022). Esse aumento exponencial não reflete apenas uma maior conscientização sobre saúde mental, mas também a medicalização da insatisfação em uma sociedade que exige produtividade constante. Alain Ehrenberg (2010) define a depressão como o “mal-estar da sociedade do desempenho”, na qual o indivíduo é cobrado a ser sempre eficiente, criativo e resiliente. Quando falha, a resposta não é a mudança das condições de trabalho, mas a prescrição de medicamentos que silenciam o sofrimento sem abordar suas causas estruturais.

Algumas empresas têm investido em “quick fixes”, soluções rápidas e superficiais, como sessões de mindfulness, programas de bem-estar e terapia online, enquanto mantêm jornadas exaustivas e políticas de demissão em massa (Hardt; Negri, 2000). Essas iniciativas, embora bem-intencionadas, muitas vezes servem como “lavagem de saúde mental” (mental health washing), desviando a atenção da necessidade de mudanças reais, como redução de carga horária, salários dignos e ambientes laborais menos tóxicos (Fleming, 2021). A psiquiatrização do sofrimento também mascara questões sociais mais profundas. Trabalhadores que desenvolvem transtornos devido a más condições de emprego são tratados como “casos clínicos”, enquanto as empresas não são responsabilizadas (Lazzarato, 2017). A saúde mental, assim, torna-se mais um custo individualizado do trabalho moderno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

Contudo, o trabalho moderno naturalizou o adoecimento mental como fracasso individual, transformando sofrimento em custo oculto. A epidemia silenciosa de burnout e depressão revela a falácia de soluções paliativas como medicalização e “resiliência”. Enquanto empresas transferem responsabilidades e governos negligenciam



regulamentações, a crise se aprofunda. Urgem políticas que garantam jornadas dignas, direitos trabalhistas e ambientes saudáveis. Saúde mental exige justiça social, não apenas intervenções individuais. O silêncio dos trabalhadores clama por transformações estruturais.

Palavras-chave: Condições de trabalho; Esgotamento profissional; Medicalização; Saúde mental; Precarização do trabalho.

Financiamento: Agradecemos à Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) pelo apoio financeiro concedido. O presente estudo contou com financiamento da referida agência de fomento. Esse suporte foi fundamental para a realização desta pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Boletim de Farmacoepidemiologia: Uso de antidepressivos no Brasil (2012-2022)**. Brasília: ANVISA, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa>. Acesso em: 15 out. 2023.

ANVISA. **Uso de antidepressivos no Brasil: relatório 2022**. Brasília, 2022.

CRARY, J. **24/7: Capitalismo tardio e os fins do sono**. São Paulo: Ubu Editora, 2013.

DAL ROSSO, S. **O ardil da flexibilidade: os trabalhadores e a teoria do valor**. São Paulo: Boitempo, 2017.

DEJOURS, C. **A banalização da injustiça social**. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.

EHREMBERG, A. **O cansaço de si mesmo: depressão e sociedade**. São Paulo: Ideias & Letras, 2010.

EUROFOUND. **Living, working and COVID-19: Mental health and trust decline across EU as pandemic enters another year**. Dublin: Eurofound, 2021. Disponível em: <https://www.eurofound.europa.eu>. Acesso em: 15 out. 2023.

FLEMING, P. **Dark academia: how universities die**. London: Pluto Press, 2021.

FOUCAULT, M. **Nascimento da biopolítica**. São Paulo: Martins Fontes, 2008.

GROHMANN, R. **Call centers: trabalho, subjetividade e saúde do trabalhador**. Curitiba: Appris, 2019.

HAN, B.-C. **Sociedade do cansaço**. Petrópolis: Vozes, 2015. HART, M.; NEGRI, A.

Império. Rio de Janeiro: Record, 2000.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa**



Nacional de Saúde (PNS) 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida e doenças crônicas. Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 out. 2023.

INTERNATIONAL STRESS MANAGEMENT ASSOCIATION NO BRASIL (ISMA-BR). **Burnout no Brasil: dados epidemiológicos (2020-2022).** Porto Alegre: ISMA-BR, 2022. Disponível em: <https://www.ismabrasil.com.br>. Acesso em: 15 out. 2023.

LAZZARATO, M. **O governo do homem endividado.** São Paulo: n-1 edições, 2017.

MASLACH, C.; LEITER, M. P. **Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry.** World Psychiatry, v. 15, n. 2, p. 103-111, 2016.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Burnout na Classificação Internacional de Doenças (CID-11).** Genebra: OMS, 2019. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 15 out. 2023.

PELBART, P. P. **O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento.** São Paulo: n-1 edições, 2013.

SENNETT, R. **A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo.** Rio de Janeiro: Record, 2006.

SRNICEK, N. **Platform Capitalism.** Cambridge: Polity Press, 2016.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Mental health at work.** Genebra: WHO, 2022. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 15 out. 2023.



ANÁLISE DA APLICABILIDADE DA CIRURGIA ROBÓTICA NO TRATAMENTO DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES

¹Melina Calmon Silva

¹Lorena Lopes Soares

¹Letícia Viana Barreto

¹Maria Rita dos Santos Gonçalves

¹Giovana Pozenato Costa

¹João de Sousa Pinheiro Barbosa

¹Centro Universitário de Brasília. Brasília, DF, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo

A cirurgia cardíaca robótica tem se consolidado como uma alternativa promissora aos procedimentos convencionais, promovendo menor trauma, redução de tempo de internação e melhores resultados estéticos. Este estudo teve como objetivo analisar criticamente a eficiência e segurança da cirurgia robótica em comparação às técnicas tradicionais. Foi conduzida uma revisão integrativa baseada na estratégia PRISMA, envolvendo dez estudos publicados entre 2011 e 2024, selecionados nas bases PubMed, BVS, MDPI, Scopus, Scielo, Wiley e ScienceDirect, acessadas nos dias 7 e 14 de abril de 2025. A leitura, análise crítica e fichamento ocorreram em 28 de abril de 2025. Utilizaram-se os descritores: Coronary Disease, Robotic, Robotic Surgery Procedure, Cardiovascular e Surgical Procedures. Dos 53 artigos encontrados, 10 atenderam aos critérios de inclusão com um total de 4206 pessoas colocadas em comparação para a atual análise. Os estudos analisados revelaram que a abordagem robótica apresenta resultados equivalentes ou superiores às técnicas tradicionais quanto à mortalidade, tempo cirúrgico, necessidade de transfusão e tempo de internação. Ademais, os benefícios cosméticos, a menor exposição à radiação e a viabilidade em casos complexos, como reoperações e pacientes com calcificação aórtica, destacam-se como vantagens relevantes. De modo geral, os estudos demonstraram que a cirurgia robótica proporciona benefícios no período pós-operatório, como menor tempo de hospitalização, redução da perda sanguínea e retorno mais rápido às atividades cotidianas, apesar do maior tempo cirúrgico inicial e dos custos elevados. Conclui-se que, embora ainda existam barreiras relacionadas à infraestrutura e ao custo, a técnica robótica representa uma estratégia promissora na prática cardiovascular contemporânea.

Palavras-chave: Cardiovascular; Coronary Disease; Robotic; Robotic Surgery Procedure; Surgical Procedures

INTRODUÇÃO

Em um panorama atual, há um avanço significativo na utilização de abordagens minimamente invasivas e assistência robótica nos procedimentos cirúrgicos cardiovasculares. Nessa análise, a utilização desses sistemas tem permitido a realização de procedimentos com maior precisão, menor trauma cirúrgico, redução de tempo de internação e melhores resultados funcionais e cosméticos, sobretudo em cirurgias cardíacas assistidas por robótica. Além de benefícios clínicos, estudos demonstram vantagens logísticas e operacionais dessas técnicas inovadoras.



Apesar da demonstração de resultados positivos quando comparados às metodologias convencionais, a implementação das cirurgias robóticas exige investimentos estruturais e formação especializada, impondo uma limitação da sua abrangência na medicina mundial, além da necessidade de estudos mais robustos para embasar a medicina baseada em evidências.

Portanto, torna-se essencial analisar comparativamente os desfechos clínicos, estruturais e operacionais da cirurgia robótica frente às abordagens convencionais, para avaliar sua real contribuição à prática cardiovascular.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão integrativa, os desfechos de estudos publicados sobre a cirurgia robótica e minimamente invasiva em comparação às abordagens tradicionais, contribuindo para a compreensão crítica do papel dessas inovações na evolução da cirurgia cardiovascular.

OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo geral analisar e discutir os avanços recentes, as técnicas utilizadas, os estágios clínicos e os desafios associados à cirurgia cardíaca minimamente invasiva (MICS) e à cirurgia robótica assistida, em comparação com as técnicas cirúrgicas convencionais.

METODOLOGIA

A revisão integrativa foi conduzida segundo os critérios do método PRISMA, com o objetivo de garantir uma seleção transparente e sistemática dos estudos. A busca foi realizada nas bases PubMed, BVS, MDPI, Scopus, Scielo, Wiley e ScienceDirect, utilizando descritores indexados no DeCS/MeSH: Coronary Disease, Robotic, Robotic Surgery Procedure, Cardiovascular e Surgical Procedures. Foram incluídos estudos publicados entre 2011 e 2024 que abordassem a temática da cirurgia robótica em comparação aos procedimentos tradicionais, com delineamento metodológico do tipo ensaio clínico controlado e randomizado, revisão sistemática ou relato de caso. Foram excluídos artigos de opinião, metanálises, capítulos de livros e estudos que não abordassem diretamente o objetivo da pesquisa. Baseada na metodologia inicial, foram encontrados 52 estudos para posterior seleção. A seleção dos estudos para serem incluídos no resumo ocorreu em três etapas: leitura dos títulos, leitura dos resumos e leitura completa dos artigos, todas realizadas pelos cinco autores deste manuscrito. Para a extração dos dados, utilizou-se uma planilha padronizada contendo autor, ano de publicação, objetivo, metodologia e principais resultados. A leitura, análise crítica e fichamento dos artigos elegíveis foram realizados no dia 28 de abril de 2025, resultando na inclusão final de 10 estudos para análise.

RESULTADOS

A partir dos descritores utilizados, foram encontrados 53 artigos que abordavam o tema proposto para esta revisão integrativa. A partir da metodologia de exclusão, 43 artigos foram excluídos, totalizando 10 artigos para análise final, com uma população total de 4206 pessoas. Os estudos incluídos evidenciaram equivalência ou superioridade das técnicas minimamente invasivas e robóticas em relação às abordagens tradicionais.

Akowuah *et al.* (2023), em um ensaio clínico randomizado com 330 pacientes,



mostraram que a minitoracotomia não apresentou superioridade em função física em 12 semanas observadas (diferença média ajustada de 0,68 pontos no SF-36, IC 95% -1,89 a 3,26; $p = 0,61$), mas alcançou taxas de reparo mitral e segurança comparáveis à esternotomia.

Van Kampen *et al.* (2023) relataram crescimento no volume institucional de cirurgias mitrais no Massachusetts General Hospital após a introdução progressiva da abordagem minimamente invasiva: de 69 casos em 2013 para 127 em 2020, com taxa de sucesso de reparo passando de 95,4% para 99,2% ($p < 0,05$).

Ilcheva *et al.* (2023) destacaram que 55,7% das cirurgias mitrais realizadas na Alemanha em 2021 foram por técnicas minimamente invasivas. A revisão evidenciou reduções na permanência hospitalar (mediana de 5 dias vs. 7,5 dias em comparação à esternotomia), no tempo de recuperação funcional (mediana de 14 dias vs. 56 dias), e nas taxas de complicações infecciosas (1,3%).

Milanez (2011) conduziu um ensaio clínico prospectivo e randomizado, demonstrando que a dissecação robótica da artéria torácica interna esquerda resultou em fluxometria equivalente à técnica convencional ($p > 0,05$), com benefícios estéticos e menor tempo de internação.

Gullu *et al.* (2022) descrevem que a maioria dos pacientes estava na classe ≥ 11 da New York Heart Association (88,0%) e o valor médio do Euroscore logístico foi de $18,5 \pm 22,3$. Os tipos de operações foram reparo/substituição da valva mitral/tricúspide, criação de comunicação interatrial e pericardiectomia. Os tempos de circulação extracorpórea foram de $141,5 \pm 47$ (mínimo 77-máximo 252) min. Não houve nenhum caso de conversão para toracotomia aberta ou esternotomia. Hemiparesia foi observada em um paciente. Dois pacientes com valores de Euroscore de 78,2 e 81,9 apresentaram isquemia mesentérica e falência multiorgânica, respectivamente, e morreram no período pós-operatório.

Jacoby *et al.* (2023) analisaram 272 hepatectomias robóticas, das quais 39 envolviam pacientes com síndrome metabólica. Após pareamento por escore de propensão ($n = 74$), não houve diferenças estatísticas entre os grupos quanto a tempo operatório, complicações intraoperatórias, sangramento ou tempo de internação ($p > 0,05$). A única variável pré-operatória significativamente diferente foi o IMC ($34 \pm 5,7 \text{ kg/m}^2$ vs. $26 \pm 4,4 \text{ kg/m}^2$; $p < 0,001$), sem impacto nos desfechos cirúrgicos.

Harky *et al.* (2020) incluíram, em seu estudo, 2.280 pacientes que passaram por CABG (Enxerto de Revascularização da Artéria Coronária) robótica. Tendo uma melhoria na idade média dos pacientes, passando de 64,5 anos no primeiro período (2005-2010) para 68,1 anos no terceiro (2017-2021). O tempo de cirurgia diminuiu progressivamente de 6,4 horas para 5,5 horas, com diferença significativa. A incidência de conversão para esternotomia e a mortalidade de 30 dias foram semelhantes entre os períodos, mas a mortalidade foi ligeiramente menor nos períodos mais recentes. A taxa de PCI (Intervenção Coronária Percutânea) com stents foi de 0,3%. Durante o seguimento médio de 4,2 anos, houve uma redução significativa nas taxas de morte, eventos adversos cardíacos, acidente vascular cerebral não fatal e necessidade de revascularização repetida com stents.

Kagiyama *et al.* (2021) reportaram que não houve diferenças significativas no histórico clínico entre o R-PCI (Intervenção percutânea coronária assistida por robótica) e o M-PCI (Intervenção percutânea coronária manual) nem diferenças significativas no vaso alvo e na prevalência de lesão característica, com exceção de lesão de bifurcação (R-PCI: 20,5% vs M-PCI: 43,1%, $p=0,047$). A taxa de sucesso clínico foi de 93,3% no R-PCI e 92,2% no M-PCI, $p=0,9$. Não houve diferenças estatísticas no tempo do procedimento, tempo de furoscopia e volume de contraste entre os dois grupos. O (DAP) e a exposição à radiação dos operadores foram significativamente menores no R-PCI (DAP: 77,6 vs. 104,8 Gy cm^2 ,



$p=0,02$, exposição do operador à radiação: 0 VS 21,5 microSV, $p<0,001$, respectivamente), enquanto a exposição à radiação dos assistentes não diferiu entre os dois grupos (10,5 vs. 9,0 microSV, $p=0,14$).

Arai *et al.* (2024) Um relato de caso que permitiu uma cirurgia com abordagem totalmente endoscópica robótica com melhor visualização para substituição da válvula aórtica com bioprótese suturada. Potenciais vantagens incluem recuperação funcional mais rápida e melhores resultados cosméticos. (Resultados específicos do caso não disponíveis no resumo).

Chi *et al.* (2024) realizaram uma comparação retrospectiva entre a abordagem robótica e a re-esternotomia convencional para reoperações isoladas de válvula mitral, ocorridas entre 2012 e 2019 em um hospital terciário. Foram incluídos 67 pacientes, sendo 23 no grupo robótico e 44 no grupo de re-esternotomia. Eles expuseram que o grupo robótico apresentou: mortalidade zero (vs. 9,0% no controle, $p=0,287$), menor tempo operatório (176 vs. 321 min, $p=0,0279$), menor necessidade de transfusão (1 vs. 2 unidades, $p=0,01189$). Porém, o tempo de ventilação, UTI e ressangramento foram similares aos procedimentos tradicionais.

DISCUSSÃO

A análise integrada dos dez estudos revela que a cirurgia cardíaca robótica e minimamente invasiva apresenta vantagens clínicas consistentes frente aos métodos convencionais. Inicialmente, destaca-se a equivalência em desfechos primários, como mortalidade e sucesso cirúrgico, conforme evidenciado por Akowuah *et al.* (2023) e Chi *et al.* (2022). A minitoracotomia, por exemplo, apresentou taxas de complicações semelhantes à esternotomia, mas com menor tempo de recuperação funcional.

Do ponto de vista técnico, a cirurgia robótica mostrou-se particularmente eficaz em contextos complexos, como reoperações e presença de calcificação aórtica. Güllü *et al.* (2021) demonstra a viabilidade de procedimentos intracardíacos sem pinçamento aórtico, ampliando as indicações para pacientes de alto risco e impedindo complicações como o tromboembolismo cerebral e a reesternotomia.

A análise de Harky *et al.* (2020) e Ilcheva *et al.* (2023) reforça a tendência de popularização dessas técnicas na prática clínica, impulsionada por evidências de menor trauma tecidual, redução de efusões pleurais e da exposição à radiação, menor incidência de fibrilação atrial e estadias hospitalares mais curtas. Entretanto, Ilcheva *et al.* (2023) aborda sobre riscos específicos como a dissecação aórtica retrógrada e o edema pulmonar unilateral (EPU).

A experiência do Massachusetts General Hospital, descrita por Van Kampen *et al.* (2023), exemplifica como a introdução gradual e estruturada dessas abordagens pode elevar o volume de cirurgias, a taxa de sucesso institucional e a precisão durante os procedimentos. Os resultados desse estudo demonstraram um aumento na taxa de sucesso cirúrgico, e os autores acreditam que a implementação de um programa focado em reparo minimamente invasivo da válvula mitral transformou a abordagem cirúrgica na instituição, resultando em aumento do volume de procedimentos e melhora nas taxas de reparo, sem aumento de complicações, dando ênfase na preocupação da capacitação dos profissionais.

De acordo com Arai *et al.* (2024), em sua publicação de estudo de caso, a assistência robótica possibilita a melhor visualização das estruturas anatômicas no procedimento cirúrgico de substituição da valva aórtica quando comparada às técnicas tradicionais. A abordagem endoscópica robótica forneceu acesso direto ao anel aórtico, independentemente



de sua posição, com potencial para oferecer o procedimento a pacientes que podem ter anatomias desfavoráveis, por exemplo, pacientes obesos ou aqueles que passaram por uma operação cardíaca anterior. Os autores ainda fornecem discussões sobre os desafios da técnica, como a necessidade da adaptação de ferramentas e avanços tecnológicos, além da escolha adequada dos elementos acessórios e cirúrgicos. Ademais, a equipe possuía vasta experiência em técnicas cardíacas assistidas, o que os autores acreditam que impactou no sucesso da cirurgia e do pós-operatório, pontuando que a experiência é algo a ser considerado quando performando tais procedimentos, corroborando com Van Kampen *et al.* (2023).

Por outro lado, a pesquisa de Milanez *et al.* (2011) enfatizou que a técnica minimamente invasiva com videotoracoscopia robótica mostrou-se tão segura e eficaz quanto a convencional, pois a utilização da artéria torácica interna esquerda para a revascularização do Reserva de Isquemia Ativo (RIA) ocasiona menos trauma e melhor resultado estético na aparência da cicatriz. Os autores ainda apontam que o tempo cirúrgico prolongado é uma desvantagem dos procedimentos minimamente invasivos, podendo elevar o risco de complicações. Entretanto, foi observado uma redução progressiva no tempo de dissecação, o que confirma a presença de uma curva de aprendizado dos cirurgiões.

O estudo de Jacoby *et al.* (2023), que avaliou pacientes com síndrome metabólica, evidenciou que o uso de técnicas robóticas não compromete os desfechos cirúrgicos nesses pacientes, reforçando a segurança da abordagem mesmo em populações com maior risco metabólico e cardiovascular.

Por fim, Kagiya *et al.* (2021) demonstraram que a cirurgia robótica não apenas melhora os desfechos clínicos, mas também protege a equipe cirúrgica ao reduzir a exposição à radiação em procedimentos intervencionistas, apontando para uma melhoria nas condições de trabalho e segurança ocupacional. Apesar dessas vantagens, a tecnologia avançada e o alto custo limitam a sua aplicação em larga escala, especialmente em contextos com menos recursos.

Os estudos analisados apontaram que a cirurgia robótica apresenta desfechos clínicos semelhantes ou superiores às abordagens tradicionais, com resultados equivalentes em termos de eficácia e superioridade em indicadores operacionais e de recuperação. Tais evidências reforçam que a incorporação das abordagens robóticas e minimamente invasivas transcende os aspectos clínicos imediatos, repercutindo positivamente em toda a cadeia de cuidado — desde a seleção de pacientes, passando pela execução operatória precisa, até a reabilitação funcional e o retorno às atividades cotidianas. A análise crítica dos dados disponíveis sustenta que, embora os resultados mostrem benefícios claros, a implantação de cirurgia robótica exige investimentos robustos em infraestrutura e capacitação, o que pode limitar sua disseminação em países em desenvolvimento. Além disso, existe a necessidade de mais estudos sobre as técnicas com populações distintas e comparativos variáveis, fornecendo desfechos bem reportados para que suportem a medicina baseada em evidência.

Em suma, a adoção das técnicas assistidas representa um caminho promissor e sustentável para o avanço da cirurgia cardiovascular moderna, consolidando um panorama favorável à sua ampliação como prática consolidada e segura.

CONCLUSÃO

A cirurgia cardíaca robótica mostra-se como uma alternativa viável, segura e eficaz, oferecendo baixa mortalidade, menor tempo operatório e desfechos clínicos promissores quando comparada aos métodos tradicionais, por mais que a gravidade da regurgitação mitral seja equivalente aos métodos tradicionais. Sua adoção crescente reflete em avanços tecnológicos que permitirão progressos futuros, uma maior capacitação das equipes cirúrgicas e facilidades maiores de superar desafios. Contudo, sua implementação ainda



exige investimentos estruturais e formação especializada, constituindo uma limitação para a sua abrangência mundial. Os dados analisados reforçam a necessidade de ampliação de estudos multicêntricos e padronizados, que consolidam a cirurgia robótica como referência terapêutica em cardiologia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKOWUAH, E. et al. Minithoracotomy vs Conventional Sternotomy for Mitral Valve Repair: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37314276/>

ARAI, T. et al. Robotic totally endoscopic aortic valve replacement with a sutured bioprosthesis. *J Clin Med*, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39207176/>

CHI, N. H. et al. Comparison of robotic and conventional sternotomy in redo mitral valve surgery. *Eur J Cardiothorac Surg*, 2024. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0929664621002382>

GULLU, A. U. et al. Robotic-assisted cardiac surgery without aortic cross-clamping: A safe alternative approach. *J Card Surg*, 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jocs.15160>

HARKY, A. et al. The evolution of mitral valve surgery: the future in the hand of robots. *Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery*, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32864937/>

ILCHEVA, D. et al. Beyond Conventional Operations: Embracing the Era of Contemporary Minimally Invasive Cardiac Surgery. *J Clin Med*, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-0383/12/23/7210>

JACOBY, J. M. et al. Does metabolic syndrome affect perioperative outcomes in patients undergoing robotic hepatectomy? A propensity score-matched analysis. *Surg Endosc*, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37038021/>

MILANEZ, V. et al. Revascularização do miocárdio por videotoracoscopia robótica: comparação com a técnica convencional. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, 2011. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-620008>

VAN KAMPEN, M. et al. Building a successful minimally invasive mitral valve repair program before introducing the robotic approach: The Massachusetts General Hospital experience. *Ann Thorac Surg*, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37025683/>

KAGIYAMA, K. et al. Successful introduction of robotic-assisted percutaneous coronary intervention system into Japanese clinical practice: a first-year survey at single center. *Heart and Vessels*, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33502572/>



AUTOMAÇÃO DA TÉCNICA DE MICRONÚCLEO COM BLOQUEIO DE CITOCINESE (CBMN): UMA NOVA PERSPECTIVA PARA DOSIMETRIA BIOLÓGICA

¹Anderson da Silva Basílio

²Ronald Mendes Leão

³Eduarda Santos Silva

¹Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)/Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE) - Laboratório de Dosimetria Biológica (LDB). Recife, Pernambuco, Brasil; ²Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE) - Laboratório de Dosimetria Biológica (LDB). Recife, Pernambuco, Brasil; ³ Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Programa de Pós-graduação em Bioquímica e Fisiologia (PPGBqF)/ Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste (CRCN-NE) - Laboratório de Dosimetria Biológica (LDB). Recife, Pernambuco, Brasil.

Área temática: Biologia

Resumo: O objetivo deste trabalho foi abordar os benefícios da automação da técnica de micronúcleo com bloqueio de citocinese (CBMN) aplicada à dosimetria biológica utilizando linfócitos do sangue periférico humano. Para isso, foi realizada uma revisão da literatura científica por meio do Google Acadêmico, selecionando artigos em inglês, publicados nos últimos 5 anos, cujo foco fosse a automação da técnica de micronúcleo com bloqueio de citocinese (CBMN) para dosimetria biológica utilizando linfócitos do sangue periférico. Foram excluídos artigos de revisão e de acesso restrito. O micronúcleo é uma pequena estrutura encontrada no citoplasma, menor do que o núcleo celular, formada por fragmentos de cromossomos acêntricos ou cromossomos inteiros que foram expulsos do núcleo principal durante a mitose. Apesar de não ser específico da radiação, sua frequência é diretamente proporcional à dose absorvida, sendo amplamente utilizado na dosimetria biológica para estimativa de dose. No entanto, a execução manual do ensaio é lenta e requer profissionais treinados, tornando-a inviável no cenário de exposição em massa de indivíduos a radiação ionizante. Todavia, a automação da leitura de micronúcleo reduz o tempo de análise, contribuindo para ações médicas rápidas baseadas na dose depositada no indivíduo. Nessa perspectiva, estudos comparativos indicam que a leitura automatizada pode ser dezenas de vezes mais rápida do que a manual, aumentando a eficiência laboratorial em cenários de alta demanda.

INTRODUÇÃO

A técnica de micronúcleo com bloqueio de citocinese (CBMN) é universalmente aceita para quantificação de danos citogenéticos. Sua aplicabilidade é bem ampla, uma vez que não se trata de um teste específico, sendo sensível a qualquer agente genotóxico. Por esse motivo, pode ser aplicada para testes de segurança de compostos regulatórios, monitoramento ambiental e monitoramento ocupacional (Wills *et al.*, 2021).

A biodosimetria utiliza o teste de micronúcleo para quantificar danos genéticos e convertê-los em dose absorvida. Embora não seja um teste específico para radiação, estudos demonstram que a frequência de micronúcleo é diretamente proporcional à dose, permitindo sua aplicação na dosimetria biológica (Vijayalakshmi *et al.*, 2024).

Entretanto, a aplicação totalmente manual da técnica de micronúcleo nos laboratórios

de dosimetria biológica demanda tempo e conhecimento técnico especializado. Isso a torna inviável em cenários de exposição em massa à radiação, devido à grande quantidade de amostras a serem analisadas somada à urgência de decisões médicas baseadas na dose recebida pelo indivíduo (Bertucci *et al.*, 2023; Vijayalakshmi *et al.*, 2024).

Todavia, a automação dessa técnica otimiza o processamento e aumenta a capacidade do laboratório, reduzindo gastos com materiais, erros humanos e o tempo de análise das amostras, especialmente em cenário de exposição em massa, nos quais a estimativa da dose é crucial para tratamento médico adequado dos indivíduos expostos (Vijayalakshmi *et al.*, 2024).

Dessa forma, a importância do aprimoramento da técnica de micronúcleo com bloqueio de citocinese (CBMN) através da automação reside no aumento da precisão da técnica, otimização de análise das amostras, ampliação da capacidade do laboratório de dosimetria biológica e redução de erros humanos. Nesse sentido, o laboratório consegue liberar os resultados com maior rapidez, permitindo que a equipe médica atue precocemente em situações de emergência radiológica ou nuclear.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é abordar os benefícios da automação da técnica de micronúcleo com bloqueio de citocinese (CBMN), utilizando linfócitos do sangue periférico humano para fins de dosimetria biológica.

METODOLOGIA

Este trabalho foi elaborado a partir de uma revisão da literatura científica. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica na base de dados Google Acadêmico, utilizando as palavras-chaves: “micronucleus”, “automation”, “semi-automation”, “human peripheral blood lymphocytes”, “biological dosimetry” e “biodosimetry”. Os critérios de seleção dos artigos foram: artigos redigidos em inglês, publicados entre janeiro de 2020 e maio de 2025, cujo foco fosse a automação da técnica de micronúcleo com bloqueio de citocinese em linfócitos humanos do sangue periférico para dosimetria biológica. Após a busca, os trabalhos encontrados passaram por uma triagem, com base na avaliação do título e resumo de cada artigo. Foram selecionados, segundo os critérios de inclusão, 6 artigos científicos, excluindo-se artigos de revisão e com acesso restrito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A dosimetria biológica, ou biodosimetria, é uma área da dosimetria que quantifica a dose de radiação depositada em organismos vivos a partir da análise de biomarcadores específicos para radiação. Atualmente, os biomarcadores citogenéticos são os mais utilizados, com destaque para os dicêntricos (DC) e os micronúcleos (MN), que são obtidos a partir de técnicas citogenéticas padronizadas pela Organização Internacional de Normalização e pelos protocolos da Agência Internacional de Energia Atômica (Beaton-Green *et al.*, 2023; Vijayalakshmi *et al.*, 2024).

O micronúcleo é uma estrutura semelhante ao núcleo, porém de menor tamanho, encontrado no citoplasma de células binucleadas obtidas por meio do bloqueio da citocinese durante a mitose. Ele é formado por cromossomos inteiros ou fragmentos de cromossomos



acêntricos que não foram incluídos em nenhum dos núcleos formados durante a anáfase, ambos envoltos pelo envelope nuclear (Fenech, 2020). Apesar da técnica de micronúcleo não ser específica para radiação, a frequência de micronúcleos aumenta proporcionalmente à dose recebida, o que permite sua aplicação na dosimetria biológica, especialmente para fins de triagem em situações de exposição acidental de múltiplas pessoas à radiação (Vijayalakshmi *et al.*, 2024).

A técnica tradicional de micronúcleo é realizada de forma totalmente manual, o que demanda tempo tanto para o processamento quanto para a análise microscópica. Além disso, depende de profissionais treinados, os quais estão sujeitos a erros de análise (Shen *et al.*, 2022). Por esse motivo, em situações de emergência radiológica ou nuclear que sobrecarregam os laboratórios, a técnica manual torna-se inadequada frente à alta demanda e à urgência na obtenção de dados biodosimétricos, comprometendo o planejamento de ações médicas que dependem da estimativa precisa da dose absorvida pelos indivíduos expostos. Para otimizar esse processo e oferecer resultados rápidos e precisos, a implementação da automação da técnica de micronúcleo surge como uma alternativa eficaz (Vijayalakshmi *et al.*, 2024).

O Metafer MNScore, da MetaSystems, é um software capaz de escanear e pontuar automaticamente as lâminas preparadas com células binucleadas. Para validação dos dados, os resultados gerados por esse programa são posteriormente analisados por um profissional (Bertucci *et al.*, 2023). Vijayalakshmi *et al.* (2024) utilizaram esse software para comparar a pontuação automatizada com a pontuação manual de micronúcleos em linfócitos do sangue periférico humano. Eles observaram que a automação reduziu o tempo de análise em torno de 15 a 20 vezes e apresentou maior precisão em relação à pontuação manual das células binucleadas. Desempenho semelhante foi observado no trabalho de Lee *et al.* (2023), que utilizou o mesmo software. Shen *et al.*, (2022) desenvolveram um sistema de detecção de células binucleadas e micronúcleos, validado por meio da comparação com a pontuação manual, os autores observaram que o método automatizado foi de 44 a 50 vezes mais rápido do que o convencional, aumentando significativamente a eficiência do laboratório.

Apesar dos benefícios, a automação apresenta taxas de falso positivo e falso negativo, relacionados a erros de pontuação automática, especialmente em lâminas de altas doses de radiação que podem reduzir a precisão (Lee *et al.*, 2023). No trabalho de Lee *et al.* (2023), por exemplo, a taxa média de falso positivo foi de 1,14% para células binucleadas e de 1,03% para micronúcleos, enquanto a taxa de falso negativo para micronúcleos foi de 3,5%. Apesar desses índices, os valores são considerados baixos e não invalidam a aplicação da leitura automatizada das lâminas, que ainda podem ser submetidas à inspeção visual para melhorar a acurácia dos resultados automatizados (Lee *et al.*, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A automação da técnica de micronúcleo para fins de dosimetria biológica é uma alternativa promissora para aumentar a eficiência dos laboratórios de dosimetria biológica, especialmente em contextos de emergência radiológica ou nuclear em massa. Isso porque, a automação é dezenas de vezes mais rápida do que a pontuação manual das células binucleadas e micronúcleos, permitindo a triagem rápida de grandes volumes de amostras.

O software Metafer MNScore, da MetaSystems, foi desenvolvido para este fim, apresentando um rendimento de 10 a 15 vezes superior à pontuação manual, além de precisão nas pontuações. Isso contribui para reduzir o tempo de análise de amostras e a variabilidade interobservadora.



Apesar disso, é importante considerar que a automação pode apresentar resultados falsos negativos e falsos positivos, influenciados pela dose absorvida. Dessa forma, é necessário validação por profissionais habilitados e calibração dos sistemas.

Portanto, a implementação de sistemas de pontuação automatizados da técnica de micronúcleo para dosimetria biológica é um grande aliado do laboratório para responder de forma rápida emergências radiológicas ou nucleares, que geram uma grande demanda por estimativas de dose absorvida, necessárias para tratamento médico adequado. Contudo, é necessário a calibração constante dos sistema, atualização e, caso necessário, validação dos resultados por um profissional.

Palavras-chave: Automação; Dosimetria biológica; Micronúcleo; Linfócitos humanos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEATON-GREEN, L. A. *et al.* Application of the cytokinesis-block micronucleus assay for high-dose exposures using imaging flow cytometry. **Cytogenetic and Genome Research**, Basileia, v. 163, e. 3-4, p. 131-142, Aug. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1159/000532124>. Disponível em: <https://karger.com/cgr/article/163/3-4/131/860656/Application-of-the-Cytokinesis-Block-Micronucleus>. Acesso em: 30 mai. 2025.

BERTUCCI, A. *et al.* Comparison of Isolated Lymphocyte and Whole Blood-Based CBMN Assays for Radiation Triage. **Cytogenetic and Genome Research**, Basileia, v. 163, n. 3-4, p. 110-120, Aug. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1159/000533488>. Disponível em: <https://karger.com/cgr/article/163/3-4/110/861390/Comparison-of-Isolated-Lymphocyte-and-Whole-Blood>. Acesso em: 23 mai. 2025.

FENECH, M. Cytokinesis-block micronucleus cytochrome assay evolution into a more comprehensive method to measure chromosomal instability. **Genes**, [s.l.], v. 11, n. 10, p. 1203, Oct. 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/genes11101203>. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2073-4425/11/10/1203>. Acesso em: 30 mai. 2025.

LEE, Y. *et al.* Improving radiation dosimetry with an automated micronucleus scoring system: correction of automated scoring errors. **Radiation and Environmental Biophysics**, [s.l.], v. 62, n. 3, p. 349-356, Aug. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00411-023-01030-7>. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00411-023-01030-7>. Acesso em: 24 mai. 2025.

SHEN, X. *et al.* Rapid and automatic detection of micronuclei in binucleated lymphocytes image. **Scientific Reports**, [s.l.], v. 12, n. 1, p. 3913, Mar. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-022-07936-4>. Disponível em:

<https://www.nature.com/articles/s41598-022-07936-4#citeas>. Acesso em: 28 mai. 2025.

VIJAYALAKSHMI, J. *et al.* Lab to Emergency: Establishment and validation of automated method for rapid biodosimetry. **Research Square**, [s.l.], v. 1. May. 2024. DOI: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4380326/v1>. Disponível em:

<https://www.researchsquare.com/article/rs-4380326/v1>. Acesso em: 30 mai. 2025.



ÚLCERA GÁSTRICA E SULFETO DE HIDROGÊNIO (H₂S): UMA MOLÉCULA PROMISSORA NO TRATAMENTO DE LESÕES GASTROINTESTINAIS?

¹Antônio Vinicius Vieira Araújo

¹Sabrine Vitoria dos Santos Ramos

¹Beatriz de Carvalho Oliveira

¹Isaac Alef Barbosa Gomes

¹Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Parnaíba, Piauí, Brasil;

Área temática: Farmacologia

Resumo: Este estudo objetivou avaliar o efeito protetor do sulfeto de hidrogênio (H₂S) na úlcera gástrica (UG) e seus mecanismos de ação na integridade da mucosa gástrica. Realizou-se uma revisão integrativa na base PubMed, utilizando descritores MeSH para H₂S e úlcera gástrica, incluindo artigos experimentais originais em inglês com texto completo, sem restrição temporal. Os resultados demonstraram que o H₂S promove cicatrização de UG, reduzindo a área ulcerada e acelerando a regeneração tecidual. Seus mecanismos envolvem: supressão da secreção ácida e da atividade pepsinogênica; atenuação do estresse oxidativo e inflamação; modulação de vias metabólicas via ativação da AMPK; e sinergia funcional com monóxido de carbono (CO) para ampliar efeitos citoprotetores. A quantificação dinâmica de H₂S in vivo valida seu papel farmacológico. Conclui-se que o H₂S atua como gasotransmissor multifuncional na homeostasia gástrica, representando um alvo terapêutico promissor para UG devido a seus efeitos antiagressivos, antioxidantes e pró-reparativos.

Palavras-chave: AMPK; Estresse Oxidativo; Gasotransmissor; Regeneração Tecidual.

INTRODUÇÃO

A úlcera gástrica (UG) constitui uma injúria comum do sistema digestivo, caracterizada por lesões na mucosa estomacal que comprometem gravemente a homeostasia tecidual. Esta condição, que afeta aproximadamente 10% da população global, apresenta um curso clínico frequentemente recorrente e associado a complicações significativas (Malfertheiner *et al.*, 2009; Guo *et al.*, 2024). Sua patogênese decorre essencialmente de um desequilíbrio entre os mecanismos de defesa da mucosa (como secreção de muco e bicarbonato, fluxo sanguíneo e regeneração celular) e fatores agressores, notadamente o ácido clorídrico e a pepsina (Calam; Baron, 2002; Brito *et al.*, 2018; Park *et al.*, 2016).

Nesse contexto, o sulfeto de hidrogênio (H₂S) emerge como uma molécula sinalizadora gasosa com funções fisiológicas e patológicas críticas no trato gastrointestinal (TGI) (Magierowski *et al.*, 2017). Produzido endogenamente a partir da L-cisteína principalmente pelas enzimas cistationina β-sintase (CBS) e cistationina γ-liase (CSE), o H₂S desempenha um papel fundamental na manutenção da integridade da mucosa gástrica (Magierowski *et al.*, 2013). Estudos demonstram suas notáveis propriedades gastroprotetoras, que incluem: a inibição da adesão leucocitária à endotélio vascular, a redução da peroxidação, e a atenuação direta de lesões gástricas (Wallace *et al.*, 2009). Adicionalmente, o H₂S estimula a secreção de bicarbonato duodenal, neutralizando o refluxo ácido, e suprime diretamente a secreção de ácido gástrico, reforçando assim a barreira mucosa contra agressões (Fiorucci *et al.*, 2006; Zanardo *et al.*, 2006; Takeuchi *et al.*, 2012).



Evidências robustas indicam que o H₂S, tanto de origem endógena quanto administrado via doadores exógenos, é capaz de mitigar significativamente o desenvolvimento de úlceras gástricas induzidas por estresse e outros agentes agressores (De Araújo *et al.*, 2018; Chen *et al.*, 2015). Essa proteção é mediada por mecanismos multifatoriais, abrangendo efeitos antioxidantes, vasodilatadores e anti-inflamatórios. Consequentemente, a modulação da via de sinalização do H₂S representa uma estratégia terapêutica promissora para o tratamento de doenças ácido-pépticas, como a úlcera gástrica.

OBJETIVO

Investigar o efeito protetor do H₂S contra lesões ulcerogênicas, com ênfase em sua modulação de marcadores de integridade tecidual, resposta inflamatória e estresse oxidativo gástrico.

METODOLOGIA

Este estudo adotou o desenho de revisão integrativa, utilizando exclusivamente a base *PubMed/Medline* devido à sua relevância internacional e rigor na indexação de literatura biomédica. A busca (abril-maio/2025) empregou descritores: "*Hydrogen Sulfide*" OR "*H2S*" AND "*Stomach Ulcer*" AND "*Gastric*". Foram incluídos artigos originais em inglês, sem restrição temporal, que abordassem o papel do H₂S na fisiopatologia ou terapia da úlcera gástrica. Estudos de revisão, modelos não gástricos e dados não primários foram excluídos. Após a seleção inicial, os estudos passaram por uma triagem criteriosa e, em seguida, por uma análise crítica para identificar padrões, lacunas na literatura e oportunidades de pesquisa. A metodologia adotada permitiu uma avaliação rigorosa e consistente, com critérios de inclusão e exclusão definidos para garantir a relevância, atualidade e adequação dos estudos selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação foi conduzida em duas etapas: inicialmente, os títulos e resumos foram analisados conforme os critérios de elegibilidade, resultando na identificação de 23 artigos. Posteriormente, constatou-se que 14 desses estudos não apresentavam relação direta com a temática proposta, sendo que 4 deles eram artigos de revisão. Dessa forma, somente 5 artigos foram considerados relevantes e incluídos para a realização desta revisão, assegurando a qualidade e a pertinência dos dados analisados. **Tabela 1.**

Tabela 1: Principais Estudos sobre o Papel H₂S na UG

AUTOR	OBJETIVO	MODELO
Wallace <i>et al.</i> , (2007)	Examinar o papel do sulfeto de hidrogênio na cicatrização de UG.	A úlcera foi induzida em ratos pela aplicação serosa de ácido acético.
Magierowski <i>et al.</i> , (2018)	Analisar a interação do H ₂ S na cicatrização da UG e na regulação do fluxo sanguíneo gástrico.	Úlceras gástricas induzidas por ácido acético.

Velázquez-moyado; Navarrete, (2018)	Avaliar as concentrações desse transmissor no estômago de ratos, com potencial aplicação nas áreas de farmacologia e fisiologia.	Úlcera induzida por etanol.
Aboubakr <i>et al.</i> , (2013)	Avaliar o papel do H ₂ S, tanto liberado exogenamente quanto sintetizado endogenamente, no dano gástrico oxidativo.	Estresse por contenção de frio em ratos.
De Araújo <i>et al.</i> , (2018)	Investigar se a AMPK previne lesões induzidas por etanol e contribui para a gastroproteção mediada por H ₂ S.	Úlcera induzida por etanol.

Os modelos animais continuam a representar ferramentas essenciais para a investigação fisiopatológica e para a prospecção de alternativas terapêuticas no contexto da ulcerogênese gástrica (KADASAH *et al.*, 2021). Entre os diversos mecanismos envolvidos na proteção da mucosa gástrica, destacam-se os efeitos multifatoriais do sulfeto de hidrogênio (H₂S), que atua tanto na prevenção quanto na reparação das lesões gástricas.

Wallace *et al.* (2007), em um estudo pioneiro, demonstraram que a administração de doadores exógenos de H₂S por um período de sete dias foi capaz de acelerar significativamente o processo de cicatrização de úlceras gástricas, promovendo a regeneração tecidual de forma mais eficiente quando comparado ao grupo controle. Tal evidência reforça a atuação do H₂S como um agente pro-reativo, diretamente associado à restauração da integridade da mucosa gástrica.

Corroborando esses achados, Aboubakr *et al.* (2013) observaram que o pré-tratamento com o doador de H₂S NaHS promoveu expressiva proteção contra úlceras induzidas por estresse térmico, evidenciada pelos seguintes efeitos: redução de aproximadamente 68% no índice ulcerativo, supressão de cerca de 45% na secreção ácida gástrica, inibição de 52% na atividade pepsinogênica e significativa atenuação de biomarcadores relacionados ao estresse oxidativo, como carbonilas proteicas e espécies reativas de oxigênio. Esses resultados sugerem a existência de um mecanismo dual, no qual há, simultaneamente, a diminuição da agressão luminal e o fortalecimento das defesas antioxidantes endógenas.

Em nível molecular, Velázquez-Moyado e Navarrete (2018) desenvolveram metodologias inovadoras para a quantificação dinâmica de H₂S *in vivo*, possibilitando o monitoramento das oscilações deste gasotransmissor durante os processos de lesão e reparação da mucosa gástrica. Essa abordagem se revela fundamental para o aprofundamento do entendimento da farmacodinâmica do H₂S, especialmente em função de sua concentração fisiológica nanomolar e da complexidade inerente à sua modulação farmacológica.

A complexidade da sinalização mediada pelo H₂S é ainda mais evidente ao se considerar suas interações com vias regulatórias centrais. Nesse contexto, Araújo *et al.* (2018) identificaram uma interação bidirecional entre o H₂S e a proteína quinase ativada por monofosfato de adenosina (AMPK), essencial para a gastroproteção: o H₂S ativa a AMPK, uma sensora energética crucial, que por sua vez, modula positivamente a biossíntese endógena de H₂S, configurando um circuito de retroalimentação que potencializa a proteção contra agentes agressivos, como o etanol.

Adicionalmente, Magierowski *et al.* (2018) elucidaram a existência de uma sinergia funcional entre diferentes gasotransmissores. Observou-se que os efeitos cicatrizantes promovidos pelo H₂S, incluindo o aumento do fluxo sanguíneo gástrico, a redução da extensão da área ulcerada e a modulação de respostas inflamatórias, são mediados, ao menos parcialmente, pelo monóxido de carbono (CO). A importância dessa interdependência foi confirmada pela abolição dos efeitos gastroprotetores do NaHS quando coadministrado com ZnPP, um inibidor da via do CO, indicando que a eficácia terapêutica do H₂S está



intrinsecamente vinculada à integridade da sinalização mediada pelo CO.

Em síntese, as evidências reunidas nesta discussão ressaltam a relevância do H₂S como um promissor agente gastroprotetor e cicatrizante, cuja ação envolve uma complexa rede de interações moleculares e sinalizações cruzadas, com potencial aplicação no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas para o tratamento de lesões gástricas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

O H₂S configura-se como um relevante mediador endógeno na proteção e reparação da mucosa gástrica, exercendo efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios e moduladores de vias celulares essenciais, como a AMPK. A sua interação funcional com outros gasotransmissores, notadamente o CO, evidencia a complexidade e a relevância das redes sinalizadoras envolvidas na gastroproteção. As evidências experimentais disponíveis indicam que os doadores de H₂S possuem potencial terapêutico significativo no tratamento das úlceras gástricas, promovendo tanto a atenuação do dano como a aceleração dos processos cicatriciais. Contudo, a aplicação clínica dessa abordagem ainda demanda o desenvolvimento de metodologias mais precisas para a quantificação e o monitoramento das concentrações fisiológicas de H₂S, a fim de assegurar sua eficácia e segurança terapêutica. Portanto, a continuidade das investigações sobre os mecanismos de ação do H₂S, bem como o aprimoramento das técnicas analíticas, são fundamentais para viabilizar sua futura incorporação como estratégia farmacológica no manejo das doenças gástricas ulcerativas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABOUBAKR, E.M. *et al.* Protective effect of hydrogen sulfide against cold restraint stress-induced gastric mucosal injury in rats. **Archives of pharmacal research**, v. 36, p. 1507-1515, 2013.

ARAÚJO, T. S.; et al. Hydrogen sulfide promotes gastroprotection through a pro-survival pathway mediated by AMPK activation. **Biochemical Pharmacology**, v. 156, p. 480-493, 2018.

BARÓN, MJ Ortiz; ZAPIAIN, J. Gómez; APODACA, Pedro. Apego y satisfacción afectivo-sexual en la pareja. **Psicothema**, p. 469-475, 2002.

BRITO, Geovânia Vieira et al. Consulta de puericultura na estratégia saúde da família: percepção de enfermeiros. **Revista de APS**, v. 21, n. 1, 2018.

CHEN, Chen; JAFARI, Roozbeh; KEHTARNAVAZ, Nasser. UTD-MHAD: A multimodal dataset for human action recognition utilizing a depth camera and a wearable inertial sensor. In: 2015 IEEE International conference on image processing (ICIP). **IEEE**, 2015. p. 168-172.

CHEN, Shan-wen *et al.* Protective effect of hydrogen sulfide on TNF- α and IFN- γ -induced injury of intestinal epithelial barrier function in Caco-2 monolayers. **Inflammation Research**, v. 64, p. 789-797, 2015.



DE ARAUJO, S.*et al.* AMPK activation promotes gastroprotection through mutual interaction with the gaseous mediators H₂S, NO, and CO. **Nitric Oxide**, v. 78, p. 60-71, 2018.

FIORUCCI, Stefano et al. The emerging roles of hydrogen sulfide in the gastrointestinal tract and liver. **Gastroenterology**, v. 131, n. 1, p. 259-271, 2006.

KADASAH, S.; et al. The protective role of hydrogen sulfide in gastric ulcer: A review of experimental and clinical studies. **Biomedicine & Pharmacotherapy**, v. 134, p. 111145, 2021.

MAGIEROWSKI, M. *et al.* Cross-talk between hydrogen sulfide and carbon monoxide in the mechanism of experimental gastric ulcers healing, regulation of gastric blood flow and accompanying inflammation. **Biochemical Pharmacology**, v. 149, p. 131-142, 2018.

MALFERTHEINER, Peter; CHAN, Francis KL; MCCOLL, Kenneth EL. Peptic ulcer disease. **The lancet**, v. 374, n. 9699, p. 1449-1461, 2009.

PARK, Joonkoo et al. Non-symbolic approximate arithmetic training improves math performance in preschoolers. **Journal of experimental child psychology**, v. 152, p. 278-293, 2016.

VELÁZQUEZ-MOYADO, J.A.; NAVARRETE, A. The detection and quantification, in vivo and in real time, of hydrogen sulfide in ethanol-induced lesions in rat stomachs using an ion sensitive electrode. *Journal of Pharmacological and Toxicological Methods*, v. 89, p. 54-58, 2018.

WALLACE, J.L. *et al.* Hydrogen sulfide enhances ulcer healing in rats. **The FASEB Journal**, v. 21, n. 14, p. 4070-4076, 2007.

ZANARDO, Renata CO et al. Hydrogen sulfide is an endogenous modulator of leukocyte-mediated inflammation. **The FASEB journal**, v. 20, n. 12, p. 2118-2120, 2006.



A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

¹Rodrigo Octávio Urban Bernardes de Menezes

¹Universidade do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

Área temática: Psicologia

Resumo: O presente trabalho procura destacar, em apertada síntese, a importância que tem a educação inclusiva na educação de crianças com transtorno do espectro autista. Através de revisão literária, pretende-se esclarecer pais e professores sobre a inclusão, e não somente das técnicas para lidar com crianças com este transtorno. Enfim, demonstrar que o acolhimento é essencial para o bom desenvolvimento do aluno com transtorno do espectro autista, com resultados que o seguirão por toda a vida, e destacar a responsabilidade de todos os envolvidos com relação à inclusão do aluno.

INTRODUÇÃO

As mudanças sociais e culturais dos últimos tempos requereram profundas mudanças educacionais. Alterações nos parâmetros curriculares, leis de acessibilidade e de acesso à escola, novos usos de tecnologias e necessidades de adaptações pedagógicas provocaram transformações significativas na prática escolar, demandando uma adequação dos docentes às novas práticas de ensino.

Segundo Barbosa e Bezerra (2021), uma das mais relevantes modificações pedagógicas implementadas no Brasil foi a Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – promulgada em 1996 e posteriormente alterada pela Lei 12.796/13, que tratou da educação de crianças com deficiência. Teve início neste momento, formalmente, por lei específica, a educação inclusiva e a obrigatoriedade de sua prática nos campos pedagógicos nacionais, tanto em escolas públicas como em instituições privadas. Assim, tida como direito, a inclusão escolar deve ser garantida a todos, sobrepujando qualquer preconceito. Desta forma:

O preconceito é o primeiro e mais difícil obstáculo encontrado para a inclusão social, ele isola as crianças, as torna inferiores; não podemos pensar que é um privilégio uma criança com necessidades especiais estudar numa escola regular, é um direito, e como tal deve ser assegurado a todos (SOBRINHO, 2021, p. 18).

É essencial que haja uma preparação do corpo docente e demais funcionários escolares, para recepção e acolhimento das crianças com necessidades, respeitando as peculiaridades de cada um. Principalmente das crianças com transtorno do espectro autista (TEA), em quem a manifestação se dá de modo praticamente individual, de acordo com cada criança. Neste sentido, é primordial que as escolas regulares estejam preparadas para atender a todos. Assim:

Se nosso objetivo é transformar escolas regulares em escolas que atendam a todos, sem discriminação, é necessário prioritariamente que todos os envolvidos no referido processo tenham em mente que o objetivo da educação inclusiva é propiciar a participação efetiva de todos os alunos em todas as atividades da escola



e da comunidade, independentemente de suas características individuais, e que todos podem contribuir para o desenvolvimento pleno deste processo (VIOTO e VITALIANO, 2012, p. 05).

É premente um atendimento de forma abrangente, resultando em uma educação agregadora para todos os alunos, independente se portadores de TEA ou não.

OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho é apresentar a importância da educação inclusiva para o desenvolvimento do aluno com TEA. Pretende-se destacar a empatia e afetividade do educador, além de outras pessoas envolvidas com a escola, para o bom resultado na aprendizagem da pessoa com TEA. Ainda, destacar a importância de toda a sociedade, escola, familiares e governo, para concretizar uma educação realmente inclusiva.

METODOLOGIA

A metodologia do trabalho consiste em uma pesquisa do tipo qualitativo, de fundamentação bibliográfica e explicativa, visto que, conforme Gil (2008), tem preocupação em identificar fatores que determinam ou contribuem para os fenômenos analisados. Ainda, se baseia em estudos anteriores, mormente produção bibliográfica hodierna e fundamentada, sem ignorar que o assunto é motivo de ampla discussão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Educação Inclusiva pode ser entendida como o processo de inclusão dos portadores de necessidades especiais ou de distúrbios de aprendizagem na rede de ensino comum, em convivência com outros alunos não portadores de transtornos.

Para Forlin (2018), especialista em educação inclusiva e consultora da UNESCO, a educação inclusiva é o método mais justo e abrangente para educar as crianças, sendo aceito como a forma mais eficaz de apoiar todos os alunos. Segundo Freitas e Souza (2021), a educação inclusiva é um espaço para todos, valorizando a diversidade e evitando a segregação.

A verdadeira inclusão permite a convivência dos alunos, sem qualquer tipo de distinção social, étnico-racial, desenvolvimento cognitivo ou ritmo de aprendizagem. Tal convivência prepara os alunos para a inserção em uma sociedade complexa e multifacetada do mundo contemporâneo, promovendo a integração e diminuindo as desigualdades históricas existentes na coletividade.

Tal medida inclui, de forma efetiva, a inclusão dos portadores de TEA juntamente com os alunos sem qualquer deficiência. Assim, neste sentido:

Para tanto, faz-se necessário realizar um trabalho de sensibilização da comunidade escolar, de orientação e capacitação dos educadores, corpo docente e técnico, visando à prevenção de situações adversas que possam prejudicar a aprendizagem de alunos com autismo (FREITAS e SOUZA, 2021, p. 65217).

É premente a empatia e atitude do educador, como aquele que mantém o contato direto com o aluno portador de TEA, fomentando o desenvolvimento e a evolução da criança,



ao mesmo tempo propiciando a interação e respeitando a individualidade. A participação do corpo docente tem influência direta no relacionamento entre os alunos e na aprendizagem de cada um.

A verdadeira educação inclusiva age neste sentido, construindo não só uma sociedade mais abrangente, mas também influenciando no desenvolvimento do próprio aluno com TEA. O modo como é abrigado na escola tem reflexos em todo o seu desenvolvimento, inclusive fase adulta. Neste diapasão:

Proporcionar a todas as crianças uma experiência educativa de qualidade, não segregada e respeitadora das diferenças individuais por muito aparentes que sejam, parece ser um meio seguro para a formação de valores que possam ser preventivos de situações mais tardias de ostracismo e conflito (RODRIGUES, 2006, p. 12).

Não obstante, conforme Vitaliano e Manzini (2010), não se pode olvidar de outros agentes importantes neste processo, como coordenadores pedagógicos, gestores, responsáveis pela educação no âmbito municipal, estadual e federal. A educação inclusiva demanda participação de toda a comunidade escolar, sem exclusões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração fomenta a educação dos portadores de TEA, e permite aos alunos do ensino regular conviverem com diferenças e se constituírem como seres humanos mais empáticos e menos preconceituosos. Ainda, a educação inclusiva, além de seu caráter agregador e integracionista, é o primeiro passo para prevenir a exclusão social.

Portanto, a educação inclusiva é plural e democrática, permitindo que todos participem dos rumos do processo de aprendizagem, além de favorecer a construção do próprio conhecimento por todos os alunos, de forma individual ou coletiva, sejam eles portadores de TEA ou não.

Para Freitas e Souza (2021), a interação social permita ajudar no desenvolvimento de novas aprendizagens e comportamentos. E que ultrapassem o ensinamento técnico da matéria, permitindo a evolução dos alunos em suas características mais relevantes: a empatia e o acolhimento das diferenças, além da compreensão da multiplicidade humana.

Este é um papel de todos os envolvidos na educação, de forma direta ou mediata, atuando de forma presencial na sala de aula ou elaborando e fomentando políticas educacionais. Só com esforço coletivo e participação integral é possível instaurar uma educação que seja realmente inclusiva.

Palavras-chave: Autismo; Criança; Educação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Ana Karla Gomes, BEZERRA, Tarcileide Maria Costa. Educação inclusiva: reflexões sobre a escola e a formação docente. **Ensino em perspectiva**. Fortaleza, v. 2, n. 2, p. 1-11, 2021.

FORLIN, Cris. The inclusive education policy conundrum: A realism for enabling sustainability, accountability and high-quality education? **Rceunesco.ae**, 2018. Disponível em: <<chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Frcpunesco.ae%2Fen%2FKnowledgeCorner%2FWorkingPapers>>. Acesso em:



31 abr 2025.

FREITAS, Sanary Dias, SOUZA, Pedro Ramon Pinheiro de. Educação inclusiva de crianças autistas na rede pública de ensino regular. **Brazilian Journal of Development**. Curitiba, v. 7, n. 7, p. 65209-65227, jul. 2021.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2008.

RODRIGUES, David (org.). **Inclusão e educação: doze olhares sobre a educação inclusiva**. São Paulo: Summus, 2006.

SOBRINHO, Luciana dos Santos. Conquistas e desafios na educação inclusiva no Brasil. **Revista educação continuada**. São Paulo, v. 3, n. 1, p. 17-19, 2021.

VIOTO, Josiane Rodrigues Barbosa, VITALIANO, Célia Regina. **O papel da Gestão Pedagógica Frente ao Processo de Inclusão dos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais**. 2012. Disponível em: <<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/viewFile/660/668>>. 01 jun 2025.

VITALIANO, Célia R., MANZINI, Eduardo J. A formação inicial de professores para inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. In: VITALINO, Célia R.(org.) **Formação de professores para a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais**. Londrina: EDUEL, 2010.



INFLUÊNCIA DA PERDA DE PESO NA REDUÇÃO DOS SINTOMAS DE DEPRESSÃO EM PESSOAS COM OBESIDADE

¹Ana Luiza Alberto Farias

¹Bruna Tomás Marra

¹Sofia Brasil Elias Rezende

¹Sophia Maciel Pereira

²Renata Aparecida Elias Dantas

^{1,2}Centro Universitário de Brasília. Brasília, DF, Brasil.

Área temática: Clínica Médica


Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar a influência da perda de peso na redução dos sintomas de depressão em pessoas com obesidade. A metodologia consistiu em uma revisão integrativa da literatura, com base em dez artigos científicos selecionados que abordam intervenções como mudanças comportamentais, dietas, exercícios físicos e cirurgia bariátrica. Os estudos incluíam populações adolescentes, adultas e idosas, com acompanhamentos que variaram de curto a longo prazo. Os resultados indicaram que a perda de peso está frequentemente associada à melhora nos sintomas depressivos, especialmente quando envolve intervenções multidisciplinares que incluíam suporte psicológico. Os dados apontam que a redução do índice de massa corporal, melhorias na qualidade da dieta e o aumento da atividade física estão ligados a ganhos na saúde mental, como diminuição da sintomatologia depressiva, melhora da autoestima e do funcionamento social. Em alguns casos, os benefícios psicológicos foram observados mesmo quando a perda de peso foi modesta. No entanto, também foram encontrados resultados que não identificaram associação significativa entre perda de peso e melhora dos sintomas depressivos, especialmente em faixas etárias mais jovens ou quando fatores hormonais e ambientais não foram controlados. Conclui-se que a perda de peso pode exercer um papel importante na redução da depressão em pessoas com obesidade, desde que integrada a estratégias que considerem aspectos comportamentais e emocionais. A abordagem integrada parece ser mais eficaz do que intervenções isoladas.

INTRODUÇÃO

A obesidade é uma condição multifatorial que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e está frequentemente associada a comorbidades físicas e psicológicas, entre elas a depressão. Estudos demonstram uma relação bidirecional entre essas duas condições, em que a obesidade pode agravar os sintomas depressivos e, por outro lado, a depressão pode dificultar o controle do peso corporal devido a fatores como desmotivação, sedentarismo e padrões alimentares desregulados. (Fan et al., 2023; Rosas et al., 2021).

Nesse contexto, diferentes estratégias têm sido propostas para avaliar o impacto da perda de peso na saúde mental de indivíduos com obesidade. Intervenções clínicas, comportamentais e cirúrgicas, como mudanças no estilo de vida, dietas com restrição calórica, exercício físico regular, terapia cognitivo-comportamental e cirurgia bariátrica, têm sido amplamente investigadas quanto à sua eficácia tanto na redução de peso quanto na melhora dos sintomas depressivos. (Jebeile et al., 2024; Murton et al., 2023).

Estudos com adultos demonstraram que programas de tratamento integrados e com suporte psicológico contínuo resultam em benefícios tanto físicos quanto emocionais,



promovendo melhorias no humor, autoestima e qualidade de vida. (Rosas et al., 2021; Rosas et al., 2020). Em adolescentes, os resultados também são promissores, embora mais heterogêneos, apontando para a necessidade de intervenções adaptadas às demandas específicas dessa faixa etária e com acompanhamento a longo prazo. (Jebeile et al., 2024; Bonin et al., 2024).

Técnicas de neuroimagem indicam ainda que a resolução de problemas e o enfrentamento de emoções negativas, trabalhados em intervenções psicológicas, podem gerar mudanças em áreas cerebrais como a amígdala, diretamente associadas ao processamento emocional, o que contribui para a melhora da saúde mental desses indivíduos. (Lv et al., 2021). No entanto, é importante destacar que alguns estudos não encontraram associação significativa entre perda de peso e sintomas depressivos, sugerindo a presença de variáveis moduladoras, como fatores hormonais, sociais, ambientais e genéticos. (Bonin et al., 2024; Silva et al., 2022).

OBJETIVO

Analisar a relação entre a obesidade e os sintomas da depressão em pessoas obesas e com sintomas depressivos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada a partir de artigos publicados em periódicos científicos, encontrados na base de dados PubMed, a respeito da influência da perda de peso com a redução dos sintomas da depressão. A busca foi realizada durante os meses de abril e maio de 2025 e foram usados os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Obesidade”, “Depressão”, “perda de peso” e “saúde mental”. Os artigos selecionados foram restringidos de acordo com o período de 2020 a 2025. Inicialmente foram encontrados 24 artigos condizentes com a temática retratada. Em seguida, foram selecionados 10 artigos na base de dados do PubMed, sendo excluídas revisões sistemáticas, metanálises e revisões simples de literatura. Foram incluídos artigos que respondiam ao tema de revisão deste artigo, com análise sobre a obesidade e depressão juntamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A perda de peso está associada à redução dos sintomas de depressão em pessoas com obesidade, especialmente quando as intervenções são realizadas de forma integrada, envolvendo aspectos físicos, psicológicos e comportamentais. Intervenções baseadas em mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos e terapia cognitivo-comportamental, mostraram melhora significativa nos indicadores de saúde mental, como humor, autoestima e qualidade de vida. (Soldevila-martías et al. 2024; Rosas et al. 2021; Rosas et al. 2020).

Em adolescentes, os resultados mostraram reduções nos sintomas depressivos com a perda de peso, mas houve necessidade de suporte contínuo para evitar o reaparecimento dos sintomas (Jebeile et al. 2024). Em adultos, a melhora foi mais consistente quando a perda de peso era acompanhada por intervenções comportamentais e acompanhamento psicológico (Rosas et al. 2021; Rosas et al. 2020). Cirurgias bariátricas também apresentaram benefícios a longo prazo na saúde mental, embora alguns estudos apontem que o impacto positivo pode reduzir com o tempo se não houver suporte contínuo (Murton et al. 2023).



Outros achados relevantes apontam que a melhora da alimentação, principalmente com aumento no consumo de frutas e vegetais, e a prática de atividade física moderada, contribuem para maior bem-estar psicológico, mesmo com perdas modestas de peso. A redução dos sintomas depressivos parece ocorrer não apenas pela mudança corporal, mas também pela percepção de autocuidado, autonomia e melhoria na funcionalidade social (Soldevila-martías et al. 2024; Rosas et al. 2021; Lv et al. 2021).

Contudo, alguns estudos não encontraram associação estatisticamente significativa entre perda de peso e depressão, especialmente quando fatores hormonais, genéticos ou ambientais não foram controlados (Bonin et al. 2024). Isso evidencia a importância de abordagens individualizadas e multidisciplinares no tratamento de pessoas com obesidade e sintomas depressivos (Bonin et al. 2024; Silva et al. 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A associação entre intervenções que integram aspectos emocionais, comportamentais e físicos, e a perda de peso, evidencia que, segundo a análise realizada, os sintomas de depressão em pessoas com obesidade são reduzidos. Retomando o objetivo proposto, observou-se que a melhora da saúde mental não depende exclusivamente da perda de massa corporal, mas também da adoção de hábitos saudáveis, suporte psicológico contínuo e percepção positiva de autocuidado.

Portanto, tratamentos que visem simultaneamente o emagrecimento e o bem-estar emocional são mais eficazes do que abordagens isoladas. Estratégias que incluam reeducação alimentar, prática regular de atividade física e apoio terapêutico demonstraram não apenas favorecer a redução do peso, como também melhorar significativamente o estado psicológico dos pacientes.

Sendo assim, recomenda-se que profissionais da saúde adotem uma perspectiva integrada e humanizada no cuidado a pessoas com obesidade e sintomas depressivos. Além disso, é fundamental que políticas públicas de saúde promovam programas de prevenção e tratamento que considerem essas duas condições de forma conjunta. Espera-se que os leitores reflitam sobre a importância de uma abordagem completa no tratamento da obesidade, visando não apenas o emagrecimento, mas também a saúde mental e a qualidade de vida dos indivíduos.

Palavras-chave: Perda de peso; Obesidade; Depressão; Saúde mental; Intervenção comportamental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1- SOLDEVILA-MARTÍAS, P. et al. Exercise as a promoter of neurocognitive improvement in people with psychiatric disorders and comorbid obesity: A randomized controlled trial. **Psychiatry research**, v. 342, n. 116226, p. 116226, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39418756/> Acessado em 2 de maio de 2025
- 2- MURTON, L. M. et al. Bariatric surgery and psychological health: A randomised clinical trial in patients with obesity and type 2 diabetes. **Obesity surgery**, v. 33, n. 5, p. 1536–1544, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36964319/> Acessado em 6 de maio de 2025



- 3- ROSAS, L. G. et al. Understanding mechanisms of integrated behavioral therapy for co-occurring obesity and depression in primary care: a mediation analysis in the RAINBOW trial. **Translational behavioral medicine**, v. 11, n. 2, p. 382–392, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32203569/> Acessado em 10 de maio de 2025
- 4- JEBEILE, H. et al. Symptoms of depression, eating disorders, and binge eating in adolescents with obesity: The Fast Track to Health randomized clinical trial. **JAMA pediatrics**, v. 178, n. 10, p. 996, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39186289/> Acessado em 10 de maio de 2025
- 5- ROSAS, L. G. et al. Effect of an intervention for obesity and depression on patient-centered outcomes: An RCT. **American journal of preventive medicine**, v. 58, n. 4, p. 496–505, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32067873/> Acessado em 13 de maio de 2025
- 6- LV, N. et al. Problem-solving therapy-induced amygdala engagement mediates lifestyle behavior change in obesity with comorbid depression: a randomized proof-of-mechanism trial. **The American journal of clinical nutrition**, v. 114, n. 6, p. 2060–2073, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34476464/> Acessado em 14 de maio de 2025
- 7- SILVA, J. V. et al. Analysis of the association between anxiety, depression and obesity in individuals with metabolic syndrome. **Endocrine regulations**, v. 57, n. 1, p. 92–98, 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37183689/> Acessado em 17 de maio de 2025
- 8- BALDINI, I.; CASAGRANDE, B. P.; ESTADELLA, D. Depression and obesity among females, are sex specificities considered? **Archives of women's mental health**, v. 24, n. 6, p. 851–866, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33880649/> Acessado em 17 de maio de 2025
- 9- FAN, Y. et al. Depression, anxiety, and development of obesity from childhood to young adulthood in China. **Journal of psychosomatic research**, v. 185, n. 111867, p. 111867, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39151258/> Acessado em 18 de maio de 2025
- 10- BONIN, S. et al. The association between depressive symptoms and overweight or obesity in prepubertal children: Findings from the QUALITY cohort. **Journal of affective disorders**, v. 367, p. 486–495, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39187203/> Acessado em 21 de maio de 2025



A IMPORTÂNCIA DO RASTREIO ATIVO DA TUBERCULOSE NA USF EM REGIÕES DO INTERIOR: ESTRATÉGIAS, DESAFIOS E IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA

¹ José Guilherme Salvino Alves

¹ Daniele Gualberto Moreira de Lima

¹ Gabriela Maria Ferreira Gomes Barros de Oliveira

¹ Milena Gabriel Marques

¹ Anna Débora Ferreira da Silva

¹ Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, Cabedelo, Paraíba, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: A tuberculose (TB) permanece como um desafio de saúde pública no Brasil, especialmente em regiões interioranas marcadas por vulnerabilidade social e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Este trabalho tem como objetivo analisar a importância do rastreio ativo da TB nas Unidades de Saúde da Família (USF) nessas localidades, destacando estratégias, desafios e impactos observados. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com base em artigos científicos publicados entre 2015 e 2025, selecionados nas plataformas SciELO e Google Acadêmico. Os resultados indicam que, embora o rastreio ativo seja uma ferramenta essencial para o diagnóstico precoce e controle da doença, sua implementação é limitada por fragilidades estruturais, escassez de recursos humanos, ausência de protocolos bem definidos, deficiências laboratoriais e formação insuficiente das equipes da Atenção Primária à Saúde. A sobrecarga assistencial e a desarticulação intersetorial também comprometem a vigilância ativa e o acompanhamento dos casos. Observa-se ainda que os determinantes sociais da TB, como moradia inadequada e insegurança alimentar, agravam o cenário, exigindo estratégias sensíveis ao contexto local. A literatura destaca a importância da educação permanente, do fortalecimento do vínculo com a comunidade e da atuação territorializada das USF. Conclui-se que o rastreio ativo da TB, mais do que uma ação técnica, representa um compromisso ético com a saúde coletiva, sendo essencial a valorização das equipes, a construção de redes de apoio e a adoção de estratégias participativas para ampliar o acesso, reduzir iniquidades e qualificar o cuidado em saúde nos territórios interioranos.

INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa milenar que ainda persiste como um grave problema de saúde pública no Brasil, especialmente em contextos de vulnerabilidade social e acesso precário aos serviços de saúde. Mais do que um agravamento epidemiológico, a tuberculose carrega consigo marcas de desigualdade, estigma e invisibilidade, afetando milhares de pessoas em silêncio, sobretudo nas regiões do interior do país. Nesse cenário, a atenção primária à saúde, por meio das Unidades de Saúde da Família (USF), representa uma porta de entrada estratégica para a identificação precoce e o controle da doença, oferecendo uma atuação contínua, territorializada e centrada na comunidade (Ministério da Saúde, 2022).

É nesse espaço de proximidade entre profissionais de saúde e população que o rastreio ativo da tuberculose ganha significado: não apenas como uma ferramenta clínica, mas como uma prática de cuidado que exige sensibilidade, escuta qualificada e compromisso ético com



a saúde coletiva. Muitas vezes, os primeiros sinais da doença — tosse persistente, emagrecimento, febre noturna — podem ser negligenciados por pacientes e até mesmo subvalorizados por profissionais, o que torna essencial a vigilância ativa e o olhar atento ao cotidiano das famílias atendidas pelas equipes de saúde da família (Santos et al., 2017).

Discutir os desafios e as potencialidades do rastreamento da tuberculose na atenção básica, especialmente nas regiões interioranas, é fundamental para fortalecer a vigilância em saúde e promover o diagnóstico precoce, o tratamento oportuno e a quebra da cadeia de transmissão. Essa discussão não se restringe ao campo biomédico; envolve também aspectos estruturais, sociais e institucionais que atravessam o trabalho das equipes, impactando diretamente os desfechos clínicos e a efetividade das políticas públicas de controle da doença (Deslandes, 2014).

Além de sua relevância técnica e epidemiológica, o tema é profundamente pertinente para as comunidades atendidas, pois reafirma o papel das USF como espaços de acolhimento, escuta e promoção da saúde em seus múltiplos sentidos. Reforça, ainda, a necessidade de capacitação permanente das equipes, de articulação com a rede de atenção e de fortalecimento do vínculo com os usuários (Garcia et al., 2018). No ambiente acadêmico, essa abordagem contribui para a formação crítica e humanizada de estudantes e profissionais da saúde, despertando o olhar para os determinantes sociais da tuberculose e para a importância da atuação territorial na transformação da realidade sanitária (Faleiros, 2011).

Dessa forma, o presente trabalho propõe-se a refletir sobre a importância do rastreamento ativo da tuberculose nas Unidades de Saúde da Família em regiões do interior, com ênfase nas estratégias empregadas, nos desafios enfrentados e nos impactos esperados na ampliação do acesso, na redução das iniquidades e na qualificação do cuidado em saúde.

OBJETIVO

Analisar a importância do rastreamento ativo da tuberculose nas Unidades de Saúde da Família localizadas em regiões do interior, destacando estratégias utilizadas, desafios enfrentados e impactos observados na vigilância e no controle da doença.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com enfoque em artigos científicos que debatam sobre o rastreamento ativo da tuberculose em regiões do interior na conjuntura da Atenção Primária à Saúde. A busca pelos dados foi feita nas plataformas SciELO e Google Acadêmico, por serem fontes acessíveis e por apresentarem um vasto repositório de materiais científicos relevantes sobre a temática. Os termos usados para localizar os estudos incluíram “tuberculose”, “rastreamento ativo”, “regiões do interior” e “saúde pública”. Foi priorizado publicações recentes entre 2015 e 2025, para que pudesse dialogar com a rotina real vivenciada pelos profissionais de saúde das USF, mas foram excluídos outros artigos que não delimitaram as regiões interioranas e que não demonstraram o cenário atual.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados evidencia que, embora o rastreamento ativo da tuberculose (TB) nas Unidades de Saúde da Família (USF) localizadas em regiões do interior represente uma estratégia fundamental para o controle da doença, sua implementação ainda é marcada por fragilidades operacionais, estruturais e formativas. Um dos principais resultados aponta para a carência de capacitação técnica e contínua dos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), especialmente quanto ao reconhecimento de sinais clínicos iniciais e à condução de casos suspeitos de forma ágil e resolutiva (SANTOS et al., 2017; SILVA et al., 2020).

Além da formação insuficiente, identificou-se a escassez de protocolos clínicos



específicos para o rastreo ativo e a ausência de fluxos bem estabelecidos de referência e contrarreferência, o que compromete a continuidade do cuidado e o tratamento oportuno dos pacientes diagnosticados. Tais limitações são agravadas pela deficiência de infraestrutura laboratorial, pela demora no transporte de amostras e pela baixa cobertura do Teste Rápido Molecular, dificultando a confirmação diagnóstica em tempo hábil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022; OLIVEIRA et al., 2023).

A articulação intersetorial, especialmente entre saúde, assistência social e vigilância epidemiológica, também se mostra deficiente, resultando na fragmentação do cuidado e na perda de oportunidades para o rastreo de contatos e ações preventivas em territórios vulneráveis. Esse cenário é ainda mais desafiador quando considerado o perfil socioeconômico das populações interioranas, muitas vezes marcadas por condições precárias de moradia, insegurança alimentar e dificuldade de acesso regular às unidades de saúde (REIS et al., 2019; FIOCRUZ, 2024).

Outro aspecto relevante discutido na literatura diz respeito à sobrecarga assistencial das equipes da APS, que convivem com demandas múltiplas e, frequentemente, com escassez de recursos humanos. Tal sobrecarga compromete a realização de visitas domiciliares e ações de vigilância ativa, reduzindo a efetividade do rastreo e o acompanhamento dos casos ao longo do tratamento. Relatos de desmotivação profissional e sentimento de impotência diante da complexidade dos determinantes sociais da TB foram identificados como fatores que dificultam o engajamento contínuo das equipes (SILVA et al., 2020; GARCIA et al., 2018).

Por fim, constatou-se que as iniciativas de educação permanente e formação em serviço permanecem insuficientes para consolidar uma abordagem clínica e territorial sensível às particularidades da tuberculose em contextos interioranos. A literatura reforça que a efetivação do rastreo ativo depende não apenas da expertise técnica, mas também da valorização do vínculo comunitário, da escuta qualificada e de uma rede de apoio institucional sólida. A construção de estratégias locais, participativas e alinhadas ao contexto epidemiológico e cultural de cada território é imprescindível para fortalecer o papel da USF na vigilância e no controle da doença (SANTOS et al., 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022; FIOCRUZ, 2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O rastreo ativo da tuberculose nas Unidades de Saúde da Família em regiões interioranas revela desafios importantes, como a carência de capacitação contínua, a sobrecarga das equipes, a fragilidade na estrutura laboratorial e a ausência de fluxos definidos. Esses entraves comprometem a detecção precoce e a efetividade das ações de controle.

Fortalecer o rastreo ativo na atenção primária requer investimento em educação permanente, infraestrutura e apoio intersetorial, além da valorização das especificidades locais. O enfrentamento da tuberculose demanda mais que ações biomédicas: exige compromisso ético, escuta ativa e atuação comunitária sensível.

Esse debate reafirma a atenção básica como espaço de cuidado integral, onde o rastreo se torna instrumento de justiça social e promoção da cidadania, sobretudo em contextos de vulnerabilidade.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Estratégias de rastreo; Interiorização da saúde; Tuberculose; Vigilância epidemiológica.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, L. A. et al. Desafios na atuação médica diante da violência infantil na atenção primária à saúde. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, v. 19, n. 3, p. 541-550, 2019.

DESLANDES, S. F. Ética e saúde pública: os desafios do enfrentamento da violência infantil. *Revista Bioética*, v. 22, n. 4, p. 721-730, 2014.

FALEROS, V. R. A violência contra crianças e a formação em saúde: desafios e perspectivas. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 27, n. 7, p. 1351-1357, 2011.

FIORUZ. Estudo revela impacto de transferência de renda na tuberculose. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/2025/01/estudo-mostra-que-transferencia-de-renda-reduziu-mortes-por-tuberculose>. Acesso em: 31 maio 2025.

GARCIA, A. M. et al. Subnotificação e dificuldades na notificação compulsória da violência infantil. *Revista de Saúde Pública*, v. 52, p. 25, 2018.

GOMES, M. R. et al. A atuação do médico da atenção primária no enfrentamento da violência infantil. *Revista de Medicina da Família e Comunidade*, v. 10, n. 2, p. 200-210, 2022.

LIMA, R. S. et al. Capacitação e insegurança dos profissionais de saúde no enfrentamento da violência infantil. *Revista de Enfermagem*, v. 14, n. 2, p. 115-123, 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Estratégias para prevenção da violência infantil. Genebra: OMS, 2016.

PESSOA, F. M. Acolhimento e escuta qualificada na atenção à violência infantil. *Revista Brasileira de Medicina*, v. 15, n. 1, p. 35-43, 2022.

PIRES, D. F. et al. Formação e práticas em saúde: enfrentamento da violência na atenção primária. *Revista Brasileira de Educação em Saúde*, v. 21, n. 1, p. 77-88, 2017.

REIS, J. A. et al. Rastreamento e fatores de risco para tuberculose em populações vulneráveis. *Revista Epidemiológica*, v. 25, n. 3, p. 450-459, 2019.

SANTOS, M. L. S. G. et al. Avaliação da atenção primária no controle da tuberculose: experiências no interior paulista. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, v. 20, n. 1, p. 161-175, 2017.

SILVA, J. V. et al. Implementação do teste rápido molecular para tuberculose em municípios do interior. *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, 2020.



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES COM CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIAS

Olga Luisa Lucena¹
Júlia Lodigiani Rodrigues Bragança²
Cecília Silva Santos³
Rayssa Nogueira Rodrigues Machado⁴
Flávia de Oliveira⁵
Fernando de Pilla Varotti⁶
Silmara Nunes Andrade⁷

¹Universidade Federal São João del Rei (olga-llucena@hotmail.com), ^{2,3}Universidade Federal São João del Rei, ^{4,5}Doutora em Enfermagem, docente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São João del Rei, ⁶Doutor em Farmacologia Bioquímica e Molecular, docente associado ao programa de Pós-graduação em Ciência da saúde da Universidade Federal de São João del Rei, ⁶Doutora em Ciências da Saúde, docente do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São João del Rei.

Resumo:

Introdução: O carcinoma de células renais (CCR), representa cerca de 95% das neoplasias renais, sendo frequentemente diagnosticado de forma incidental e associado a elevada taxa de mortalidade. O manejo terapêutico inclui nefrectomia parcial ou radical, além de tratamentos sistêmicos, como inibidores de tirosina quinase e imunoterápicos. **Objetivo:** Analisar a atuação da enfermagem ao paciente com CCR. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa construída a partir da seleção de textos selecionados, para analisar a atuação da enfermagem, destacando os pontos fortes e as lacunas presentes na literatura científica, em relação ao cuidado ao paciente. **Resultados e Discussão:** Os achados demonstram que a atuação da enfermagem é fundamental na educação do paciente, no monitoramento pós-operatório e na promoção da adesão ao tratamento, contribuindo para a redução de complicações e para a melhoria da qualidade de vida. Contudo, ainda são escassas as diretrizes nacionais específicas que norteiem essa prática. **Conclusão:** A integração formal da enfermagem na equipe multiprofissional pode otimizar os desfechos clínicos, evidenciando a necessidade da criação e implementação de protocolos bem definidos e baseados em evidências para o cuidado ao paciente com CCR.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem; Carcinoma de Células Renais; Tratamento oncológico.

Área Temática: Enfermagem

INTRODUÇÃO

O câncer de células renais (CCR), de origem epitelial, é responsável por aproximadamente 95% das neoplasias renais em âmbito mundial. Sua incidência e mortalidade vêm apresentando um crescimento linear de cerca de 3% a cada década. Em 2018, o câncer renal foi responsável por 2,2% dos novos casos de neoplasias malignas em adultos no mundo. No Brasil, as estimativas para o ano de 2022 indicaram aproximadamente 10.688 novos casos, correspondendo a uma taxa de 4,3 casos por 100.000 habitantes (Brasil, 2022; ACS, 2025).

Os tratamentos mais eficazes para o CCR localizado incluem a nefrectomia radical



e a cirurgia poupadora de néfrons. Contudo, o diagnóstico frequentemente tardio contribui para a baixa taxa de sobrevida em casos metastáticos, estimada em apenas 12% em cinco anos. Além disso, o CCR apresenta resposta limitada à radioterapia e aos tratamentos farmacológicos convencionais, o que reforça a necessidade de desenvolver estratégias terapêuticas mais eficazes para o manejo clínico dessa neoplasia (Krabbe et al., 2014).

Nesse contexto, em resposta à Portaria SCTIE/MS nº 91, de 27 de dezembro de 2018, que incorporou ao SUS os medicamentos cloridrato de pazopanibe e malato de sunitinibe para o tratamento do carcinoma de células claras metastático, surgiu a necessidade de elaboração de um relatório de diretrizes diagnósticas e terapêuticas para o CCR. Assim, em 2022, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) publicou um relatório com recomendações destinadas ao direcionamento das ações voltadas aos pacientes com CCR (Brasil, 2022).

Ressalta-se, nesse cenário, o papel fundamental do enfermeiro na assistência ao paciente oncológico com CCR. Esse profissional atua diretamente no cuidado ao paciente, adotando medidas que visam minimizar os riscos de perda da função renal após procedimentos cirúrgicos e promovendo um desfecho clínico mais favorável. Além disso, sua atuação em ações de educação em saúde é essencial para a prevenção do diagnóstico tardio (Parreira et al., 2024).

Adicionalmente, a administração de quimioterápicos antineoplásicos é uma atividade privativa do enfermeiro (Brasil, 2018). Diante da implementação de novos protocolos terapêuticos para o tratamento do CCR, é imprescindível que esse profissional esteja capacitado e orientado quanto à farmacodinâmica dos medicamentos, seus efeitos adversos e os riscos envolvidos no tratamento (Santos et al., 2020). No entanto, apesar da relevância da enfermagem nesse processo assistencial, observa-se a ausência de diretrizes, relatórios e recomendações específicas que norteiem a prática da enfermagem no cuidado ao paciente com CCR (Brasil, 2022).

Dessa forma, diante das atualizações terapêuticas e da incorporação de novas tecnologias no tratamento do CCR, torna-se essencial analisar criticamente a atuação da enfermagem, destacando os avanços, os pontos fortes e as lacunas ainda existentes na literatura científica quanto à assistência prestada a esses pacientes.

OBJETIVO

Analisar a atuação da enfermagem ao paciente com CCR, destacando os pontos fortes e as lacunas presentes na literatura científica, em relação ao cuidado ao paciente.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa que analisa a produção científica sobre a atuação da enfermagem na assistência ao paciente com carcinoma de células renais (CCR). Para a construção desta revisão, foi utilizada predominantemente a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com buscas realizadas nas bases de dados *Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde* (LILACS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF). Complementarmente, também foram incluídos manuais e protocolos disponíveis no Ministério da Saúde. Foram selecionados estudos que abordassem pacientes adultos com CCR, intervenções de enfermagem e comparações com as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT) para o CCR. O processo de seleção dos estudos foi conduzido por duas pesquisadoras durante o segundo semestre de 2024.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este estudo realizou uma revisão sobre o carcinoma de células renais (CCR), com ênfase no papel da equipe de enfermagem na assistência aos pacientes acometidos pela doença. A busca inicial identificou 1.211 artigos nas bases de dados PubMed, Medline e ScienceDirect, além de protocolos e manuais do ministério da saúde. No entanto, apenas 42 tratavam especificamente do CCR e, desses, nove não estavam disponíveis, resultando em 33 trabalhos incluídos na revisão.

Entre os 33 trabalhos selecionados, seis abordaram diretamente os cuidados de enfermagem no contexto do CCR, destacando a importância da educação em saúde e das intervenções personalizadas conforme o estágio da doença. Pullen (2021) enfatiza que a enfermagem exerce um papel fundamental na redução da morbidade e mortalidade, sobretudo por meio da prevenção de complicações pós-operatórias e do suporte emocional oferecido aos pacientes.

Outros estudos destacam a atuação da equipe de enfermagem na identificação precoce de sintomas, como as síndromes paraneoplásicas, e no monitoramento de eventos adversos decorrentes de terapias ablativas, quimioterapia e imunoterapia (Kelly et al., 2021; Pereira et al., 2024). No período pós-operatório, o enfermeiro tem papel essencial no monitoramento da função renal e na detecção de possíveis recorrências, sendo que intervenções como a oxigenoterapia têm contribuído para a redução de complicações e a melhoria do bem-estar dos pacientes (Kelly et al., 2021).

Além disso, o enfermeiro possui competências para realizar auditorias in loco, assegurando a conformidade com os protocolos estabelecidos e a qualidade da assistência prestada. Sua formação generalista, aliada a competências técnico-científicas, possibilita uma atuação efetiva na regulação em saúde, monitorando o estado clínico dos pacientes e promovendo o uso racional dos recursos (Ferreira et al., 2024).

Vinte e dois artigos abordaram aspectos epidemiológicos e clínicos do CCR. Bruinsma et al. (2021) associaram o uso regular de paracetamol ao risco aumentado de desenvolvimento da doença, enquanto Chen et al. (2023) identificaram subtipos de CCR de células claras com características clínicas e moleculares distintas. Quatro estudos avaliaram o custo-benefício de tratamentos para o CCR. Qin et al. (2023) compararam terapias de primeira linha para casos metastáticos, e Li et al. (2021) analisaram a relação custo-benefício entre nivolumabe + cabozantinibe e sunitinibe nos Estados Unidos. Modelagens e simulações também foram exploradas: Orlandella et al. (2020) demonstraram que a combinação de rapamicina e acarbose pode aumentar a eficácia de inibidores de PD-1 e mTOR.

A análise desses 31 estudos, complementada pelo Relatório de Recomendação da CONITEC (Brasil, 2022), proporcionou uma visão abrangente das diretrizes para o manejo do CCR. A CONITEC recomenda a realização de nefrectomia parcial ou radical, conforme o tamanho e a localização do tumor, sendo a adrenalectomia indicada apenas em situações específicas. Contudo, a nefrectomia está associada ao risco de desenvolvimento de doença renal crônica (DRC) no pós-operatório. Ferramentas como a proposta por Ellis et al. (2020) auxiliam na estratificação desse risco, permitindo a adoção de intervenções precoces.

Apesar do papel essencial da enfermagem no cuidado ao paciente com CCR, observou-se uma escassez de estudos específicos voltados à assistência de enfermagem. Ainda que a CONITEC (Brasil, 2022) reforce a necessidade de auditorias para garantir a conformidade dos protocolos e a qualidade do cuidado — com hospitais credenciados pelo



SUS responsáveis pela padronização e registro dos procedimentos —, as diretrizes ainda carecem de orientações claras sobre a atuação da enfermagem. Essa lacuna é especialmente relevante, considerando que a assistência de enfermagem está diretamente relacionada à qualidade do cuidado prestado ao paciente oncológico.

CONCLUSÃO

A literatura destaca que o enfermeiro desempenha um papel crucial no manejo do paciente com CCR, atuando desde a educação em saúde para prevenção e diagnóstico precoce até o acompanhamento pós-cirúrgico e monitoramento de complicações. No entanto, há uma lacuna significativa na integração dessas práticas nas diretrizes nacionais. A CONITEC, em seu relatório de Diretrizes Diagnósticas Terapêuticas do CCR (BRASIL, 2022), enfatiza a importância do diagnóstico precoce e do tratamento cirúrgico, mas pouco aborda o papel da enfermagem no cuidado multidisciplinar desses pacientes. Essa omissão pode limitar a atuação do enfermeiro, que poderia contribuir de forma mais efetiva com ações como o monitoramento de sinais vitais, a prevenção de infecções pós-operatórias, o suporte emocional ao paciente e a educação sobre mudanças no estilo de vida para reduzir fatores de risco.

REFERÊNCIAS

AMERICAN CANCER SOCIETY (ACS). **Kidney Cancer (Adult) - Renal Cell Carcinoma**. 2025. Disponível em: <https://www.cancer.org/cancer/kidney-cancer.html>. Acesso em: 10 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do carcinoma de células renais**. Brasília, DF, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2022/20220601_ddt_ccr_cp_38.pdf>. Acesso em: 15 dez. 2024.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem. **Resolução nº 569, de 19 de fevereiro de 2018**. Aprova o Regulamento Técnico da Atuação dos Profissionais de Enfermagem em Quimioterapia Antineoplásica. 2018. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-0569-2018_60766.html. Acesso em 08 abr 2025.

BRUINSMA, F. J. et al. Analgesic use and the risk of renal cell carcinoma – findings from the Consortium for the Investigation of Renal Malignancies (CONFIRM) study. **Cancer Epidemiology**, v. 75, p. 102036, 1 dez. 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34562747/>. Acesso em: 15 dez. 2024.

CHEN, Z. et al. Gene set enrichment analysis identifies immune subtypes of kidney renal clear cell carcinoma with significantly different molecular and clinical properties. **Frontiers in immunology**, v. 14, 23 jun. 2023. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37426638/>. Acesso em: 01 mai. 2025.

ELLIS, R. J. et al. A simple clinical tool for stratifying risk of clinically significant CKD after nephrectomy: development and multinational validation. **Journal of the American Society of Nephrology**, v. 31, n. 5, p. 1107–1117, 1 maio 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32238473/>. Acesso em: 01 mai. 2025.



FERREIRA, R. et al. Atuação da enfermagem no núcleo de internação e regulação: um relato de experiência. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 17, n. 9, p. e10292, 9 set. 2024.

KELLY, D. et al. "The role of nursing in the management of patients with renal and hepatic cancers: A systematic literature review." **European journal of oncology nursing : the official journal of European Oncology Nursing Society**, v. 55, 2021. Disponível em: [https://www.ejoncologynursing.com/article/S1462-3889\(21\)00149-6/fulltext](https://www.ejoncologynursing.com/article/S1462-3889(21)00149-6/fulltext) Acesso em: 01 set. 2024.

KRABBE, L. M.; BAGRODIA, A.; MARGULIS, V.; WOOD, C. G. Surgical management of renal cell carcinoma. **Semin Intervent Radiol**. v. 31, n. 1, p. 27-32, 2014.

ORLANDELLA, R. M.; TURBITT, W. J.; GIBSON, J. T. et al. The Antidiabetic Agent Acarbose Improves Anti-PD-1 and Rapamycin Efficacy in Preclinical Renal Cancer. **Cancers (Basel)**. v. 12, n. 10, 2020. Disponível em: https://www.mdpi.com/2072-6694/12/10/2872/review_report. Acesso em: 15 dez. 2024.

PARREIRA, S.; BURNS, K.; MOLDAWER, N. et al. The Role of Nurses in the Management of Adverse Events in Patients Receiving First-Line Axitinib Plus Immuno-Oncology Agents for Advanced Renal Cell Carcinoma. **Semin Oncol Nurs**. v. 40, n. 1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.soncn.2023.151545>>. Acesso em: 10 mar. 2025.

PULLEN, R. L. Jr. Renal cell carcinoma, part 1. **Nursing**. v. 51, n. 7, p.34-40, 2021. Disponível em: https://journals.lww.com/nursing/abstract/2021/07000/renal_cell_carcinoma,_part_1.9.aspx. Acesso em: 10 set. 2024.

QIN, Y. et al. "Distribution of pathological types and epidemiological characteristics based on kidney biopsy in Northwest China." **Kidney research and clinical practice**, v. 42, n. 1, p. 63-74, 2023. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9902739/>. Acesso em: 10 set. 2024.

SANTOS, K. B.; CAMPOS, C. S.; PERRONE, A. C. A. S.; VIEIRA, C. A. S.; COELHO, D. P.; HALLAK-NETO, A. E, et al. Nursing documentation for chemotherapy in a university hospital's bone marrow transplant unit: a best practice implementation Project. **Int J Evid Based Healthc**. v. 18, n. 1, p. 75-85, 2020.

AGRADECIMENTOS:

Este trabalho foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).



VALIDAÇÃO DE UMA TECNOLOGIA EDUCACIONAL AUDIOVISUAL EM QUADRINHOS ACERCA DA DOENÇA DE CHAGAS

Ananda Ewelín da Silva Rodrigues¹
Alba Lucia Ribeiro Raithy Pereira²

¹² Universidade do Estado do Pará. Belém, Pará, Brasil

Área temática: Educação em Saúde

RESUMO: O estudo tem por objetivo legitimar uma mídia audiovisual em relação aos conhecimentos da Doença de Chagas. Trata-se de uma validação tecnológica, de caráter metodológico, com abordagem quantitativa e qualitativa. Selecionaram-se 15 juízes, divididos em três categorias (conteúdo, técnicos e design) que avaliaram a HQ com critérios específicos de concordância. Os instrumentos de coleta de dados, foram baseados na Escala de Likert e adaptados para cada grupo, permitindo adicionar comentários e sugestões para validar a relevância e adequação da tecnologia. A HQ animada foi validada com média geral de aprovação de 87,07%, destacando-se em clareza, relevância e adequação cultural para o público infantil da região Norte. Como resultado juízes apontaram 91% de aprovação de conteúdo e 81,25% de aceitação técnica, elogiando o engajamento, clareza de linguagem e representações culturais locais, e os de design validaram com 88,88%, embora sugerindo melhorias na fluidez das animações. A tecnologia mostrou-se eficaz no ensino de saúde, sendo bem avaliada por especialistas pela relevância e acessibilidade. As representações visuais e culturais locais aumentam o interesse infantil e reforçam o potencial educativo na promoção de práticas de saúde nas escolas.

PALAVRAS-CHAVE: doença de chagas, tecnologia educacional,

INTRODUÇÃO

A Doença de Chagas (DC) é uma antropozoonose causada pelo protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi* (*T. cruzi*), cujo vetor é o triatomíneo hematófago, popularmente, conhecido como barbeiro (Silva, *et al.*, 2021). Essa doença é responsável por milhares de casos anualmente, atingindo principalmente as populações em situação de vulnerabilidade social, constituindo assim um sério problema de saúde pública, em especial no Brasil e mais evidente na Região Norte do país (Vargas, *et al.*, 2018).

Acerca da fisiopatologia Fernandes (2018) e Ortiz *et al.* (2018) observam que as manifestações da Doença de Chagas ocorrem de seis a dez dias após a infecção e apresentam em 2 fases: a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda (DCA) é caracterizada por ser a etapa primária, apresentando uma alta parasitemia circulante no sangue, com sinais e sintomas pouco específicos, essa fase raramente é identificada pelos pacientes e notificada pelas instituições de saúde. A fase aguda é bastante crítica, principalmente quando possui a possibilidade de evolução para a fase crônica, caso não obtenha diagnóstico efetivo, o que reduz a quantidade de casos notificados. Já na etapa onde há um desenvolvimento mais lento e tardio da DC, apresentando baixa parasitemia circulante no sangue, destacando-se as febres de alta intensidade, hepatoesplenomegalia, miocardite, adenomegalia, que quando identificadas tardiamente, o paciente evolui para o óbito. (Gomes, Aviz e Monteiro, 2020). De acordo com Simões, *et al.* (2018), está relacionado a perfil sociodemográfico das regiões mais ao norte do Brasil, cujo estudos apontam ter indivíduos de baixa escolaridade, e



diversas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e econômica, logo, tendem a morar em periferias onde ficam expostas a diversos riscos de saúde e de infraestrutura sanitária, o que facilitam a adesão da infecção.

Portanto, por ser uma doença considerada negligenciada no Brasil e que está relacionada principalmente a populações em situações de vulnerabilidade, ausência dos cuidados necessários no manuseio dos alimentos e no quesito de conhecimento da patologia, fazem com que o número de pessoas infectadas seja crescente (SILVA *et al.*, 2021). Ademais, pontua-se a importância da enfermagem no processo de ensino-aprendizagem a respeito da doença, realizando educação em saúde com a população no manejo, acolhimento e cuidado, esclarecendo seus meios de transmissão, sintomas, prevenção e tratamento.

OBJETIVO

Legitimar uma mídia audiovisual em relação aos conhecimentos da Doença de Chagas.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma validação tecnológica, de caráter metodológico, e com uma abordagem quantitativa e qualitativa. O produto foi desenvolvido após o levantamento da literatura e produzido para a promoção de conhecimentos acerca da Doença de Chagas, abordando a etiologia, transmissão, diagnóstico, tratamento, prevenção e suas consequências, contextualizado e abordado através de uma história em quadrinhos, descrita por um narrador. A mídia em quadrinhos será avaliada por juízes de três categorias, denominadas: conteúdo, técnicos e design, sendo, respectivamente, caracterizadas por especialistas no assunto incluindo enfermeiros e biólogos, pesquisadores e docentes, especializados em parasitologia; pedagogos do público-alvo especialistas em TE; e designer digital e produtores gráficos expertise em quadrinhos e/ou em animação e edição.

Participarão do estudo 15 juízes, sendo 7 de conteúdo e 5 técnicos e 3 de design. O número de juízes atendeu as indicações de Pasquali (2010), o qual recomenda de 6 a 20 especialistas, tendo um mínimo de três indivíduos em cada grupo de profissionais, também utilizado em outros estudos com validação de produtos educativos na área da saúde. Ressalta-se que a seleção em numeração ímpar de participantes foi importante para evitar empates nas escolhas e críticas na validação da TE. A validação contará com duas etapas: um de revisão/aprimoramento da animação em quadrinhos e outro da avaliação pelos juízes.

A análise dos dados seguirá o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) adotado por Nascimento *et al.* (2023), com um índice de concordância de 370% para a categoria de conteúdo e 360% para as categorias técnicas e de design, como parâmetro de validade, o qual será calculado pela razão do número de pontuações “3” ou “4” pelo número total de alternativas vezes 100.

Serão aplicados três modelos de instrumento para a coleta de dados, sendo um para cada categoria desenvolvida anteriormente. Ambos os instrumentos já haviam sido usados em outros trabalhos de validação, sendo adaptados para melhor adequação ao trabalho, embasados na Escala de Likert, na qual buscaremos descrever a relevância da tecnologia para a comunidade científica, social e artística.

Para os juízes de conteúdo será utilizado uma adaptação de um instrumento aplicado por Nascimento, *et al.* (2023), composto por três blocos com os questionamentos representados da seguinte forma: I) objetivos; II) estrutura e apresentação; e III) relevância, onde os juízes devem atribuir um valor de 1 a 4 baseado na relevância atribuída para cada



aspecto, podendo ser: 1- Irrelevante, 2- Parcialmente relevante, 3- Relevante e 4- Totalmente relevante, sendo que em casos de pontuação “1” ou “2” os juízes obterão uma área a baixo da pergunta para justificar a atribuição do valor, comentar e dar sugestões (APÊNDICE A)

Para os juízes técnicos e de design o questionário estruturado em cinco blocos de perguntas, quanto a: I) conteúdo; II) linguagem; III) ilustrações gráficas; IV) motivação; e V) adequação, porém com interrogações divergentes. Onde os juízes, também, devem atribuir um valor de 1 a 4 baseado na relevância atribuída para cada aspecto, como demonstrado anteriormente, além de, também, obterem uma área abaixo da pergunta para justificar a atribuição do valor, comentar e dar sugestões

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados serão abordados em dois tópicos: I) Descrição da tecnologia educacional; II) Validação (perfil dos participantes, validação dos juízes por categoria, pontos a melhorar). A presente tecnologia retrata uma história em quadrinhos com 16 páginas ilustrativas, sendo possível animar 14 quadrinhos com auxílio do aplicativo Flipaclip, a tecnologia foi editada em formato de vídeo no aplicativo CapCut, em sequência no formato de livro, o qual narra a vida cotidiana de uma família do interior do Pará, que foi infectada pela Doença de Chagas e que aborda os principais aspectos da doença como sintomas, transmissão e meios de prevenção.

Para avaliar a tecnologia foram selecionados 15 juízes, sendo da categoria de conteúdo 7 enfermeiros, todos possuíam publicações sobre a doença e especialistas em parasitologia; 5 técnicos, sendo 40% pedagogos e 60% com licenciatura plena, todos trabalhando com público-alvo e tendo especialização em tecnologias educativas; e 3 designs com experiência em animações e quadrinhos. Ademais, 100% dos juízes atuam na região norte, exercem suas profissões a mais de 2 anos e referiram nível *lato sensu* com especialização, sendo destes 26,6% doutores, as idades variaram de 28 a 50 anos, e obteve-se uma predominância do sexo feminino, com 53,4% da participação e 46,6% são homens.

Quanto aos juízes de conteúdo, foi possível identificar uma média de aprovação de 87,4% no Índice de Validade de Conteúdo (IVC), superando o critério mínimo estabelecido de 70%. Na análise das três categorias avaliadas, o IVC obteve 82,84% para o objetivo do conteúdo, 85,7% para a estrutura e apresentação, e 87,74% para a relevância, demonstrando alta aceitabilidade dos itens analisados. A maioria dos juízes considerou o conteúdo coerente e adequado ao público-alvo, avaliando positivamente sua estrutura e apresentação como clara e acessível para o contexto em que será aplicado. O aspecto da relevância foi destacado, com 87,74% dos juízes validando o conteúdo como pertinente e significativo, o que indica que o material é capaz de promover discussões significativas e facilitar a compreensão dos tópicos abordados. Em termos gerais, a avaliação pelos juízes de conteúdo reflete que o material atende aos critérios de adequação, acessibilidade e relevância, apontando uma consistência positiva para uso em contextos educacionais.

Quanto aos juízes técnicos pudemos analisar uma média de aprovação 81,25% do IVC, os mesmos expressaram valores de alta aceitabilidade para todos os itens dos cinco blocos mostrando que para a vertente de conteúdo 95% deles julgou adequado ao público coerente com a realidade que permitirá a discussão em diversos grupos vivenciados pela criança e compatível com o âmbito escolar. No que tange a linguagem, 80% dos juízes referiu que a abordagem condiz com a faixa etária e gera proximidade com o assunto, além de ser socialmente acessível para compreensão. A mesma porcentagem anterior foi atribuída pelos juízes no eixo design, indicando que a tecnologia apresenta imagens, didática e animações atrativas, lúdicas e dinâmicas, que aproximam o telespectador e aumenta seu



interesse.

Ainda referente a avaliação pedagógica, a TE foi abordada como motivacional para melhorar os hábitos e serem propagadores de informação, afim de proliferar os cuidados necessários referentes a DC. Por fim, concluiu-se que a tecnologia se encontra adequada, resultado este que se mostra positivo visto que uma maioria significativa pontua pertinente que a tecnologia educacional proposta seja aplicada aos infantes.

Em resumo, o índice de validação geral do projeto ficou com uma média de aprovação final de 88,88% entre os juizes de design. De maneira especifica, na categoria Conteúdo, a validação foi de 88,88%, nos aspectos avaliados, que incluíram o contexto da história, a sequência entre narração e quadrinhos, e a sincronização dos elementos narrativos, gráficos e sonoros. Para o bloco Ilustrações Gráficas, que abrange coloração, dinamismo e coerência das animações, a média geral de aprovação foi de 77.77%. Os juizes sugeriram que as animações poderiam ser mais fluidas, ajudando a manter o público infantil engajado no conteúdo. Sendo este um ponto a ser aprimorado para garantir que não haja interrupções que possam dispersar a atenção das crianças.

Em Linguagem, os aspectos de clareza da narração, nitidez e audibilidade foram analisados, alcançando uma média de aprovação de 100%, destacando a qualidade sonora e de narração, o que facilita a assimilação do conteúdo pelo público infantil. A mesma porcentagem foi aplicada para a categoria Adequação, estando o material apropriado para o público alvo, com representações visuais e sonoras adequadas à faixa etária infantil e com boas referências ao contexto regional, o que pode facilitar a identificação das crianças com o conteúdo. Já na motivação ele foi indicado por 88,88% dos juizes como validado, dado que foi considerada a capacidade do projeto de estimular o interesse tanto das crianças quanto dos educadores.

Em complemento às observações dos juizes e às sugestões de melhorias apontadas, é importante justificar alguns aspectos que foram projetados conforme o contexto e os objetivos específicos do material: A escolha de expressões regionais e referências culturais locais, como o contexto da Amazônia e a experiência da população com a doença de Chagas, foi deliberada para criar uma conexão mais autêntica e representativa da realidade da comunidade. Embora o uso de algumas expressões regionais possa trazer desafios para a compreensão de públicos externos, o objetivo é promover uma identificação imediata entre as crianças da região Norte e o conteúdo. Essa estratégia também valoriza a cultura local e permite que crianças de outras regiões possam expandir seu conhecimento sobre o tema, incentivando a diversidade cultural.

Por fim, o projeto foi validado como relevante a visão geral, com uma porcentagem final de 88,33%, para o contexto educativo e de promoção à saúde, apresentando um bom alinhamento com as necessidades do público infantil e com a temática DC. Embora os juizes tenham apontado a necessidade de aperfeiçoamentos tecnologia, o índice final demonstra que o material atende aos critérios esperados e pode ser utilizado com eficácia no ambiente escolar, além de indicar que o projeto tem alto potencial para atrair e motivar o público infantil e também para encorajar os professores a utilizarem recursos audiovisuais em suas práticas educativas, mas também eduque e respeite a realidade cultural e social do público- alvo, proporcionando uma experiência educacional enriquecedora e significativa para as crianças da região Norte e demais interessados.

CONCLUSÃO

Nesse sentido, tecnologias educacionais desenvolvidas para tratar temas de saúde, como a Doença de Chagas, evidenciam a importância de recursos inovadores no ensino no



processo saúde-doença, além de promover e prevenir endemias. Com o uso de uma HQ animada, o projeto provou ser eficaz e bem recebido tanto pelos avaliadores de conteúdo quanto por especialistas em áreas técnicas e de design. A aprovação média indica que o conteúdo atende aos requisitos de clareza, relevância e acessibilidade, elementos essenciais para a disseminação de informações sobre a doença para o público infantil. A utilização de representações visuais e sonoras, somadas a expressões culturais locais e uma metodologia lúdica, proporcionam um conteúdo dinâmico e envolvente, aumentando o interesse dos jovens e aproximando-os do tema. Portanto, as tecnologias educacionais como essa promovem uma aprendizagem ativa, enriquecendo o conhecimento e incentivando a participação do público-alvo de forma significativa.

Financiamento: FAPESPA e CNPq

REFERÊNCIAS

FERNANDES, Anna Luísa Barbosa *et al.* Incidência e prevalência da doença de chagas no Brasil. **CIPEEX**, v. 2, p. 978-983, 2018. Disponível em: <http://anais.unievangelica.edu.br/index.php/CIPEEX/article/view/2989>. Acesso em: 20 abr. 2024.

ORTIZ, Jessica Vanina *et al.* Cardiac evaluation in the acute phase of Chagas' disease with post-treatment evolution in patients attended in the state of Amazonas, Brazil. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 112, p. 240-246, 2019.

PACHECO, Luciano Vasconcelos. Transmissão oral da doença de Chagas: Uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**. São Paulo, v. 10, n. 2, fev. 2021. DOI: <https://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i2.12636>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12636/11312>. Acesso: 20 abr. 2024.

RODRIGUES FCS, *et al.* Equipe de enfermagem: percepção sobre a doença de Chagas. São Paulo: Rev Recien. 2020; 10(32):367-372

SILVA, Brígida Adriene Muniz *et al.* PERFIL DE TRANSMISSÃO DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL: 2008 A 2020. **Revista Presença**, [S.l.], v. 7, n. 15, p. 22-42, nov. 2021. ISSN 2447-1534.

SILVA, Giovanna Gomes e; DE AVIZ, Gabriele Barros; MONTEIRO, Ronaldo Costa. Perfil epidemiológico da Doença de Chagas aguda no Pará entre 2010 e 2017. **Pará Research Medical Journal**. Belém, v. 4, jan. 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.4322/prmj.2019.029>. Disponível em: <https://www.prmjournall.org/article/doi/10.4322/prmj.2019.029>. Acesso em: 20 abr. 2024.

SIMÕES, Taynãna César *et al.* Chagas disease mortality in Brazil: A Bayesian analysis of age-period-cohort effects and forecasts for two decades. **PLoS neglected tropical diseases**, v. 12, n. 9, p. e0006798, 2018. Disponível em: <https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0006798>. Acesso em: 20 abr. 2024.

VARGAS, Alexander. *et al.* Investigação de surto de doença de Chagas aguda na região Extra-amazônica, **Cad Saude Publica**, Rio Grande do Norte, Brasil, 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00006517>. PMid:29412311. Acesso em: 20 abr. 2024



IMPACTOS DO ESTRESSE NO SISTEMA IMUNOLÓGICO

¹Fernanda Inacio Lima Freitas

¹Isabela Rotta

¹Isabella Lustosa de Sousa

¹Letícia Guerra Tavares

¹Milena Sousa

²Renata Aparecida Elias Dantas

^{1,2}Centro de Ensino Unificado de Brasília. Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo:

O estresse, em suas diferentes manifestações, exerce impactos relevantes sobre o sistema imunológico, afetando células de defesa, a produção de citocinas e o equilíbrio entre respostas inflamatórias e anti-inflamatórias. Este trabalho teve como objetivo investigar e compreender os mecanismos pelos quais diferentes tipos de estresse — agudo, crônico, psicológico e social — influenciam o funcionamento do sistema imune, com base em evidências de estudos em humanos e modelos animais. A metodologia consistiu na análise de dez estudos experimentais e clínicos que abordaram protocolos de indução de estresse, avaliações psicológicas, intervenções terapêuticas como tele-yoga, manejo cognitivo-comportamental e suplementação de probióticos, com avaliação de parâmetros imunológicos por técnicas laboratoriais. Os resultados demonstraram que o estresse psicológico altera a atividade de células natural killer, aumenta a liberação de citocinas inflamatórias e favorece a resposta imunológica pró- inflamatória. Modelos animais indicaram a ativação da microglia e alterações comportamentais associadas ao estresse, enquanto em humanos foram observadas correlações entre estresse familiar e maior risco de doenças autoimunes. Intervenções de enfrentamento mostraram potencial para mitigar os efeitos imunológicos negativos do estresse. Conclui-se que o estresse constitui um importante fator de risco biológico, capaz de comprometer a imunocompetência e favorecer o surgimento de doenças inflamatórias e autoimunes, sendo essencial a promoção de estratégias de manejo de estresse para a preservação da saúde física e mental.

INTRODUÇÃO

O estresse, tanto em sua forma aguda quanto crônica, tem sido amplamente estudado devido às suas repercussões sobre o sistema imunológico (Barrett et al., 2021; Miller et al., 2009). A literatura científica demonstra que as respostas fisiológicas ao estressor, especialmente aquelas mediadas pelo eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) e pelo sistema nervoso simpático, podem afetar significativamente a função imunológica, promovendo alterações celulares, humorais e moleculares. Alterações na liberação de hormônios como o cortisol e a adrenalina interferem em diversos marcadores imunológicos, como citocinas, células natural killer (NK), linfócitos T e B, e níveis de inflamação sistêmica (Miller et al., 2009; Carlsson et al., 2014; Maciel et al., 2015).



Entre os temas investigados, destacam-se: os efeitos do estresse psicossocial agudo e crônico (Miller et al., 2009; Barrett et al., 2021), a resposta imunológica em crianças expostas a estresse familiar (Carlsson et al., 2014), o impacto do estresse acadêmico sobre estudantes universitários (Maciel et al., 2015), bem como os efeitos de intervenções psicossociais e comportamentais, como a terapia cognitivo-comportamental (Walsh et al., 2022), o uso de probióticos (West et al., 2021) e a prática de tele-yoga (Naveen et al., 2024), em populações vulneráveis como pacientes com câncer e profissionais da saúde (Walsh et al., 2022).

Além disso, alguns estudos investigaram os mecanismos neuroimunes envolvidos na resposta ao estresse, como a ativação microglial cerebral em modelos animais, o papel da microbiota intestinal na modulação do comportamento relacionado ao álcool, e a influência da ansiedade sobre a função das células NK em adultos saudáveis (Nie et al., 2018; Becker et al., 2023; Breeze et al., 2024). Esses achados evidenciam não apenas a complexidade das interações entre os sistemas neuroendócrino e imunológico, mas também a necessidade de estratégias personalizadas de enfrentamento ao estresse como forma de preservar a imunocompetência (Walsh et al., 2022; Naveen et al., 2024; West et al., 2021).

Diante disso, este fichamento tem como propósito sistematizar e discutir evidências que associam o estresse a alterações imunológicas, destacando os principais achados, metodologias utilizadas, populações estudadas e implicações clínicas (Becker et al., 2023; Miller et al., 2009; Carlsson et al., 2014; Maciel et al., 2015; Walsh et al., 2022; Naveen et al., 2024; West et al., 2021; Barrett et al., 2021; Breeze et al., 2024; Nie et al., 2018). A compreensão aprofundada desses mecanismos é essencial para o desenvolvimento de intervenções eficazes, capazes de minimizar os efeitos deletérios do estresse sobre a saúde física e mental da população (Barrett et al., 2021; Naveen et al., 2024; Walsh et al., 2022).

OBJETIVO

Investigar e compreender os mecanismos pelos quais diferentes tipos de estresse — agudo, crônico, psicológico e social — impactam o funcionamento do sistema imunológico, analisando alterações celulares, moleculares e funcionais, e discutindo as consequências para a saúde física e mental, com base em evidências de estudos em humanos e modelos animais. (Carlsson et al., 2014);(Maciel et al., 2015);(Barrett et al., 2021); (Nie et al., 2018); (Breeze et al., 2024).

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, utilizando as bases de dados PubMed, ScienceDirect, Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), Scielo e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram usados os seguintes descritores em Ciências da Saúde: "Sistema Imunológico", "Estresse Crônico", "Imunidade", "Estresse", "Sistema Imune". Como critérios de seleção, foram excluídas revisões, teses, cartas ao editor, dissertações e demais artigos que não abordassem o tema central proposto. Inicialmente, foram selecionados 22 artigos na língua portuguesa e na língua inglesa, publicados entre 2009 e 2024. Foi realizada a leitura dos resumos e abstracts, e foram excluídos 12 artigos, restando 10 para a leitura, síntese de dados e construção da revisão. (Ref: Carlsson et al., 2014); (Maciel et al., 2015); (Walsh et al., 2022); (Naveen et al., 2024); (West et al., 2021).



RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estresse tem sido amplamente investigado por seu papel na disfunção imunológica, especialmente em contextos acadêmicos, ocupacionais e clínicos. De acordo com Turner et al. (2020), estudantes universitários saudáveis submetidos ao período de provas apresentaram aumento estatisticamente significativo na proporção de células B ($p = 0,027$), indicando um estado inflamatório induzido pelo estresse psicológico. A amostra de 54 alunos da Universidade de Cambridge foi dividida entre um grupo de intervenção com mindfulness ($n=27$) e um grupo controle ($n=27$), mas mesmo aqueles que praticaram a técnica de atenção plena não apresentaram melhora nos biomarcadores imunes, embora relatassem redução subjetiva do estresse. Isso revela que, embora intervenções psicológicas possam aliviar sintomas emocionais, a resposta fisiológica ao estresse pode persistir de forma autônoma, indicando uma dissociação entre mente e corpo em certos contextos de estresse.

Essa hipótese se fortalece quando observamos o estudo de MacCormack et al. (2021), em que 90 adultos jovens foram expostos ao Trier Social Stress Test (TSST), recebendo previamente propranolol ($n=43$) ou placebo ($n=47$). Os resultados mostraram que o estresse agudo elevou a expressão de genes inflamatórios e antivirais, como IL-6 e TNF, além de modular a distribuição de células imunes. No entanto, nos participantes que tomaram propranolol, houve atenuação dessas respostas, revelando que o sistema nervoso simpático, via sinalização β -adrenérgica, é um eixo crucial na mediação entre estresse e resposta imunológica. A comparação com o estudo anterior sugere que intervenções que atuam diretamente no sistema fisiológico, como o bloqueio adrenérgico, podem ser mais eficazes na modulação da imunidade, enquanto abordagens comportamentais, como o mindfulness, possuem efeitos limitados sobre parâmetros biológicos.

No campo do estresse ocupacional digital, Becker et al. (2023) investigaram 186 adultos jovens em ambientes simulados de multitarefa digital e interrupções tecnológicas. Os resultados indicaram elevação significativa da alfa-amilase salivar (sAA) — marcador do sistema nervoso simpático — durante as tarefas simultâneas, mas não houve alterações relevantes nos níveis de cortisol, imunoglobulina-A ou proteína C-reativa. Esse achado reforça a chamada hipótese da especificidade do estressor (Kemeny, 2003), segundo a qual o tipo e a natureza do estressor (social, cognitivo ou físico) determinam o padrão fisiológico de resposta. Ou seja, estressores cognitivos ou tecnológicos ativam o sistema simpático, mas não necessariamente a resposta imune inflamatória, ao contrário do que ocorre em estressores sociais e interpessoais mais ameaçadores.

Já o estudo de Naveen et al. (2024) explorou uma intervenção integrativa baseada em yoga, aplicada remotamente (tele-yoga) em 90 profissionais da saúde durante a pandemia de COVID-19. O grupo intervenção apresentou redução significativa de IL-6, TNF- α e

cortisol, além de melhora nos índices de burnout e saúde mental. Estes resultados sugerem que práticas como o yoga, que combinam regulação respiratória, atenção plena e movimento físico leve, podem atuar de forma mais sistêmica — afetando não apenas o bem-estar emocional, mas também os eixos hormonais e imunológicos, algo não observado com o mindfulness isoladamente. Comparando-se aos dados de Turner et al. e MacCormack et al., podemos inferir que o potencial terapêutico de intervenções mente-corpo depende da abrangência dos estímulos fisiológicos e da constância da prática, além do tipo de estresse enfrentado.

Sob outra perspectiva, o estudo transcultural de Breeze et al. (2023), com uma amostra robusta de 2.482 participantes da Itália, Índia e Nova Zelândia, demonstrou por meio de análise de regressão e dominância que a ansiedade foi a variável mais fortemente associada à baixa imunidade percebida, superando tanto o estresse quanto a depressão. Este dado é extremamente relevante, pois desafia o modelo clássico de que o estresse é o principal



fator psicossocial a comprometer a imunidade. O achado sugere que a ansiedade — por sua natureza mais persistente, antecipatória e fisiologicamente ativadora — pode ser um agente imunossupressor ainda mais potente, o que reorienta o foco das intervenções futuras.

Por fim, Nie et al. (2018), utilizando um modelo animal de estresse social crônico (R-SDS), demonstraram que a ativação dos receptores TLR2 e TLR4 na microglia do córtex pré-frontal medial foi essencial para o surgimento de comportamentos depressivos, como esquiva social, além da produção de citocinas inflamatórias (IL-1 α e TNF- α). Camundongos geneticamente modificados, deficientes nesses receptores, não desenvolveram tais alterações comportamentais ou neuroinflamatórias, sugerindo que o sistema imune inato cerebral desempenha papel central na transdução de estresse psicológico em sintomas psiquiátricos. Esse modelo biológico corrobora os achados humanos de MacCormack et al., reforçando a existência de um eixo neuroimune sensível ao estresse, com implicações para o tratamento de distúrbios psicossomáticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste estudo, buscou-se compreender como diferentes tipos de estresse — agudo, crônico, social e ocupacional — impactam o funcionamento do sistema imunológico em distintos contextos e populações. Retomando os objetivos propostos, ficou evidente que o estresse pode desencadear respostas imunológicas adversas, seja por meio da supressão de células de defesa, do aumento de citocinas inflamatórias ou da ativação exacerbada de vias neurais e endócrinas, como o eixo HPA. Esses achados reforçam a importância de abordar o estresse não apenas como um fenômeno psicológico, mas como um fator de risco biológico, com implicações significativas para a saúde física e mental. Além disso, observou-se que intervenções como probióticos, tele-yoga e manejo cognitivo-comportamental do estresse podem atenuar os efeitos negativos do estresse sobre o sistema imune, apontando caminhos promissores para ações preventivas e terapêuticas. Portanto, sugere-se que os leitores, especialmente profissionais da saúde e da educação, promovam estratégias de enfrentamento saudáveis e incentivem práticas integrativas e preventivas no cotidiano, a fim de mitigar os efeitos nocivos do estresse e preservar o equilíbrio imunológico. Diante disso, conclui-se que a compreensão da conexão entre mente e imunidade é essencial para o avanço de políticas públicas, intervenções clínicas e práticas educativas mais humanas e eficazes.

Palavras-chave: Efeitos; Estresse; Sistema imunológico, imunidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1) BECKER, L., Kaltenegger, H. C., Nowak, D., Weigl, M., & Rohleder, N. (2023). **Biological stress responses to multitasking and work interruptions: A randomized controlled trial.** *Psychoneuroendocrinology*, 156(106358), 106358.
- 2) MACCORMACK, J. K. et al. **Beta-adrenergic blockade blunts inflammatory and antiviral/antibody gene expression responses to acute psychosocial stress.** *Neuropsychopharmacology: official publication of the American College of Neuropsychopharmacology*, v. 46, n. 4, p. 756–762, 2021.
- 3) CARLSSON, E., Frostell, A., Ludvigsson, J., & Faresjö, M. (2014). **Psychological stress in children may alter the immune response.** *The Journal of Immunology*, 192(5), 2071–2081.
- 4) WALSH E. A. et al. **Effects of a randomized-controlled trial of cognitive**



behavioral stress management: Psychosocial adaptation and immune status in men with early-stage prostate cancer. General hospital psychiatry, v. 79, p. 128–134, 2022.

5) TURNER, L. et al. **Immune dysregulation among students exposed to exam stress and its mitigation by mindfulness training: findings from an exploratory randomised trial.** Scientific reports, v. 10, n. 1, p. 5812, 2020.

6) WEST, N. P. et al. **Probiotics, anticipation stress, and the acute immune response to night shift.** Frontiers in immunology, v. 11, p. 599547, 2020.

7) NAVEEN, K. H. et al. **Effect of tele-yoga on burnout, mental health and immune markers of health care workers on COVID-19 duty: An open-label parallel group pilot randomized controlled trial.** Complementary therapies in medicine, v. 87, n. 103109, p. 103109, 2024.

8) BARRETT, T. J. et al. **Chronic stress primes innate immune responses in mice and humans.** Cell reports, v. 36, n. 10, p. 109595, 2021.

9) NIE X. et al. **The Innate Immune Receptors TLR2/4 Mediate Repeated Social Defeat Stress-Induced Social Avoidance through Prefrontal Microglial Activation.** Neuron, v. 99, p. 464–479, 2018.

10) BREEZE, C. et al. **Unique contributions of anxiety, stress and depression to immunity: A cross-cultural investigation.** Journal of affective disorders reports, v. 15, n. 100699, p. 100699, 2024.



INDUÇÃO DA HEMOGLOBINA FETAL VIA CRISPR-CAS9 EM PACIENTES BETA TALASSÊMICOS COMO ALTERNATIVA TERAPÊUTICA AO TRATAMENTO CONVENCIONAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

¹Laíza Maria Ferreira Souza

²Vanessa Ellen de Moura Luna

³Ednayran da Silva Galdino

⁴Gabriela da Silva Arcanjo

^{1,2,3,4} Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brasil

Área temática: Biotecnologia

Resumo: A β -talassemia é uma das doenças monogênicas mais comuns no mundo, caracterizada por manifestações clínicas graves e potencialmente fatais. Níveis elevados de HbF podem minimizar seu fenótipo mais agressivo. Dessa forma, a busca por novas abordagens terapêuticas que atuem na reativação da γ -globina se tornam relevantes no contexto clínico da doença. Esse estudo teve como objetivo realizar uma revisão integrativa acerca do uso de CRISPR-Cas9 como ferramenta para induzir maiores níveis de HbF em pacientes beta talassêmicos. A busca por trabalhos relacionados foi realizada em dois bancos bibliográficos: ScienceDirect e Pubmed, utilizando os descritores “CRISPR-CAS9”, “*beta thalassemia*” e “*fetal hemoglobin*”. Foram selecionados, por fim, 9 artigos para análise completa, dentre eles sua maioria avaliou edições genéticas atuando na inibição de repressores da γ -globina, como o BCL11A. Ainda, outros trabalhos também avaliaram a edição nos promotores da γ - globina, *HBG1* e *HBG2*, e em alvos pós-transcricionais. Todos os trabalhos mostraram eficiência na indução de HbF em seus respectivos estudos, demonstrando assim, o potencial terapêutico das edições gênicas em pacientes β -talassêmicos. Todavia, a segurança das edições genéticas ainda precisam ser melhor elucidadas.

INTRODUÇÃO

A β -talassemia é caracterizada pela redução ou deleção no gene da β -globina (HBB) que ocasiona um distúrbio no equilíbrio da síntese das cadeias da hemoglobina A, com menor produção de β -globina em relação à α -globina, que em excesso forma precipitados tóxicos (LOCATELLI et al, 2024). Esse processo costuma acarretar em hemólise e na eritropoese ineficaz, que pode levar a um quadro grave de anemia e a desregulação do metabolismo do ferro (LOCATELLI et al, 2024).

Ela é uma doença autossômica recessiva com variáveis níveis de gravidade clínica entre os pacientes. Nos casos considerados mais agravados, são necessárias transfusões sanguíneas regulares, diferente de outros com o curso clínico mais brando, sendo estes normalmente associados a um nível elevado de hemoglobina fetal (HbF) (JIA et al, 2023).

A HbF é composta por duas cadeias de γ -globina, e, normalmente, sua síntese é diminuída após o nascimento (ZHOU et al, 2023). Estudos mostram que a expressão contínua da γ -globina após nascimento em pacientes talassêmicos mantém o equilíbrio das cadeias globinas, prevenindo apoptose dos eritrócitos e a melhorando os sintomas causados



pela hemoglobinopatia (ZHOU et al, 2023) (MOTLAGH et al, 2023).

O transplante de células-tronco hematopoiéticas é a cura para β -talassemia, porém há fatores limitantes, como a quantidade de doadores e os efeitos colaterais, então novas estratégias para reverter ou atenuar o quadro clínico dessa doença são importantes (GRUPTA et al, 2024). As edições gênicas são uma alternativa para tratamento de hemoglobinopatias, como, por exemplo, o sistema de repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente espaçadas (CRISPR) com a proteína 9 (Cas9) associada, que é um método acessível e eficiente (MOTLAGH et al, 2023) (COSENZA et al, 2022). Essa ferramenta é capaz de interromper, adicionar ou até mesmo corrigir diferentes genes de interesse (UREÑÁ-BAILÉN et 2023).

Assim, utilizar a CRISPR-Cas9 para potencializar a regulação positiva da HbF é uma importante estratégia terapêutica para o tratamento da β -talassemia, seja por meio de reativação ou supressão de diferentes genes.

OBJETIVO

Esta revisão tem como objetivo realizar uma análise integrativa de artigos científicos sobre o potencial do uso CRISPR-Cas9 como uma ferramenta alternativa para o tratamento da β -talassemia, visando aumentar os níveis de hemoglobina fetal nos pacientes com essa hemoglobinopatia.

METODOLOGIA

A busca por artigos relacionados ao tema foi realizada no primeiro semestre de 2025 a partir de duas bases de dados bibliográficos on-line: Pubmed e ScienceDirect. Utilizou-se o idioma inglês na pesquisa das palavras-chave “*CRISPR-CAS9*”, “*beta thalassemia*” e “*fetal hemoglobin*”, e ainda, foram ativados filtros de tempo, que incluíram trabalhos publicados entre 2021 e 2025. Foi utilizado o operador booleano “AND” para auxiliar na busca. Durante a seleção de artigos para avaliação crítica, foram aplicados os seguintes critérios de inclusão: (1) artigos escritos na língua inglesa e (2) artigos experimentais. Ademais, nessa etapa, foram considerados como parâmetros de exclusão (1) trabalhos de conclusão de curso, (2) artigos de revisão, (3) dissertações de mestrado e (4) teses de doutorado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise bibliográfica de artigos do período de 2021 a 2025 resultou em 58 artigos no banco de dados PubMed e 98 no Science Direct. Destes, foram selecionados 18 artigos para a leitura, dos quais 9 se encaixam em todos os critérios adotados para esse trabalho.

A β -talassemia é uma das doenças monogênicas mais prevalente na população mundial, desse modo, estudos com tratamentos alternativos eficazes são necessários (JIA et al, 2023). Assim, terapias celulares utilizando CRISPR/Cas9

com objetivo de melhorar o prognóstico de pacientes com β -talassemia são essenciais.

Nesse sentido, diferentes estudos utilizam essa ferramenta de edição genética para inibir a ação do gene 11A do linfoma/leucemia de células B (*BCL11A*), que atua silenciando a expressão da γ -globina e, conseqüentemente, diminuindo o nível de HbF, hemoglobina que em quantidades mais altas é indicadora de casos clínicos mais brandos da doença (MA



et al, 2022; JIA et al. 2023).

UREÑA-BAILÉN et al, 2023 e LOCATELLI et al, 2024 realizaram a edição pelo sistema CRISPR-Cas9 em células-tronco hematopoiéticas (HSPCs), utilizando a metodologia de eletroporação (pulsção elétrica) e *exagamglogene autotemcel* (exa-cel), respectivamente. Ambas com função de desativar o potencializador eritroide de *BCL11A* em HSCs e nos dois estudos, houve o aumento da HbF com distribuição pancelular nos indivíduos.

Em LOCATELLI et al, 2024, posteriormente, os pacientes receberam a infusão, após mieloablação, das células modificadas e foi observado a presença de independência transfusional em 91% dos pacientes durante o período de acompanhamento. Tendo estes aumento de hemoglobina total e fetal maiores em comparação aos que continuam necessitando de transfusão. Além disso, visualizou-se que em todos os pacientes houve algum evento adverso após infusão, mas apesar de revertidos posteriormente, a ocorrência desses eventos ainda torna questionável a segurança dessa edição.

A associação de dois mecanismos reguladores de HbF são adotados por SAMUELSON et al, 2021, utilizando dois RNAs guias únicos (sgRNA), um para interrupção da ligação do *BCL11A* dentro das regiões promotoras do gene da gama globulina, *HBG1* e *HBG2* (*HBG-113*), e o segundo atua atingindo o locus *BCL11A-ee* (intensificador eritroide *BCL11A*). Em seu artigo, HAN et al, 2022, também usa essa metodologia multiplex, com dois focos, sendo o primeiro no *BCL11A-ee* e o outro ao motivo TGGACCA do promotor da γ -globina, local em que o *BCL11A* se liga.

Nos estudos multiplex, foi demonstrado que quando os dois fatores eram associados os níveis da hemoglobina fetal apresentaram-se mais elevados do que nos casos da utilização dos mecanismos isolados. Além disso, foi observada uma melhora na diferenciação eritroide e redução dos sinais de ineficácia eritropoiéticas, assim, potencializando a aplicabilidade da edição genética. Em SAMUELSON et al, 2021, as modificações nos genes realizadas ocasionaram translocações cromossômicas entre *loci*, tornando questionável a segurança dessas edições duplas.

Em MA et al, 2022, há utilização do DNA minicírculo para administração do sistema CRISPR em células HSPCs, e ele se diferencia pela utilização da bactéria *Staphylococcus aureus* Cas9 (SaCas9), pois é tida como uma ferramenta eficaz de edição do genoma em células humanas. O sgRNA foi direcionado ao *BCL11A-ee*, e por meio de cromatografia líquida de alta eficiência observou-se que os níveis de HbF eram maiores nas células que foram modificadas pela ferramenta de edição.

Apesar do foco maior de estudos com CRISPR-Cas9 em β -talassemia serem o silenciamento do gene *BCL11A*, outras alternativas para o aumento da quantidade de hemoglobina fetal também são adotadas.

A γ -globina possui dois promotores, *HBG1* e *HBG2*, desse modo, BAO et al, 2025 utilizou a edição genética para a inserção do nucleotídeo A (insA) no promotor distal, *HBG2*, em eritroblastos humanos adultos (*HUDEP-2*). Por promover a desmetilação específica de um sítio, tal alteração facilita modificações nas histonas e ativação da RNA polimerase II. Isso ocasionou o aumento da expressão da γ -globina e inibição dos repressores dessa cadeia, *BCL11A* e *ZBTB7A* (*Leukemia/lymphoma-related factor*).

Em abordagens pós-transcricionais, JIA et al, 2023 realiza o silenciamento por meio da CRISPR-Cas9 através do RNA não codificante longo (lncRNA) NR_120526, que tem capacidade de regular a expressão de genes alvos por modificação e remodelação da cromatina. Como resultado, houve aumento na atividade gênica da proteína ribossomal S6 quinase B1 (*S6K*), *RhoA*, *HBG1* e *HBG2*, sem mudança nos níveis de RNA mensageiro



(mRNA). Assim, a via S6K-RhoA foi identificada como mediadora da inibição da HbF por esse lncRNA, sendo o bloqueio uma estratégia terapêutica inovadora.

Ainda nesse viés, WAKABAYASHI et al, 2022, realizou modificações no mRNA por proteínas ligação ao RNA (RBPs) em HUDEP-2 com a CRISPR-Cas9 clivando-o em domínios RRM e RNA metiltransferase, 4 RBPs se demonstraram como potenciais repressoras de HbF, sendo considerada principal a RBM12, pois após o silenciamento dela houve aumento da expressão dessa hemoglobina sem comprometimento da maturação celular.

CONCLUSÃO

Durante a revisão integrativa foi possível observar diferentes metodologias que visavam aumentar o nível de hemoglobina fetal em pacientes com β -talassemia por meio de edição genética utilizando a ferramenta de CRISPR-Cas9.

Todos os artigos apresentados nesta revisão tiveram resultados positivos em relação à elevação da síntese de HbF, utilizando mecanismos pós-transcricionais, repressão de *BCL11A* e *ZBTB7A* e regulação positiva das regiões promotoras do gene da γ - globina. Isso demonstra o potencial terapêutico que a alteração genética possui como tratamento alternativo em β -talassêmicos, diminuindo a dependência transfusional e melhorando o prognóstico desses indivíduos.

No entanto, apesar da maioria não comprometer a maturação celular, a segurança dessas edições, principalmente multiplex, não é totalmente comprovada, assim, mais ensaios clínicos em pacientes ainda são necessários.

Palavras-chave: BCL11A; Beta-talassemia; Hemoglobinopatia; HBB; HGB.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAO, X. et al. A one-base therapeutic insertion in the HBG2 distal promoter reactivates γ -globin expression. **Experimental Hematology & Oncology**, v. 14, n. 1, 28 mar. 2025.

COSENZA, L. C. et al. Co-Treatment of Erythroid Cells from β -Thalassemia Patients with CRISPR-Cas9-Based β 039-Globin Gene Editing and Induction of Fetal Hemoglobin. **Genes**, v. 13, n. 10, p. 1727, 26 set. 2022.

FATEMEH MOVAHEDI MOTLAGH et al. CRISPR/Cas9 Ablated BCL11A Unveils the Genes with Possible Role of Globin Switching. **Advanced Pharmaceutical Bulletin**, v. 13, n. 4, p. 799–805, 21 fev. 2023.

GUPTA, P. et al. Development of pathophysiologically relevant models of sickle cell disease and β -thalassemia for therapeutic studies. **Nature Communications**, v. 15, n. 1, p. 1794, 27 fev. 2024.

HAN, Y. et al. CRISPR/Cas9-based multiplex genome editing of BCL11A and HBG efficiently induces fetal hemoglobin expression. **European Journal of Pharmacology**, v. 918, p. 174788, mar. 2022.

JIA, W. et al. Negative regulation of HBG1/2 expression through S6K by long



noncoding RNA NR_120526. **Translational Pediatrics**, v. 12, n. 5, p. 907–917, 1 maio 2023.

LOCATELLI, F. et al. Exagamglogene Autotemcel for Transfusion-Dependent β -Thalassemia. **New England Journal of Medicine/The New England Journal of Medicine**, v. 390, n. 18, 24 abr. 2024.

MA, S.-P. et al. Reactivation of γ -globin expression using a minicircle DNA system to treat β -thalassemia. **Gene**, v. 820, p. 146289, 30 abr. 2022.

SAMUELSON, C. et al. Multiplex CRISPR/Cas9 genome editing in hematopoietic stem cells for fetal hemoglobin reinduction generates chromosomal translocations. **Molecular Therapy - Methods & Clinical Development**, out. 2021.

WAKABAYASHI, A. et al. Identification and characterization of RBM12 as a novel regulator of fetal hemoglobin expression. **Blood Advances**, v. 6, n. 23, p. 5956–5968, 13 dez. 2022.

ZHOU, G.; LU, D. Proteomics screening uncovers HMGA1 as a promising negative regulator for γ -globin expression in response to decreased β -globin levels. **Journal of Proteomics**, v. 286, p. 104957, 7 jul. 2023.



ATUALIZAÇÃO SOBRE A ESPOROTRICOSE FELINA NO BRASIL: DESAFIOS E A IMPORTÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA

¹Bianca Calixtro Silva

²Brenda Aiello Macfadem

³Rafaella Victoria Ribeiro Soares Leite

⁴Guilherme Santana de Souza

⁵Letícia Gabriele da Silva

⁶Beatriz da Silva Tavares

⁷Beatriz Valentim Carmona

⁸Elisabeth Criscuolo Urbinati

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Jaboticabal, São Paulo, Brasil.

Área temática: Saúde Coletiva

Resumo: A esporotricose é uma zoonose que vem ganhando importância devido à expansão global das áreas de ocorrência, à descrição de novas espécies patogênicas e às mudanças na epidemiologia da doença. Até recentemente, a notificação dos casos confirmados não era obrigatória, o que dificultava o conhecimento da verdadeira carga da doença e a implementação de estratégias de prevenção e controle, incluindo a conscientização de profissionais e da população, em geral. No entanto, com a publicação do Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS nº 6.734, em 18 de março de 2025, que obriga a notificação de casos de esporotricose humana em todos os serviços de saúde do país, garantindo um melhor controle da doença e ações de saúde pública. Com essa medida, o Ministério da Saúde fortalece a vigilância epidemiológica, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz às necessidades da população. Esta revisão atualiza o conhecimento sobre a esporotricose humana no Brasil e reforça que a implementação da notificação obrigatória de casos da doença deverá contribuir para ações coordenadas entre autoridades, agências de saúde e a sociedade para conter a expansão da doença.

INTRODUÇÃO

A esporotricose é uma micose zoonótica causada por fungos do gênero *Sporothrix*, com larga distribuição geográfica, sendo prevalente em regiões tropicais e subtropicais. A transmissão se dá por inoculação traumática dos propágulos do fungo por meio de ferimentos na pele em contato com solo ou material orgânico contaminado, ou ainda por lesões causadas por animais infectados. A esporotricose pode afetar vários animais, mas os gatos são os mais afetados e podem transmitir a doença para os seres humanos (RODRIGUES et al., 2016). A doença se manifesta principalmente como uma micose subcutânea nodular, que pode evoluir para úlceras gomosas, afetando a pele, subcutâneo, sistema linfático, fâscias musculares, cartilagem e ossos (CHAKRABARTI et al., 2015). As formas linfocutânea e cutânea fixa são as mais comuns, mas manifestações atípicas, como formas sistêmicas que envolvem ossos, pulmões e sistema nervoso central, também foram descritas (ZANCOPE-OLIVEIRA et al., 2015; OROFINO-COSTA et al., 2017). O gênero *Sporothrix* é composto por patógenos termodimórficos (RODRIGUES et al., 2016), com *Sporothrix schenckii* sendo a primeira espécie descrita (SCHENCK, 1898). No entanto, técnicas moleculares



revelaram que *S. schenckii* é, na verdade, um complexo de espécies, incluindo *S. brasiliensis*, *S. globosa* e *S. mexicana* (MARIMON et al., 2007), sendo *S. brasiliensis* associado a manifestações mais graves e atípicas da doença (ALMEIDA-PAES et al., 2014).

Embora o Brasil tenha registrado, globalmente, o maior número de casos diagnosticados de esporotricose em gatos e humanos (SANTOS et al., 2024), a real gravidade da ocorrência da doença é provavelmente subestimada, visto que, até 2024, a notificação dos casos diagnosticados não era obrigatória.

OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo analisar a situação atual da esporotricose como zoonose no Brasil, sua ocorrência e consequências, enfatizando a necessidade de os profissionais colocarem em prática a notificação obrigatória de casos.

METODOLOGIA

Os dados apresentados foram obtidos por meio de uma revisão bibliográfica conduzida pelo Grupo PET Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP, campus de Jaboticabal, SP. A revisão foi realizada com base em consultas a diversas bases de dados, como PubMed (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>), SciELO (<https://www.scielo.org/>), Google Scholar (<https://scholar.google.com/>), ScienceDirect (<https://www.sciencedirect.com/>), Web of Science (<https://www.webofscience.com/>), Scopus (<https://www.scopus.com/>), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) (<https://lilacs.bvsalud.org/>), além de consulta a dados disponíveis na Organização Mundial da Saúde Animal (WOAH/OIE) (<https://www.woah.org/>), Ministério da Saúde do Brasil e Secretarias Estaduais de Saúde. As palavras-chave utilizadas incluíram esporotricose felina, esporotricose em gatos, *Sporothrix schenckii* x gatos, *Sporothrix brasiliensis* x gatos, zoonose fúngica felina, infecção fúngica em gatos, micose subcutânea felina, e suas respectivas versões em inglês e espanhol.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No Brasil, a esporotricose tem se expandido geograficamente, com maior incidência em áreas com desafios sociais e econômicos, como baixa renda e condições inadequadas de saneamento (GREMIÃO et al., 2020; ALZUGUIR et al., 2020). A prevalência é particularmente alta entre mulheres, possivelmente devido à sua maior exposição ao cuidado de animais (ALVAREZ et al., 2022). SANTOS et al. (2024) abordam o início e a propagação da epidemia no Brasil, especialmente pela presença do *S. brasiliensis*, sugerindo que a crise atual resulta de eventos de emergência independentes, com a transmissão ocorrendo tanto entre animais quanto de animais para humanos, em diversos estados. Pesquisas moleculares indicam que o *S. brasiliensis* emergiu de forma independente em pelo menos sete regiões do Brasil, incluindo Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo (Spruijtenburg et al., 2023).



Conforme o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (Brasil, 2023a), em 2022, 56,8% das 287 Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ) realizaram atividades relacionadas à esporotricose. Ao serem questionados sobre as principais doenças notificadas, 40,7% dos coordenadores mencionaram a esporotricose, superando a leishmaniose visceral (13,9%). Esses dados destacam a importância das UVZ na documentação e monitoramento

de doenças zoonóticas, essenciais para a formulação de políticas públicas e tomada de decisões em saúde.

Com a promulgação da Lei nº 14.384 em 2025, a notificação de casos de esporotricose passou a ser obrigatória em todo o país, estabelecendo um marco legal para o monitoramento da doença. O estado do Rio de Janeiro foi pioneiro na implementação da notificação obrigatória em 2013 (Resolução SES nº 674/13), seguido por outros estados como Paraíba (Resolução CIB/SES/PB nº 80/18, de 7 de agosto de 2018), Mato Grosso do Sul (Resolução nº 88/CIB/SES, de 28 de outubro de 2020), Amazonas (Lei Ordinária nº 5.411, de 25 de fevereiro de 2021), Paraná (Resolução SESA nº 93/2022), Pernambuco (Projeto de Lei Ordinária 872/2023), Bahia (Portaria Estadual nº 274, de 7 de março de 2023) e Rio Grande do Norte (Projeto de Lei nº 95/2024), com a implementação mais recente ocorrendo no Rio Grande do Sul em 2024 (Nota Técnica nº 3/2024). Além disso, algumas cidades, como Guarulhos, São Paulo e Belo Horizonte, também adotaram a notificação obrigatória. Em Salvador, essa exigência já estava em vigor desde 2018. A falta de uma cobertura uniforme dificultava a efetividade no controle da esporotricose no Brasil, mas a nova legislação promete um monitoramento mais eficiente e abrangente.

Desde a identificação da esporotricose, houve avanços significativos, incluindo maior visibilidade da doença na comunidade médica, ampliação da pesquisa e aumento do envolvimento das autoridades e agências de financiamento (ALMEIDA-PAES et al., 2024). No entanto, ainda existem desafios no controle da doença, que requerem ações coordenadas entre o governo, o setor de saúde e a população, adotando uma abordagem "One Health" (SCHECHTMAN et al., 2022; RABELLO et al., 2022). Medidas essenciais incluem o desenvolvimento de testes diagnósticos rápidos, novos antifúngicos e o tratamento de manifestações extracutâneas (ALMEIDA-PAES et al., 2024). O atraso no diagnóstico e no início do tratamento pode resultar em infecções secundárias e sequelas graves (SCHECHTMAN et al., 2022).

No que tange aos felinos, é fundamental implementar cuidados adequados, como a castração e tratamento precoce, para reduzir a transmissão entre animais e de animais para humanos. Além disso, iniciativas educativas que incentivem a posse responsável e o uso de equipamentos de proteção podem contribuir para a prevenção da transmissão zoonótica. Um desafio adicional é o destino dos gatos infectados, muitos dos quais são abandonados ou morrem sem tratamento adequado (ALMEIDA-PAES et al., 2024). Portanto, considerar a esporotricose como uma doença negligenciada poderia aumentar sua visibilidade e direcionar mais recursos para pesquisas, auxiliando no desenvolvimento de estratégias de controle mais eficazes.

CONCLUSÃO

Concluindo, a esporotricose tem se expandido rapidamente no Brasil, representando uma crescente preocupação para a saúde pública e a comunidade científica. Apesar dos avanços, como o aumento da visibilidade da doença, ainda existem desafios no controle, especialmente quanto à uniformidade da notificação e manejo dos animais infectados. A



implementação da notificação obrigatória em todo o país, conforme a Portaria GM/MS nº 6.734, é fundamental para melhorar o monitoramento e o controle da doença e fortalecer a colaboração entre Órgãos Governamentais, Órgãos de Pesquisa, profissionais de saúde e a população, com destaque para a conscientização sobre a posse responsável de animais. Incluir a esporotricose na lista de doenças negligenciadas aumentará sua visibilidade e direcionará mais atenção das autoridades responsáveis e demais envolvidos para o desenvolvimento de estratégias de controle mais eficazes da esporotricose humana.

Palavras-chave: felinos; *Sporothrix*; fungos patogênicos; zoonoses

Financiamento: Secretaria de Educação Superior (SESU) e Ministério da Educação (MEC).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA-PAES, R. et al. Sporotrichosis in Rio de Janeiro, Brazil: *Sporothrix brasiliensis* is associated with atypical clinical presentations. **PLoS Neglected Tropical Diseases**, v. 8, n. 9, e3094, 2014. DOI: 10.1371/journal.pntd.0003094.

ALMEIDA-PAES, R. *et al.* The present and future research agenda of sporotrichosis on the silver anniversary of zoonotic sporotrichosis in Rio de Janeiro, Brazil. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, Rio de Janeiro, v.119, e230208, 2024.

ALVAREZ, C. M.; OLIVEIRA, M. M. E.; PIRES, R. H. Sporotrichosis: A review of a neglected disease in the last 50 years in Brazil. **Microorganisms**, v. 10, p. 2152, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/microorganisms10112152>. Acesso em: 22 mai. 2025.

ALZUGUIR, C. L. C. et al. Geo-epidemiology and socioeconomic aspects of human sporotrichosis in the municipality of Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brazil, between 2007 and 2016. **Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 114, n. 2, p. 99–106, fev. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/trstmh/trz081>. Acesso em: 22 mai. 2025.

BRASIL. (2023a) Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Estrutura e atividades das Unidades de Vigilância de Zoonoses no Brasil: **Boletim Epidemiológico**, Brasil, v.54, n.4, Mar. 2023a. ISSN 9352-7864

CHAKRABARTI, A. et al. Global epidemiology of sporotrichosis. **Medical Mycology**, v. 53, n. 1, p. 3–14, jan. 2015. DOI: 10.1093/mmy/myu062.

GREMIÃO, I. D. F. et al. Geographic expansion of sporotrichosis, Brazil. **Emerging Infectious Diseases**, v. 26, n. 3, p. 621–624, 2020. DOI: 10.3201/eid2603.190803.

MARIMON, R. et al. *Sporothrix brasiliensis*, *S. globosa*, and *S. mexicana*, three new *Sporothrix* species of clinical interest. **Journal of Clinical Microbiology**, v. 45, n. 10, p. 3198–3206, out. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1128/JCM.00808-07>. Acesso em: 22 mai. 2025.



- OROFINO-COSTA, R. C. et al. Sporotrichosis: An update on epidemiology, etiopathogenesis, laboratory and clinical therapeutics. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 92, n. 5, p. 606–620, set.-out. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/abd1806-4841.2017279>. Acesso em: 22 mai. 2025.
- RABELLO, V. B. S. et al. The historical burden of sporotrichosis in Brazil: A systematic review of cases reported from 1907 to 2020. **Brazilian Journal of Microbiology**, v. 53, n. 1, p. 231–244, mar. 2022. DOI: 10.1007/s42770-021-00658-1.
- RODRIGUES, A. M.; HOOG, G. S.; CAMARGO, Z. P. Sporothrix species causing outbreaks in animals and humans driven by animal–animal transmission. **PLoS Pathogen**, v. 12, n. 7, e1005638, jul. 2016. DOI: 10.1371/journal.ppat.1005638.
- SCHECHTMAN, R. C. et al. Sporotrichosis: Hyperendemic by zoonotic transmission, with atypical presentations, hypersensitivity reactions and greater severity. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 97, n. 1, p. 1-13, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.abd.2021.07.003>. Acesso em: 22 mai. 2025.
- SANTOS, A. R. et al. Emergence of zoonotic sporotrichosis in Brazil: A genomic epidemiology study. **Lancet Microbe**, v. 5, n. 3, e282–90, mar. 2024. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S2666-5247\(23\)00364-6](https://doi.org/10.1016/S2666-5247(23)00364-6). Acesso em: 22 mai. 2025.
- SPRUIJTENBURG, B. et al. Sporothrix brasiliensis genotyping reveals numerous independent zoonotic introductions in Brazil. **Journal of Infection**, v. 86, n. 6, p. 610-613, jun. 2023.
- ZANCOPE-OLIVEIRA, R. M. et al. Diagnosis of sporotrichosis: Current status and perspectives. In: ZEPPONE CARLOS, I. (Ed.). **Sporotrichosis**. Springer, Cham, 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-319-11912-0_8. Acesso em: 22 mai. 2025.



SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL E EIXO INTESTINO-CÉREBRO: NOVAS PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS

¹Julia Macedo Cavalcante do Amaral

²Rebeca Martino de Assis Pereira e Silva

³Marcos Pereira Machado

⁴Gabriela Teles Estolano

⁵Hartur Fontes Assis de Sousa

⁶Ana Luiza Martins Prudente

⁷Julia Macedo Cavalcante do Amaral

¹Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ^{2,3,4,5,6,7,8} Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: A síndrome do intestino irritável (SII) é um distúrbio gastrointestinal funcional caracterizado por dor abdominal crônica associada a alterações no hábito intestinal, na ausência de lesão orgânica demonstrável. Estudos recentes têm destacado a importância do eixo intestino-cérebro na fisiopatologia da SII, envolvendo interações complexas entre microbiota intestinal, sistema imunoneuroendócrino e fatores psicossociais. Este artigo revisa as principais evidências científicas sobre intervenções terapêuticas que modulam esse eixo, incluindo o uso de probióticos, psicoterapias direcionadas e agentes farmacológicos neuromoduladores. Também são discutidas as limitações metodológicas dos estudos atuais e as perspectivas futuras para um manejo mais personalizado e integrativo da SII.

INTRODUÇÃO

A síndrome do intestino irritável (SII) é um distúrbio gastrointestinal funcional de alta prevalência, caracterizado por dor abdominal crônica associada a alterações no hábito intestinal, como diarreia, constipação ou ambos, na ausência de anormalidades estruturais ou bioquímicas detectáveis (PURSELL et al., 2023). Embora não cause danos orgânicos permanentes, a SII pode impactar significativamente a qualidade de vida dos pacientes, sendo uma das principais causas de procura por atendimento médico em gastroenterologia (ALGERA et al., 2023). Tradicionalmente, seu diagnóstico baseia-se em critérios clínicos, como os critérios de Roma, e o tratamento foca no alívio dos sintomas (RAO et al., 2020).

No entanto, nas últimas décadas, uma nova compreensão da fisiopatologia da SII tem ganhado destaque, centrando-se no papel do eixo intestino-cérebro — uma complexa rede de comunicação bidirecional entre o sistema nervoso central e o trato gastrointestinal (MARTIN; MAYER, 2017). Esse eixo integra vias neurais, imunológicas, hormonais e metabólicas que regulam funções digestivas, emocionais e cognitivas (CHUN et al., 2018; XING et al., 2025). Disfunções nesse sistema estão associadas a alterações na motilidade intestinal, hipersensibilidade visceral, inflamação de baixo grau, alterações na permeabilidade intestinal e desequilíbrios na microbiota intestinal (LIAO et al., 2024; LIU, H. R. et al., 2015; GAO et al., 2023; XIAO et al., 2021). Além disso, fatores psicossociais como estresse, ansiedade e depressão podem exacerbar os sintomas, reforçando o caráter multifatorial da SII (ZENG et al., 2023; LIU, S. B. et al., 2015).

Com base nessa perspectiva integrativa, surgem novas abordagens terapêuticas que vão além do controle sintomático tradicional. Estratégias como a modulação da microbiota



intestinal por meio de probióticos, prebióticos ou transplante de microbiota fecal, terapias psicossociais como a terapia cognitivo-comportamental e intervenções que visam modular o eixo neurogastrointestinal têm mostrado resultados promissores (ALGERA et al., 2023; CHUN et al., 2018; RAO et al., 2020). Assim, o manejo da SII caminha para uma abordagem mais personalizada e multidisciplinar, considerando a interação dinâmica entre corpo e mente (MARTIN; MAYER, 2017).

OBJETIVO

Analisar criticamente as evidências científicas atuais sobre intervenções terapêuticas que atuam no eixo intestino-cérebro no manejo da Síndrome do Intestino Irritável (SII), destacando os efeitos clínicos da modulação da microbiota intestinal, das intervenções psicoterapêuticas e dos agentes neuromoduladores, bem como discutir suas limitações metodológicas e implicações para a prática clínica baseada em uma abordagem integrativa e personalizada.

METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma revisão narrativa da literatura científica disponível nas bases PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando descritores como “gut-brain axis”, “irritable bowel syndrome”, “probiotics”, “psychotherapy” e “neuromodulation”. Foram selecionados artigos originais, ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e metanálises publicados entre 2015 e 2025, com ênfase nos estudos mais recentes. Os critérios de inclusão consideraram publicações em inglês e português, com foco em intervenções terapêuticas que atuam na modulação do eixo intestino-cérebro em pacientes com SII. Excluíram-se estudos com amostras exclusivamente pediátricas ou com foco exclusivo em outras doenças gastrointestinais funcionais. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e interpretativa, integrando os achados relevantes com base nos objetivos da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ensaio clínico recente tem avaliado intervenções voltadas ao eixo intestino-cérebro em pacientes com Síndrome do Intestino Irritável (SII), com destaque para abordagens microbiológicas e psicológicas. Em um estudo duplo-cego, adultos com SII e depressão subclínica tratados com leite fermentado contendo cepas de *Lactobacillus acidophilus* e *L. paracasei* apresentaram redução significativa nos escores de depressão, melhora na qualidade de vida e elevação dos níveis séricos de serotonina ($p < 0,05$), em comparação ao grupo placebo. Houve melhora relevante na severidade global da SII em todos os grupos após 12 semanas; contudo, somente o grupo que recebeu o probiótico demonstrou alterações favoráveis nos biomarcadores hormonais (CHUN et al., 2018).

Em contraste, outro ensaio clínico controlado com mulheres com SII predominantemente diarreica documentou melhora dos sintomas em ambos os grupos (probiótico versus placebo), sem diferença estatisticamente significativa entre eles e sem redução diferencial nos marcadores inflamatórios, como proteína C-reativa ultrasensível (hs-CRP) e calprotectina fecal (JOOST ALGERA et al., 2023). De modo geral, meta-análises recentes sugerem que os probióticos são eficazes e seguros para o alívio dos sintomas da SII,



promovendo redução significativa nos escores de sintomas globais, com perfil de efeitos adversos comparável ao placebo (JOOST ALGERA et al., 2023; RAO et al., 2020). Assim, as terapias moduladoras da microbiota podem proporcionar benefícios clínicos, como alívio da dor abdominal e melhora na frequência e consistência das evacuações, além de ganhos

em qualidade de vida, embora haja variabilidade entre as cepas utilizadas, doses administradas e duração dos tratamentos (JOOST ALGERA et al., 2023; MARTIN; MAYER, 2017).

Além dos moduladores microbianos, intervenções psicológicas específicas demonstram eficácia significativa. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) e a hipnoterapia dirigida ao intestino mostraram-se eficazes na redução da frequência e intensidade das crises de dor abdominal, bem como de outros sintomas da SII (GAO et al., 2023; XING et al., 2025). Essas intervenções também reduziram níveis de ansiedade, depressão e estresse, melhorando a adesão às modificações dietéticas e promovendo ganhos adicionais em qualidade de vida (LIAO et al., 2024; ZENG et al., 2023). Técnicas de mindfulness e relaxamento apresentaram resultados semelhantes em ensaios controlados, reduzindo a carga sintomática total (GAO et al., 2023). No contexto farmacológico, antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos da recaptação de serotonina mostraram benefício moderado, com uma metanálise apontando risco relativo de 0,66 (IC95% 0,57–0,76) de persistência dos sintomas em comparação ao placebo, sem diferença significativa entre as classes (JOOST ALGERA et al., 2023). Em síntese, tanto as psicoterapias quanto os neuromoduladores do sistema nervoso central têm sido associados a maiores taxas de resposta global, com modalidades como TCC, hipnose, relaxamento e terapia multimodal demonstrando eficácia em múltiplos ensaios clínicos (ZENG et al., 2023; XIAO et al., 2021).

Os achados clínicos reforçam o papel central do eixo intestino-cérebro na fisiopatologia da SII. A eficácia de probióticos e psicobióticos sustenta a hipótese de que a modulação da microbiota intestinal influencia vias neuroimunes e neurotransmissoras, como o aumento da serotonina entérica, responsável pela regulação da motilidade intestinal e da percepção dolorosa (MARTIN; MAYER, 2017; CHUN et al., 2018). Tal evidência apoia a teoria de que metabólitos microbianos (ex.: ácidos graxos de cadeia curta) e citocinas intestinais podem modificar a permeabilidade intestinal e a sinalização do sistema nervoso entérico, promovendo sensibilização visceral (JOOST ALGERA et al., 2023; LIU, S. B. et al., 2015).

Paralelamente, a eficácia de intervenções psíquicas como a TCC, hipnose e mindfulness evidencia a importância da modulação central da dor e do estresse. Essas terapias atuam na diminuição da ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e na reorganização das redes neurais responsáveis pelo processamento da dor, atenuando a hipersensibilidade visceral característica da SII (LIU, H. R. et al., 2015; GAO et al., 2023; LIAO et al., 2024; XING et al., 2025). Por sua vez, terapias convencionais, como dietas restritivas (ex.: dieta pobre em FODMAPs) e antiespasmódicos, apresentam eficácia sintomática, mas não atuam diretamente sobre os desequilíbrios neuroimunes subjacentes (JOOST ALGERA et al., 2023).

As abordagens inovadoras, como os psicobióticos, neuromoduladores e terapias digitais, visam tratar os fatores psicossociais da SII, promovendo melhorias na regulação emocional e na resiliência ao estresse. Isso justifica os benefícios observados não apenas nos sintomas gastrointestinais, mas também nos parâmetros psicológicos associados à síndrome (PURSELL et al., 2023; ZENG et al., 2023).

Entretanto, há importantes limitações nos estudos disponíveis. A heterogeneidade nos desenhos metodológicos, tipos de intervenção e desfechos dificulta a comparabilidade



entre os ensaios. Meta-análises evidenciam elevada heterogeneidade estatística (ex.: $I^2 \approx 69\%$) e presença de viés de publicação, especialmente nas pesquisas sobre psicoterapias (JOOST ALGERA et al., 2023; RAO et al., 2020). Muitos estudos envolvem amostras pequenas, curto tempo de seguimento e ausência de duplo-cego, o que pode superestimar os

efeitos terapêuticos (ZENG et al., 2023; CHUN et al., 2018). Além disso, é frequente a ausência de biomarcadores objetivos padronizados, o que compromete a correlação entre desfechos clínicos e parâmetros biológicos (ex.: TNF- α , IL-6, PCR, serotonina entérica) (LIU, H. R. et al., 2015; LIU, S. B. et al., 2015).

Para o futuro, espera-se um avanço na personalização terapêutica, com seleção de cepas probióticas baseada no perfil individual da microbiota e integração de estratégias combinadas, como associação de psicoterapia e modulação microbiana, terapias digitais baseadas em realidade virtual e neuromodulação não invasiva (XIAO et al., 2021; MARTIN; MAYER, 2017). Estudos multicêntricos, com padronização metodológica e uso de biomarcadores clínicos, moleculares e de neuroimagem funcional, serão essenciais para validar essas abordagens e orientar intervenções personalizadas no manejo da SII (GAO et al., 2023; PURSELL et al., 2023).

CONCLUSÃO

Portanto, a síndrome do intestino irritável (SII) é uma condição multifatorial, cuja fisiopatologia está fortemente ligada à disfunção do eixo intestino-cérebro. Evidências clínicas demonstram que alterações na microbiota intestinal, na resposta neuroendócrina ao estresse e na percepção visceral da dor contribuem para o quadro clínico da SII. Intervenções como o uso de probióticos, terapias cognitivo-comportamentais, hipnose e antidepressivos têm mostrado eficácia na redução dos sintomas e melhora da qualidade de vida, embora existam diferenças nos desfechos conforme o tipo de intervenção, cepa probiótica ou modalidade psicoterapêutica. Esses achados sustentam uma abordagem terapêutica que vá além do controle sintomático, considerando a interação entre fatores gastrointestinais e psicossociais.

Entretanto, a heterogeneidade metodológica dos estudos, o alto efeito placebo e a escassez de biomarcadores objetivos padronizados limitam a generalização dos resultados. O futuro do manejo da SII demanda ensaios clínicos multicêntricos e bem desenvolvidos, com avaliação combinada de parâmetros clínicos, neuroendócrinos e microbiológicos. A tendência é que o tratamento seja cada vez mais personalizado, com estratégias integrativas que combinem modulação da microbiota, terapias psicossociais e ferramentas digitais. Essa abordagem integrada poderá redefinir as dificuldades sobre a terapia da SII e contribuir para o desenvolvimento de modelos aplicáveis a outros distúrbios neurogastrointestinais.

Palavras-chave: Eixo intestino-cérebro; Modulação da microbiota; Síndrome do Intestino Irritável

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Seguir as normas da ABNT 10520/2023 para as referências bibliográficas.

ALGERA, Joost et al. Managing pain in irritable bowel syndrome: current perspectives and best practice. *Expert Review of Gastroenterology & Hepatology*, v. 17, n. 9, p. 871–881, 8 ago. 2023.



CHUN, E. et al. Alleviation of irritable bowel syndrome-like symptoms and control of gut and brain responses with oral administration of *Dolichos lablab* L. in a mouse model. *Nutrients*, v. 10, n. 10, p. 1475, 10 out. 2018.

GAO, F. et al. Electroacupuncture in the treatment of IBS in rats: investigation of the mechanisms of CRH+ neurons in the paraventricular nucleus. *Journal of Neurophysiology*, v. 130, n. 2, p. 380–391, jan. 2023.

KONG, F. et al. Comparison of laparoscopic and robotic pancreaticoduodenectomy: a systematic review and meta-analysis. *Surgical Endoscopy*, v. 35, n. 5, p. 1875–1884, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32925728/>. Acesso em: 22 abr. 2025.

LIAO, L.-M. et al. Moxibustion ameliorates visceral hypersensitivity by regulating hypothalamus-spinal cord-colon axis in rats with irritable bowel syndrome with diarrhea. *Zhen ci yan jiu = Acupuncture Research*, v. 49, n. 1, p. 47–56, 2024.

LIU, H. R. et al. Effects of electroacupuncture on corticotropin-releasing hormone in rats with chronic visceral hypersensitivity. *World Journal of Gastroenterology*, v. 21, n. 23, p. 7181–7190, 21 jun. 2015. DOI: 10.3748/wjg.v21.i23.7181.

LIU, S. B. et al. Long-term upregulation of cortical glutamatergic AMPA receptors in a mouse model of chronic visceral pain. *Molecular Brain*, v. 8, n. 1, p. 76, 19 nov. 2015. DOI: 10.1186/s13041-015-0169-z.

MARTIN, C. R.; MAYER, E. A. Gut-brain axis and behavior. In: MARTIN, C. R. (Ed.). *Intestinal microbiome: functional aspects in health and disease*. [S. l.]: [s. n.], 2017. p. 45–53.

PURSELL, Huw et al. The prevalence and burden of Rome IV bowel disorders of gut brain interaction in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a cross-sectional study. *Scientific Reports*, v. 13, n. 1, p. 8769, 2023. DOI: 10.1038/s41598-023-35774-5. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37253969/>. Acesso em: 22 abr. 2025.

RAO, S. S. C. et al. Randomised clinical trial: linaclotide vs placebo – a study of bi-directional gut and brain axis. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, v. 51, n. 12, p. 1332–1341, jun. 2020. DOI: 10.1111/apt.15772.

XING, Jiaotao et al. Lateral periaqueductal gray participate in the regulation of irritable bowel syndrome induced by chronic restraint stress. *Neurobiology of Disease*, v. 204, p. 106758, jan. 2025. DOI: 10.1016/j.nbd.2024.106758. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39638155/>. Acesso em: 22 abr. 2025.

XIAO, Y. et al. Transcranial direct current stimulation relieves visceral hypersensitivity via normalizing GluN2B expression and neural activity in anterior cingulate cortex. *Journal of Neurophysiology*, v. 125, n. 5, p. 1787–1797, 1 maio 2021. DOI: 10.1152/jn.00025.2021.

ZENG, X. et al. Clinical efficacy of one-finger meditation massage on IBS-C based on the "gut-brain axis" theory: study protocol for a randomized controlled trial. *BMC Complementary Medicine and Therapies*, v. 23, n. 1, p. 185, 6 jun. 2023. DOI: 10.1186/s12906-023-04019-3.



AUTISMO, VACINAÇÃO E ATENDIMENTO HUMANIZADO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

¹ Maria Luiza Marques Mateus Moreira

² Ana Maria Nascimento Marques Amorim

³ Giovanna de Abreu Castro

⁴ Maria Eduarda Cabral Mergulhão de Souza

⁵ Matheus Nascimento Marques Amorim

^{1, 2, 3, 4} Faculdade Pernambucana de Saúde. Recife, Pernambuco, Brasil; ⁵ Universidade de Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brasil.

Área temática: Enfermagem

Resumo: **Objetivo:** Relatar, a partir de uma vivência em uma clínica de vacinação, como a abordagem humanizada e a comunicação efetiva podem favorecer a adesão vacinal em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), enfrentando a hesitação vacinal gerada por desinformações como a falsa associação entre vacinas e autismo. **Metodologia:** Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, com base em observação participante de um caso real ocorrido em Recife, Pernambuco. A situação envolveu uma mãe em busca de informações sobre a vacina da gripe para o filho com TEA nível 3. **Resultados e discussão:** A angústia da mãe era motivada tanto por experiências anteriores frustrantes em serviços de saúde quanto por dúvidas sobre a segurança da vacina, reforçadas por conteúdos incorretos disseminados por terceiros. A equipe de enfermagem, ao reconhecer essa vulnerabilidade, ofereceu um atendimento individualizado, com escuta ativa, orientações claras, revisão de condutas previamente treinadas e agendamento estratégico para respeitar a rotina da criança. A atuação cuidadosa resultou na reconstrução da confiança da família no processo de imunização. **Conclusões:** Como resultado, a mãe demonstrou satisfação e alívio, o que reafirma que o atendimento humanizado e capacitado é capaz de reverter resistências e garantir a inclusão segura de indivíduos com TEA em ações de saúde pública. A experiência reforça a necessidade de preparo técnico, sensibilidade no acolhimento e combate à desinformação como caminhos para o fortalecimento da cobertura vacinal e da saúde coletiva.

INTRODUÇÃO

Segundo a etimologia, o “autismo” vem da palavra grega *autos*, que significa eu mesmo, exprime a noção de próprio, de si próprio. E a sua etiologia se dá por origem genética – mais de 100 genes já foram associados ao transtorno, e até o momento não há tratamento específico ou cura. O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) tem sido uma das ferramentas mais utilizadas no diagnóstico, ele é publicado pela American Psychiatric Association (APA) e propõe critérios que facilitam e uniformizam o diagnóstico de doenças mentais, em 2013 propôs uma nova classificação onde o termo transtorno do espectro autista (TEA) foi sugerido como termo único que inclui as várias condições anteriormente diagnosticadas de forma separada, unificando e simplificando os critérios na tentativa de facilitar o diagnóstico, passou a conter apenas dois critérios: 1. dificuldades sociais e de comunicação e 2. comportamentos repetitivos e interesses restritos, fixos e intensos. Também acrescentou especificadores e elencou de acordo com a gravidade (nível



1 – exigindo apoio; nível 2 – apoio substancial e nível 3 – apoio muito substancial). Devido à sua complexidade, com múltiplos graus e manifestações, o transtorno acaba sendo alvo de muita desinformação, sendo o mito mais conhecido o de que vacinas causam autismo, o que leva algumas famílias optarem por não vacinar seus filhos, devido ao medo de as vacinas possam desencadear ou agravar a doença. Esse movimento se deu por conta de um artigo científico publicado na revista “The Lancet” em 1998 pelo médico britânico Andrew Wakefield, que utilizou dados falsos e contrariou todos os princípios básicos da pesquisa científica, relacionando a manifestação de autismo em crianças à vacinação. O resultado foi a queda da cobertura vacinal e o surgimento de movimentos antivacina em diferentes partes do mundo, que conquistam adeptos até hoje.

OBJETIVO

Relatar, por meio de uma experiência vivenciada em uma clínica de vacinação, como a abordagem humanizada e a comunicação efetiva podem contribuir para a adesão vacinal de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), enfrentando a hesitação vacinal decorrente da desinformação, especialmente aquela relacionada ao mito da associação entre vacinas e autismo.

METODOLOGIA

Este relato de experiência configura-se como um estudo de abordagem qualitativa, do tipo descritivo e exploratório. Baseia-se na observação participante e na coleta de dados a partir de um caso real ocorrido em uma clínica de vacinação no Recife, Pernambuco. A narrativa detalha a interação entre uma mãe de criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a equipe de saúde, com foco nas estratégias de atendimento humanizado empregadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O período entre março e setembro corresponde aos meses de outono e inverno no Brasil, onde algumas doenças são mais comuns, entre elas a gripe, que é causada pelo Vírus da Influenza. Devido a isso ocorrem campanhas de vacinação anualmente a fim de prevenir formas graves da doença, óbitos, internações e a sobrecarga nos serviços de saúde, além de minimizar sintomas que podem ser confundidos com outras doenças respiratórias. Essa proteção deve ser geral, mas é especialmente importante para os mais vulneráveis como crianças, gestantes e idosos. O relato em questão aconteceu em uma clínica de vacinas do Recife, onde diariamente recebe público de todas as idades e dezenas de famílias que buscam imunização. Uma mãe veio à clínica em busca de informações sobre a vacina da gripe para o seu filho, com o passar do atendimento foi perceptível sua preocupação, ansiedade e angústia em dois aspectos principais. Um deles seria quanto a segurança da vacina, taxa de eficácia, efeitos colaterais, indicações e contra indicações, seus componentes, tudo acerca de detalhes técnicos, pois estava em dúvida sobre algumas informações que havia lido na internet e escutado de amigos e familiares. E o outro por seu filho se tratar de uma criança de 11 anos que possui o Transtorno do Espectro Autista, com nível de apoio muito substancial, que requer um atendimento personalizado e de profissionais da saúde capacitados para o manejo adequado. Por diversas vezes foi em busca de imunizá-lo, mas passou por situações desagradáveis que pouco a pouco a desestimulou, o que levou a um atraso no calendário vacinal, com isso vinha mais uma preocupação pois aumenta o risco de exposição a doenças graves e contagiosas. Através de uma comunicação clara, honesta e



empática, a técnica de enfermagem construiu uma relação de confiança com aquela mãe, transmitiu segurança e reforçou os benefícios da vacinação. Foi agendado um horário na clínica, pensando em alterar o mínimo possível da rotina dele, a mãe recebeu instruções de como prepará-lo para aquele momento, conversando sobre o que iria acontecer e como seria feito, com objetivo de familiarizá-lo. Também foi revisitado com as demais colaboradoras o treinamento de capacitação que haviam recebido de um instituto especializado em autismo, que visa um atendimento com cuidado humanizado, com acolhimento e criação de ambientes inclusivos, além de reafirmar o compromisso e lema da clínica - “família protegida, saúde garantida”. Todas essas etapas de preparação foram fundamentais, pois ao final do atendimento a mãe relatou estar muito grata e satisfeita por toda atenção da equipe com ela e seu filho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

O mito infundado de que vacinas causam autismo, propagado por estudos desacreditados, é um exemplo de como a falta de informação e a disseminação de notícias falsas podem impactar negativamente a saúde coletiva, gerando hesitação vacinal e colocando indivíduos vulneráveis em risco. O relato de caso do menino e sua mãe é um microcosmo dessa problemática. A ansiedade e a angústia, motivadas tanto pela desinformação sobre a segurança das vacinas quanto pelas experiências negativas anteriores em ambientes de saúde que não consideraram as particularidades do indivíduo, ilustram os desafios enfrentados por famílias de pessoas com TEA. A experiência da clínica prova que, ao priorizar o cuidado humanizado, é possível reconstruir a confiança, desmistificar a vacinação e fortalecer a adesão às campanhas, garantindo que todos tenham acesso à imunização necessária, protegendo não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade.

Palavras-chave: Cuidado Humanizado; Transtorno do Espectro Autista; Vacinas;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MONTENEGRO, Maria A.; CELERI, Eloisa Helena R. V.; CASELLA, Erasmo B. Transtorno do Espectro Autista - TEA: Manual Prático de Diagnóstico e Tratamento. Rio de Janeiro: Thieme Revinter, 2018. E-book. ISBN 9788554650827.

VACINAS causam autismo? Conheça a história por trás desse mito. [S. l.]: Butantan, 2021. Disponível em: <https://butantan.gov.br/covid/butantan-tira-duvida/tira-duvida-noticias/por-que-e-mentira-que-vacinas-causam-autismo-conheca-a-historia-por-tras-desse-mito>.

SILVA, Ana. Compreendendo o autismo. [S. l.]: CAPES, [20--?]. Disponível em: <https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/744198/2/Compreendendo%20o%20Autismo.pdf>.

INFLUVAC TETRA. [S. l.]: Abbott, [20--?]. Disponível em: <https://www.abbottbrasil.com.br/content/dam/corp/abbott/pt-br/documents/pdfs/nossas-bulas/I/BU-13-INFLUVAC-TETRA-Bula-Profissional-FINAL.pdf>.



IMPACTO DO USO DE PROBIÓTICOS EM PACIENTES COM SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL (SII)

¹Rodrigo Almeida Resplande

²Ana Laura Meireles Tormim

³Clara Pereira Andrade

⁴Catarina Inumarú Esteves

⁵Isabella Barbosa Machado

⁶Marcela Santos Liston

⁷Natália Ferro de Oliveira

⁸Murillo Moreira Oliveira de Carvalho

¹Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ²Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ³Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁴Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁵Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁶Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁷Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁸Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: Este trabalho teve como objetivo analisar os efeitos do uso de probióticos na melhora dos sintomas da Síndrome do Intestino Irritável (SII), considerando os principais microrganismos utilizados, seus mecanismos de ação e os desfechos clínicos observados. A metodologia consistiu em uma revisão narrativa da literatura recente, contemplando estudos clínicos e revisões sistemáticas. Os resultados indicaram que cepas como *Bacillus coagulans*, *Lactobacillus plantarum*, *Bifidobacterium longum* e *Saccharomyces cerevisiae* proporcionaram alívio significativo de sintomas gastrointestinais como dor abdominal, distensão e irregularidade intestinal. Além disso, observou-se melhora em aspectos psicossociais, especialmente ansiedade e depressão, sugerindo a atuação dos probióticos no eixo intestino-cérebro. Os estudos também demonstraram que tratamentos entre 6 a 12 semanas foram mais eficazes, com baixa incidência de efeitos adversos. Conclui-se, portanto, que os probióticos são uma abordagem terapêutica funcional, segura e com potencial de personalização no tratamento da SII, contribuindo para a qualidade de vida dos pacientes.

INTRODUÇÃO

A síndrome do intestino irritável (SII) é uma condição gastrointestinal crônica e comum na população mundial. De acordo com o critério de Roma IV, cerca de 6% da comunidade global possui essa síndrome (Ford *et al.*, 2018). Caracterizada por sintomas clínicos sem grandes alterações anatomopatológicas, como inchaço, má digestão, dor abdominal, tenesmo fecal e esforço evacuatório. Associado ao estresse, hábitos alimentares e alterações na microbiota intestinal, é um quadro clínico muito particular de cada paciente e com uma grande variedade de tratamentos, que, geralmente, cuidam dos sintomas e não da enfermidade como um todo (Zhang *et al.*, 2022).

Compreendendo que essa síndrome está muito relacionada com a colonização bacteriana do trato gastrointestinal, pesquisadores propuseram o uso de probióticos para o tratamento da SII, visto que certas cepas e gêneros de bactérias contribuem para a



minimização das inflamações crônicas e para a melhora das dores e distensões abdominais

(Goodoory *et al.*, 2023). O uso de probióticos para a melhora dos sintomas possui benefícios por, no geral, não piorar o quadro clínico do paciente, possuir mínimos efeitos colaterais e não afetar doenças prévias ou de base (Asha e Khalil, 2020).

Estudos indicam que vários probióticos podem ser efetivos para o tratamento de SII, apresentando potencial significativo para melhora dos sintomas globais, distensão abdominal e esforço evacuatório. Os probióticos com melhor efeito, possuíam cepas de *Bacillus*, *Lactobacillus* e *Saccharomyces* (Wu *et al.*, 2024).

Os probióticos destacam-se como alternativa de abordagem funcional, especialmente por suas ações anti-inflamatórias, imunomoduladoras e pela capacidade de restaurar o equilíbrio microbiano intestinal (Chen *et al.*, 2023). Neste contexto, a literatura científica tem investigado de forma crescente os efeitos clínicos, microbiológicos e psicofisiológicos dos probióticos em pacientes com SII. Além de promoverem alívio sintomático gastrointestinal, essas intervenções demonstram impacto positivo sobre os componentes psicossociais frequentemente associados à SII, como ansiedade e depressão. (Jouët *et al.*, 2024).

Diante da complexidade fisiopatológica da SII e da evidente relação entre microbiota intestinal e os sintomas apresentados, torna-se essencial aprofundar a compreensão sobre intervenções terapêuticas que atuem na modulação do ecossistema intestinal. Dessa forma, o estudo do papel dos probióticos na SII surge como um campo promissor e alinhado com as diretrizes atuais de tratamento integrativo para distúrbios funcionais do trato digestório.

OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto do uso de probióticos na melhora dos sintomas clínicos da SII. Pretende-se avaliar as principais cepas utilizadas, seus mecanismos de ação propostos, os desfechos clínicos observados em ensaios clínicos e as possíveis implicações psicofisiológicas associadas ao uso dessas intervenções, com foco na promoção de qualidade de vida, alívio da dor abdominal, normalização do hábito intestinal e redução da distensão abdominal. Além disso, busca-se discutir a segurança, tolerabilidade e aplicabilidade prática dos probióticos no contexto ambulatorial e multidisciplinar do tratamento da SII.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, com busca nas bases de dados PubMed/MedLine e SciELO. Os descritores utilizados foram “*probiotics*” e “*irritable bowel syndrome*”, com o operador booleano “AND” e os filtros “*free full text*” e “*last 10 years*”. Foram selecionados 34 artigos para análise mais aprofundada, dos quais 30 foram elegíveis para esta revisão e 4 descartados por não se adequarem ao tema a ser pesquisado. Os critérios de inclusão foram artigos que analisavam o uso de probióticos como forma de intervenção em pacientes diagnosticados com síndrome do intestino irritável, publicados nos últimos 5 anos e disponíveis gratuitamente na íntegra. Foram considerados estudos que apresentavam dados clínicos relacionados à melhora de sintomas como dor abdominal, distensão, constipação, diarreia ou qualidade de vida. Os critérios de exclusão foram artigos fora do recorte temporal determinado, que não estavam disponíveis gratuitamente na íntegra e que abordavam o uso de probióticos em outras condições gastrointestinais que não incluíam a SII como foco principal.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os artigos analisados evidenciam que o uso de probióticos em pacientes com Síndrome do Intestino Irritável (SII) promove alívio significativo dos sintomas clínicos, como dor abdominal, distensão, irregularidade no hábito intestinal e desconforto geral (Zhang et al., 2022; Goodoory et al., 2023). Cepas como *Bacillus coagulans*, *Lactobacillus plantarum*, *Bifidobacterium longum* e *Saccharomyces cerevisiae* destacaram-se por sua eficácia terapêutica (Wu et al., 2024; Skrzydło-Radomańska et al., 2021).

Além dos efeitos gastrointestinais, foi observado impacto positivo em aspectos psicossociais, com redução dos sintomas de ansiedade e depressão, sugerindo a atuação dos probióticos no eixo intestino-cérebro (Jouët et al., 2024; Pinto-Sanchez et al., 2017). A duração do tratamento, geralmente entre 6 a 12 semanas, e a escolha da cepa são fatores determinantes na efetividade clínica (Chen et al., 2023). Os estudos também reforçam a segurança dessas intervenções, com baixos índices de efeitos adversos relatados (Asha e Khalil, 2020).

Apesar da heterogeneidade dos desenhos metodológicos e das limitações de alguns ensaios, há evidências consistentes de que os probióticos representam uma abordagem terapêutica promissora, especialmente quando aplicados de forma personalizada de acordo com o subtipo de SII (Ford et al., 2018; Kajander et al., 2016).

A análise dos estudos selecionados reforça a relevância dos probióticos como intervenção terapêutica complementar na Síndrome do Intestino Irritável (SII). Os resultados demonstram que cepas específicas, como *Bacillus coagulans*, *Lactobacillus plantarum*, *Bifidobacterium longum* e *Saccharomyces cerevisiae*, apresentam eficácia na atenuação de sintomas gastrointestinais característicos da SII, incluindo dor abdominal, distensão e irregularidades no hábito intestinal. Essas cepas atuam na modulação da microbiota intestinal, promovendo equilíbrio e reduzindo processos inflamatórios, o que contribui para a melhora clínica dos pacientes (Zhang et al., 2022; Goodoory et al., 2023; Wu et al., 2024).

Além dos benefícios gastrointestinais, os probióticos demonstraram impacto positivo em aspectos psicossociais associados à SII. Estudos indicam que a modulação do eixo intestino-cérebro por meio de probióticos pode reduzir sintomas de ansiedade e depressão em pacientes com SII. Esse efeito é atribuído à capacidade de certas cepas probióticas de influenciar a produção de neurotransmissores, como a serotonina, e de regular a resposta ao estresse, evidenciando a interconexão entre saúde intestinal e bem-estar mental (Pinto-Sanchez et al., 2017; Jouët et al., 2024).

A duração do tratamento e a escolha das cepas probióticas são fatores determinantes na efetividade clínica. Intervenções com duração entre 6 a 12 semanas mostraram-se eficazes, e a seleção de cepas específicas deve considerar o subtipo de SII apresentado pelo paciente. Apesar da heterogeneidade metodológica dos estudos analisados, há consenso quanto à segurança e tolerabilidade dos probióticos, com baixos índices de efeitos adversos relatados (Asha e Khalil 2020; Chen et al., 2023).

Contudo, é importante destacar que, embora os resultados sejam promissores, a variabilidade nos desenhos dos estudos e nas cepas utilizadas limita a generalização dos achados. Portanto, são necessários ensaios clínicos adicionais, com metodologias padronizadas e amostras representativas, para consolidar as evidências e orientar a prática clínica (Ford et al., 2018).

Em suma, os probióticos emergem como uma abordagem terapêutica promissora para a SII, oferecendo benefícios tanto gastrointestinais quanto psicossociais. Sua aplicação



prática requer uma abordagem personalizada, considerando as características individuais de cada paciente e o subtipo de SII, visando otimizar os resultados clínicos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes (Kajander et al., 2016).

CONCLUSÃO

Portanto, conclui-se que os probióticos representam uma estratégia terapêutica funcional e promissora no manejo da Síndrome do Intestino Irritável (SII), sobretudo pela sua capacidade de modular a microbiota intestinal e atuar de forma benéfica no eixo intestino-cérebro. É importante destacar que cepas específicas demonstraram eficácia na redução de sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, distensão e alterações no hábito intestinal, além de impactos positivos sobre sintomas de ansiedade e depressão, frequentemente associados à SII. Logo, o uso de probióticos apresenta-se como uma alternativa segura, bem tolerada e aplicável no contexto ambulatorial, com potencial de melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Assim, torna-se de extrema importância o investimento em novos estudos clínicos controlados e padronizados, que possam consolidar essas evidências e guiar o uso racional e individualizado dessas intervenções.

Palavras-chave: Microbiota intestinal; Probióticos; Qualidade de vida; Síndrome do Intestino Irritável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASHA, Mohammad Z.; KHALIL, Sundos F. H. Efficacy and safety of probiotics, prebiotics and synbiotics in the treatment of irritable bowel syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Sultan Qaboos University Medical Journal*, Seeb, v. 20, n. 1, p. e13–e24, fev. 2020. DOI: <https://doi.org/10.18295/squmj.2020.20.01.003>.
- CHEN, Min et al. Probiotics for the management of irritable bowel syndrome: a systematic review and three-level meta-analysis. *International Journal of Surgery*, Chengdu, v. 110, 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10651259/>.
- COZMA-PETRUȚ, Anamaria; LOGHIN, Felicia; MIERE, Doina; DUMITRAȘCU, Dan Lucian. Diet in irritable bowel syndrome: What to recommend, not what to forbid to patients! *World Journal of Gastroenterology*, v. 23, n. 21, p. 3771–3783, 2017. Disponível em: <https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i21/3771.htm>.
- FORD, Alexander C. et al. Systematic review with meta-analysis: the efficacy of prebiotics, probiotics, synbiotics and antibiotics in irritable bowel syndrome. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, Leeds v. 48, n. 10, p. 1044–1060, nov. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1111/apt.15001>.
- FRANCAVILLA, Ruggiero et al. Clinical and microbiological effect of a multispecies probiotic supplementation in celiac patients with persistent IBS-type symptoms: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter trial. *Journal of Clinical Gastroenterology*, v. 53, n. 3, p. e117–e125, mar. 2019. DOI: <https://doi.org/10.1097/MCG.0000000000001023>.
- GARGARI, Giorgio et al. Collinsella aerofaciens as a predictive marker of response to probiotic treatment in non-constipated irritable bowel syndrome. *Gut Microbes*, v. 16, n. 1, 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10773624/>.
- GOODOORY, Vivek C. et al. Efficacy of probiotics in irritable bowel syndrome: systematic review and meta-analysis. *Gastroenterology*, Leeds, v. 165, p. 1206–1218, nov. 2023. DOI:



<https://doi.org/10.1053/j.gastro.2023.07.018>.

GUPTA, Anil Kumar; MAITY, Chiranjit. Efficacy and safety of *Bacillus coagulans* LBSC in irritable bowel syndrome: a prospective, interventional, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical study. *Medicine (Baltimore)*, v. 100, n. 5, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7837859/>.

JOUËT, Pauline et al. Probiotics plus vitamin D in irritable bowel syndrome: a prospective multicentric non-interventional study. *Minerva Gastroenterology*, Torino, v. 70, n. 3, p. 332–341, set. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.23736/S2724-5985.24.03581-2>.

KAJANDER, K. et al. Clinical trial: multispecies probiotic supplementation alleviates the symptoms of irritable bowel syndrome and stabilizes the intestinal microbiota. *World Journal of Gastroenterology*, v. 22, n. 4, 2016.

KWON, H. et al. Effect of *Lactocaseibacillus rhamnosus* IDCC 3201 on irritable bowel syndrome with constipation: a randomized, double-blind, and placebo-controlled trial. *Scientific Reports*, v. 14, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-72887-x>.

LEWIS, Erin D. et al. Efficacy of *Lactobacillus paracasei* HA-196 and *Bifidobacterium longum* R0175 in alleviating symptoms of irritable bowel syndrome (IBS): A randomized, placebo-controlled study. *Nutrients*, v. 12, n. 4, p. 1159, 2020. DOI: 10.3390/nu12041159.

LYRA, Anna et al. Irritable bowel syndrome symptom severity improves equally with probiotic and placebo. *World Journal of Gastroenterology*, v. 22, n. 48, p. 10631–10642, 2016. DOI: <https://doi.org/10.3748/wjg.v22.i48.10631>.

MARTONI, Christopher J.; SRIVASTAVA, Shalini; LEYER, Gregory J. *Lactobacillus acidophilus* DDS-1 and *Bifidobacterium lactis* UABla-12 improve abdominal pain severity and symptomology in irritable bowel syndrome: Randomized controlled trial. *Nutrients*, v. 12, n. 2, p. 363, 2020. DOI: 10.3390/nu12020363.

MATSUURA, Nozomi et al. Effect of personalized prebiotic and probiotic supplements on the symptoms of irritable bowel syndrome: an open-label, single-arm, multicenter clinical trial. *Nutrients*, v. 16, n. 19, art. 3333, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/nu16193333>.

MOUREY, Florian et al. *Saccharomyces cerevisiae* I-3856 in irritable bowel syndrome with predominant constipation. *World Journal of Gastroenterology*, v. 28, n. 22, p. 2509–2522, 14 jun. 2022. DOI: <https://doi.org/10.3748/wjg.v28.i22.2509>.

NUTRIENTS. Effectiveness and safety of probiotics in irritable bowel syndrome with constipation: systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, v. 14, p. 2482, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/nu14122482>.

PINTO-SANCHEZ, Maria Ines et al. Probiotic *Bifidobacterium longum* NCC3001 reduces depression scores and alters brain activity: a pilot study in patients with irritable bowel syndrome. *Gastroenterology*, v. 153, n. 2, p. 448–459, ago. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2017.05.003>.

SKRZYDŁO-RADOMAŃSKA, Barbara et al. The effectiveness of synbiotic preparation containing *Lactobacillus* and *Bifidobacterium* probiotic strains and short chain fructooligosaccharides in patients with diarrhea predominant irritable bowel syndrome—A randomized double-blind, placebo-controlled study. *Nutrients*, v. 12, n. 6, 2020. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7400954/>.

WU, Youhe et al. The efficacy of probiotics, prebiotics, synbiotics, and fecal microbiota transplantation in irritable bowel syndrome: a systematic review and network meta-analysis. *Nutrients*, Zheiang, v. 16, n. 13, p. 2114, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3390/nu16132114>.

ZHANG, Tao et al. Efficacy of probiotics for irritable bowel syndrome: a systematic review and network meta-analysis. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, Peking, v. 12, art. 859967, 1 abr. 2022. DOI: <https://doi.org/10.3389/fcimb.2022.859967>.



PANCREATITE AGUDA GRAVE: DESAFIOS NA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA E ENDOSCÓPICA

¹Rodrigo Almeida Resplande

²Maria Lúcia Batista Toledo

³João Victor Coimbra Porto Rassi

⁴Amanda Alves Vieira

⁵Fábio Marques Camilo

⁶Rafael Sandro Rodrigues Manrique

⁷Murillo Moreira Oliveira de Carvalho

¹Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ² Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ³ Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁴ Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁵ Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁶ Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁷ Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo: A pancreatite aguda grave (PAG) é uma condição inflamatória complexa, frequentemente associada a necrose pancreática e disfunções orgânicas múltiplas. Este estudo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre as intervenções cirúrgicas e endoscópicas no manejo da PAG, com ênfase nas estratégias minimamente invasivas, como o modelo “step-up” e a drenagem endoscópica guiada por ultrassonografia (EUS). Os resultados demonstram que abordagens menos invasivas estão associadas a menor morbimortalidade, tempo de internação reduzido e melhor preservação da função pancreática. Conclui-se que a personalização das condutas, aliada à experiência da equipe e à avaliação criteriosa do caso, é essencial para a otimização do tratamento da PAG.

INTRODUÇÃO

A pancreatite aguda grave (PAG) é uma condição inflamatória do pâncreas caracterizada por evolução clínica complexa, marcada por intensa resposta inflamatória sistêmica e risco elevado de disfunções orgânicas múltiplas. Estima-se que aproximadamente 20% dos casos de pancreatite aguda evoluem para a forma grave, sendo responsáveis por significativa morbimortalidade, sobretudo quando associadas a necrose pancreática infectada e outras complicações locais.

O manejo da PAG exige abordagem multidisciplinar e, frequentemente, intervenções terapêuticas invasivas para o controle de coleções necróticas e infecções secundárias. Tradicionalmente, a cirurgia aberta era considerada o padrão-ouro para o tratamento de necroses infectadas; no entanto, nas últimas décadas, técnicas minimamente invasivas, especialmente a endoscopia terapêutica e as abordagens cirúrgicas por via laparoscópica ou retroperitoneal, vêm ganhando espaço, com resultados promissores em termos de redução de complicações e tempo de internação.

Apesar dos avanços técnicos, persistem desafios relevantes na definição do momento ideal da intervenção, na escolha entre as vias endoscópica ou cirúrgica e na estratificação dos pacientes que mais se beneficiaram de cada abordagem. Além disso, a variabilidade nos



protocolos adotados entre centros e a escassez de ensaios clínicos randomizados de grande escala limitam a consolidação de diretrizes universais.

OBJETIVO

Diante desse cenário, o presente artigo tem como objetivo discutir os principais desafios relacionados às intervenções cirúrgicas e endoscópicas no tratamento da pancreatite aguda grave, à luz das evidências mais recentes da literatura, destacando os critérios de indicação, os desfechos clínicos e as limitações que ainda permeiam essas abordagens.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, com busca nas bases de dados PubMed/MedLine e SciELO. Os descritores utilizados foram “*severe acute pancreatitis*” e “*surgical and endoscopic management*”, com o operador booleano “AND” e os filtros “*free full text*” e “*last 10 years*”. Foram selecionados 25 artigos para análise mais aprofundada, dos quais 20 foram elegíveis para esta revisão e 1 descartado por não se adequar ao tema a ser pesquisado. Os critérios de inclusão foram artigos que analisavam os diferentes tipos de manejo cirúrgico e/ou endoscópico na pancreatite aguda grave, publicados nos últimos 5 anos e disponíveis gratuitamente na íntegra. Foram priorizados estudos que abordavam abordagens minimamente invasivas, indicações cirúrgicas, tempo ideal para intervenção e resultados clínicos relacionados à mortalidade e complicações. Os critérios de exclusão foram artigos fora do recorte temporal estabelecido, indisponíveis gratuitamente na íntegra e que abordavam exclusivamente casos leves de pancreatite ou manejo clínico sem foco em intervenção cirúrgica ou endoscópica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O manejo da pancreatite aguda necrosante (PAN) evoluiu significativamente nas últimas décadas, com ênfase crescente na adoção de estratégias minimamente invasivas. O modelo terapêutico conhecido como “step-up approach” tornou-se o padrão de referência, iniciando-se com drenagem percutânea ou endoscópica e escalonando-se para necrosectomia apenas em casos refratários (PURSCHKE et al., 2022; RASSLAN et al., 2017; BRUNO, 2016). Essa abordagem demonstrou redução significativa nas taxas de complicações, tempo de internação e necessidade de reoperações, além de preservar melhor a função pancreática exócrina (TIMMERMANN et al., 2024; TANG et al., 2023).

O tratamento endoscópico, particularmente por via transmural guiada por ultrassonografia endoscópica (EUS), apresentou alta taxa de sucesso clínico e técnico, superando 80% em diversas séries (AGHDASSI et al., 2018; MOURA et al., 2017). A introdução de stents metálicos autoexpansíveis com aposição luminal (LAMS) facilitou o acesso às coleções necrosadas, otimizando o processo de drenagem e permitindo necrosectomia direta por via endoscópica (PURSCHKE et al., 2022; AGHDASSI et al., 2018). No entanto, recomenda-se sua remoção após três semanas, devido ao alto risco de complicações como sangramentos e perfurações caso mantidos por períodos prolongados (PURSCHKE et al., 2022).

Comparativamente, a necrosectomia cirúrgica aberta permanece associada a elevada morbimortalidade, sendo hoje reservada para casos específicos, como abordagens minimamente invasivas sem êxito, perfurações ou síndrome compartimental (PURSCHKE et al., 2022; SORRENTINO et al., 2017; PODDA et al., 2023). Alternativas cirúrgicas



menos invasivas, como o Debridamento Retroperitoneal Assistido por Vídeo (VARD) e a Necrosectomia Laparoscópica Assistida (LAPN), demonstraram eficácia clínica relevante, especialmente em necroses retroperitoneais laterais (BUGIANTELLA et al., 2016; HOUGHTON et al., 2018; ENG et al., 2023).

A decisão quanto à via de acesso deve considerar a localização e o encapsulamento da necrose, a estabilidade clínica do paciente e a experiência da equipe assistente (PURSCHKE et al., 2022; TIMMERMAN et al., 2024; SORRENTINO et al., 2017).

Intervenções precoces antes da formação de necrose encapsulada (WON) aumentam o risco de complicações e mortalidade, embora alguns estudos demonstrem que, em casos selecionados com deterioração clínica precoce, a drenagem endoscópica pode ser segura e eficaz (JAGIELSKI, PIATKOWSKI, JACKOWSKI, 2022).

Aspectos funcionais também são relevantes: a insuficiência pancreática exócrina é mais prevalente após intervenções cirúrgicas extensas, enquanto a função endócrina tende a se deteriorar independentemente da via de abordagem, possivelmente como consequência direta da gravidade da doença de origem (ONNEKINK et al., 2022; TIMMERMAN et al., 2024). A síndrome do ducto pancreático desconectado (DPDS), frequentemente associada a pseudocistos ou WON, constitui um fator de risco para recorrência, complicações prolongadas e necessidade de drenagens de longo prazo (AGHDASSI et al., 2018; CHEN et al., 2019; HOUGHTON et al., 2018).

Do ponto de vista nutricional, a nutrição enteral precoce mostrou-se superior à parenteral na redução de complicações infecciosas, e sua administração por via nasogástrica, após as primeiras 72 horas, é segura e bem tolerada (BOUGARD et al., 2019; RASSLAN et al., 2017; BRUNO, 2016). Contudo, evidências recentes indicam que, em pacientes com menor risco, a introdução de dieta oral com suporte enteral sob demanda não compromete os desfechos clínicos e pode reduzir custos e desconforto (BRUNO, 2016).

Adicionalmente, fatores clínicos como hipertensão arterial sistêmica descompensada, falência renal aguda e colangite associada foram identificados como marcadores de mau prognóstico (PODDA et al., 2023). Por outro lado, intervenções minimamente invasivas e nutrição enteral precoce mostraram-se fatores protetores independentes, reforçando a importância de estratégias conservadoras e individualizadas sempre que possível (PODDA et al., 2023; BANG et al., 2019).

Casos complexos, como necroses localizadas em regiões anatômicas de difícil acesso ou associadas a fístulas biliares ou vaginais, têm sido tratados com sucesso através de abordagens personalizadas, demonstrando a versatilidade e segurança das técnicas endoscópicas em mãos experientes (SORRENTINO et al., 2017; MOURA et al., 2017; AERENLUND et al., 2023). Ainda, iniciativas como a formação de painéis multidisciplinares virtuais têm contribuído para uniformizar condutas e promover a inclusão de pacientes em protocolos clínicos, elevando a qualidade do cuidado (BRUNO, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A pancreatite aguda grave representa um desafio terapêutico complexo, exigindo intervenções que conciliem eficácia clínica com minimização de danos. A consolidação do modelo step-up, com prioridade para estratégias minimamente invasivas — como a drenagem endoscópica guiada por EUS associada ao uso de LAMS — refletiu-se em importantes avanços no manejo da PAN, incluindo menores taxas de complicações, tempo de internação reduzido e melhor preservação da função pancreática. Entretanto, a escolha entre abordagem endoscópica, percutânea ou cirúrgica deve considerar fatores como a localização e o encapsulamento da necrose, a estabilidade clínica do paciente, a presença de



complicações como DPDS e a experiência da equipe assistente. A definição do tempo ideal de intervenção ainda carece de maior consenso, embora se reconheça que procedimentos precoces em necroses não encapsuladas elevam os riscos de morbimortalidade.

Além da escolha da via de abordagem, aspectos clínicos como insuficiência renal aguda, colangite e hipertensão descompensada são marcadores de pior prognóstico e exigem atenção redobrada. Por outro lado, intervenções precoces bem indicadas e a nutrição enteral nasogástrica demonstraram-se fatores protetores relevantes. A introdução controlada da dieta oral, em pacientes de menor risco, também contribui para o conforto e a desospitalização precoce. Diante da heterogeneidade dos casos e da limitação de evidências robustas, a personalização das condutas, o fortalecimento de equipes interdisciplinares e a padronização de protocolos baseados em evidência são medidas centrais para a otimização do cuidado. O enfrentamento dos desafios na intervenção da PAG dependerá não apenas da evolução técnica, mas de uma articulação sólida entre conhecimento científico, julgamento clínico e organização sistêmica do cuidado.

Palavras-chave: Endoscopia terapêutica; Intervenções minimamente invasivas; Necrosectomia; Pancreatite aguda grave; Step-up approach.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGHDASSI, Ali et al. Endoscopic management of complications of acute pancreatitis: an update on the field. **Expert Review of Gastroenterology & Hepatology**, v. 12, n. 12, p. 1207–1218, 2018.
- BANG, Ji Young et al. An endoscopic transluminal approach, compared with minimally invasive surgery, reduces complications and costs for patients with necrotizing pancreatitis. *Gastroenterology*, v. 156, p. 1027–1040, 2019.
- BOUGARD, M. et al. Management of biliary acute pancreatitis. **Journal of Visceral Surgery**, v. 156, n. 2, p. 113–125, 2019.
- BRUNO, Marco J. et al. Improving the outcome of acute pancreatitis. **Digestive Diseases**, v. 34, n. 5, p. 540–545, 2016.
- BUGIANTELLA, Walter et al. Pancreatite necrosante: uma revisão das intervenções. **International Journal of Surgery**, v. 28, p. S163–S171, 2016.
- CHEN, Yan et al. Endoscopic transpapillary drainage in disconnected pancreatic duct syndrome after acute pancreatitis and trauma: long-term outcomes in 31 patients. **BMC Gastroenterology**, v. 19, p. 1–9, 2019.
- ENG, Nina L. et al. Laparoscopic-assisted pancreatic necrosectomy: technique and initial outcomes. **The American Surgeon**, v. 89, n. 11, p. 4459–4468, 2023.
- HANEY, Caelán Max et al. Endoscopic versus surgical treatment for infected necrotizing pancreatitis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. **Surgical Endoscopy**, v. 34, p. 2429–2444, 2020.
- JAGIELSKI, Mateusz; PIĄTKOWSKI, Jacek; JACKOWSKI, Marek. Early endoscopic treatment of symptomatic pancreatic necrotic collections. **Scientific Reports**, v. 12, p. 308, 2022.
- MOURA, Cássia Lemos et al. Minimally invasive endoscopic treatment of necrotizing pancreatitis: a case report with images and review of the literature. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 63, n. 3, p. 207–209, 2017.
- ONNEKINK, Anke M. et al. Endoscopic versus surgical step-up approach for infected necrotizing pancreatitis (ExTENSION): long-term follow-up of a randomized trial. **Gastroenterology**, v. 163, n. 3, p. 712–722, 2022.
- PODDA, Mauro et al. Infected pancreatic necrosis: outcomes and clinical predictors of mortality. A post hoc analysis of the MANCTRA 1 international study. **Updates in Surgery**, v. 75, p. 493–522, 2023.



PURSCHKE, Birte et al. Interventional strategies in infected necrotizing pancreatitis: indications, timing, and outcomes. **World Journal of Gastroenterology**, v. 28, n. 27, p. 3383–3397, 2022.

SORRENTINO, Luca et al. Combined totally mini-invasive approach in necrotizing pancreatitis: a case report and systematic literature review. **World Journal of Emergency Surgery**, v. 12, 2017.

THOMSON, John-Edwin et al. Managing infected pancreatic necrosis. **Chirurgia**, v. 113, n. 3, p. 291–299, 2018.

TIMMERMANN, Lea et al. Endoscopic and surgical treatment of necrotizing pancreatitis—a comparison of short- and long-term outcome. **Langenbeck's Archives of Surgery**, v. 409, n. 58, 2024.

TONG, Zhihui et al. Negative pressure irrigation and endoscopic necrosectomy through man-made sinus tract in infected necrotizing pancreatitis: a technical report. **BMC Surgery**, v. 16, p. 73, 2016.

WEXLER, Tanja Lundholm Rasmussen et al. Videoskopisk assisteret retroperitoneal debridement ved nekrotiserende pankreatitis. **Ugeskrift for Læger**, v. 183, 2021. Código: V09200669.

ÆRENLUND, Mia Prindahl et al. Endoscopic transvaginal drainage and necrosectomy of presacral walled-off pancreatic necrosis. **Endoscopy**, v. 55, p. E940–E941, 2023.



FATORES DESENCADEANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA DEPRESSÃO PÓS PARTO E SUAS PREVENÇÕES

¹ Ana Carolina Schueng Lemos

¹ Natasha Soares da Cunha Gandara

¹ Renata Aparecida Elias Dantas

¹ Centro Universitário de Brasília - UniCeub. Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo

A depressão pós-parto é um transtorno psicológico que afeta a saúde física, emocional e social da mulher, com sintomas como ansiedade, humor deprimido, distúrbios do sono e sensação de incapacidade, sendo mais prevalente nas primeiras semanas após o parto devido a mudanças hormonais e emocionais. Essa condição impacta negativamente o vínculo mãe-bebê e o bem-estar familiar. Fatores como alterações hormonais, trauma infantil, experiências adversas na gestação, histórico de transtornos mentais, conflitos conjugais e falta de apoio social aumentam significativamente o risco. Este estudo teve como objetivo identificar os fatores associados à depressão pós-parto e as estratégias preventivas descritas na literatura. A revisão integrativa analisou 37 artigos entre 1998 e 2024, com base em descritores como “postpartum depression”, “mental illness” e “mental health”, resultando na seleção de 11 estudos relevantes. Os achados indicam que a depressão pós-parto é uma condição multifatorial, influenciada por aspectos biológicos, psicossociais e contextuais. Intervenções como mindfulness, exercício físico, apoio nutricional e financeiro demonstraram benefícios para a saúde mental materna. Embora não tenham sido identificados biomarcadores cerebrais precoces confiáveis, o monitoramento contínuo dos sintomas pode contribuir para a detecção e o manejo adequado da condição. Conclui-se que políticas públicas intersetoriais e estratégias de cuidado perinatal integradas, com foco em intervenções precoces, eficazes e humanizadas, são fundamentais para reduzir os impactos da depressão pós-parto na vida das mulheres, de seus filhos e famílias.

Palavras-chave: Depressão; Pós-parto; Prevenção; Risco.

INTRODUÇÃO

De acordo com Schnakenberg *et al.* (2021) a depressão pós-parto é um transtorno psicológico relevante na saúde da mulher, caracterizado por sintomas que comprometem o bem-estar físico, emocional e social da mãe. Entre os principais sintomas estão ansiedade constante, humor deprimido, irritabilidade, distúrbios do sono, dificuldades de concentração, lapsos de memória e sentimentos de culpa ou incapacidade diante dos cuidados com o recém-nascido. Embora semelhantes aos da depressão em outros momentos da vida, esses sintomas são mais frequentes e intensos no período pós-parto, especialmente nas primeiras cinco semanas após o nascimento, quando ocorrem intensas mudanças hormonais, emocionais e sociais.

Para Abou-saleh *et al.* (1998), os efeitos da depressão pós-parto não se limitam à mãe o bebê, o parceiro e o núcleo familiar também são diretamente afetados. A ausência de tratamento pode prejudicar o vínculo entre mãe e filho, impactando negativamente o desenvolvimento emocional, cognitivo e comportamental da criança. Por isso, trata-se de



um problema de saúde pública, que exige políticas voltadas à prevenção, diagnóstico precoce e intervenção adequada.

Lewis *et al.* (2021) constataram que além das alterações hormonais típicas do período como a queda abrupta de estrogênio e progesterona —, diversos fatores biopsicossociais contribuem para o surgimento da depressão. Estilo de vida sedentário, alimentação inadequada, excesso de telas, isolamento social, sobrecarga de tarefas e idealizações irreais sobre a maternidade aumentam a vulnerabilidade da mulher nesse momento (Lewis *et al.*, 2021).

Camargo Jr *et al.* (2024) analisou que fatores psicológicos também são relevantes. Traumas na infância ou durante a gestação (como perdas, complicações obstétricas ou experiências negativas no parto) podem funcionar como gatilhos emocionais. A queda hormonal após o parto — principalmente de estrogênio e progesterona, que atingem seus níveis máximos na gravidez — provoca uma reconfiguração hormonal que pode afetar diretamente o equilíbrio emocional da mulher. Em alguns casos específicos, a reposição hormonal tem se mostrado eficaz sob orientação médica.

Para Bante *et al.* (2021), o histórico prévio de transtornos mentais, especialmente episódios de depressão antes da gestação, é um dos maiores fatores de risco. Mulheres com esse histórico são até 20 vezes mais propensas a desenvolver depressão pós-parto, e entre 30% e 40% dos casos podem se tornar persistentes se não forem tratados adequadamente. Por isso, é essencial que o acompanhamento pré-natal inclua uma avaliação da saúde mental da gestante.

O estudo de Hossain *et al.* (2024) constatou que fatores externos também influenciam fortemente: conflitos conjugais, falta de apoio familiar ou social, dificuldades financeiras, complicações durante a gestação e parto, além da sobrecarga emocional associada aos cuidados com o bebê. A predisposição genética e fatores transgeracionais — como histórico familiar de distúrbios de humor — também aumentam o risco.

Diante da complexidade de fatores envolvidos, este estudo destaca a importância de identificar os principais fatores de risco associados à depressão pós-parto e propor estratégias preventivas e intervenções contínuas. Garantir o bem-estar físico e emocional da puérpera é fundamental não apenas para sua recuperação, mas para a formação de um ambiente familiar saudável e para o desenvolvimento integral da criança. Investir na saúde mental materna é, portanto, um investimento na saúde de toda a sociedade.

OBJETIVO

O objetivo principal do estudo foi identificar e analisar os principais fatores associados à ocorrência da depressão pós-parto, bem como estratégias preventivas descritas nos estudos revisados.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura, com o objetivo de reunir e discutir conhecimentos atualizados sobre o tema. A seleção dos artigos foi realizada de forma não sistemática, com a análise de 37 publicações dos anos de 1998 a 2024, extraídas das bases de dados: Web of Science, PubMed, BVS, Cochrane Library. Após a leitura e avaliação do conteúdo, 11 estudos foram selecionados por apresentarem maior relevância e adequação ao objetivo da pesquisa. Foram incluídos artigos, ensaios clínicos, estudos transversais disponíveis em português e inglês. Utilizaram-se os descritores “postpartum depression”, “mental illness” e “mental health”, isoladamente ou combinados. Excluíram-se estudos sem relação direta com os objetivos da pesquisa, meta-análises e revisões sistemáticas.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de Lewis *et al.* (2021) demonstrou que a intervenção de bem-estar resultou em uma redução significativa dos sintomas de depressão em comparação com os cuidados habituais. Além disso, a intervenção de exercício físico reduziu de forma significativa o estresse percebido. Diante dos benefícios para a saúde geral e do impacto positivo sobre o estresse, foi recomendada a integração de exercícios e intervenções de bem-estar nos cuidados pós-parto.

No contexto do artigo de Bante *et al.* (2021), alguns fatores como estado civil, classificação econômica, presença de doenças, sinais de perigo durante a gravidez, eventos de risco de vida e insegurança alimentar mostraram-se significativamente associados a essa condição. No geral, uma em cada dez mulheres enfrentou essa enfermidade no estudo. Em vista de minimizar o risco, são essenciais intervenções nutricionais, identificação e tratamento precoce de doenças relacionadas à gravidez, além do rastreio e intervenções para problemas de saúde mental durante a gestação.

De acordo com Pan *et al.* (2023) O grupo de intervenção que participou de programas de mindfulness apresentou uma significativa redução nos níveis de estresse, ansiedade e depressão, tanto no período pré-natal quanto no pós-natal, em comparação ao grupo controle. Dessa forma, os resultados indicam que esses programas são eficazes na mitigação de distúrbios de humor e ansiedade.

Em vista disso, o estudo de Schnakenberg *et al.* (2021) mostrou que análises de neuroimagem estrutural e funcional realizadas imediatamente após o parto não mostraram diferenças significativas entre os grupos de depressão pós-parto, transtorno de adaptação e controle. Contudo, após 12 semanas, foi observada uma associação significativa entre a pontuação na Escala de Depressão Pós-Natal de Edinburgh e a Correlação Local Integrada, uma medida de conectividade funcional. Por fim, os resultados indicam que as alterações estruturais e funcionais cerebrais não podem ser usadas como biomarcadores precoces de depressão pós-parto ou transtorno de adaptação imediatamente após o parto.

Após um ano de intervenção, Hossain *et al.* (2024) demonstrou que as mães do grupo analisado demonstraram uma diminuição significativa nos sintomas depressivos. Nessa perspectiva, melhorias notáveis na qualidade de vida foram observadas, abrangendo aspectos como saúde física, bem-estar psicológico, relações sociais e ambiente. Além disso, as intervenções focadas na parentalidade, que associaram educação nutricional e apoio financeiro voltado ao desenvolvimento infantil, contribuíram para um aprimoramento geral da qualidade de vida materna.

Ainda, em artigo publicado por Abou-Saleh *et al.* (1998), foi identificado que mulheres no pós-parto têm alterações hormonais marcantes, com destaque para a relação entre baixa prolactina e depressão. A amamentação, ao elevar a prolactina, associou-se a menos sintomas depressivos, sugerindo efeito protetor. Tiroxina alta e histórico de depressão também se ligaram à maior gravidade do quadro.

O estudo de Faria *et al.* (2024) identificou que a dor moderada a intensa na gestação, especialmente entre adolescentes, está associada a mais sintomas depressivos. Em apoio a isso, a dispareunia e dor pélvica pós-intercurso mostraram forte correlação com depressão. Entretanto, a gestão da dor pode ser crucial para a saúde mental no período perinatal.

De acordo com os achados de Camargo Jr. *et al.* (2024), a prevalência de depressão pós-parto foi identificada em 36,8% das mulheres. No estudo, as diferentes formas de trauma infantil analisadas (abuso emocional, negligência emocional, abuso físico, negligência física e abuso sexual) mostraram uma associação significativa com a depressão pós-parto. Por conseguinte, o abuso emocional permaneceu associado à depressão pós-parto, mesmo após



a análise de todos os tipos de trauma infantil. Portanto, o trauma infantil é um indicador relevante para rastrear fatores de risco durante o acompanhamento obstétrico.

Conforme observado pelo estudo de Conceição *et al.* (2024) sobre a prevalência de depressão pós-parto, foi identificado que 16,3% da população amostral apresentou sintomas depressivos. Diante disso, 97,4% dessas mulheres relataram desrespeito ou abuso durante o parto, sendo que 66,3% mencionaram dois tipos de abuso. A ocorrência de abusos foi associada a um aumento significativo nas chances de desenvolvimento de depressão pós-parto. Desse modo, a análise evidenciou uma associação significativa entre o desrespeito durante o parto e a depressão subsequente, sugerindo que a forma de tratamento pode atuar como fator protetor contra sintomas depressivos nesse período de risco.

Houve demonstração por Séjourné *et al.* (2011) que mulheres no qual suas mães apresentaram depressão pós-parto exibiram maiores escores na Escala de Depressão Pós-natal de Edinburgh (EPDS). Portanto, a depressão prévia e a depressão pós-parto das avós foram fatores preditivos significativos desses sintomas, confirmando a hipótese de transmissão intergeracional da depressão pós-parto e destacando a importância de considerar a história familiar no manejo do risco clínico.

Além disso, Iranpour *et al.* (2016) apontou que mulheres com redução na qualidade do sono tiveram 3,34 vezes mais chance de desenvolver depressão pós-parto. Os fatores como latência do sono, distúrbios noturnos e disfunção diurna foram os mais prevalentes, indicando a importância de monitoramento do sono no puerpério.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a depressão pós parto não se trata de uma temática simples, pois seus determinantes envolvem interações complexas entre fatores biológicos, psicossociais, culturais e socioeconômicos. Diante disso, a prevenção e o tratamento eficazes da depressão pós-parto requerem uma abordagem multidisciplinar, que inclua suporte psicológico, físico e social. Sendo assim, as intervenções baseadas em consciência plena, exercício físico, educação nutricional e suporte financeiro são promissoras, mas é fulcral que essas abordagens considerem as condições de vida e experiências anteriores das mulheres, como histórico de trauma na infância e violência obstétrica. Por conseguinte, o suporte para melhorar a qualidade do sono e a promoção de um ambiente mais saudável e seguro durante o parto são componentes imprescindíveis para a redução dos riscos dessa condição e para a melhoria da qualidade de vida das mulheres puérperas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABOU-SALEH, M.T. et al. Hormonal aspects of postpartum depression. *Psychoneuroendocrinology*, v. 23, n. 5, p. 465-475, 1998. DOI: 10.1016/S0306-4530(98)00022-5.

BANTE, A. et al. Comorbid anxiety and depression: prevalence and associated factors among pregnant women in Arba Minch Zuria District, Gamo Zone, Southern Ethiopia. *PloS One*, v. 16, n. 3, e0248331, 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0248331.

CAMARGO JR, E.B. et al. Association between childhood trauma and postpartum depression among Brazilian puerperal women. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 32, 2024, e4170. DOI: 10.1590/1518-8345.6761.4170.



CONCEIÇÃO, H.N.; MADEIRO, A.P. Association between disrespect and abuse during labor and the risk of postpartum depression: a cross-sectional study. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 40, e00008024, 2024. DOI: 10.1590/0102-311XPT008024.

FARIA, B.B.A. et al. Association between pain during pregnancy and postpartum depressive symptoms in adolescent and adult women. *Pain Management Nursing*, v. 25, n. 6, p. e420-e427, 2024. DOI: 10.1016/j.pmn.2024.06.014.

HOSSAIN, S.J. et al. Parenting with nutrition education and unconditional cash reduces maternal depressive symptoms and improves quality of life: findings from a cluster randomised controlled trial in urban Bangladesh. *Global Health Action*, v. 17, n. 1, 2426784, 2024. DOI: 10.1080/16549716.2024.2426784.

IRANPOUR, S. et al. Association between sleep quality and postpartum depression. *Journal of Research in Medical Sciences*, v. 21, n. 1, p. 110, 2016. DOI: 10.4103/1735-1995.193500.

LEWIS, B.A. et al. Randomized trial examining the effect of exercise and wellness interventions on preventing postpartum depression and perceived stress. *BMC Pregnancy and Childbirth*, v. 21, n. 1, p. 785, 2021. DOI: 10.1186/s12884-021-04257-8.



IMPACTOS DA OBESIDADE NA SARCOPENIA: DESAFIOS ATUAIS E AVANÇOS

¹Eduardo Bello Bertin

²Vinícius Eugenio Yokoy

³Letícia Palmeira Dias de Souza

⁴Isabella Victoria Garcia Bressan

⁵Arthur Jordão de Paula

⁶Renata Aparecida Elias Dantas

¹Centro Universitário de Brasília, CEUB, Brasília, DF, Brasil.

Área temática: Medicina.

Resumo: O presente estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura, cujo objetivo foi analisar o impacto da obesidade na progressão e gravidade da sarcopenia em adultos. Utilizou-se a estratégia PICO para a formulação da pergunta de pesquisa e seleção de estudos nas bases PubMed, SciELO e BVS, com os descritores “sarcopenia” e “obesity”, restringindo-se a publicações entre 2020 e 2024. Foram incluídos 10 estudos clínicos com adultos acima de 20 anos. Os achados indicam que a obesidade sarcopênica agrava a perda funcional, eleva o risco de quedas e está associada a alterações metabólicas e inflamatórias relevantes. Critérios diagnósticos heterogêneos dificultam a padronização de condutas clínicas. Ademais, estratégias combinadas, como restrição calórica moderada, maior ingestão proteica e prática regular de atividade física, mostraram-se eficazes na melhora da composição corporal e funcionalidade. A suplementação de vitamina D pode exercer efeito preventivo; contudo, isoladamente, não se mostra suficiente para tratamento. Dessa forma, conclui-se que o manejo da obesidade sarcopênica deve ser multidimensional, envolvendo avaliação clínica, suporte nutricional, atividade física e políticas públicas adaptadas ao contexto populacional.

INTRODUÇÃO

A obesidade sarcopênica, caracterizada pela coexistência de excesso de gordura corporal e perda de massa muscular, tem aumentado sua prevalência entre adultos e idosos, comprometendo a funcionalidade e elevando o risco de quedas, hospitalizações e mortalidade (Teixeira et al., 2024; Nascimento et al., 2024). Sedentarismo, baixa ingestão proteica, deficiência de vitamina D e alterações hormonais associadas ao envelhecimento são fatores determinantes para sua progressão (Jia et al., 2022; Casagrande et al., 2022). Com isso, torna-se evidente a complexa interação entre metabolismo energético e integridade muscular, ressaltando a necessidade de abordagens terapêuticas que sejam coerentes às múltiplas dimensões da doença.

Intervenções combinadas que incluem dieta hipocalórica com ingestão adequada de proteínas, atividade física regular e suplementação de vitamina D, demonstram efeitos positivos (Yin, Liu e Välimäki, 2023). Todavia, a suplementação isolada de vitamina D para tratamento não se mostrou eficaz no tratamento, especialmente em indivíduos com alto percentual de gordura, o qual reduz sua biodisponibilidade (Jabbour et al., 2022).

Além disso, a heterogeneidade nos critérios diagnósticos, associada às desigualdades socioeconômicas, dificulta o manejo clínico, especialmente em países de baixa e média renda (Frisoli Jr. et al., 2023; Daskalopoulou et al., 2020). Nessa perspectiva, o uso de



biomarcadores clínicos e funcionais tem se mostrado essencial para o diagnóstico e acompanhamento da condição (Brunani et al., 2024; Nascimento et al., 2024).

OBJETIVO

Analisar a tendência sarcopênica em adultos obesos, buscando compreender os mecanismos envolvidos nessa relação e suas implicações para a progressão da condição, seu prognóstico clínico e o desenvolvimento de novos avanços terapêuticos.

METODOLOGIA

O atual estudo consiste em uma revisão integrativa de literatura fundamentada na análise de pesquisas clínicas. Para tal, foi utilizada a estratégia PICO para formulação da pergunta de pesquisa, sendo P (População) = adultos com sarcopenia, de ambos os sexos; I (Intervenção) = presença de obesidade; C (Comparação) = pacientes não obesos, com sarcopenias; O (Desfecho) = aumento da gravidade ou progressão da sarcopenia; resultando na seguinte pergunta norteadora: "Como a obesidade impacta a gravidade ou progressão da sarcopenia em adultos?". Desse modo, os artigos e trabalhos científicos utilizados foram selecionados nas bases de dados PubMed, SciELO e BVS, utilizando os termos de pesquisa "sarcopenia" e "obesity" como palavras-chave e restringindo-se aos idiomas português e inglês. Foram selecionados apenas estudos clínicos publicados nos últimos cinco anos, entre 2020 e 2024, que atenderam aos critérios estabelecidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A obesidade sarcopênica tem apresentado crescente prevalência em diferentes grupos, especialmente entre idosos (Yin, Liu e Välimäki, 2023). No que tange à sua definição e diagnóstico, Frisoli Jr. et al. (2023) destacam que diferentes critérios diagnósticos influenciam diretamente na prevalência da condição e na associação com a fragilidade física, o que dificulta a comparação entre estudos e a padronização de condutas, principalmente quando a sarcopenia está associada à obesidade. Por outro lado, Daskalopoulou et al. (2020) enfatizam que fatores socioeconômicos e culturais interferem nos índices de sarcopenia e obesidade, principalmente em países de baixa e média renda, o que requer abordagens contextualizadas e políticas públicas específicas.

Casagrande et al. (2022) identificaram prevalência expressiva de obesidade sarcopênica entre mulheres idosas, revelando que esse grupo, particularmente, se encontra mais vulnerável devido à menor mobilidade e participação em atividades físicas. Além disso, Daskalopoulou et al. (2020) indicam que a menopausa agrava a condição, devido à redução dos níveis de estrogênio – o anabolismo muscular sofre redução considerável, ao passo que a gordura corporal aumenta.

Do ponto de vista funcional, Teixeira et al. (2024) observaram que mulheres idosas com obesidade sarcopênica apresentaram desempenho inferior em testes de força muscular específica e funcionalidade, comparadas às que possuíam obesidade ou sarcopenia isoladamente. Isso aponta que a sobreposição das duas condições agrava o comprometimento físico, estabelecendo um ciclo vicioso de inatividade e perda de função muscular. Além dos impactos funcionais, a obesidade sarcopênica está ligada a alterações metabólicas e inflamatórias, como resistência à insulina e elevação da proteína C reativa (Nascimento et al., 2024).

Sendo assim, estratégias têm sido investigadas para mitigar os efeitos da obesidade sarcopênica. Yin, Liu e Välimäki (2023) demonstraram que uma intervenção dietética com



redução calórica (12%) e aporte proteico adequado, aliada a técnicas de mudança de comportamento, resultou em perda de peso e melhora funcional, embora sem ganhos significativos na massa muscular. Carvalho et al. (2024) destacaram que baixos níveis de atividade física aumentam significativamente o risco da condição. Portanto, o manejo da obesidade sarcopênica requer ações combinadas, envolvendo alimentação, exercício físico e suporte comportamental.

Jia et al. (2022) indicam que níveis adequados de vitamina D, em conjunto com maior prática de atividade física, foram protetores contra o desenvolvimento da condição de obesidade sarcopênica, especialmente entre homens, que costumam apresentar maior taxa de deficiência da vitamina. Entretanto, quanto ao tratamento com vitamina D, o estudo de Jabbour et al., 2022, revela que apesar da vitamina D ser fundamental para melhorar força muscular e desempenho físico ao estimular a síntese proteica muscular, sua suplementação isolada não foi suficiente para evitar a sarcopenia em idosos obesos. Isso se explica pela alta quantidade de gordura corporal, que pode sequestrar parte da vitamina D suplementada ao tecido adiposo, reduzindo sua biodisponibilidade sistêmica.

Por fim, Nascimento et al. (2024) demonstraram que condições relacionadas à composição corporal, como a obesidade sarcopênica, estão associadas a alterações em biomarcadores glicêmicos, lipídicos e inflamatórios, evidenciando a complexidade clínica da condição e sua interface com o risco cardiometabólico. Sabe-se que essa condição aumenta o risco de quedas, fraqueza muscular, e limita a capacidade de realizar atividades da vida diária, com impacto significativo na autonomia e qualidade de vida (Teixeira et al., 2024; Frisoli Jr. et al., 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obesidade contribui para a progressão da sarcopenia ao intensificar a perda de massa e força muscular, configurando o quadro de obesidade sarcopênica. Fatores como sedentarismo, baixa ingestão de proteínas e deficiência de vitamina D são determinantes para esse agravamento (Jia et al., 2022). Estratégias combinadas que envolvam dieta adequada, exercício físico e suporte comportamental, têm mostrado bons resultados no controle da condição (Yin, Liu e Välimäki, 2023).

Dessa forma, é essencial adotar abordagens individualizadas e integradas para o manejo da obesidade sarcopênica, contemplando intervenções nutricionais, programas de atividade física supervisionados e acompanhamento clínico contínuo. Acima disso, políticas públicas que promovam o envelhecimento saudável e o acesso a recursos de saúde são essenciais para prevenir e minimizar os impactos dessa condição na população adulta e idosa, cuja prevalência tem se intensificado. Consta-se que futuras pesquisas são necessárias para desenvolver protocolos terapêuticos mais eficazes e compreender melhor os mecanismos fisiopatológicos envolvidos.

Palavras-chave: Biomarcadores; Exercício; Idosos; Obesidade; Sarcopenia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRUNANI, A. et al. Muscle strength and phase angle are potential markers for the efficacy of multidisciplinary weight-loss program in patients with sarcopenic obesity. **Journal of Clinical Medicine**, v. 13, n. 17, p. 5237, 2024.

CARVALHO, E. S. et al. Prevalence of sarcopenic obesity in women and its association with



level of independent physical activity combined with sedentary behavior. **Menopause (New York, N.Y.)**, v. 31, n. 11, p. 966–972, 2024.

CASAGRANDE, M. L. et al. Sarcopenia, obesity and sarcopenic obesity among community-dwelling and institutionalized female older women in Caxias do Sul, Brazil. **ABCS Health Sciences**, v. 47, p. e022215, 2022.

DA COSTA TEIXEIRA, L. A. et al. Analysis of body composition, functionality and muscle-specific strength of older women with obesity, sarcopenia and sarcopenic obesity: a cross-sectional study. **Scientific Reports**, v. 14, n. 1, p. 24802, 2024.

DASKALOPOLOU, C. et al. Factors related with sarcopenia and sarcopenic obesity among low- and middle-income settings: the 10/66 DRG study. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, p. 20453, 2020.

FRISOLI, A. JR. et al. Sarcopenic obesity definitions and their associations with physical frailty in older Brazilian adults: data from the SARCOS study. **Archives of Endocrinology and Metabolism**, v. 67, n. 3, p. 361–371, 2023.

JABBOUR, J. et al. Effect of high dose vitamin D supplementation on indices of sarcopenia and obesity assessed by DXA among older adults: a randomized controlled trial. **Endocrine**, v. 76, n. 1, p. 162–171, 2022.

JIA, S. et al. Sex differences in the association of physical activity levels and vitamin D with obesity, sarcopenia, and sarcopenic obesity: a cross-sectional study. **BMC Geriatrics**, v. 22, n. 1, p. 898, 2022.

NASCIMENTO, G. M. et al. Prevalence of body composition phenotypes and their associations with glycemic, lipidic, and inflammatory biomarkers: a population-based study. **Cadernos de Saúde Pública** v. 40, n. 5, p. e00109823, 2024.

YIN, Y.-H.; LIU, J. Y. W.; VÄLIMÄKI, M. Dietary behaviour change intervention for managing sarcopenic obesity among community-dwelling older people: a pilot randomised controlled trial. **BMC Geriatrics**, v. 23, n. 1, p. 597, 2023.



O PAPEL DA ENFERMAGEM NA REABILITAÇÃO PULMONAR DE PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA

¹Hygo Marcus Da Silva Barreto

²Aline Freire Falcão

¹ Centro Universitário de João Pessoa. João Pessoa, Paraíba, Brasil ² Centro Universitário de João Pessoa. João Pessoa, Paraíba, Brasil

Área temática: Enfermagem

Resumo: Objetivos: Analisar o papel da enfermagem na reabilitação pulmonar de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, destacando as principais intervenções e estratégias que contribuem para a melhoria da capacidade funcional e qualidade de vida desses pacientes. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, realizada por meio de busca na Biblioteca Virtual em Saúde, foram utilizando os descritores: "Cuidados de Enfermagem", "Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica" e Promoção da Saúde. **Resultados e Discussão:** Foi possível compreender a atuação do enfermeiro no cuidado a pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), destacando intervenções estruturadas que englobam o monitoramento contínuo, a consulta de enfermagem e ações educativas. **Considerações finais:** As práticas contínuas e estruturadas de enfermagem são fundamentais no cuidado a pacientes com DPOC, promovendo a redução de complicações e o bem-estar emocional. O trabalho alcançou seu objetivo ao identificar intervenções relevantes para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, apesar das dificuldades na seleção e síntese das informações. Por fim, reforça-se a importância de práticas baseadas em evidências e a necessidade de mais pesquisas para apoiar a criação de protocolos que garantam um cuidado integral e humanizado, valorizando a enfermagem no manejo da DPOC.

INTRODUÇÃO

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma condição respiratória progressiva e irreversível, caracterizada pela obstrução crônica das vias aéreas, resultando em sintomas como dispneia, tosse persistente e produção de muco. Globalmente, a DPOC é a terceira principal causa de morte, com mais de 3 milhões de óbitos anuais, sendo que mais de 80% dessas mortes ocorrem em países de baixa e média renda, onde o acesso a estratégias de prevenção e tratamento é limitado (Brasil, 2021).

Segundo Pedrosa *et al.*, (2024) a reabilitação pulmonar é uma intervenção terapêutica multidisciplinar que visa melhorar a capacidade funcional, reduzir sintomas e aprimorar a qualidade de vida de pacientes com DPOC. Programas de reabilitação pulmonar, que incluem exercícios físicos supervisionados, educação em saúde e suporte psicossocial, têm demonstrado benefícios significativos, como aumento da tolerância ao esforço, redução da dispneia e melhora na resposta imune.

Nesse contexto, a enfermagem desempenha um papel crucial na implementação e condução desses programas. Enfermeiros especializados são responsáveis por avaliar as necessidades individuais dos pacientes, planejar e executar intervenções personalizadas, monitorar a evolução clínica e promover a educação em saúde. Estudos indicam que



intervenções de enfermagem focadas na capacitação para o autocuidado e na adesão ao tratamento contribuem para a redução de readmissões hospitalares e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com DPOC (Carezoli *et al.*, 2025).

Diante da alta prevalência da DPOC e dos desafios associados ao seu manejo, é fundamental compreender e valorizar o papel da enfermagem na reabilitação pulmonar. Assim, justifica-se a importância deste estudo ao investigar a atuação do enfermeiro na reabilitação pulmonar de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva, com base em literatura atual, visando promover práticas fundamentadas em evidências para estudantes e profissionais de enfermagem que buscam a integralidade do cuidado.

OBJETIVO

Analisar o papel da enfermagem na reabilitação pulmonar de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, destacando as principais intervenções e estratégias que contribuem para a melhoria da capacidade funcional e qualidade de vida desses pacientes.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, que consiste em uma análise sistemática de materiais publicados sobre um tema específico, com o objetivo de organizar, avaliar criticamente e sintetizar o conhecimento existente. A revisão de literatura permite fundamentar o problema de pesquisa, identificar lacunas no conhecimento e contextualizar o estudo em desenvolvimento (Marconi ; Lakatos, 2017).

A coleta de dados foi realizada em maio de 2025, por meio de consultas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), abrangendo as bases MEDLINE, BDENF (Enfermagem) e LILACS. Foram utilizados os descritores “Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica” AND “Cuidados de Enfermagem” AND “Promoção da Saúde”.

Foram definidos como critérios de inclusão artigos científicos publicados entre 2020 e 2025, disponíveis em português ou inglês, que abordassem especificamente os cuidados de enfermagem e a promoção da saúde em pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, com foco nas intervenções de Enfermagem.

Os critérios de exclusão abrangeram artigos duplicados, opiniões de especialistas e publicações fora do período estabelecido e tese de mestrados. A análise dos resultados e discussão concentrou-se na literatura selecionada, inicialmente caracterizando a amostra em quadro com a distribuição dos artigos por título, ano de publicação, base de dados, intervenções de Enfermagem, resultados alcançados, categorizados e discutidos posteriormente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos estudos selecionados, foi possível compreender a atuação do enfermeiro no acompanhamento de pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, destacando não apenas o monitoramento clínico, mas também a condução da reabilitação pulmonar, as intervenções e as principais dificuldades e potencialidades dessa prática no cotidiano dos serviços de saúde.

Quadro 1 – Caracterização dos artigos incluídos (Título, Ano de publicação, base de



dados, Intervenções de Enfermagem e Resultados alcançados. João Pessoa, Paraíba, Brasil, 2025. (N = 3)

Título	Ano de publicação	Base de dados	Intervenções de Enfermagem	Resultados alcançados
Avaliando o Impacto da Abordagem de Enfermagem de Análise de Modos de Falha e Efeitos nas Complicações de Pacientes com DPOC com Insuficiência Respiratória	2025	MEDLINE	- Monitoramento e gerenciamento de complicações comuns (ex.: lesões faciais, boca seca, obstrução de catarro, flatulência, bronquiectasia e pneumonia por aspiração). - Intervenções focadas na redução de eventos adversos e melhoria da adesão ao tratamento.	- Redução significativa das complicações mencionadas no grupo comparado ao grupo de cuidados habituais. - Redução expressiva da ansiedade e depressão (SAS e SDS).
Efeitos da intervenção contínua de enfermagem combinada com orientação de treinamento respiratório para melhorar o efeito de reabilitação e a capacidade de autocuidado de pacientes idosos com DPOC.	2024	MEDLINE	- Supervisão contínua e personalizada dos pacientes por enfermeiros. - Orientação prática em treinamento respiratório. - Educação em saúde para manejo da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e melhoria da adesão às terapias.	- Melhoria da função pulmonar (aumento do Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo - VEF1 e Capacidade Vital Forçada - CVF). - Qualidade de vida elevada (escores superiores nos indicadores de qualidade de vida). - Autonomia funcional (melhora no índice de Barthel para atividades da vida diária - índice MBI e na escala de Avaliação da Capacidade de Autocuidado - ESCA). - Aumento do bem-estar subjetivo (escores superiores na escala de felicidade da Memorial University of Newfoundland - MUNSH). - Redução de emoções negativas e maior autocuidado.



A eficácia do cuidado contínuo de enfermagem para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica: um protocolo de ensaio clínico randomizado	2021	MEDLINE	- Implementação do cuidado contínuo baseado na teoria da Informação, Conhecimento, Atitude e Prática (IKAP). - Educação e capacitação dos pacientes sobre manejo da doença. - DPOC para melhorar adesão e autocuidado. - Acompanhamento regular para promover mudanças positivas em hábitos e comportamentos relacionados à saúde,	- Melhoria da qualidade de vida avaliada pelo Questionário Respiratório de St. George (St. George's Respiratory Questionnaire - SGRQ). - Maior conhecimento e atitude positiva dos pacientes em relação à sua condição e estado geral dos pacientes com DPOC.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2025.

Inicialmente, foram encontrados 225 artigos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Após a aplicação do recorte temporal entre 2020 e 2025 e a seleção dos idiomas português e inglês, o número de artigos foi reduzido para 48, sendo 46 publicados em inglês e 2 em português. Dos 48 artigos selecionados, apenas 3 trabalhos atenderam aos critérios para a análise final. Esses artigos foram publicados nos anos de 2021, 2024 e 2025, sendo a base de dados encontrado como maioria MEDLINE. Representando, respectivamente, 1 trabalho por ano. Essa análise evidencia a predominância de publicações em inglês e o recorte temporal específico entre os anos analisados.

Com base na análise dos artigos selecionados, observa-se que intervenções de enfermagem contínuas e estruturadas desempenham papel fundamental na melhoria da qualidade de vida de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Estratégias como a aplicação da Análise de Modos de Falha e Efeitos (FMEA) para prevenção de complicações, combinada com monitoramento e ações proativas, têm demonstrado eficácia significativa na redução de eventos adversos, além de promover a diminuição dos sintomas emocionais como ansiedade e depressão, aumentando o nível de esperança e o bem-estar geral dos pacientes (Guo *et al.*, 2025).

De acordo com Zhang (2024), a combinação da intervenção contínua de enfermagem com orientação de treinamento respiratório em pacientes idosos com DPOC promove melhorias na função pulmonar, na capacidade de autocuidado e no bem-estar subjetivo. Essa abordagem destaca a importância do suporte educacional e prático oferecido por enfermeiros para fortalecer a autonomia do paciente e otimizar os resultados da reabilitação.

Homens *et al.*, (2021) apontam que o cuidado contínuo baseado na teoria da Informação, Conhecimento, Atitude e Prática (IKAP) é eficaz para promover mudanças positivas no comportamento e na qualidade de vida dos pacientes com DPOC. Esse modelo reforça a necessidade de intervenções de enfermagem que considerem o paciente de forma integral, atendendo às suas demandas físicas, emocionais e educacionais, sendo fundamental no manejo das doenças crônicas.



CONCLUSÃO

Diante das evidências apresentadas, destaca-se a relevância das práticas de enfermagem contínuas e estruturadas no cuidado aos pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). A adoção de intervenções como a Análise de Modos de Falha e Efeitos (FMEA) e a orientação de treinamentos respiratórios demonstra não apenas a capacidade da enfermagem em atuar na redução de complicações clínicas, mas também na promoção do bem-estar psicológico e emocional, fortalecendo a qualidade de vida dos pacientes. Essas estratégias evidenciam o papel crucial da enfermagem como agente transformador, integrando ações proativas e humanizadas à prática assistencial.

Pode-se afirmar que o objetivo do trabalho foi alcançado, uma vez que foi possível identificar e discutir as principais intervenções de enfermagem no manejo da DPOC, destacando sua relevância na melhoria da qualidade de vida e na redução de complicações. Contudo, algumas dificuldades foram enfrentadas durante a elaboração do trabalho, como a seleção de artigos relevantes em meio ao vasto número de publicações disponíveis e a necessidade de sintetizar informações complexas de maneira clara e objetiva.

Diante disso, as contribuições dos estudos reforçam a importância de práticas baseadas em evidências no campo da enfermagem, especialmente no cuidado a pacientes com condições crônicas. Além disso, destaca a necessidade de mais investigações que explorem o impacto de intervenções específicas na DPOC, proporcionando subsídios para a criação de protocolos assistenciais que promovam um cuidado integral e humanizado. Dessa forma, o trabalho contribui para o avanço do conhecimento e a valorização da enfermagem como um pilar fundamental na assistência à saúde.

Palavras-chave: Cuidados de Enfermagem; Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; Promoção da Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. 21/11 – Dia Mundial da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC. **Biblioteca Virtual em Saúde**, 2021.

CAREZOLLI, Fernando Rezende *et al.* Atuação do enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação aos utentes com DPOC: protocolo de revisão de escopo. **Revista Contemporânea**, v. 5, n. 2, p. e7534-e7534, 2025.

GUO, Xue; *et al.* A eficácia do cuidado contínuo de enfermagem para pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica: um protocolo de ensaio clínico randomizado. **Medicine (Baltimore)**, v. 100, n. 2, p. e23974, 15 jan. 2021.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

PEDROSA, Pietro Henrique Benevides; *et al.* Enfermagem na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC): abordagem e desafios para promover a qualidade de vida. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 405–419, 2024.



XIE, Deli; ZHENG, Xiuyun; PENG, Lingcong. Avaliando o impacto da abordagem de enfermagem de análise de modos de falha e efeitos nas complicações de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica com insuficiência respiratória. **British Journal of Hospital Medicine (London)**, Reino Unido, v. 86, n. 4, p. 1–16, 2025.

ZHANG, Miao. Efeitos da intervenção contínua de enfermagem combinada com orientação de treinamento respiratório na melhoria do efeito de reabilitação e da capacidade de autocuidado de pacientes idosos com DPOC. **Alternative Therapies in Health and Medicine**, v. 30, n. 12, p. 242–248, dez. 2024.



ENFRENTAMENTO FAMILIAR NO CÂNCER PEDIÁTRICO EM ESTÁGIO TERMINAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA

¹Giovanna de Abreu Castro

²Ana Maria Nascimento Marques Amorim

³Maria Eduarda Cabral Mergulhão de Souza

⁴Maria Luiza Marques Mateus Moreira

⁵Rafaella Christine Tenório de Arruda Macêdo

⁶Matheus Nascimento Marques Amorim

¹Faculdade Pernambucana de Saúde. Recife, Pernambuco, Brasil; ²Faculdade Pernambucana de Saúde. Recife, Pernambuco, Brasil; ³Faculdade Pernambucana de Saúde. Recife, Pernambuco, Brasil; ⁴Faculdade Pernambucana de Saúde. Recife, Pernambuco, Brasil; ⁵Universidade Federal de Pernambuco. ⁶Universidade Federal de Pernambuco.

Área temática: Cuidados Paliativos

Resumo: O câncer pediátrico em estágio terminal representa um desafio significativo para as famílias, que enfrentam não apenas a progressão irreversível da doença, mas também profundas repercussões emocionais, sociais e espirituais. Este estudo teve como objetivo identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos familiares de crianças e adolescentes com câncer terminal, bem como reunir estratégias de apoio utilizadas pela equipe multiprofissional de saúde. A metodologia adotada foi uma revisão sistemática da literatura, com busca realizada nas bases BVS, SciELO, LILACS e PubMed, utilizando descritores em português, inglês e espanhol. Foram incluídos estudos publicados nos últimos dez anos que abordassem especificamente o enfrentamento familiar e os cuidados paliativos em oncologia pediátrica terminal. Os resultados apontam que os familiares enfrentam sofrimento emocional intenso, dificuldades na aceitação do prognóstico, sobrecarga física e financeira, além de dilemas éticos relacionados à comunicação sobre a terminalidade. Estratégias como fé, espiritualidade, apoio social e reorganização da rotina familiar são frequentemente utilizadas. A equipe de saúde, especialmente enfermeiros, desempenha papel crucial ao oferecer suporte emocional por meio de escuta ativa, linguagem lúdica e incentivo à participação nos cuidados. Conclui-se que o enfrentamento familiar do câncer pediátrico terminal exige uma abordagem centrada na família, que considere suas necessidades emocionais, sociais e espirituais. É essencial que profissionais da saúde atuem com empatia e promovam intervenções individualizadas, fortalecendo o apoio integral às famílias nesse momento delicado.

INTRODUÇÃO

As doenças oncológicas na infância e na adolescência são um conjunto diversificado de neoplasias, nos quais células anormais crescem e se multiplicam de maneira descontrolada em diferentes partes do corpo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017). No Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o número de casos novos de câncer infanto-juvenil para o triênio de 2023 a 2025, é de aproximadamente 7.930, sendo o câncer



infantil considerado a primeira causa de morte por doenças, e a segunda causa em óbito em geral (INCA, 2022).

Em comparação com o câncer no adulto, as formas mais frequentes na infância e na adolescência (0 a 19 anos) são aquelas que afetam as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação, como as leucemias, linfomas e tumores do sistema nervoso central (TRAZZI, 2022). Embora os avanços técnico-científicos em oncologia tenham levado a índices significativos de cura e sobrevida, nem todas as crianças e adolescentes alcançaram esses resultados. O câncer nesta população em estágio terminal é caracterizado pela progressão da doença sem possibilidade de cura, exigindo cuidados voltados ao alívio dos sintomas e à melhoria da qualidade de vida da criança (GUIMARÃES *et al.*, 2021).

Os achados científicos e o cenário epidemiológico não revelam apenas um desafio na saúde pública, mas também o impacto profundo que o diagnóstico e o tratamento do câncer infanto-juvenil causam na dinâmica familiar. Apesar de a família estar profundamente envolvida no tratamento desta criança, ela frequentemente não está preparada, especialmente no aspecto psicológico, para lidar com todas as mudanças provocadas por um tratamento tão agressivo quanto o oncológico (SOUZA *et al.* 2021; GODINHO *et al.*, 2021).

A iminência da perda definitiva de um filho com câncer desafia profundamente a compreensão dos pais, tornando a aceitação um processo extremamente difícil e doloroso (SOUZA *et al.*, 2021; GUIMARÃES *et al.*, 2021). Diante do exposto, torna-se necessário identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos familiares durante o estágio terminal do câncer na população pediátrica e reunir as estratégias de apoio que são utilizadas pela equipe multidisciplinar de saúde.

OBJETIVO

Este estudo visou identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos familiares durante o estágio terminal do câncer na população pediátrica, como as dificuldades na compreensão sobre o prognóstico, o sofrimento emocional extremo, e a degradação física dos mesmos. Para além disso, buscou-se reunir as estratégias de apoio que são utilizadas pela equipe multidisciplinar de saúde. Por fim, o estudo pretende oferecer subsídios baseados em evidências para que profissionais possam melhorar o enfrentamento familiar, fortalecendo o apoio emocional e psicológico.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura e a busca dos artigos foi conduzida nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e PubMed, utilizando os descritores “câncer pediátrico”, “terminalidade”, “enfrentamento familiar” e “cuidados paliativos”, em português, inglês e espanhol. Inicialmente, foram encontrados 54 artigos. Após a leitura dos títulos e resumos, 20 estudos foram selecionados para leitura integral, dos quais 11 atenderam aos critérios de inclusão e foram incorporados à análise final da revisão sistemática. Foram incluídos artigos publicados nos últimos dez



anos, disponíveis em texto completo, que abordassem especificamente as dificuldades enfrentadas por familiares de crianças e adolescentes em fase terminal do câncer, bem como as estratégias de apoio empregadas pela equipe multiprofissional de saúde. Foram excluídos estudos que tratavam apenas da população adulta, relatos de casos isolados, resumos de eventos, teses, dissertações e publicações duplicadas. A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas: inicialmente, por meio da leitura dos títulos e resumos, seguida da leitura integral dos textos selecionados. Os dados extraídos dos artigos foram organizados e analisados de forma descritiva, buscando identificar as principais dificuldades relatadas pelas famílias, os recursos de enfrentamento utilizados e as intervenções propostas ou implementadas pelas equipes de saúde, visando subsidiar recomendações para a prática profissional e o fortalecimento do apoio emocional e psicológico aos familiares. O estudo seguiu a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, dispensando aprovação ética por utilizar fontes públicas, mas garantindo o respeito aos direitos autorais e integridade das fontes consultadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As famílias de crianças em estágio terminal de câncer lidam com desafios complexos, principalmente a dificuldade em compreender e aceitar o prognóstico irreversível, somada ao temor da morte próxima de seu filho. Esse sofrimento emocional intenso se manifesta em sentimentos de desespero, ansiedade e tristeza profunda, agravados pela exaustão física decorrente dos cuidados contínuos e pela sobrecarga financeira (CAIRES *et al.*, 2024; POSSARLE, V. R *et al.*, 2024).

A comunicação acerca da terminalidade da enfermidade representa um aspecto delicado, já que muitos pais optam por não tratar do assunto na tentativa de “proteger” a criança, o que pode ocasionar dilemas éticos e emocionais (CAIRES *et al.*, 2024). Para lidar com esses desafios, as famílias recorrem a estratégias de adaptação, como a busca por esclarecimentos sobre a condição clínica, a solução prática de questões logísticas e o fortalecimento dos vínculos com redes de apoio social (ALVES *et al.*, 2016).

A fé e a espiritualidade surgem como pilares centrais para lidar com a incerteza, enquanto a reorganização das dinâmicas domésticas, como a divisão de tarefas entre cuidadores, ajuda a mitigar impactos psicossociais (ALVES *et al.*, 2016; GUIMARÃES *et al.*, 2021). Estudos indicam que as mães, principais cuidadoras, tendem a priorizar estratégias focadas no autocontrole emocional e na manutenção da rotina hospitalar, mesmo em detrimento do próprio bem-estar (RIBEIRO *et al.*, 2015).

O apoio da equipe multidisciplinar é fundamental para auxiliar as famílias nesse processo. Intervenções baseadas em comunicação empática, como a escuta ativa e a validação das emoções familiares, são essenciais para reduzir a sensação de isolamento. Enfermeiros utilizam estratégias como o incentivo à participação ativa nos cuidados paliativos e o uso de linguagem lúdica para facilitar a adaptação das crianças e familiares à nova realidade (CAIRES *et al.*, 2024).

A literatura recente aponta a necessidade de protocolos que integrem avaliações



periódicas do estado emocional dos cuidadores, associadas a intervenções personalizadas que considerem estágios específicos da doença (diagnóstico, tratamento, terminalidade). A criação de espaços para discussão ética entre equipes e famílias sobre limites terapêuticos e diretivas antecipadas é crucial para alinhar expectativas (GUIMARÃES *et al*, 2021).

Por fim, a ampliação de programas de suporte material, como auxílio financeiro, e simbólico, como grupos de apoio comunitários, mostra-se essencial para um enfrentamento mais equilibrado (CAIRES *et al.*, 2024).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta revisão integrativa da literatura evidenciou-se que o impacto emocional, a sobrecarga de cuidados e os desafios na comunicação são aspectos críticos que demandam atenção especial por parte dos profissionais de saúde. As famílias, por sua vez, recorrem a mecanismos como a busca por informações, o apoio social e a fé para lidar com a difícil realidade. O estudo reforça a importância de uma abordagem centrada na família, que considere as necessidades emocionais, sociais e espirituais de todos os seus membros. A equipe multidisciplinar desempenha um papel fundamental ao oferecer suporte, informações claras e um espaço seguro para que as famílias possam expressar seus sentimentos e angústias. Ressalta-se a importância de intervenções que considerem as necessidades específicas de cada família, fortalecendo o suporte emocional e a comunicação transparente. Por fim, destaca-se a necessidade de mais pesquisas para aprimorar práticas que favoreçam o enfrentamento familiar nessa fase tão delicada.

Palavras-chave: Apoio Familiar; Cuidados Paliativos; Neoplasia; Pediatria.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

ALVES, D. et al. *Espiritualidade e enfrentamento familiar em câncer pediátrico*. 2016. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2216-09732016000200009. Acesso em: 29 abril 2025

CAIRES, S. et al. *A fase terminal do filho com câncer: percepções dos profissionais hospitalares*. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/QGzms4PgH95dtLkZNQvVxsZ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 29 abril 2025

GUIMARÃES, C. A. DELLAZZANNA-ZANON, L. L. ENUMO, S. R. F. *Enfrentamento materno do câncer pediátrico em quatro fases da doença*. *Pensando Famílias*, Porto Alegre, v. 25, n. 2, p. 1-17, dez. 2021. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-494X2021000200007. Acesso em: 29 abril 2025

GODINHO, I. C. et al. *Aspectos psicológicos de pacientes pediátricos acometidos pelo câncer*. *Brazilian Journal of Health Review*, 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/22894>. Acesso em: 24 maio 2025.



INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). **Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil.** Rio de Janeiro: INCA, 2022.

Disponível em:

<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2023.pdf>.

Acesso em: 22 abril 2025.

Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. **Epidemiologia dos tumores da criança e do adolescente.** 2023. Disponível

em:

<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2023.pdf>.

Acesso em: 29 abril 2025

POSSARLE, V. R.; SCHERER, A. **Oncologia pediátrica: fase terminal.** Revista Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 2024. Disponível em:

<https://revistaft.com.br/oncologia-pediatria-fase-terminal/>. Acesso em: 24 maio 2025.

RIBEIRO, M. S. et al. **Câncer infantil: qualidade de vida do cuidador.** Revista Contemporânea, 2023. Disponível

em:

<https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/3866>. Acesso em: 22 abril 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamento Científico de Oncologia. **Atuação do pediatra: epidemiologia e diagnóstico precoce do câncer pediátrico.** Documento Científico, n. 1, mar. 2017. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/publicacoes/C-Doc-Cientifico-Oncologia-Epidemiol-30-mar-17.pdf. Acesso em: 29 abril 2025

SOUZA, J. A. et al. **Câncer infantil e impactos emocionais para a família: Uma revisão da literatura.** Research, Society and Development, v. 10, n. 10, e56101017931, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/17931/16583/230490>. Acesso em: 24 maio 2025.

TRAZZI, Gabriel Henrique Lemos. **Doença oncológica pediátrica: estratégias de enfrentamento do acompanhante nas diferentes fases do tratamento clínico.** 2022. Trabalho de Conclusão da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre, 2022. Disponível em:

<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/234972/001136877.pdf;jsessionid=FA771537969311593446C2638F2E7D03?sequence=1>. Acesso em: 29 abril 202



AVALIAÇÃO BROMATOLÓGICA COMO INSTRUMENTO DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO FARMACÊUTICA

¹ Daniela Borges Marquez Barbosa

² Letícia Cristina Alves de Sousa

³ Pamela Cristina Sousa Guardiano Reis Oliveira

¹Universidade Estadual de Goiás. Itumbiara, Goiás, Brasil; ²Universidade Estadual de Goiás. Itumbiara, Goiás, Brasil; ³Universidade Estadual de Goiás. Itumbiara, Goiás, Brasil.

Área temática: Bromatologia

Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre as práticas de avaliação bromatológica realizadas por acadêmicos do curso de Farmácia, como parte integrante da disciplina de Bromatologia. O objetivo foi proporcionar uma vivência que integrasse teoria e prática, a partir da análise físico-química de alimentos industrializados e in natura, reforçando a importância da qualidade e segurança alimentar. A metodologia envolveu a aplicação de técnicas laboratoriais para determinação de umidade, cinzas, lipídeos, proteínas e carboidratos em amostras reais, coletadas pelos próprios alunos. A experiência permitiu observar o desenvolvimento de habilidades analíticas, o fortalecimento da consciência crítica sobre o controle de qualidade de alimentos e a valorização da atuação do profissional farmacêutico no campo da alimentação e saúde pública. Os resultados demonstraram grande diversidade na composição dos alimentos e, em alguns casos, inconformidades com os dados de rotulagem. A discussão evidenciou a relevância da prática laboratorial para a consolidação do conhecimento teórico e a formação ética e técnica do futuro profissional. Conclui-se que a inserção de atividades práticas bem estruturadas no ensino de Bromatologia contribui significativamente para a formação integral do farmacêutico.

Palavras-chave: Alimentos, Análise físico-química, Ensino prático, Formação em saúde, Segurança alimentar.

INTRODUÇÃO

A Bromatologia, enquanto disciplina obrigatória no curso de Farmácia, tem papel fundamental na formação crítica e técnica deste profissional de saúde, ao abordar os aspectos qualitativos e quantitativos dos alimentos. Para além do conteúdo teórico, é na prática laboratorial que o discente vivencia os desafios e exigências da análise de alimentos. Considerando a relevância da segurança alimentar no contexto da saúde pública e a atuação farmacêutica nesse campo, este trabalho propõe apresentar um relato de experiência vivenciado por alunos de graduação, no qual realizaram análises bromatológicas como parte do processo formativo.

OBJETIVO

Relatar a experiência de aplicação prática de técnicas de análise bromatológica em alimentos diversos, destacando os aprendizados técnicos, os desafios enfrentados e os impactos na formação acadêmica e profissional dos estudantes de Farmácia.

METODOLOGIA



A atividade foi conduzida com alunos do 6º período do curso de Farmácia, no laboratório de Bromatologia da instituição. Os discentes formaram grupos e selecionaram diferentes alimentos para análise: carne moída bovina, leite pasteurizado, suco de uva e presunto. Foram seguidos métodos oficiais de análise físico-química, conforme a legislação vigente do Ministério da Agricultura e da Anvisa, com base nas metodologias clássicas: secagem em estufa para umidade, calcinação em mufla para cinzas, extração com éter para lipídeos (método Soxhlet) e determinação de proteína bruta (Kjeldahl), além do cálculo de carboidratos por diferença. Os resultados obtidos foram comparados aos valores de referência da rotulagem dos produtos e/ou dos dados da tabela de composição de alimentos (SIMPAN, 2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As aulas práticas de Bromatologia foram organizadas em uma sequência pedagógica semanal, na qual os discentes eram introduzidos, de forma progressiva, às metodologias clássicas de análise físico-química de alimentos. A cada semana, um novo parâmetro da composição centesimal era abordado, possibilitando uma construção gradual do conhecimento. Inicialmente, foram realizadas análises de umidade, por meio da secagem em estufa a 105 °C, procedimento fundamental para compreender a conservação e estabilidade dos alimentos, em consonância com Nascimento et al., 2024, que destacam a importância da umidade na deterioração microbiológica. Nas semanas seguintes, os alunos aplicaram o método de incineração em mufla para determinação de cinzas, seguido pela extração de lipídeos utilizando o método de Soxhlet. Conforme mencionado em estudo anterior (COSTA et al., 2022), esses métodos permitem a identificação de constituintes minerais e energéticos com grande precisão, sendo essenciais para o controle de qualidade. Posteriormente, foi realizada a determinação de proteínas pelo método de Kjeldahl, cuja aplicação exigiu atenção rigorosa às etapas de digestão, destilação e titulação, reforçando o rigor analítico necessário ao farmacêutico. Por fim, os carboidratos foram estimados por diferença, completando a análise centesimal ao final do semestre letivo. A participação dos alunos foi crescente, evidenciando o desenvolvimento de habilidades técnicas e maior domínio das boas práticas laboratoriais. Inicialmente, observou-se insegurança e dúvidas frequentes quanto à manipulação de equipamentos e vidrarias, mas ao longo das atividades, houve notável autonomia e cooperação entre os membros dos grupos. Essa evolução prática validou a proposta metodológica da disciplina, baseada na aprendizagem significativa de Ausubel, pois os alunos passaram a relacionar os dados obtidos em laboratório com os conceitos estudados em aula teórica. Os resultados das análises também suscitaram debates relevantes. As amostras dos alimentos analisado apresentaram composições compatíveis com os dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO), sendo os alimentos ultraprocessados, como o presunto, confirmado como de pior qualidade nutricional. Tal fato reforçou a importância da alimentação natural e não processada, conforme apontado por estudos do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014). Essas comparações fortaleceram a criticidade dos discentes e destacaram a relevância da análise laboratorial como ferramenta de vigilância em saúde pública. Em síntese, a rotina prática, sustentada em metodologias oficiais e literatura científica atualizada, demonstrou-se eficaz não apenas para consolidar os conhecimentos técnicos da disciplina, mas também para sensibilizar os estudantes quanto ao papel social do farmacêutico na promoção da segurança alimentar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da atividade prática em Bromatologia mostrou-se essencial para



aproximar os conteúdos teóricos da realidade profissional. A experiência favoreceu o aprendizado ativo, a integração entre ciência e prática e a reflexão sobre o papel do farmacêutico na segurança alimentar. A vivência em laboratório contribuiu para a formação técnica, ética e crítica dos estudantes, valorizando a interdisciplinaridade e a importância do controle de qualidade dos alimentos como estratégia de promoção da saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Guia alimentar para a população brasileira** / ministério da saúde, secretaria de atenção à saúde, departamento de atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : ministério da saúde, 2014.

COSTA, Juliana de Abreu; SANTOS, Julliet Teixeira de Oliveira; BACELAR, Rafael Gomes Abreu; CARNEIRO, Rosana Martins; SILVA, Darlisson Escória Neri; NÓBREGA, Maria Marlúcia Gomes Pereira; MURATORI, Maria Christina Sanches. Bebida láctea fermentada com semente de chia e xarope de acerola: caracterização físico-química, microbiológica e sensorial. **Ciência Animal Brasileira**, Goiânia, v. 23, e72395E, 2022.

NASCIMENTO, Pedro César Andrade do; LOPES, Melissa Moser de Araújo; STAMFORD, Thayza Christina Montenegro; LEÃO, Viviane Lansky Xavier de Souza; RIBEIRO, Marisilda de Almeida; VASCONCELOS, Margarida Angélica da Silva. Efeitos do processamento térmico na composição nutricional e toxicidade de sementes de jaca. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 54, n. 4, e20230111, 2024.

SIMPAN. 2014. **Tabela brasileira de Composição de Alimentos-TACO/ NEPA**. UNICAMP.



IMPACTOS DA IMPLANTAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA RADIOLOGIA

¹Gabrielle Sousa de Oliveira

²Manuela Prestes Alves

³Telmo Laurence Acunha Solé Filho

⁴Raquel Pereira Janelli da Silva

¹Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil; ²Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil; ³Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil;

⁴Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil.

Área temática: Medicina.

Resumo: Introdução: A inteligência artificial vem contribuindo para a melhora de condutas médicas, na radiologia ela aprimora a velocidade de laudos e auxilia o profissional, porém sua base de dados ainda é limitada podendo gerar diagnósticos equivocados, ocasionando ansiedade em pacientes. Objetivo: O estudo visa discutir os benefícios e as adversidades encontradas na implementação da Inteligência Artificial na Radiologia. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura baseada em buscas no Google Acadêmico e SciELO, com foco nos benefícios e desafios da Inteligência Artificial na Radiologia. Foram incluídos estudos gratuitos, completos e publicados entre 2023 e 2025, resultando na seleção de 5 artigos. Resultados e discussão: A Inteligência Artificial na radiologia tem reduzido o tempo de emissão de laudos, permitindo aos profissionais mais atenção aos pacientes e maior agilidade em emergências. Também é eficaz na radiologia pediátrica, contribuindo para diagnósticos precoces e menor exposição à radiação. No entanto, ainda enfrenta limitações, como erros diagnósticos e a necessidade de bases de dados mais diversas e confiáveis para evitar vieses e garantir segurança no uso clínico. Conclusão: A Inteligência Artificial pode tornar os diagnósticos em radiologia mais rápidos, entretanto, sua eficácia depende do uso de bases de dados amplas e diversificadas para evitar vieses e garantir uma aplicação segura e ética.

INTRODUÇÃO

A inteligência artificial está transformando as condutas médicas, ela acelera diagnósticos, contribuindo para uma melhor eficiência dos profissionais. Na radiologia, sua implementação permite a detecção precoce de doenças, redução de erros auxiliando o profissional médico na tomada de decisões. No entanto, apesar dos benefícios, ainda há desafios a serem superados, como a qualidade e diversidade dos dados usados no treinamento dos algoritmos. Esta revisão de literatura aborda os avanços e as limitações encontradas na implementação da Inteligência Artificial na Radiologia.

OBJETIVO

O estudo visa explorar os benefícios e as adversidades encontradas na implementação da inteligência artificial na Radiologia.



METODOLOGIA

O estudo abordado é uma Revisão de Literatura, utilizou-se a base de coleta de dados do Google Acadêmico e do SciELO. Os estudos foram escolhidos de modo que a pergunta “Quais os benefícios e as adversidades encontradas na implementação da Inteligência Artificial na Radiologia?” fosse esclarecida, utilizou-se a combinação de palavras chaves com os operadores booleanos “AND” e “OR”. Os critérios de inclusão foram estudos de 2023 até 2025, disponibilidade gratuita e estudos pertinentes ao tema escolhido, os critérios de exclusão foram estudos incompletos e estudos que foram publicados fora do período selecionado, após análise foram selecionados 5 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sabe-se que com a Inteligência Artificial existe uma redução do tempo necessário para a emissão de laudos na radiologia, favorecendo os profissionais médicos, os quais podem dedicar mais atenção aos pacientes (ROSÁRIO et al., 2024). Essa otimização do tempo não apenas melhora o fluxo de trabalho, mas também contribui para uma atuação mais humanizada na prática clínica, permitindo ao radiologista focar mais na comunicação e orientação do paciente, aspectos inúmeras vezes afetados pelas longas jornadas de trabalho.

Além disso, segundo Idalino et al. (2024), essa nova tecnologia possui uma grande capacidade de lidar com situações de emergência, em seu estudo ele observou um aumento de 12% na taxa de detecção de hemorragias intracranianas em tomografias realizadas no setor de emergência, um avanço relevante para diagnósticos rápidos e precisos, agilizando o tempo de resposta do profissional que atua sob pressão e diversas vezes sozinho sem nenhum tipo de auxílio.

Essa tecnologia também tem se mostrado especialmente útil na radiologia pediátrica. Em pacientes com pouca idade, a IA contribui para o diagnóstico precoce de doenças raras e graves, possibilitando intervenções mais eficazes e seguras. Os avanços no aprendizado de máquina e no processamento de imagens já permitem que algoritmos apresentem níveis de precisão comparáveis aos dos radiologistas humanos em diversas situações clínicas. Isso favorece, entre outros benefícios, uma menor exposição das crianças à radiação, visto que a IA pode ajudar a evitar exames repetidos ou desnecessários, além de aprimorar a eficácia diagnóstica em populações vulneráveis (MELO et al., 2025).

Entretanto, mesmo com tantos avanços, ainda há certas limitações. Na pesquisa de Silva et al. (2025), o sistema de Inteligência Artificial identificou 132 casos de infecção nos lobos pulmonares, enquanto a confirmação por avaliação clínica e laboratorial apontou 129 casos reais. Esse tipo de erro, ainda que pequeno, pode gerar ansiedade e preocupação desnecessária nos pacientes, além de sobrecarregar os profissionais com verificações adicionais. De certa forma, ainda existem inúmeras barreiras a serem superadas, principalmente no que se refere à qualidade e diversidade dos dados utilizados no banco de dados. A limitação desses algoritmos podem gerar vieses, afetando negativamente a confiabilidade dos diagnósticos e levantando questões éticas e técnicas importantes (JUCÁ et al., 2024).

CONCLUSÃO

Portanto, a Inteligência Artificial tem grande potencial para tornar os diagnósticos em radiologia mais rápidos e precisos, entretanto, para garantir sua eficácia e segurança, é essencial que os sistemas sejam treinados com bases de dados amplas e diversificadas. Isso permite reduzir vieses, ampliar a aplicabilidade clínica e assegurar uma adoção ética



responsável da tecnologia.

Palavras-chave: Inteligência Artificial na Medicina; Medicina; Radiologia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ROSÁRIO, Débora Jesus do; COSTA NETO, Rogério; PINTO, Emanuel Vieira. Inteligência artificial na radiologia. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 5, p. 2938–2952, 2024. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/14009>. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i5.14009>.

IDALINO, C. C. P. et al. O uso da inteligência artificial na detecção e classificação de imagens em radiologia: desafios e avanços na implementação clínica. **Observatório de la Economía Latinoamericana**, [S. l.], v. 22, n. 12, p. e8270, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/oelv22n12-156>. DOI: <https://doi.org/10.55905/oelv22n12-156>.

JUCÁ, Jéssica Amaral Guimarães et al. O impacto da inteligência artificial na interpretação de exames de imagem e na prática clínica radiológica. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 11, p. 72–86, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i10.16393>. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i10.16393>.

MELO, André Cades Barbosa Paz Oliveira de et al. O papel da inteligência artificial na radiologia pediátrica: benefícios e desafios em estudos recentes. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 2121–2130, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v11i1.18013>. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v11i1.18013>.

DA SILVA, José Carlos Pena et al. **Revolução tecnológica no diagnóstico do câncer de mama: benefícios da inteligência artificial na análise por imagem**. Aracê, [S. l.], v. 1, p. 1484–1493, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.56238/arev7n1-089>. DOI: <https://doi.org/10.56238/arev7n1-089>.



PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS ÓBITOS POR EXPOSIÇÃO À FUMAÇA, AO FOGO E ÀS CHAMAS NA DÉCADA DE 2013 A 2023

¹Marcos Corrêa Franco

²Cristiane Inês Queiroz

³Deborah Borges Palis

⁴Lohan Gonçalves Santos

⁵Paulo Otávio Bizinotto

⁶Arthur Augusto Araújo

⁷Vinícius José de Oliveira

¹²³⁴⁵⁶⁷Faculdade Mais de Ituiutaba. Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil.

Área temática: Saúde Pública

Resumo: Este estudo objetivou analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por exposição à fumaça, ao fogo e às chamas no Brasil entre 2010 e 2023, com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e documental, que considerou variáveis como sexo, faixa etária, cor/raça, escolaridade, estado civil, local do óbito e unidade federativa. No período analisado, foram registrados 13.788 óbitos, com maior concentração nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os homens representaram a maioria das vítimas (66,2%), especialmente nas faixas etárias entre 30 e 59 anos. A população parda foi a mais atingida (43,8%), seguida da branca (40,8%), e os óbitos foram mais frequentes entre indivíduos com baixa escolaridade e pessoas solteiras. A maioria dos eventos fatais ocorreu em ambiente hospitalar (57,8%), seguido por domicílios e vias públicas. Os achados revelam que fatores estruturais e sociais, como habitação precária, acesso limitado a serviços de emergência e baixa escolaridade, elevam significativamente o risco de morte por queimaduras. Os dados também destacam a vulnerabilidade de crianças pequenas e idosos. Conclui-se que a mortalidade por queimaduras no Brasil reflete desigualdades sociais e falhas nas políticas preventivas e de assistência, sendo urgente a adoção de estratégias intersetoriais que promovam segurança, equidade e educação em saúde, especialmente para os grupos mais expostos e vulneráveis.

INTRODUÇÃO

As lesões térmicas representam um importante problema de saúde coletiva no Brasil, especialmente aquelas causadas por exposição ao fogo, fumaça e chamas. Trata-se de um agravo externo com alta letalidade, exigindo atenção imediata das políticas públicas. Entre 2015 e 2020, foram registrados 19.772 óbitos por queimaduras no país, evidenciando a gravidade da situação (Brasil, 2023). Esses eventos estão frequentemente associados a condições de vulnerabilidade, como moradias inadequadas, desastres ambientais e, principalmente, acidentes domésticos (Brasil, 2023). Além de causarem sofrimento individual, essas ocorrências geram impactos relevantes sobre o sistema de saúde, demandando ações preventivas e terapêuticas específicas.

O perfil das vítimas revela padrões sociodemográficos complexos. Embora o sexo masculino historicamente apresente maior incidência, estudos recentes mostram uma



redução dessa diferença entre os gêneros (Fontana et al., 2020). Jovens adultos, na faixa de 20 a 29 anos, concentram o maior número de internações, enquanto os idosos apresentam as maiores taxas de mortalidade, superando outras faixas etárias (Fontana et al., 2020). A análise regional revela vulnerabilidades marcantes em áreas com infraestrutura precária, onde mulheres (81,6%), crianças e adolescentes (92%) e idosos (84,4%) são desproporcionalmente afetados por acidentes domésticos (Brasil, 2023). Tais dados evidenciam a heterogeneidade do problema e reforçam a importância de estratégias preventivas direcionadas a grupos mais vulneráveis.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por exposição à fumaça, ao fogo e às chamas no Brasil, no período de 2010 a 2023, com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), considerando variáveis sociodemográficas, regionais e circunstanciais associadas à ocorrência desses eventos fatais.

METODOLOGIA

Este estudo possui delineamento quantitativo, descritivo e de base documental, com análise dos dados públicos disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), acessado por meio da plataforma do DATASUS, mantida pelo Ministério da Saúde do Brasil. Foram incluídos todos os registros de óbitos cuja causa básica foi classificada segundo a CID-10, código X00–X09 (exposição à fumaça, ao fogo e às chamas), ocorridos no território brasileiro entre os anos de 2010 e 2023. As variáveis investigadas foram: ano do óbito, unidade da federação, sexo, faixa etária, raça/cor, escolaridade, estado civil e local da ocorrência do óbito. A extração dos dados foi realizada diretamente nas tabelas disponíveis na plataforma, sem manipulação estatística adicional. As informações foram organizadas e interpretadas em termos de frequência absoluta, com o objetivo de identificar padrões epidemiológicos e populacionais. Por se tratar de dados anonimizados e de domínio público, a pesquisa dispensa aprovação de Comitê de Ética, conforme preconiza a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre 2010 e 2023, foram registrados 13.788 óbitos por exposição à fumaça, ao fogo e às chamas (CID-10: X00–X09) no Brasil. Os anos com maior número de mortes foram 2013 (1.261 óbitos; 9,1%) e 2011 (1.051 óbitos; 7,6%). Em contrapartida, os menores registros ocorreram em 2019 (847 óbitos; 6,1%) e 2010 (953 óbitos; 6,9%). A média anual de mortes no período foi de aproximadamente 985 óbitos, mantendo relativa estabilidade ao longo dos anos.

A mortalidade estudada não pode ser dissociada dos determinantes sociais da saúde. A distribuição desigual desses óbitos entre diferentes grupos populacionais e regiões geográficas sugere fortemente que fatores estruturais, como condições socioeconômicas e acesso a recursos, desempenham um papel crucial na modulação do risco e da letalidade. A constatação de que o agrupamento X00-X09 apresenta taxas de mortalidade particularmente elevadas em comparação com outras causas de queimaduras reforça a necessidade de investigar como as vulnerabilidades sociais potencializam o impacto fatal desses eventos (Fontana et al., 2020).

Os estados com maior número de óbitos por exposição à fumaça, ao fogo e às chamas no Brasil foram São Paulo (2.682; 19,4%), Rio de Janeiro (2.013; 14,6%) e Rio Grande do



Sul (1.349; 9,8%), totalizando juntos mais de 45% dos casos do país. Em contrapartida, os menores números foram registrados no Acre e em Roraima (27 óbitos cada), Amapá (25) e Tocantins (91), evidenciando diferenças regionais expressivas. O Nordeste também apresentou números relevantes, como Pernambuco (509) e Bahia (1.028).

A precariedade da infraestrutura habitacional e urbana é um fator determinante proeminente. Condições de moradia inadequadas, frequentemente encontradas em áreas de menor nível socioeconômico, aumentam a suscetibilidade a incêndios devido a instalações elétricas deficientes, uso de materiais inflamáveis e superlotação. Estudos indicam que queimaduras afetam desproporcionalmente essas populações Souza et al., 2024. A dificuldade de acesso rápido para serviços de emergência, como bombeiros e ambulâncias, a essas localidades, muitas vezes devido a barreiras físicas e urbanísticas, agrava a situação, retardando o socorro e contribuindo para desfechos mais graves Souza et al., 2024.

Entre os registros identifica-se a maioria em indivíduos do sexo masculino (9.127; 66,2%). Em comparação, 4.522 óbitos (32,8%) ocorreram entre mulheres, evidenciando maior vulnerabilidade dos homens a esse tipo de evento.

A predominância de óbitos por queimaduras entre indivíduos do sexo masculino (66,2%) reflete uma tendência observada em diversas análises epidemiológicas nacionais. Essa maior vulnerabilidade dos homens pode estar associada a fatores ocupacionais e comportamentais, como maior exposição a atividades de risco e menor adesão a medidas de segurança (Silva et al., 2023). Além disso, comportamentos de risco associados ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas, mais prevalentes entre homens, também elevam a incidência de acidentes letais com fogo (Oliveira et al., 2022).

No período estudado, o Brasil registrou os óbitos com maior concentração nas faixas etárias de 40 a 49 anos (2.012; 14,6%), 50 a 59 anos (2.006; 14,5%) e 30 a 39 anos (1.694; 12,3%). Já entre crianças menores de 1 ano foram 137 óbitos (1%) e de 1 a 4 anos, 639 (4,6%), indicando também um impacto significativo entre os extremos etários. Indivíduos com 80 anos ou mais representaram 1.143 mortes (8,3%).

A concentração de óbitos nas faixas etárias de 30 a 59 anos (41,4%) sugere que adultos economicamente ativos são os mais expostos a riscos relacionados ao fogo e à fumaça, tanto no ambiente laboral quanto domiciliar (Oliveira et al., 2022). Por outro lado, a ocorrência de mortes em crianças menores de 5 anos (5,6%) e idosos acima de 80 anos (8,3%) revela a vulnerabilidade dos extremos etários, cuja limitação física e cognitiva os torna mais suscetíveis às consequências de queimaduras graves (Silva et al., 2023).

Quanto à cor/raça, a maioria dos óbitos ocorreu entre indivíduos autodeclarados pardos (6.038; 43,8%) e brancos (5.633; 40,8%), refletindo o perfil racial predominante da população brasileira. Pessoas pretas representaram 1.200 mortes (8,7%), enquanto indígenas (91; 0,7%) e amarelos (56; 0,4%) somaram percentuais menores. Houve ainda 770 registros (5,6%) com raça/cor ignorada.

A maior incidência de óbitos entre indivíduos autodeclarados pardos (43,8%) e brancos (40,8%) acompanha o perfil demográfico da população brasileira, mas não elimina as desigualdades estruturais. A população parda, por exemplo, costuma residir em áreas com infraestrutura precária e menor acesso a medidas de prevenção e serviços de emergência, o que eleva o risco de exposição e morte por queimaduras (OLIVEIRA et al., 2022; Silva et al., 2023).

Os óbitos por exposição à fumaça, ao fogo e às chamas no Brasil ocorreram majoritariamente entre pessoas com baixa escolaridade. Destacam-se os indivíduos com 4 a 7 anos de estudo (3.079 óbitos; 22,3%) e aqueles com 8 a 11 anos (2.468; 17,9%), seguidos por pessoas com 1 a 3 anos de escolaridade (2.114; 15,3%). Indivíduos sem qualquer grau de instrução somaram 1.251 óbitos (9,1%) e os com 12 anos ou mais de estudo representaram



749 casos (5,4%). Um total de 4.127 registros (29,9%) apresentaram escolaridade ignorada.

A maior parte dos óbitos por queimaduras ocorreu entre pessoas com até 7 anos de escolaridade, evidenciando o impacto do nível educacional na vulnerabilidade a acidentes. A baixa escolaridade está relacionada à dificuldade de acesso a informações sobre prevenção de acidentes domésticos, bem como à inserção em empregos com maior risco ocupacional e menor regulamentação quanto ao uso de EPIs (Silva et al., 2023). Isso corrobora estudos que apontam a escolaridade como um determinante social da saúde em contextos de mortalidade por queimaduras (Oliveira et al., 2022).

Quanto ao estado civil, houve maior prevalência entre pessoas solteiras, totalizando 6.148 casos (44,6%), seguidas por casados (2.851; 20,7%) e viúvos (1.096; 8%). Indivíduos separados judicialmente representaram 872 mortes (6,3%), enquanto a categoria “outro” somou 398 óbitos (2,9%). Houve ainda 2.423 registros (17,6%) com estado civil ignorado.

A alta mortalidade entre pessoas solteiras (44,6%) pode ser interpretada à luz de fatores como isolamento social, ausência de rede de apoio e maior exposição a comportamentos de risco, como o uso de álcool e negligência em ambientes domésticos (Oliveira et al., 2022). Indivíduos sem parceiro fixo também podem ter menor suporte em emergências, o que retarda o socorro e contribui para o agravamento dos desfechos (Silva et al., 2023).

A maioria dos óbitos brasileiros estudados ocorreu em ambiente hospitalar, totalizando 7.977 casos (57,8%). O domicílio foi o segundo local mais frequente, com 3.091 mortes (22,4%), seguido por ocorrências em via pública (1.141; 8,3%) e em outros locais (1.430; 10,4%). Apenas 109 óbitos (0,8%) aconteceram em outros estabelecimentos de saúde, enquanto 40 casos (0,3%) foram registrados como “outros”.

O acesso desigual a serviços de saúde especializados representa outra camada crítica de vulnerabilidade. A disponibilidade de Centros de Tratamento de Queimados CTQ e leitos de UTI varia significativamente entre as regiões brasileiras, criando barreiras geográficas e logísticas para vítimas residentes em áreas menos assistidas (Albuquerque et al., 2017). O tempo entre a ocorrência da exposição e o início do tratamento adequado, especialmente em casos de lesão inalatória ou queimaduras extensas comuns no grupo X00-X09, é um fator crítico para a sobrevivência. Atrasos no atendimento pré-hospitalar ou na transferência para unidades de referência, decorrentes dessas desigualdades no acesso, podem comprometer fatalmente o prognóstico (Fontana et al., 2020).

A efetividade e o alcance de programas de educação em saúde e prevenção também são mediados por determinantes sociais. A falta de informação adaptada à realidade local sobre prevenção de incêndios domésticos, manuseio seguro de fontes de calor e fogo, e ações de primeiros socorros, impacta desproporcionalmente populações com menor acesso à educação formal. As políticas preventivas precisam considerar as vulnerabilidades específicas de cada grupo, como idosos (com maior mortalidade) e crianças (frequentemente vítimas de acidentes domésticos), conforme apontado por dados epidemiológicos (Fontana et al., 2020; Brasil, 2023). A concentração de acidentes domésticos fatais em grupos específicos sinaliza a necessidade de intervenções customizadas e culturalmente sensíveis (Brasil, 2023; Souza et al., 2024).

CONCLUSÃO

Em conclusão, a mortalidade por exposição à fumaça, fogo e chamas no Brasil é um reflexo contundente das desigualdades sociais e ambientais. Falhas na infraestrutura, barreiras no acesso a serviços de saúde de qualidade e a insuficiência de estratégias de



prevenção e educação contextualizadas convergem para aumentar o risco e a letalidade em populações vulneráveis. Abordar essa questão exige uma ação intersetorial robusta, focada na redução das iniquidades e na promoção de condições de vida mais seguras e saudáveis para todos.

Palavras-chave: Desigualdades sociais; Epidemiologia; Fumaça e fogo; Mortalidade; Queimaduras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, M. V. et al. Desigualdades regionais na saúde: uma análise da distribuição espacial da oferta de serviços e da estrutura socioeconômica no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 6, p. 1861-1872, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Boletim Epidemiológico sobre óbitos por queimaduras no Brasil, 2015–2020**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016**. *Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais*. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 maio 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf/view>. Acesso em: 25 maio 2025.

FONTANA, T. S. et al. Queimaduras no Brasil: análise retrospectiva de internações e mortalidade. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 19, n. 1, p. 6-11, 2020.

OLIVEIRA, M. A.; SANTOS, G. H.; BARBOSA, T. V.; FONSECA, D. S. Análise retrospectiva de internações e mortalidade por queimaduras no Brasil (2009–2019). **Revista Brasileira de Queimaduras**, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 30-37, 2022. Disponível em: <https://www.rbqueimaduras.org.br/details/501/pt-BR>. Acesso em: 25 maio 2025.

SILVA, J. P.; GONÇALVES, A. L.; MATOS, R. F.; LIMA, C. M. Perfil epidemiológico de pacientes vítimas de queimaduras no Brasil. **Revista Brasileira de Queimaduras**, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 15-22, 2023. Disponível em: <https://www.rbqueimaduras.com.br/details/528/pt-BR>. Acesso em: 25 maio 2025.

SOUZA, L. C. et al. Tendência temporal, distribuição regional e perfil da morbimortalidade por queimadura na infância em Santa Catarina: Um estudo ecológico. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica**, v. 39, n. 3, e0888, 2024.



RETRATO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE ENVENENAMENTO NO BRASIL: IDENTIFICAÇÃO DE FATORES DE RISCO E NECESSIDADES DE INTERVENÇÕES

¹Deborah Borges Palis

¹Lohan Gonçalves Santos

¹Paulo Otávio Bizinotto Parreira

¹Arthur Augusto Araujo

¹Marcos Corrêa Franco

¹Cristiane Inês de Queiroz

¹Vinícius José de Oliveira

¹Faculdade Mais de Ituiutaba. Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil.

Área temática: Saúde Pública

Resumo: Este estudo objetivou descrever o perfil epidemiológico dos óbitos por envenenamento, intoxicação ou exposição a substâncias nocivas no Brasil, entre 2010 e 2023, com base em dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Trata-se de um estudo observacional, de caráter transversal, com abordagem quantitativa e descritiva, que analisou registros classificados pelo CID-10 (X40–X49), considerando variáveis sociodemográficas e territoriais. No período analisado, foram registrados 11.477 óbitos, com maior incidência em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Homens foram maioria (73,8%), especialmente na faixa etária de 20 a 39 anos, com destaque também para pessoas pardas (51,3%) e indivíduos com baixa escolaridade. A maior parte dos óbitos ocorreu entre solteiros e em regiões com maior densidade urbana, indicando associação com comportamentos de risco, automedicação, uso abusivo de substâncias e fragilidades em saúde mental. A subnotificação, a concentração dos Centros de Assistência Toxicológica em regiões mais desenvolvidas e a ausência de políticas intersetoriais efetivas contribuem para a perpetuação do problema. Conclui-se que o envenenamento continua sendo um grave problema de saúde pública, com impactos sociais e econômicos relevantes. É urgente o fortalecimento de ações preventivas, de educação em saúde e de vigilância toxicológica, priorizando os grupos mais vulneráveis e a articulação entre setores como saúde, meio ambiente e educação, para garantir respostas mais equitativas e efetivas frente a essa demanda crescente.

INTRODUÇÃO

Constata-se que os envenenamentos configuram um relevante problema de saúde pública no Brasil, caracterizando-se por elevada morbimortalidade, complexidade etiológica e forte impacto sobre populações vulneráveis. Entre 2010 e 2015, foram registrados inúmeros óbitos por intoxicação no país, com destaque para agrotóxicos, medicamentos e drogas de abuso como principais agentes causadores. Além disso, os homens apresentaram maior risco de mortalidade por intoxicação em comparação às mulheres (Silva et al., 2021).

Embora sua magnitude seja expressiva, esse agravo ainda permanece frequentemente negligenciado e subnotificado, o que compromete tanto a formulação de políticas públicas quanto a efetividade das ações de vigilância, prevenção e cuidado. Estudos apontam que a subnotificação das intoxicações por agrotóxicos é significativa, com estimativas de que



apenas 1 em cada 50 casos seja registrado, devido a fatores como baixa capacitação dos profissionais de saúde, alta rotatividade médica e sobrecarga dos serviços (Fernandes et al., 2021).

A dinâmica dos envenenamentos é profundamente marcada por sua natureza multifatorial, na qual interação determinantes biológicos, sociais, ambientais, econômicos e territoriais. Variáveis como faixa etária, sexo, localização geográfica, tipo de agente tóxico e intenção do evento exercem influência direta sobre a gravidade dos casos, seus desfechos clínicos e os padrões epidemiológicos observados no território nacional (Torre; Amarante, 2022).

Os envenenamentos representam um agravo significativo à saúde pública no Brasil, caracterizado por elevada morbimortalidade e forte relação com determinantes sociais, econômicos e territoriais. Embora sua magnitude seja reconhecida, há lacunas importantes na compreensão de seus padrões regionais, nos perfis sociodemográficos das vítimas e na identificação de fatores de risco associados, o que limita a efetividade das ações preventivas e assistenciais. Estudos apontam que, além da subnotificação, existe uma distribuição desigual dos serviços de toxicovigilância, com concentração nas regiões mais desenvolvidas do país (Fiocruz, 2021; Fernandes et al., 2021). Nesse cenário, a análise do perfil epidemiológico dos óbitos por intoxicação torna-se essencial para revelar desigualdades estruturais, orientar o planejamento de políticas públicas e fortalecer a resposta intersetorial ao problema, com foco especial em populações vulneráveis e territórios negligenciados.

OBJETIVO

Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por envenenamento, intoxicação ou exposição a substâncias nocivas no Brasil, entre 2010 e 2023, com o propósito de identificar padrões regionais de distribuição, grupos populacionais mais vulneráveis e fatores sociais associados, a fim de subsidiar estratégias intersetoriais de prevenção, vigilância toxicológica e formulação de políticas públicas mais eficazes.

METODOLOGIA

Este trabalho configura-se como um estudo observacional de caráter transversal, com enfoque quantitativo e descritivo, baseado na análise de dados secundários extraídos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram selecionados os registros de óbitos com causa básica classificada pelo código CID-10: X40 a X49, que correspondem a envenenamentos, intoxicações ou exposições a substâncias nocivas, ocorridos no Brasil no período de 2010 a 2023. As informações foram organizadas conforme variáveis sociodemográficas, incluindo ano do óbito, unidade federativa, sexo, faixa etária, raça/cor, escolaridade, estado civil e local de ocorrência. Os dados foram sistematizados em planilhas e analisados por meio da distribuição de frequências absolutas. A utilização de dados de domínio público, devidamente anonimizados, dispensa a necessidade de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa, conforme estabelecido pela Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2016).



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre 2010 e 2023, o Brasil registrou 11.477 óbitos por envenenamento, intoxicação ou exposição a substâncias nocivas (CID-10: X40–X49). Os anos com maior número de mortes foram 2015 (1.069; 9,3%) e 2014 (989; 8,6%), seguidos por 2016 (942) e 2023 (869).

Os menores registros ocorreram em 2010 (414) e 2011 (454), representando juntos apenas 7,6% do total. Observa-se um aumento progressivo entre 2010 e 2015, seguido de uma estabilização nos anos seguintes.

Esse comportamento temporal pode estar relacionado ao maior acesso a substâncias químicas e ao uso inadequado de medicamentos, frequentemente associados a tentativas de suicídio. De acordo com Frazão et al. (2023), os medicamentos representam a principal causa de intoxicações exógenas, sendo o tipo mais comum em episódios com desfecho fatal.

Gemaque et al. (2025) também apontam que esse padrão se mantém estável em anos recentes, sobretudo em áreas urbanas com alta densidade populacional.

Os estados com maior número de óbitos por envenenamento, intoxicação ou exposição a substâncias nocivas no Brasil foram São Paulo (2.540; 22,1%), Rio de Janeiro (2.476; 21,6%) e Minas Gerais (818; 7,1%). Esses três estados somaram mais de 50% do total nacional. Em contrapartida, os menores registros foram observados no Acre (14), Roraima (34), Amapá (15) e Alagoas (31). Estados como Amazonas (1.240), Bahia (327) e Goiás (355) também apresentaram números expressivos.

A maioria das notificações de intoxicação exógena no Brasil ocorre na região Sudeste, possivelmente devido à maior disponibilidade de substâncias químicas e à eficiência do sistema de notificação (Gemaque et al., 2025). Frazão et al. (2023) associam esse padrão ao uso indevido de substâncias psicoativas nos centros urbanos. Estudos regionais reforçam esse cenário, como o de Machado et al. (2025), que identificou alta mortalidade por intoxicações no Paraná, sobretudo por agrotóxicos e medicamentos. Na Bahia, Steele et al. (2020) demonstraram uma distribuição desigual dos casos, relacionada a fatores socioeconômicos e ambientais.

Entre óbitos por envenenamento, intoxicação ou exposição a substâncias nocivas no Brasil, 8.468 (73,8%) ocorreram entre indivíduos do sexo masculino, enquanto 3.007 (26,2%) foram do sexo feminino. Esses dados reforçam dados anteriores que apontam maior exposição ocupacional, comportamentos de risco e associação com tentativas de suicídio (Frazão et al., 2023; Gemaque et al., 2025). Além disso, Silva et al. (2016) destacam que o uso de carbamato (“chumbinho”) em episódios de autoextermínio é mais frequente entre homens em situação de vulnerabilidade social, ampliando o risco de desfecho letal.

Os óbitos estudados no Brasil concentraram-se principalmente entre adultos jovens. A faixa etária de 20 a 29 anos apresentou o maior número de mortes (3.120; 27,2%), seguida por 30 a 39 anos (2.331; 20,3%) e 15 a 19 anos (1.362; 11,9%). Crianças de 1 a 4 anos somaram 208 óbitos, enquanto menores de 1 ano contabilizaram 47 casos. Entre idosos com 80 anos ou mais, ocorreram 281 mortes (2,4%).

Essa faixa etária está mais propensa ao uso abusivo de substâncias psicoativas e à automedicação, além de ser a mais afetada por transtornos mentais comuns. Conforme relatado por Gemaque et al. (2025), os jovens adultos estão envolvidos em mais da metade das intoxicações fatais registradas entre 2017 e 2023. Frazão et al. (2023) complementam ao afirmar que fatores como impulsividade e fácil acesso a medicamentos contribuem significativamente para o agravamento dos casos.

As notificações estudadas foram mais frequentes entre indivíduos autodeclarados pardos (5.888; 51,3%) e brancos (4.045; 35,2%). Pessoas pretas representaram 1.203 mortes (10,5%), enquanto indígenas (76; 0,7%) e amarelos (31; 0,3%) apresentaram menor



número de ocorrências.

Populações pardas, segundo Gemaque et al. (2025), enfrentam maior exposição a fatores de risco ambientais e menor acesso a cuidados emergenciais, o que contribui para os desfechos letais. Frazão et al. (2023) também apontam a predominância de notificações em grupos racialmente marginalizados, o que evidencia a intersecção entre intoxicação e determinantes sociais da saúde.

No período estudado, a maioria dos óbitos por envenenamento, intoxicação ou exposição a substâncias nocivas no Brasil ocorreu entre indivíduos com escolaridade de 4 a 7 anos (3.786; 33%) e de 8 a 11 anos (2.967; 25,9%). Pessoas com 1 a 3 anos de estudo representaram 1.780 mortes (15,5%), enquanto aqueles sem nenhuma escolaridade totalizaram 522 óbitos (4,5%). Indivíduos com 12 anos ou mais de estudo somaram 679 casos (5,9%), e 1.743 registros (15,2%) apresentaram escolaridade ignorada.

A educação desempenha papel fundamental na promoção da saúde e na mudança de comportamentos de risco. Campanhas educativas acessíveis e a inclusão de conteúdos sobre toxicologia, saúde mental e meio ambiente nos currículos escolares e em programas de educação permanente são estratégias eficazes para consolidar uma cultura de prevenção, sobretudo entre crianças, adolescentes e profissionais da saúde (Costa; Alonzo, 2019).

A maioria dos óbitos notificados no Brasil ocorreu entre pessoas solteiras, totalizando 7.623 casos (66,4%). Casados representaram 1.590 mortes (13,9%), seguidos por separados judicialmente (522; 4,5%) e viúvos (400; 3,5%).

A expressiva concentração de óbitos entre solteiros pode refletir maior vulnerabilidade social, menor suporte emocional e familiar, além de possíveis relações com isolamento, uso abusivo de substâncias e transtornos mentais, destacando a importância de políticas intersetoriais de proteção social e saúde mental (Santos et al., 2017).

A elevada incidência de envenenamentos no Brasil e sua persistente subnotificação indicam falhas estruturais nos sistemas de vigilância, notadamente no que diz respeito à integração e à atuação coordenada entre diferentes setores governamentais e sociais. A natureza multifatorial das intoxicações que podem decorrer de causas acidentais, intencionais, ocupacionais ou ambientais, exige que sua prevenção e manejo não sejam atribuídos exclusivamente ao setor saúde. Ao contrário, trata-se de um desafio que demanda o fortalecimento de políticas públicas intersetoriais e a criação de protocolos regionais específicos, adaptados às realidades locais (Fiocruz, 2021).

A prevenção e o controle eficazes dos envenenamentos no Brasil exigem ações integradas entre os setores da saúde, meio ambiente, agricultura e educação. A atuação isolada dessas áreas tem comprometido a efetividade das intervenções, especialmente diante do uso indiscriminado de agrotóxicos e da exposição ocupacional sem proteção no meio rural. Compreender a natureza multifatorial desses eventos é essencial para a formulação de políticas públicas equitativas, que combinem prevenção, regulação, educação e fortalecimento dos serviços de saúde, respeitando as vulnerabilidades específicas de cada território (Abrasco, 2015).

A codificação dos óbitos segundo a CID-10 (X40–X49) no SIM/DATASUS não permite identificar os agentes específicos envolvidos, como medicamentos, agrotóxicos ou drogas ilícitas, limitando análises mais detalhadas. Apesar disso, o estudo apresenta robustez metodológica, com rigor na seleção e análise dos dados, e revela padrões relevantes de mortalidade, que podem subsidiar políticas públicas mais eficazes para prevenção das intoxicações exógenas no Brasil.



CONCLUSÃO

Conclui-se que os óbitos por envenenamento no Brasil (2010–2023) evidenciam desigualdades regionais, vulnerabilidades sociais e falhas assistenciais. A predominância entre homens jovens, solteiros, com baixa escolaridade e pertencentes a grupos racialmente marginalizados destaca a urgência de políticas focadas nesses perfis. A concentração dos casos em estados populosos reforça a relação entre densidade urbana, acesso a substâncias químicas e transtornos mentais. Esses achados reforçam a necessidade de políticas intersetoriais voltadas à prevenção, educação em saúde, vigilância toxicológica e suporte psicossocial, com foco em territórios mais vulneráveis. O estudo oferece subsídios relevantes para estratégias públicas baseadas em evidências.

Palavras-chave: Envenenamento; Epidemiologia; Intoxicação; Saúde pública; Vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA (ABRASCO). *Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde*. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 2015. Disponível em: <https://www.abrasco.org.br>. Acesso em: 19 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. *Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016*. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 24 maio 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf/view>. Acesso em: 25 maio 2025.

COSTA, Aline de Oliveira; ALONZO, Herling Gregorio Aguilar. Centros de Informação e Assistência Toxicológica no Brasil: descrição preliminar sobre sua organização e funções. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 43, n. 120, p. 110-121, jan./mar. 2019.

FERNANDES, F. L. et al. Análises das causas das subnotificações das intoxicações por agrotóxicos: estudo de caso no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 26, n. 12, p. 6037-6047, 2021.

FRAZÃO, Luiz Felipe Neves et al. A epidemiologia das intoxicações exógenas das regiões brasileiras no período de 2017 a 2023. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*, São José dos Pinhais, v. 16, n. 10, p. 24113–24122, 2023.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). *Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox): dados sobre intoxicações humanas no Brasil*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2021. Disponível em: <https://sinitox.icict.fiocruz.br/>. Acesso em: 19 maio 2025.

GEMAQUE, Nedson Sombra et al. Perfil epidemiológico dos casos notificados de intoxicação exógena nas regiões do Brasil no período de 2014 a 2023. *Revista ARACÊ*, v. 7, n. 2, p. 7666–7677, 2025.

MACHADO, Pedro Henrique; LIMA, Urielly Tayná da Silva; ALBIERO, James. Análise do perfil epidemiológico de óbitos por intoxicação exógena no estado do Paraná de 2019 a 2023. *Revista Ciências da Saúde*, São Paulo, v. 29, n. 144, p. 1–15, mar. 2025.



SANTOS, Marília Suzi Pereira dos et al. Identificação de aspectos associados à tentativa de suicídio por envenenamento. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, v. 66, p. 197-202, 2017.

SILVA, J. C. et al. Fatores associados aos óbitos entre homens envenenados por carbamato (“chumbinho”). *Revista Gaúcha de Enfermagem*, Porto Alegre, v. 37, e54799, 2016.

SILVA, J. M. et al. Análise dos óbitos decorrentes de intoxicação ocorridos no Brasil entre 2010 e 2015. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 26, n. 12, p. 6037- 6047, 2021.

STEELE, S. B. et al. Casos de intoxicação exógena com desfecho de óbito no estado da Bahia, Brasil: estudo ecológico. *Revista Saúde Coletiva*, Salvador, v. 9, n. 1, p. 10118, 2020.

TORRE, Eduardo; AMARANTE, Paulo. Saúde mental, direitos humanos e justiça ambiental: a ‘quimicalização da vida’ como uma questão de violação de direitos humanos decorrente da intoxicação institucionalizada. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 46, n. esp. 2, p. 327–344, jun. 2022.



EDUCAÇÃO EM SAÚDE PERMANENTE PARA PREVENÇÃO DA DOENÇA RENAL EM HIPERTENSOS E DIABÉTICOS

¹Anderson Nascimento de Andrade

² Alan Nascimento de Andrade

¹ Universidade Estadual do Ceará. Itapipoca, Ceará, Brasil; ² Universidade Federal do Ceará. Sobral, Ceará, Brasil

Área temática: Biologia

Resumo: Doenças renais crônicas são descritas com um grave problema de Saúde Pública de âmbito mundial e estão associadas a hipertensão sistêmica e a *diabetes mellitus*. A sua evolução é insidiosa e com diagnóstico tardio, amplifica a demanda por tratamentos de onerosos, como a hemodiálise. Portanto, a Educação em Saúde Permanente, emerge com uma das estratégias fundamentais de prevenção e cuidado, com forte atuação no protagonismo dos usuários, que podem contar com a atuação das equipes da Atenção Primária à Saúde. Logo, esta revisão, analisou 12 artigos entre 2014 e 2024, revelando que práticas educativas contínuas, com linguagem acessível, abordagem interdisciplinar e valorização do conhecimento popular, são mais eficazes que campanhas pontuais. A ESP possibilita maior adesão aos controles glicêmico e pressórico, prevenindo comorbidades renais e favorecendo a corresponsabilidade no cuidado. Há destaque para o papel da Estratégia Saúde da Família, enfaticamente no acolhimento, na escuta qualificada e no engajamento dos agentes comunitários de saúde. Além disso, o uso de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação tem potencializado o alcance e a efetividade das ações educativas. Conclui-se que a ESP deve ser contínua, humanizada e territorializada, articulando teoria e prática, fortalecendo redes de apoio e promovendo a equidade no cuidado em saúde.

INTRODUÇÃO

As doenças renais crônicas apresentam-se como grave problema de Saúde Pública e Coletiva mundial, devido sua alta prevalência em grupos de risco (hipertensos e diabéticos), e com progressão silenciosa, possuindo diagnóstico tardio, implicando aumento de custos com tratamentos especializados (hemodiálise) (Brasil, 2023).

A Educação em Saúde Permanente (ESP) emerge como uma estratégia fundamental, para o cuidado profilático e paliativo, já elas representam fatores de risco significativos para a gênese das doenças renais. A ESP, possibilita o acompanhamento contínuo por parte das equipes da Atenção Primária à Saúde (APS), que de acordo com Ceccim e Feuerwerker (2004, p. 9), “propõe mudanças das práticas, mediante a problematização do processo de trabalho, para dirimir situações-problemas no trabalho.” Isto é crucial, pois, contribui para a qualificação dos profissionais da saúde e para a ampliação do olhar sobre os determinantes sociais dos pacientes.

As instituições de saúde reforçam com veemência a importância de estratégias educativas voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce, como a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN, 2022), que difunde que “a maioria dos pacientes que inicia o tratamento dialítico não possuem conhecimentos que tem a doença renal até fases avançadas”. Diante disso, há necessidade de intervenções precoces, baseadas no acompanhamento sistemático. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, destaca que a ESP deve



compreendida como um dispositivo de transformações significativas nos modos de cuidar, portanto, é possível construir práticas educativas mais próximas da realidade dos usuários, valorizando o diálogo e o saber popular como elementos fundamentais na promoção do autocuidado (Brasil, 2009).

Neste sentido, Freire (2005, p. 47) descreve que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”, o que evidencia a necessidade de uma prática educativa crítica, voltada para a emancipação dos sujeitos e o fortalecimento do protagonismo na gestão de sua própria saúde.

Assim, promover ações de ESP com foco na prevenção em doenças renais, significa criar espaços coletivos de aprendizagem, que permitam compreender a doença, adotar hábitos saudáveis e aderir ao tratamento de forma consciente.

Dessa forma, essas estratégias não devem ser vista como uma ação pontual, sobretudo, como um processo contínuo e articulado à prática assistencial, potencializando o cuidado integral, fortalecendo a autonomia dos usuários do SUS. Isto não é para meramente reduzir os custos da hemodiálise, porém para contribuir na melhora da qualidade de vida dos indivíduos acometidos por doenças crônicas evitáveis.

OBJETIVO

Analisar as principais estratégias e impactos da Educação em Saúde Permanente na prevenção da doença renal em pessoas com hipertensão e diabetes.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa, descritivo-analítico e narrativo. A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados científicas PubMed, Scopus, e SciELO, utilizando os seguintes descritores controlados e não controlados: "Chronic Kidney Disease", "Progression of Kidney Disease", "Renal Therapy" e "Health Education Strategies", combinados com os operadores booleanos (and e or). Os critérios de inclusão foram: artigos originais publicados entre os anos de 2014 a 2024 em português ou inglês, que abordassem de forma direta as estratégias da educação em saúde permanente em populações com comorbidades associadas (hipertensão e diabetes).

Os critérios de exclusão foram as como revisões sistemáticas, ensaios clínicos com que não focaram em desfechos nefrológicos, nem aqueles com atuação da terapia renal. Portanto, analisaram-se 12 artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos revelou que as ações educativas mais eficazes estão associadas a práticas continuadas, com uso de linguagem acessível, foco no protagonismo do usuário e abordagem interdisciplinar. Campanhas pontuais, sem continuidade ou integração com a realidade dos pacientes, mostraram-se pouco efetivas na mudança de comportamentos. É neste sentido que a ESP possibilita maior compreensão sobre a importância do controle glicêmico e pressórico, a fim de atenuar, prevenir e/ou evitar lesões renais, pois segundo Almeida et al., (2021, p. 6) “a educação deve ir além da mera transmissão de informações, promovendo reflexão crítica e autonomia dos sujeitos”.

Sobre os achados da pesquisa as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), possuem papel de destaque, pois quando os profissionais da saúde estão habilitados e capacitados, apresentam maior efetividade na condução de ações educativas, com ênfase no acolhimento e escuta qualificada, além disso, a equipe multiprofissional, possui a



participação ativa dos agentes comunitários de saúde (ACS), os quais possuem destaque para o monitoramento e incentivo à adesão aos tratamentos (Silva; Ferreira, 2020).

Atualmente as estratégias são apoiadas em recursos tecnológicos como as TDICs, os quais são aplicativos de uso mais exploratório, educativo e consultivo, bem como, vídeos e plataformas de educação permanente, portanto, tais ferramentas têm favorecido o acompanhamento remoto e o engajamento de populações adultas e jovens com diagnósticos mais precoce de hipertensão e diabetes, consoante Santos et al. (2023). Diante, há pontos favoráveis, pois com essas ações a ESP, mostrou impacto na redução de hospitalizações evitáveis e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes, quando integrada ao plano terapêutico singular (PTS), o que por sua vez é corroborado por Oliveira e Lima (2022, p.10), que descreve que “a abordagem educativa fortalece o vínculo entre profissional e usuário, criando um ambiente propício à corresponsabilidade no cuidado.”

Destacam-se que a efetividade dessas estratégias está diretamente relacionada à contextualização e sua aplicabilidade no território e à valorização do conhecimento empírico dos acometidos pelas comorbidades. Deste modo, iniciativas que consideram as práticas culturais e as vivências dos usuários favorecem maior adesão às orientações e fortalecimento da autonomia no manejo das condições crônicas (Costa; Nascimento; Rocha, 2019). Nesse sentido, a escuta ativa e a personalização das abordagens tornam-se fundamentais para que a educação em saúde seja, de fato, significativa.

Salienta-se que a ESP, deve algo contínuo tanto para os profissionais da APS, quanto para os pacientes, já que a capacitação técnica aliada à reflexão crítica sobre a prática cotidiana permite que os profissionais desenvolvam estratégias mais humanizadas e centradas nas necessidades dos usuários (Ceccim; Feuerwerker, 2020). Deve coexistir uma articulação com a teoria e prática, notadamente entre as famílias e comunidades. Logo, a inclusão de cuidadores, familiares e lideranças comunitárias nos processos formativos contribui para a criação de redes de apoio mais sólidas, essenciais para o autocuidado apoiado (Souza et al., 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação em Saúde Permanente constitui uma estratégia essencial e transformadora no enfrentamento das doenças renais crônicas, principalmente entre pessoas hipertensas e diabéticas. De modo que há evidências positivas nas ações educativas que devem ultrapassar a lógica de campanhas pontuais, além de coexistir investimentos em práticas continuadas, humanizadas e territorializadas. Ela deve articulada de acordo com as diretrizes da atenção primária à saúde, consequentemente fortalecendo o autocuidado e a corresponsabilização dos usuários do SUS.

Observou-se que o uso de tecnologias digitais da informação e comunicação, quando aliado as abordagens pedagógicas críticas e dialógicas, possui o potencial sinérgico do alcance das ações educativas, favorecendo o protagonismo dos sujeitos e ampliando o acesso à informação de qualidade, além disso, a integração dessas ações ao projeto terapêutico singular, demonstrou redução de agravos evitáveis e melhoria na qualidade de vida dos pacientes com doenças crônicas.

Portanto, reforça-se que a Educação em Saúde Permanente deve ser concebida como um processo contínuo de aprendizagem e reflexão, que envolve tanto os profissionais quanto os usuários do SUS, com vistas à construção coletiva de saberes e práticas de cuidado mais integradas, sensíveis e eficazes. Assim, promover a ESP não é apenas uma medida preventiva, mas um compromisso ético e político com a promoção da saúde e a equidade no cuidado.



Palavras-chave: Doença renal crônica; Diabetes mellitus; Educação permanente em saúde; Hipertensão arterial sistêmica; Prevenção em saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Thaís Rodrigues de et al. **Educação em saúde no contexto da Atenção Primária: autonomia e protagonismo do usuário.** Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 55, p. 1-8, 2021. Disponível em: <https://www.rsp.fsp.usp.br>. Acesso em: 28 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde.** Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 76 p. (Série B. Textos Básicos de Saúde).

_____. Ministério da Saúde. **Plano Nacional de Saúde: 2020–2023.** Brasília: Ministério da Saúde, 2023. 224 p. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/gestao-do-sus/planejamento/plano-nacional-de-saude>. Acesso em: 28 maio 2025.

CECCIM, Ricardo Burg; FEUERWERKER, Laura Camargo Macruz. **O quadrilátero da formação para a área da saúde: ensino, gestão, atenção e controle social.** PHYSIS: Revista de Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 41–65, jan./jun. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/physis/a/QRj9W9p79frjsHjJW6mnr9P>. Acesso em: 28 maio 2025.

COSTA, Luciana da Conceição; NASCIMENTO, Eliane Rosas Pacheco do; ROCHA, Liane Alves. **Educação em saúde e práticas culturais: contribuições para o autocuidado em doenças crônicas.** Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 72, supl. 1, p. 225–230, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/zHg6pnXTx7JbYFfRtkRfqXF>. Acesso em: 28 maio 2025.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 144 p. (Coleção Leitura).

OLIVEIRA, Mariana Jatobá de; LIMA, Renata Moura. **Educação em saúde na prevenção de doenças crônicas: vínculo e corresponsabilidade no cuidado.** Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 46, n. 132, p. 1–12, jul./set. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sdeb/a/kP9dwjyxvjzCprXfLhYXrHh>. Acesso em: 28 maio 2025.

SANTOS, Ana Maria dos et al. **Tecnologias digitais na educação em saúde: possibilidades no cuidado de pacientes crônicos.** Interface: Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 27, p. 1–14, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/RG8XY9Z6qKtPYqgYBbNDzDJ>. Acesso em: 28 maio 2025.

SILVA, Daiane Ferreira da; FERREIRA, Milena Monteiro. **Atuação do agente comunitário de saúde na adesão ao tratamento de hipertensão e diabetes: uma revisão integrativa.** Revista Eletrônica Acervo Saúde, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 1–8, 2020. Disponível em: <https://www.acervosaude.com.br/doc/REAS3621.pdf>. Acesso em: 28 maio 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA – SBN. **Campanha do Dia Mundial do**



Rim 2022: saúde renal para todos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2022.
Disponível em: <https://www.sbn.org.br>. Acesso em: 28 maio 2025.



EFEITOS DOS INIBIDORES DE SGLT2 NA PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA

¹Anderson Nascimento de Andrade

² Alan Nascimento de Andrade

¹ Universidade Estadual do Ceará. Itapipoca, Ceará, Brasil; ² Universidade Federal do Ceará. Sobral, Ceará, Brasil

Área temática: Biologia

Resumo: A doença renal crônica representa uma condição clínica complexa e multifacetada que se caracteriza por uma deterioração progressiva, irreversível e insidiosa da função renal. Analisar os efeitos dos inibidores de SGLT2 na doença renal crônica, elencando seus mecanismos fisiopatológicos subjacentes e suas implicações terapêuticas. Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa e delineamento descritivo-analítico. Foram incluídos artigos publicados entre 2014 e 2024, redigidos em português ou inglês, no total de 12 artigos que abordassem de forma direta os efeitos dos inibidores de SGLT2 sobre a função renal. A doença renal crônica tem fisiopatologia complexa, sistêmica e multifatorial. Iniciando-se, geralmente, por uma agressão contínua ao néfron, seja de origem hemodinâmica, inflamatória, imunológica, metabólica ou tóxico-infecciosa, com uma hiperfiltração compensatória nos néfrons remanescentes, o que acelera sua deterioração funcional. Então, os inibidores do cotransportador SGLT2i, emergem como uma inovação terapêutica de grande impacto, cuja aplicabilidade clínica ultrapassa o controle glicêmico, demonstrando benefícios nefroprotetores e cardiovasculares robustos, mesmo em indivíduos não diabéticos.

INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) representa uma condição clínica complexa e multifacetada que se caracteriza por uma deterioração progressiva, irreversível e insidiosa da função renal, abrangendo não apenas a capacidade excretora, mas também os importantes papéis endócrino e metabólico desempenhados pelo órgão (Sies; Jones, 2020). Tal enfermidade tem emergido como um problema de Saúde Pública e Coletiva global de proporções alarmantes, em virtude do aumento constante de sua prevalência e da morbidade associada (Diwan et al., 2022).

Segundo estimativas recentes, mais de 850 milhões de pessoas no mundo sofrem algum grau de comprometimento renal, representando uma das principais causas de morbidade, mortalidade e incapacidade funcional (Khan et al., 2021). Esse cenário torna-se ainda mais preocupante quando se considera que a DRC está intrinsecamente relacionada a outras doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), notadamente a *diabetes mellitus* tipo 2 (DM2), a hipertensão arterial sistêmica (HAS) e as doenças cardiovasculares (DCVs), cujas inter-relações sinérgicas amplificam o impacto clínico e econômico da condição (Moe et al., 2021). Do ponto de vista fisiopatológico das doenças renais, elas resultam da perda gradual da massa funcional dos néfrons, com consequente redução da taxa de filtração glomerular (TFG), retenção de toxinas urêmicas e distúrbios da homeostase hidroeletrólítica, ácido-básica e endócrina (Heerspink et al., 2020). O impacto epidemiológico dessas patologias renais transcendem a esfera clínica, impondo um ônus substancial aos sistemas



de saúde e à sociedade, devido à elevada demanda por serviços especializados, hospitalizações frequentes e alta mortalidade cardiovascular, esta última reconhecida como

a principal causa de óbito em pacientes renais crônicos (Levey et al., 2020).

Além disso, a associação com a DM2, em particular, é notória, dado que a nefropatia diabética (ND), constitui a principal etiologia da DRC em países desenvolvidos e em desenvolvimento, e decorre do dano metabólico e hemodinâmico provocado pela hiperglicemia crônica. Ressalta-se que a coexistência da HAS exacerba a lesão renal por meio do aumento da pressão glomerular, levando a uma aceleração da perda da função renal (KDIGO, 2022).

Nesse contexto desafiador, a introdução dos inibidores do co-transportador sódio-glicose tipo 2 (SGLT2i) tem revolucionado o tratamento da DRCs. Inicialmente desenvolvidos para o manejo do DM2, visando a redução da glicemia por meio da promoção da glicosúria, esses fármacos revelaram-se agentes multifuncionais que extrapolam seu efeito hipoglicemiante. Estudos clínicos robustos demonstraram que os SGLT2i conferem proteção renal significativa, retardando a progressão da DRC, e benefícios cardiovasculares, inclusive em populações sem diabetes (Ferreira; Silva, 2023; Heerspink et al., 2020).

Portanto, os inibidores de SGLT2 configuram-se como uma classe terapêutica paradigmática, cuja incorporação ao arsenal nefrológico contemporâneo representa uma mudança de paradigma, potencializando a capacidade de controle da DRC e mitigando os impactos sociais, econômicos e clínicos decorrentes dessa enfermidade devastadora.

OBJETIVO

Analisar os efeitos dos inibidores de SGLT2 na doença renal crônica, elencando seus mecanismos fisiopatológicos subjacentes e suas implicações terapêuticas.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa e delineamento descritivo-analítico. Utilizaram-se as seguintes bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e Scielo, com os seguintes descritores: "Chronic Kidney Disease"; "Progression of Kidney Disease"; "Renal Therapy" e "SGLT2 Inhibitors", combinados por operadores booleanos. Foram incluídos artigos publicados entre 2014 e 2024, redigidos em português ou inglês, no total de 12 artigos que abordassem de forma direta os efeitos dos inibidores de SGLT2 sobre a função renal. Excluíram-se estudos com populações pediátricas, revisões sistemáticas e ensaios com foco exclusivamente glicêmico, sem desfechos nefrológicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As DRCs são compreendidas como um grave problema de saúde se configuram como a 10ª principal causa global, possui uma projeção exponencial, saltando para a 5ª posição até o ano de 2040, segundo dados da Global Burden of Disease (GBD, 2020). A HAS e DM-2 são os principais fatores etiológicos associados as patologias renais (SBN, 2023), somados a fatores fisiopatológicos subjacentes as DRC como: a produção exacerbada dos radicais livres, oriundo do estresse oxidativo (EO), que em condições desbalanceada, implica prejuízos nas membranas biológicas devido a lipoperoxidação e lesões em proteínas e no DNA, impactando negativamente nas células e tecidos (Sies; Jones, 2020), elementos cruciais na progressão da lesão renal (Diwan et al., 2022).

As DRCs representam um espectro de alterações estruturais e funcionais renais progressivas, cuja fisiopatologia é complexa, sistêmica e multifatorial. Iniciando-se,



geralmente, por uma agressão contínua ao néfron, seja de origem hemodinâmica, inflamatória, imunológica, metabólica ou tóxico-infecciosa, com uma hiperfiltração compensatória nos néfrons remanescentes, o que acelera sua deterioração funcional (Fogo; Kon, 2020). A perda nefronal provoca uma elevação da pressão intraglomerular e consequente lesão do endotélio capilar, espessamento da membrana basal e esclerose glomerular. Esses eventos são acompanhados por alterações tubulointersticiais, incluindo fibrose, inflamação crônica e atrofia tubular, perpetuando o ciclo de lesão (Brenner; Rector, 2019).

Segundo KDIGO (2022), a progressão da DRC é marcada por mecanismos comuns, independentemente da etiologia primária, tais como: ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), EO, apoptose celular, e deposição de matriz extracelular. Estes mecanismos contribuem para o desenvolvimento da fibrose renal, considerada o principal marcador histopatológico da irreversibilidade funcional do parênquima renal. (Diwan et al., 2022). A ativação crônica do SRAA promove vasoconstrição e retenção de sódio (Na^+), agravando a HAS e provocando remodelamento vascular e glomerular. A angiotensina II, neste contexto, atua como potente mediador profibrótico e pró-inflamatório, estimulando a produção de TGF- β 1, principal citocina envolvida na fibrogênese renal (Remuzzi et al., 2018). Adicionalmente, a retenção de produtos nitrogenados, como ureia, creatinina, guanidinas e indoxil sulfato, induz um estado de toxemia urêmica, com repercussões neurológicas, hematológicas, cardiovasculares e imunológicas (Levey et al., 2020). A uremia também compromete o equilíbrio ácido-base, favorecendo o surgimento de acidose metabólica, a qual contribui para a degradação muscular e progressão da nefropatia (Lopes et al. (2021)

Outros aspectos fisiopatológicos relevante são respectivamente, a disfunção endotelial associada à DRC, pois, o ambiente inflamatório e oxidativo leva à redução da biodisponibilidade do óxido nítrico (NO), aumento da rigidez vascular e ativação de células endoteliais, promovendo eventos aterotrombóticos. Segundo Stenvinkel et al. (2021), “a DRC é considerada um estado de envelhecimento acelerado vascular, caracterizado por calcificação arterial precoce e disfunção mitocondrial.” Bem como, a anemia da DRC, que decorre da diminuição da síntese de eritropoetina pelos fibroblastos peritubulares, além de inflamação crônica e deficiência de ferro funcional. Essa condição agrava a hipóxia tecidual, levando à disfunção orgânica progressiva. Conforme Lopes et al. (2021), “a anemia na DRC está diretamente associada à redução da capacidade funcional e ao aumento da hospitalização e mortalidade”.

Do ponto de vista mineral e ósseo, a disfunção renal compromete o metabolismo do cálcio, fósforo, paratormônio (PTH) e vitamina D, levando à osteodistrofia renal e à calcificação metastática de tecidos moles, inclusive cardiovasculares (Moe et al., 2021). Esse distúrbio, conhecido como doença mineral e óssea associada à DRC (DRC-MBD), contribui para eventos cardiovasculares, fraturas e dor crônica. Em suma, a fisiopatologia da DRC configura uma cascata interligada de processos adaptativos que, com o tempo, tornam-se deletérios. A compreensão desses mecanismos é essencial não apenas para o diagnóstico precoce, mas também para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficazes que interrompam ou retardem a progressão do dano renal (Sies; Jones, 2020),

Partindo dessa perspectiva, as pesquisas convergem para a constatação na terapêutica farmacológica de que os inibidores de SGLT2 promovem retardamento significativo da progressão da DRC, independentemente da presença da DM-2. O estudo DAPA-CKD (Heerspink et al., 2020), que é um ensaio clínico randomizado, duplo-cego e multicêntrico, evidenciou que a dapagliflozina reduziu de maneira significativa a incidência de eventos compostos renais e cardiovasculares em pacientes com DRC moderada a avançada (Levey



et al., 2020). Os mecanismos de nefroproteção incluem: a redução da pressão intraglomerular por meio da restauração do feedback túbulo-glomerular, a atenuação da albuminúria, a melhora da função endotelial, o efeito natriurético e a modulação das vias inflamatórias e oxidativas. (Remuzzi et al., 2018). O estudo de EMPA-KIDNEY (KDIGO, 2022), corroborou, destacando a eficácia da empagliflozina na preservação da função renal em ampla gama de pacientes, inclusive aqueles com etiologias não diabéticas de DRC. Os SGLT2i também demonstraram capacidade de reduzir a albuminúria, estabilizar a TFG e

mitigar os riscos de internação hospitalar por insuficiência cardíaca. A farmacodinâmica se dá predominantemente no túbulo contorcido proximal, onde bloqueiam o reabsorvedor sódio-glicose, reduzindo a reabsorção tubular tanto de glicose quanto de sódio, o que resulta em alterações hemodinâmicas renais benéficas, como a restauração do *feedback* túbulo-glomerular, diminuição da hiperfiltração glomerular e redução da pressão intraglomerular. (Remuzzi et al., 2018).

A inibição do SGLT2 induz um efeito diurético e natriurético que contribui para a diminuição do volume plasmático e da pressão arterial, fatores cruciais na modulação da progressão da nefropatia. Essas drogas reduzem o EO e inflamação renal, mecanismos centrais na patogênese da fibrose intersticial e da perda da função renal. O sinergismo atua positivamente nos aspectos clínicos, com redução significativa dos eventos renais adversos, como o declínio acelerado da TFG, a progressão para insuficiência renal terminal e a necessidade de terapia dialítica (Ferreira; Silva, 2023; KDIGO, 2022). A segurança dos SGLT2i é favorável, pois apesar dos efeitos adversos como: infecções do trato geniturinário, a hipotensão ortostática e, em casos raros, a cetoacidose euglicêmica. Ainda assim, os benefícios superam substancialmente os riscos, especialmente quando considerados os desfechos clínicos renais e cardiovasculares (Moe et al., 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As doenças renais crônicas constitui desafio à saúde pública global, não apenas pela sua alta prevalência e impacto clínico devastador, mas também por sua íntima associação com o *diabetes mellitus* tipo 2 e a hipertensão arterial sistêmica. Sua fisiopatologia complexa, marcada por processos inflamatórios, hemodinâmicos, oxidativos e fibrogênicos, demanda abordagens terapêuticas que transcendam o mero controle sintomático, exigindo estratégias capazes de intervir precocemente e de maneira eficaz na progressão do dano renal. Então, os inibidores do cotransportador SGLT2i, emergem como uma inovação terapêutica de grande impacto, cuja aplicabilidade clínica ultrapassa o controle glicêmico, demonstrando benefícios nefroprotetores e cardiovasculares robustos, mesmo em indivíduos não diabéticos.

A análise dos estudos multicêntricos, evidencia a consistência dos resultados favoráveis à redução da progressão da DRC, da albuminúria e de eventos adversos renais e cardiovasculares, consolidando o papel dos SGLT2i como agentes multifuncionais e indispensáveis no manejo das nefropatias crônicas. Assim, os efeitos benéficos são a restauração do *feedback* túbulo-glomerular, diminuição da pressão intraglomerular, modulação do estresse oxidativo, a melhora da função endotelial e o efeito anti-inflamatório.

Portanto, a incorporação dos inibidores de SGLT2 à prática clínica representa uma mudança de paradigma na nefrologia, com potencial para transformar significativamente o curso natural da DRC, reduzindo sua carga assistencial e socioeconômica. Cabe agora à comunidade científica e aos gestores de saúde assegurar o acesso ampliado e equitativo a essa classe terapêutica, promovendo a implementação de protocolos baseados em evidências e a educação permanente dos profissionais envolvidos no cuidado dos pacientes renais. A



continuidade de estudos clínicos e translacionais é imperativa para elucidar plenamente o potencial terapêutico dos SGLT2i e expandir suas indicações, contribuindo para a evolução do cuidado centrado no paciente com DRC.

Palavras-chave: Doença renal crônica; Estresse oxidativo; Inibidores do co-transportador sódio-glicose tipo 2; Nefropatias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRENNER, Barry M.; RECTOR, Floyd C. **O rim: fisiologia e fisiopatologia**. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

DIWAN, Vikas et al. **Pathophysiology of chronic kidney disease: An overview**. Kidney International Supplements, v. 12, n. 1, p. 23-36, 2022.

<https://doi.org/10.1016/j.kisu.2021.11.004>

FERREIRA, Lúcio S.; SILVA, Amanda P. **Inibidores de SGLT2 no tratamento da doença renal crônica: novos paradigmas terapêuticos**. Revista Brasileira de Nefrologia Clínica, v. 45, n. 2, p. 133-142, 2023.

FOGO, Agnes B.; KON, Valentina. **Pathophysiology of chronic kidney disease: insights into mechanisms and therapy**. Nature Reviews Nephrology, v. 16, p. 49–62, 2020.

<https://doi.org/10.1038/s41581-019-0190-1>

GBD. **Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2020: a systematic analysis**. The Lancet, v. 395, n. 10225, p. 709-733, 2020.

HEERSPINK, Hiddo J. L. et al. **Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease**. The New England Journal of Medicine, v. 383, n. 15, p. 1436–1446, 2020.

<https://doi.org/10.1056/NEJMoa2024816>

KHAN, M. Amir et al. **Global burden of chronic kidney disease: current status, challenges and future perspectives**. Nature Reviews Nephrology, v. 17, p. 719–732, 2021. <https://doi.org/10.1038/s41581-021-00452-0>

KDIGO. **2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease**. Kidney International Supplements, v. 12, n. 4, p. 1–115, 2022.

<https://kdigo.org>

LEVEY, Andrew S. et al. **Chronic kidney disease**. The Lancet, v. 395, p. 709–733, 2020.

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30541-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30541-8)

LOPES, Aline C. et al. **Anemia na doença renal crônica: causas, consequências e tratamentos**. Jornal Brasileiro de Nefrologia, v. 43, n. 4, p. 510-518, 2021.

<https://doi.org/10.1590/2175-8239-JBN-2021-0104>

MOE, Sharon M. et al. **Chronic kidney disease–mineral and bone disorder: Pathophysiology and management**. The Lancet Diabetes & Endocrinology, v. 9, n. 12, p. 873–885, 2021. [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(21\)00241-6](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00241-6)

REMUZZI, Giuseppe et al. **Chronic kidney disease: a public health priority with new challenges and opportunities**. The Lancet, v. 392, n. 10151, p. 264–271, 2018.



[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31069-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31069-4)

SBN. **Dados da doença renal crônica no Brasil**. São Paulo: SBN, 2023. Disponível em: <https://www.sbn.org.br>. Acesso em: 4 jun. 2025.

SIES, Helmut; JONES, Dean P. **Reactive oxygen species (ROS) as pleiotropic physiological signalling agents**. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, v. 21, p. 363–383, 2020. <https://doi.org/10.1038/s41580-020-0230-3>

STENVINKEL, Peter et al. **Vascular ageing and chronic kidney disease: a nuclear threat to life**. *Nephrology Dialysis Transplantation*, v. 36, n. 3, p. 393–399, 2021. <https://doi.org/10.1093/ndt/gfaa158>



ESTRESSE OXIDATIVO E DISFUNÇÃO MITOCONDRIAL EM NEFROPATIAS: IMPLICAÇÕES TERAPÊUTICAS

¹Anderson Nascimento de Andrade

²Alan Nascimento de Andrade

³Anderson Nascimento de Andrade

¹ Universidade Estadual do Ceará. Itapipoca, Ceará, Brasil; ² Universidade Federal do Ceará. Sobral, Ceará, Brasil

Área temática: Biologia

Resumo: As nefropatias como as doenças renais crônicas, representam um grave e crescente problema de Saúde Pública e Coletiva, com alterações funcionais e estruturais nos néfrons. Analisou-se a inter-relação entre estresse oxidativo e disfunção mitocondrial. Pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, com abordagem narrativa, baseada em artigos publicados entre 2014 e 2024, em português e inglês, em bases de dados sólidos para as pesquisas. Evidências apontam que o estresse oxidativo desempenha papel crucial na indução da lesão tubular e glomerular, agravando processos inflamatórios e fibrosantes no parênquima renal. O estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial representam mecanismos fisiopatológicos na progressão das nefropatias, notadamente, na doença renal crônica e na nefropatia diabética. A mitocôndria, ao atuar como epicentro da homeostase energética, regula também a produção de espécies reativas de oxigênio. Então, a compreensão aprofundada desses mecanismos permite o delineamento de estratégias terapêuticas mais precisas e eficazes, ancoradas na proteção da integridade mitocondrial e no reequilíbrio do estado redox celular. Dessa forma, o uso de antioxidantes como os discutidos e compostos mitoprotetores naturais e sintéticos se apresenta como uma alternativa terapêutica promissora.

INTRODUÇÃO

As nefropatias, notadamente as doenças renais crônicas (DRC), representam um grave e crescente problema de Saúde Pública e Coletiva, sendo marcadas por alterações funcionais e estruturais nas unidades básicas dos rins (néfrons). Estima-se que elas afetem atualmente cerca de 850 milhões de pessoas de forma global, configurando-se como a 10^a principal causa de morte mundial. Sendo assim, as DRC possuem uma projeção de forma exponencial, saltando para a 5^a posição até o ano de 2040, segundo dados da Global Burden of Disease (GBD, 2020).

No Brasil, os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) apontam que mais de 145 mil pessoas realizaram terapia renal substitutiva no de 2023, sendo que a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus são os principais fatores etiológicos associados as patologias renais (SBN, 2023), e entre os fatores fisiopatológicos subjacentes as DRC, têm-se encontrado tanto o estresse oxidativo (EO), que gera a produção exacerbada de radicais livres, quanto a disfunção mitocondrial, já que ambos foram apontados como elementos centrais na progressão da lesão renal (Diwan et al., 2022).

O estresse oxidativo é um fator chave na fisiopatologia de diversas doenças crônicas, incluindo as nefropatias e é caracterizado por um desbalanço entre a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e a atuação pouco eficiente do sistema antioxidante endógeno celular, implicando sérias consequências como: a lipoperoxidação nas membranas



biológicas, lesões em proteínas e no DNA, comprometendo intrinsecamente a fisiologia celular (Sies; Jones, 2020). Sendo assim, ao mesmo tempo, que a mitocôndria que é uma organela responsável pelo processamento energético e reguladora da apoptose, torna-se vulnerável a atuação do EO, pois apesar de existir o estresse celular fisiológico, o desbalanço dos sistema redox, cria uma condição de agravamento à disfunção metabólica renal (Liu et al., 2019).

Nesse cenário, as substâncias antioxidantes emergem como elementos fundamentais para atenuar os danos oxidativos, proteger estruturas celulares, como as mitocôndrias, e assim, contribuir para o manejo das DRC e outras nefropatias. Então, o uso de substâncias antioxidantes, naturais ou sintéticas, representa uma estratégia terapêutica promissora, capaz de restaurar o balanço redox e a funcionalidade mitocondrial. Diversos estudos têm destacado o papel de antioxidantes como a coenzima Q10, vitaminas C e E, curcumina, resveratrol, N-acetilcisteína (NAC) e compostos fenólicos oriundos de plantas medicinais.

Em suma, o emprego de substâncias antioxidantes representa uma abordagem multifacetada para mitigar o estresse oxidativo e restaurar a integridade mitocondrial em nefropatias. Portanto, a compreensão desses mecanismos tem impulsionado a busca por terapias antioxidantes e mitocondriais, com potencial para retardar a progressão das nefropatias.

OBJETIVO

Analisar a inter-relação entre estresse oxidativo e disfunção mitocondrial nas nefropatias, destacando suas implicações terapêuticas para dirimir as consequências crônicas ao longo dessas enfermidades.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, com abordagem narrativa, baseada em artigos publicados entre 2014 e 2024, em português e inglês, nas bases de dados PubMed, Scielo, ScienceDirect, Elsevier, Scopus. As buscas foram realizadas com o uso dos seguintes descritores: “oxidative stress”, “mitochondrial dysfunction”, “kidney disease”, “nephropathy”, “antioxidants”, e “renal therapy”. Foram selecionados 28 artigos nos idiomas supracitados. Para seleção desses artigos, utilizaram-se os critérios de inclusão como: as revisões sistemáticas, ensaios clínicos e estudos experimentais com foco em mecanismos fisiopatológicos e terapias inovadoras, e como os critérios de exclusão foram descartados aqueles que não estivessem de acordo com o escopo com os objetivos da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Evidências apontam que o estresse oxidativo desempenha papel crucial na indução da lesão tubular e glomerular, agravando processos inflamatórios e fibrosantes no parênquima renal (Zhou et al., 2023), principalmente pelo fato da mitocôndria, além de ser fonte primária de EROs, pois em muitos pacientes há redução de enzimas antioxidantes como SOD (superóxido dismutase), catalase e glutathione peroxidase, as quais são primordiais no combate aos radicais livres e esse estresse, portanto, favorecendo a progressão da doença (Yang et al., 2020), consequentemente há danos estruturais com liberação de citocromo C, diminuição do potencial de membrana e indução da apoptose (Kim et al., 2021), condições são críticas nas DRC.

Dados da Global Burden of Disease (2020) e da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN, 2023) indicam que há 10 doenças ou condições mais comumente associadas à



mortalidade por esse rol de doenças, as quais incluem, respectivamente: a diabetes mellitus tipo 2 (DM-2), responsável por cerca de 30 a 40% desses casos em nível mundial, já que o excesso de glicemia plasmático, promove glicação avançada de proteínas e aumento das EROs, desencadeando dano mitocondrial e fibrose renal (Forbes; Cooper, 2013).

Outra doença que se destaca é a hipertensão arterial sistêmica (HAS), já que a condição é atribuída diretamente na atuação exacerbada por meio da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), promovendo inflamação crônica e disfunção endotelial (Taylor et al., 2021). A aterosclerose também é inclusão neste rol, visto que o EO compartilha contribui na fisiopatologia imunológica, culminando a sobreposição entre disfunção endotelial e lesão glomerular (Stocker; Keane, 2022). Deste modo, as glomerulonefrites crônicas, as quais são caracterizadas por infiltração imune e aumento de citocinas inflamatórias, intensificam a produção de EROs e a apoptose celular tubular (Zhang et al., 2020). Logo em seguida há a lúpus eritematoso sistêmico, de modo que em casos de nefrite lúpica, há intensa produção de auto anticorpos que ativam vias oxidativas e lesam diretamente os glomérulos (Fonseca et al., 2019).

Além dessas, patologias há a nefropatia obstrutiva crônica (uropatia obstrutiva), que por sua vez ocasiona o acúmulo de urina e isquemia resultando em EO local, inflamação e remodelamento tecidual (Lee et al., 2022). Há também a nefropatia por HIV e coinfeções, logo, a replicação viral induz dano mitocondrial e aumenta a produção de EROs nos túbulos proximais renais (Wynn et al., 2020). Outras patologias como: a doença policística renal autossômica dominante (DPAD), embora seja uma condição genética, a progressão dela está associada ao acúmulo de RLs e dano ao DNA mitocondrial (Torres; Harris, 2021). As Intoxicações por metais pesados (como chumbo e cádmio), promovem no organismo uma série de consequências o que inclui o EO direto e inibem enzimas antioxidantes e levam à apoptose tubular (Wu et al., 2020).

No contexto das nefropatias diabéticas, substâncias antioxidantes vêm sendo exploradas não apenas por seu efeito de neutralização de ERO, mas também por sua capacidade de modular vias sinalizadoras relacionadas à fibrose e à apoptose. De acordo com Bhatti et al. (2023), a administração de antioxidantes reduziu significativamente a expressão de marcadores inflamatórios e fibrogênicos em modelos experimentais de lesão renal. E findando as 10 doenças deste rol tem-se nefrotoxicidade induzida por anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), já que o uso desses fármacos é mediada por redução da síntese de prostaglandinas, isquemia medular e aumento de EROs (Nakagawa; Tanaka, 2018).

Diante o exposto, uma das terapias a ser utilizada nessas mazelas seria o uso de antioxidantes que de acordo com Halliwell e Gutteridge (2015), “os antioxidantes são moléculas capazes de retardar ou inibir a oxidação de um substrato mesmo quando presentes em baixas concentrações, atuando por meio da neutralização de RLs.” Essa neutralização evita as lesões comentadas, que fazem parte dos eventos comuns em tecidos renais sob condições de estresse oxidativo.

Deste modo, os antioxidantes que vêm sendo testadas com resultados promissores são compostos como coenzima Q10, resveratrol e NAC mostraram eficácia em modular vias oxidativas e preservar a função mitocondrial (LI; ZHAO et al., 2022). A NAC, por exemplo, atua como precursor da glutatona, um antioxidante endógeno essencial, promovendo proteção contra danos renais induzidos por cisplatina (Yang et al., 2018). Já o resveratrol tem se mostrado eficaz na preservação da função mitocondrial e na redução da inflamação renal por meio da ativação da via SIRT1/PGC-1 α (Zhou et al., 2021).

Intervenções com agonistas de PGC-1 α (coativador γ do receptor ativado por proliferador de peroxissoma) promoveram biogênese mitocondrial e melhoraram a função



renal em modelos experimentais (Ferreira; Lima; Oliveira, 2021). Por sua vez, terapias direcionadas às mitocôndrias, como os peptídeos mitocondriais (SS-31), apresentaram efeitos antiapoptóticos e anti-inflamatórios em modelos de nefropatia diabética (Chen et al., 2023). Portanto, vale destacar que o uso terapêutico dessas substâncias requer a compreensão de aspectos como biodisponibilidade, farmacocinética, interações medicamentosas e possíveis efeitos adversos. Por isso, o desenvolvimento de formulações com maior estabilidade e liberação controlada tem sido um foco da farmacotecnologia atual, visando potencializar os efeitos protetores renais dos antioxidantes (Al-Otaibi et al., 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial representam mecanismos fisiopatológicos centrais na progressão das nefropatias, em especial na doença renal crônica e na nefropatia diabética. A mitocôndria, ao atuar como epicentro da homeostase energética, regula também a produção de EROs. A compreensão aprofundada desses mecanismos permite o delineamento de estratégias terapêuticas mais precisas e eficazes, ancoradas na proteção da integridade mitocondrial e no reequilíbrio do estado redox celular. Dessa forma, o uso de antioxidantes como os discutidos e compostos mitoprotetores naturais e sintéticos se apresenta como uma alternativa terapêutica promissora.

No entanto, observa-se uma lacuna entre os avanços obtidos em modelos pré-clínicos e sua tradução para a prática clínica. Estudos clínicos randomizados de maior escala e rigor metodológico ainda são necessários para avaliar a eficácia, segurança e aplicabilidade dos antioxidantes no contexto das nefropatias. Adicionalmente, o desenvolvimento de tecnologias de liberação controlada e de compostos com maior biodisponibilidade e especificidade mitocondrial pode ampliar consideravelmente o potencial terapêutico dessas substâncias.

Neste cenário, reforça-se a relevância da mitocôndria como alvo terapêutico emergente na nefrologia moderna. A interdependência entre o estresse oxidativo e as alterações mitocondriais no parênquima renal revela a necessidade de abordagens integradas e sistêmicas, que considerem não apenas o controle das comorbidades de base (como a hipertensão e o diabetes). Além disso, o uso de compostos bioativos derivados de plantas medicinais com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias tem se mostrado eficaz em diversos modelos experimentais de nefropatia. Essas evidências apontam para um caminho terapêutico complementar ao tratamento farmacológico convencional, sobretudo em contextos de medicina integrativa.

Portanto, diante do crescente impacto das DRC na Saúde Pública e Coletiva da limitada eficácia dos tratamentos atuais em impedir sua progressão, torna-se urgente o investimento em pesquisas translacionais que integrem biomarcadores mitocondriais, terapias antioxidantes e estratégias personalizadas de intervenção. Assim, vislumbra-se a possibilidade de redefinir paradigmas no cuidado ao paciente renal, promovendo maior eficácia terapêutica, menor toxicidade e melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Antioxidantes; Disfunção mitocondrial; Estresse oxidativo; Nefropatias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AL-OTAIBI, Mohammed Fahad et al. **Antioxidant therapies in kidney diseases: recent advances and future perspectives.** International Journal of Molecular Sciences, Basel, v. 23, n. 18, p. 10751, 2022.



BHATTI, Jaspreet Singh; RANI, Anuradha; BHATTI, Gurjeet Singh. **Role of oxidative stress and antioxidant therapies in diabetic nephropathy: a review**. Life Sciences, Amsterdam, v. 318, p. 121444, 2023.

CHEN, Xiaojun; et al. **Mitochondria-targeted peptide SS-31 protects against diabetic nephropathy via inhibition of oxidative stress and apoptosis**. Redox Biology, v. 65, p. 102779, 2023.

DIWAN, Vishal; PARANJAPE, Aniket; RAGHUNATH, Muthuswamy; CHOUDHARY, Gaurav. **Mitochondrial dynamics and kidney disease: therapeutic implications**. Kidney International Reports, v. 7, n. 1, p. 45–56, 2022.

FERREIRA, Carlos Henrique; LIMA, Amanda Raquel; OLIVEIRA, Bruno Luiz. **PGC-1 α : papel terapêutico na biogênese mitocondrial e na função renal**. Revista Brasileira de Nefrologia, São Paulo, v. 43, n. 2, p. 211–218, 2021.

FORBES, Josephine M.; COOPER, Mark E. **Mechanisms of diabetic complications**. Physiological Reviews, Bethesda, v. 93, n. 1, p. 137–188, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1152/physrev.00045.2011>.

GLOBAL BURDEN OF DISEASE COLLABORATORS. **Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2020: a systematic analysis**. The Lancet, v. 396, n. 10258, p. 1223–1249, 2020.

HALLIWELL, Barry; GUTTERIDGE, John Michael Christopher. **Free radicals in biology and medicine**. 5. ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.

KIM, Ji Hye; et al. **Mitochondrial dysfunction in chronic kidney disease: mechanisms and therapeutic targets**. International Journal of Molecular Sciences, v. 22, n. 10, p. 5297, 2021.

LEE, Hee-Seung et al. **Oxidative stress-induced kidney injury in obstructive uropathy**. International Journal of Molecular Sciences, Basel, v. 23, n. 11, p. 6114, 2022. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijms23116114>.

LI, Xue; ZHAO, Ming et al. **Effects of coenzyme Q10, resveratrol, and N-acetylcysteine on mitochondrial function and oxidative stress in renal disease models**. Redox Biology, [S.l.], v. 51, p. 102282, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.redox.2022.102282>.

LIU, Yuan; et al. **Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in kidney diseases**. Journal of Molecular Medicine, v. 97, p. 1327–1340, 2019.

MANSOUR, Heba Hassan; EZZ, Mona Khairy; ATEF, Heba Mahmoud. **Mitochondrial dysfunction and oxidative stress in renal diseases: an update**. Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, Hoboken, v. 34, n. 9, e22574, 2020.

NAKAGAWA, Takashi; TANAKA, Tetsuhiro. **Mechanisms of NSAID-induced nephropathy**. Clinical and Experimental Nephrology, Tokyo, v. 22, n. 1, p. 1–8, 2018.



DOI: <https://doi.org/10.1007/s10157-017-1442-0>.

SIES, Helmut; JONES, Dean Paul. **Reactive oxygen species (ROS) as pleiotropic physiological signalling agents**. Nature Reviews Molecular Cell Biology, v. 21, p. 363–383, 2020.



DISTÚRBIOS ENDÓCRINOS E SAÚDE MENTAL: A RELAÇÃO ENTRE HIPOTIREOIDISMO E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS

¹Thiago Pereira Carvalho Franco de Souza

²Mariana Rocha Abrahão

³Isabela Cher Pimentel Afiune

⁴Thais Salles Pereira

⁵Ana Letícia Teixeira Couto

⁶Rogério Esposito Vilela Filho

⁷Maria Clara de Castro Galvão

⁸Isabel Cristina Carvalho Medeiros Francescantonio

¹Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ²Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ³Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁴Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁵Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁶Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁷Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil; ⁸Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil.

Área temática: Medicina.

Resumo: Distúrbios endócrinos, em especial o hipotireoidismo subclínico (HSC), estabelecem uma relação bidirecional complexa com transtornos psiquiátricos, como o transtorno depressivo maior (TDM) e a ansiedade, através de mecanismos neuroendócrinos, genéticos e neurofuncionais. Esta revisão de literatura examinou 23 estudos na base PubMed, com os termos "*Mental Disorders*" AND "*Hypothyroidism*", para apresentar as principais evidências sobre tal relação. O HSC apresenta prevalência de 9,4%–60,6% entre os pacientes com TDM e correlaciona-se com desfechos clínicos mais graves, como sintomatologia depressiva intensa, déficits cognitivos e desregulação metabólica. Estudos de imagem por ressonância magnética funcional (fMRI) em pacientes com HSC-TDM mostraram conectividade alterada das redes sensoriais e visuais, associada a alterações funcionais em regiões cerebrais ligadas à cognição e a níveis de triiodotironina livre (T3L) anormais. Depressão e ansiedade aumentaram o risco de disfunção tireoidiana com índices ajustados de 1,27–1,56 para hipotireoidismo e de 1,19–1,84 para hipertireoidismo, sustentados por *loci* genéticos compartilhados. Os mecanismos bidirecionais envolvem desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide (HHT), desequilíbrios de neurotransmissores (serotonina/noradrenalina) e fatores autoimunes. Mesmo pacientes psiquiátricos eutireoideos podem apresentar irregularidades hormonais tireoidianas, sugerindo que os valores de referência atuais talvez não reflitam adequadamente a atividade tireoidiana cerebral. As descobertas apontam para um tratamento clínico integrado, que deve incluir rastreamento tireoidiano rotineiro (TSH, T4L) em populações psiquiátricas e indicação de terapia hormonal suplementar. Pesquisas futuras devem focar em intervenções personalizadas que visem vias fisiopatológicas comuns para otimizar os resultados terapêuticos. Esta revisão enfatiza a importância da colaboração interdisciplinar entre endocrinologia e psiquiatria para abordar essa comorbidade complexa.

INTRODUÇÃO

Distúrbios endócrinos, como o hipotireoidismo, são frequentemente relacionados a problemas psiquiátricos, como o transtorno depressivo maior (TDM) e ansiedade, evidenciando uma complexa interação entre os sistemas hormonal e neurológico (LIU et al.,



2025; FAN et al., 2024). O hipotireoidismo subclínico (HSC), caracterizado por níveis elevados de hormônio tireoestimulante (TSH) com T4 livre normal, acomete 9,4% a 60,6% dos pacientes com TDM e provoca agravamento dos sintomas depressivos e redução das funções cognitivas (LIU et al., 2025; ZHAO et al., 2025). Os pacientes que apresentam TDM e HSC apresentam maior risco de síndrome metabólica, dislipidemia e alterações neurofuncionais, como conectividade anormal em redes cerebrais associadas ao processamento sensorial e visual (ZHAO et al., 2025).

Além disso, a relação bidirecional entre disfunção tireoidiana e saúde mental é reforçada por pesquisas prospectivas. Um estudo de coorte com 349.993 participantes do UK Biobank identificou que depressão e ansiedade aumentam o risco de desenvolvimento de doenças tireoidianas, com hazard ratios (HR) de 1,56 para hipotireoidismo e 1,84 para hipertireoidismo em casos graves (FAN et al., 2024). Esses achados sugerem que alterações no eixo hipotálamo-hipófise-tireoide (HHT) e no sistema imunológico, como a presença de anticorpos antitireoidianos, podem mediar essa associação (LIU et al., 2025; FAN et al., 2024).

A análise por ressonância magnética funcional (fMRI) mostrou que pacientes com TDM e HSC apresentam conectividade anormal em redes de repouso, como o córtex cuneal e a área motora suplementar, correlacionando-se com déficits cognitivos e níveis de T3 livre (ZHAO et al., 2025). As evidências científicas destacam a necessidade de rastreamento e manejo integrado do HSC em populações psiquiátricas, visando melhorar desfechos clínicos e qualidade de vida. Este resumo expandido explora os mecanismos fisiopatológicos, impactos clínicos e implicações terapêuticas dessa comorbidade, com base em evidências recentes.

OBJETIVO

Analisar as evidências científicas sobre a relação entre hipotireoidismo (com ênfase no hipotireoidismo subclínico) e transtornos psiquiátricos, particularmente o transtorno depressivo maior e transtornos de ansiedade, abordando seus mecanismos fisiopatológicos, manifestações clínicas e implicações para o diagnóstico e tratamento integrado.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão de literatura conduzida na base de dados PubMed, em 7 de maio de 2025, com a utilização dos descritores “Mental Disorders” e “Hypothyroidism”, combinados pelo operador booleano “AND” e refinados por termos MeSH (Medical Subject Headings), aplicando-se os filtros “free full text”, “associated data” e “in the last 5 years”. A busca resultou em 25 artigos, sendo 3 excluídos por não se adequarem ao tema. Permaneceram 23 artigos para a análise que foram selecionados conforme o critério de inclusão: estudos que sejam meta-análises, artigos originais ou revisões que abordam sobre a relação do hipotireoidismo com transtornos psiquiátricos. Foram excluídos artigos de opinião, editoriais, resumos de eventos e estudos com metodologia inadequada. Os dados dos artigos selecionados foram organizados em formulários padronizados e analisados qualitativamente, com o objetivo de identificar padrões temáticos e evidências recorrentes relacionados ao tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Pesquisas recentes confirmam a conexão entre distúrbios endócrinos, como o



hipotireoidismo, especialmente o HSC, e o agravamento ou desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, em particular o TDM e a ansiedade. Essa associação é respaldada por achados clínicos, neurofuncionais e genéticos, reforçando a complexidade da interação entre o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide e o sistema nervoso central.

Estudos de neuroimagem funcional mostraram que pacientes com TDM e HSC apresentam alterações significativas na conectividade funcional (CF) cerebral, especialmente nas redes sensoriomotoras e visuais (RSMV, RSMD e RVO). Especificamente, maior CF no cuneus esquerdo foi observada no grupo HSC-TDM, indicando uma possível tentativa de compensação cerebral frente ao prejuízo cognitivo. A análise revelou que níveis mais baixos de triiodotironina livre (T3L) correlacionaram-se com menor CF no córtex motor suplementar, enquanto maior CF no cuneus se associou a melhor desempenho no teste cognitivo DSST (LI et al., 2024). Esses achados são altamente relevantes, pois demonstram não apenas a sobreposição entre distúrbios endócrinos e psiquiátricos, mas também sugerem mecanismos neurobiológicos compartilhados que impactam diretamente a cognição, um dos pilares do bem-estar funcional em pacientes com TDM.

A relevância desses dados está no reforço da necessidade de abordagem diagnóstica e terapêutica integrada. Em nível clínico, pacientes com HSC e TDM tendem a apresentar sintomas mais graves e persistentes, possivelmente devido à modulação inadequada de neurotransmissores como serotonina e noradrenalina, diretamente influenciada pelos hormônios tireoidianos. Portanto, os dados neurofuncionais não só esclarecem os mecanismos que interligam disfunções tireoidianas e transtornos mentais, como também justificam o rastreio de TSH e T4 livre em pacientes psiquiátricos, mesmo na ausência de sintomas endócrinos clássicos.

Essa relação é apoiada por estudos epidemiológicos. Uma análise com 349.993 indivíduos do UK Biobank revelou que sintomas de depressão e ansiedade aumentam significativamente o risco de desenvolver hipotireoidismo (HR ajustado: 1,27 a 1,56) e, em menor grau, hipertireoidismo (HR: 1,19 a 1,84), com um efeito dose-resposta proporcional à gravidade dos sintomas (ZHOU; ZHU, 2024). Esses achados indicam que transtornos psiquiátricos não são apenas consequências das disfunções tireoidianas, mas também potenciais fatores de risco, enfatizando a bidirecionalidade dessa relação. Isso se alinha com hipóteses fisiopatológicas como ativação crônica do eixo HPA, alteração da resposta do TSH ao TRH e presença de autoanticorpos tireoidianos em pacientes com distúrbios do humor.

Complementando esses dados, Zhou e Zhu (2024) identificaram uma forte correlação genética entre hipotireoidismo e transtornos como TDM e ansiedade, com 30 loci pleiotrópicos compartilhados. A correlação mais forte foi com TDM (coeficiente genético de 0,264; $p = 7,35 \times 10^{-12}$), sugerindo que a base dessa comorbidade pode estar enraizada não apenas em fatores ambientais e fisiológicos, mas também genéticos (ZHAO et al., 2025). Essa evidência reforça a hipótese de um substrato biológico comum, explicando a alta prevalência da associação entre essas condições e sustentando a concordância observada na literatura.

Adicionalmente, há implicações específicas em subgrupos, como demonstrado por um estudo com adolescentes chineses com depressão maior, onde foi observada maior prevalência de hipotiroxinemia isolada, principalmente entre mulheres. Tais alterações foram independentes do status nutricional de iodo, indicando que o TSH e T4L, mesmo dentro da normalidade, podem não refletir adequadamente a função tireoidiana em populações psiquiátricas (WEI et al., 2024). Isso pode explicar por que muitos pacientes não respondem de forma satisfatória apenas ao tratamento antidepressivo, indicando que a função tireoidiana pode ser um alvo terapêutico adicional relevante.



Os estudos revisados na literatura demonstraram uma relação sólida entre disfunção tireoidiana e transtornos psiquiátricos, especialmente TDM e ansiedade. Os mecanismos fisiopatológicos propostos — disfunção do eixo HPT, alterações na neuroplasticidade e neurotransmissão, e predisposição genética — sustentam a plausibilidade dessa relação. No entanto, os achados também expõem a heterogeneidade individual e a complexidade diagnóstica, reforçando a necessidade de abordagens clínicas personalizadas e investigações futuras sobre intervenções que integrem tratamento hormonal e psiquiátrico.

CONCLUSÃO

As evidências científicas mostraram que existe uma conexão importante entre o HSC e os transtornos psiquiátricos, em particular o TDM e os transtornos de ansiedade. Os mecanismos fisiopatológicos que explicam essa associação envolvem alterações no eixo HPT, disfunções neuroquímicas relacionadas a neurotransmissores como serotonina e noradrenalina, conectividade funcional cerebral anormal e fatores genéticos compartilhados. Além disso, os dados apontam para uma relação bidirecional entre essas condições, sugerindo que tanto as disfunções tireoidianas podem predispor a transtornos psiquiátricos quanto os próprios transtornos mentais podem aumentar o risco de alterações tireoidianas.

Essas descobertas reforçam a necessidade de um enfoque clínico mais atento e integrado entre endocrinologia e psiquiatria, com o rastreo de parâmetros tireoidianos mesmo em pacientes sem sintomas endócrinos típicos. A implementação de métodos diagnósticos e de tratamentos que integram a conexão hormonal com a saúde mental, permitirá uma abordagem mais eficiente, melhorando a resposta ao tratamento psiquiátrico e promovendo maior qualidade de vida aos pacientes. Futuras pesquisas devem aprofundar o papel da terapia hormonal adjuvante e explorar intervenções individualizadas com base nos perfis fisiológicos e genéticos dos pacientes.

Palavras-chave: Ansiedade; Endocrinologia; Hipotireoidismo; Transtorno Depressivo Maior.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FAN, T. et al. The association between depression, anxiety, and thyroid disease: a UK Biobank prospective cohort study. **Depression and Anxiety**, v. 2024, p. 1-9, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2024/8000359>

LIU, J. et al. Prevalence and risk factors of subclinical hypothyroidism in young and middle-aged patients with first-episode drug-naïve major depressive disorder. **Depression and Anxiety**, v. 2025, p. 1-9, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/da/3154096>

ZHAO, S. et al. Exploring the interaction effects of subclinical hypothyroidism and major depressive disorder on brain networks. **BMC Medicine**, v. 23, n. 177, p. 1-11, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12916-025-03995-2>

LI, Z. et al. Causal relationship between insomnia and thyroid disease: a bidirectional Mendelian randomization study. **Brain and Behavior**, v. 14, n. 9, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/brb3.70046>



ZHOU, J.; ZHU, L. Shared genetic links between hypothyroidism and psychiatric disorders: evidence from a comprehensive genetic analysis. **Frontiers in Endocrinology**, v. 15, 2024. DOI: <https://doi.org/10.3389>

WEI, W. *et al.* Development of an animal model of hypothyroxinemia during pregnancy in Wistar rats. **Animal Models and Experimental Medicine**, v. 7, n. 6, p. 926–935, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ame2.12459>

FAN, J.; ZHOU, K.; YU, C. Causal Relationship Between Emotional Disorders and Thyroid Disorders: A Bidirectional Two-Sample Mendelian Randomization Study. **Brain and Behavior**, v. 15, n. 1, 2025. Disponível em <https://doi.org/10.1002/brb3.70252>

DEHESH, T.; MOSLEH-SHIRAZI, M. A.; DEHESH, P. Prevalence and associated factors of anxiety and depression among patients with hypothyroidism in Southern Iran. **BMC Psychiatry**, v. 25, n. 54, 2025. Disponível em <https://doi.org/10.1186/s12888-025-06490-3>

YE, J. *et al.* Thyroid dysfunction and risk of different types of dementia: A systematic review and meta-analysis. **Medicine**, v. 103, n. 34, 2024. Disponível em <http://dx.doi.org/10.1097/MD.00000000000039394>

ZHANG, X. *et al.* The causal relationship between major depression disorder and thyroid diseases: A Mendelian randomization study and mediation analysis. **Journal of Affective Disorders**, v. 359, p. 287–299, 2024. Disponível em <https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.05.097>



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APLICATIVOS MÓVEIS NO RASTREIO DE DOENÇAS OCULARES: POTENCIAL, LIMITAÇÕES E DESAFIOS ÉTICOS

¹Isadora Cristina Sobral Binda

²Alejandro Pereira Fernandes

¹Faculdade Brasileira de Cachoeiro - MULTIVIX. Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil;

²Universidade Federal do Oeste do Pará. Santarém, Pará, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo: O avanço da inteligência artificial (IA) e sua integração a aplicativos móveis têm transformado o rastreo de doenças oculares, oferecendo soluções acessíveis e ágeis, especialmente em regiões com acesso limitado a serviços oftalmológicos. Este trabalho analisa o potencial e as limitações dessas tecnologias na triagem de patologias como retinopatia diabética, glaucoma e degeneração macular. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica qualitativa, com base em estudos publicados entre 2015 e 2024, abordando desempenho técnico, aplicação clínica e desafios éticos e operacionais de sistemas de IA em plataformas móveis. Os resultados indicam que os algoritmos analisados demonstram alta sensibilidade e especificidade, sendo eficazes como ferramentas de apoio ao diagnóstico. Aplicativos como EyeArt, IDx-DR e Peek Vision mostram viabilidade mesmo em ambientes com pouca infraestrutura médica, permitindo triagens rápidas e em larga escala. As limitações incluem dificuldades na generalização dos algoritmos, riscos de viés, falta de padronização na validação clínica e preocupações com segurança de dados. Conclui-se que, embora promissores, esses sistemas exigem regulamentação clara, validação contínua e integração ética ao cuidado em saúde. O uso responsável dessas tecnologias pode ampliar o alcance do rastreo ocular e apoiar profissionais na identificação precoce de condições visuais tratáveis.

INTRODUÇÃO

Doenças oculares são uma das principais causas de deficiência visual e cegueira no mundo, muitas vezes evitáveis com diagnóstico precoce e acompanhamento adequado (World Health Organization, 2020). No entanto, a escassez de oftalmologistas, especialmente em regiões periféricas e países em desenvolvimento, compromete o rastreo eficaz. Nesse cenário, aplicativos móveis aliados à IA surgem como solução promissora para superar essas barreiras.

Avanços em algoritmos de aprendizado profundo possibilitam sistemas capazes de analisar imagens da retina e identificar sinais de retinopatia diabética, glaucoma e degeneração macular (Abràmoff et al., 2018). Em 2018, o FDA aprovou o IDx-DR, primeiro sistema de IA autônomo para detecção de retinopatia diabética, com sensibilidade de 87,4% e especificidade de 89,5% (Abràmoff et al., 2018).

A incorporação desses algoritmos em plataformas móveis expande as possibilidades de rastreo remoto. Aplicativos como Peek Vision e EyeArt permitem a captura e análise de imagens oculares por smartphones, com resultados em tempo real (Bastawrous et al., 2016; Rajalakshmi et al., 2015).

Contudo, permanecem desafios significativos: acurácia em populações diversas, necessidade de validação ampla, riscos de vieses e preocupações com privacidade dos dados



(Beede *et al.*, 2020). Também há questões éticas sobre delegar julgamentos clínicos a sistemas automatizados.

Este resumo expandido analisa criticamente o potencial e as limitações dos aplicativos móveis com IA para rastreamento ocular, considerando evidências científicas, aspectos técnicos, éticos e operacionais. O objetivo é discutir a viabilidade dessas soluções e os cuidados necessários para sua implementação segura e eficaz.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é apresentar, de forma clara e concisa, os principais avanços, aplicações e limitações do uso de aplicativos móveis integrados à inteligência artificial no rastreamento de doenças oculares. Busca-se fornecer ao leitor uma compreensão objetiva sobre o potencial dessas tecnologias para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, assim como os desafios técnicos, éticos e operacionais que ainda precisam ser superados para sua adoção segura e eficaz.

METODOLOGIA

Este trabalho adotou uma abordagem qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e análise crítica de estudos recentes sobre o uso de inteligência artificial e aplicativos móveis no rastreamento de doenças oculares. Foram selecionados artigos científicos, relatórios técnicos e diretrizes internacionais publicados entre 2015 e 2024, disponíveis nas bases de dados PubMed, Scopus e IEEE Xplore.

Os critérios de inclusão consideraram publicações com dados sobre desempenho de algoritmos de IA na detecção de patologias oculares, validações clínicas, aplicações em dispositivos móveis e discussões sobre ética, privacidade e viabilidade de uso em larga escala. Foram priorizados estudos com amostras significativas, validação externa e aplicabilidade prática. Por outro lado, os critérios de exclusão abrangeram estudos publicados antes de 2015, trabalhos sem acesso ao texto completo, artigos de opinião e revisões narrativas sem metodologia claramente descrita, publicações com viés comercial evidente e pesquisas que não envolvessem diretamente o uso de IA ou aplicativos móveis no contexto do rastreamento ocular. Também foram excluídos estudos duplicados encontrados em diferentes bases de dados.

Além disso, foram examinadas plataformas e aplicativos já utilizados em contextos reais de triagem, como o IDx-DR, EyeArt, Retmarker e Peek Vision, visando identificar seu funcionamento, eficácia diagnóstica e limitações reportadas. A análise foi orientada por três eixos principais: efetividade clínica, aplicabilidade tecnológica e implicações éticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise da literatura revelou que os algoritmos de inteligência artificial aplicados ao rastreamento de doenças oculares têm alcançado níveis elevados de acurácia em cenários clínicos controlados. Estudos demonstram que sistemas como o IDx-DR, EyeArt e Retmarker apresentam sensibilidade superior a 85% na detecção de retinopatia diabética, com especificidade também elevada, tornando-os viáveis para uso como ferramentas de triagem (Abramoff *et al.*, 2018; Rajalakshmi *et al.*, 2015).

Aplicativos móveis, quando integrados a esses algoritmos, mostraram-se eficazes



especialmente em regiões com escassez de oftalmologistas. O Peek Vision, por exemplo, tem sido utilizado em programas de saúde pública em países da África e da Ásia, permitindo a triagem ocular em larga escala com uso de smartphones e adaptadores ópticos de baixo custo (Bastawrous *et al.*, 2016).

No entanto, os resultados também evidenciam limitações importantes. A maioria dos algoritmos foi treinada com dados de populações específicas, o que pode comprometer seu desempenho em grupos étnicos ou clínicos diferentes daqueles usados no treinamento (Beede *et al.*, 2020). Além disso, muitos estudos são conduzidos em ambientes controlados, e sua eficácia no uso cotidiano, fora do contexto de pesquisa, ainda é incerta.

Outro ponto crítico é a ausência de padronização nos critérios de validação clínica e nos indicadores de desempenho, o que dificulta a comparação entre soluções. Questões éticas como privacidade de dados, consentimento informado e responsabilidade em caso de erro diagnóstico também foram apontadas como barreiras relevantes para a adoção ampla dessas tecnologias (Morley *et al.*, 2020).

Apesar desses desafios, há um consenso crescente na literatura de que aplicativos e IA podem atuar como ferramentas complementares ao trabalho dos profissionais da saúde, especialmente na triagem inicial e no monitoramento de pacientes em regiões carentes de infraestrutura médica. No entanto, sua implementação requer protocolos rigorosos de validação, transparência algorítmica e regulamentação adequada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do crescimento das doenças oculares evitáveis e da desigualdade no acesso ao diagnóstico, o uso de aplicativos móveis integrados à inteligência artificial se destaca como uma estratégia promissora para ampliar o rastreio de forma ágil e acessível. Como demonstra nos resultados, essas tecnologias já demonstram resultados positivos em termos de acurácia diagnóstica e viabilidade operacional, especialmente em regiões com escassez de recursos.

Entretanto, é preciso reconhecer que seu uso ainda envolve limitações importantes, como a variabilidade nos dados de treinamento, os riscos de viés algorítmico e as lacunas regulatórias e éticas. Portanto, conclui-se que, embora o potencial seja evidente, a aplicação prática dessas ferramentas exige cuidado, validação contínua e comprometimento com princípios de equidade e segurança.

Em síntese, a incorporação de IA e aplicativos no rastreio ocular deve ser vista não como uma substituição ao olhar clínico, mas como um complemento capaz de ampliar o alcance do cuidado. Recomenda-se que pesquisadores, desenvolvedores e profissionais da saúde atuem em conjunto para garantir que essas soluções tecnológicas sejam eficazes, transparentes e acessíveis a todos. Ao leitor interessado na área, cabe refletir sobre como essas inovações podem ser integradas de forma responsável ao cotidiano dos serviços de saúde.

Palavras-chave: Aplicativos Móveis; Diagnóstico Precoce; Doenças Oculares; Inteligência Artificial;



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Abràmoff, M. D; Lavin, P. T; Birch, M; Shah, N; Folk, J. C. Pivotal trial of an autonomous AI-based diagnostic system for detection of diabetic retinopathy in primary care offices.

npj Digital Medicine, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 39, 2018. Disponível em:

<https://www.nature.com/articles/s41746-018-0040-6>. Acesso em: 10 abr. 2025.

Bastawrous, A; Murphy, O; Shreve, M; Shingleton, K; Blandford, A; Mushtaque, N; Olusola, P; O'mullane, M; Morrissey, S; Kinross, J; Macdonald, L; Urban, G; Mutwiri, G; Chalmers, N; Phiri, E; Muto, S; Mair, G; Seed, P. Development and validation of a smartphone-based visual acuity test (Peek Acuity) for clinical practice and community-

based fieldwork. *JAMA Ophthalmology*, [S.l.], v. 134, n. 2, p. 204–210, 2016. Disponível em: <https://jamanetwork.com/journals/jamaophthalmology/fullarticle/2480722>. Acesso em: 23 abr. 2025.

Beede, E; Roehrenbeck, C; Trujillo, S; Goldstein, J; Graves, A. A human-centered evaluation of a deep learning system deployed in clinics for the detection of diabetic retinopathy. In: **Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems**. [S.l.]: ACM, 2020. p. 1–12. Disponível em:

<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3313831.3376718>. Acesso em: 23 abr. 2025.

Morley, J; Machado, C. C. V; Burr, C; Cows, J; Joshi, I; Taddeo, M; Floridi, L. Ethical guidelines for the use of AI in health care: a review of policy documents. **The Lancet Digital Health**, [S.l.], v. 2, n. 6, p. e255–e266, 2020. Disponível em:

[https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500\(20\)30060-1/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(20)30060-1/fulltext). Acesso em: 24 abr. 2025.

Rajalakshmi, R; Subramanian, M; Swaminathan, G; Sivakumar, J; Danda, S; Panwar, S; Kandasamy, B; Winnicki, J; Rogovin, J. Validation of smartphone-based retinal photography for diabetic retinopathy screening. **PLOS One**, [S.l.], v. 10, n. 9, p. e0138285, 2015. Disponível em:

<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0138285>. Acesso em: 23 abr. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **World report on vision**. Geneva: WHO, 2020.

Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570>.

Acesso em: 23 abr. 2025.

**BURNOUT EM TRABALHADORES DA SAÚDE: QUANDO O CUIDAR ADOECE**¹Gabrielle Sousa de Oliveira²Manuela Prestes Alves³Lara Backes de Lima⁴Telmo Laurence Acunha Solé Filho⁵Eduardo Araldi Didoné⁶Huda Tareq Khamis Ahmad⁷Manuela Bernardi da Silva⁸Raquel Pereira Janelli da Silva

¹Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil; ²Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil; ³Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil; ⁴Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil; ⁵Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil; ⁶Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil; ⁷Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil; ⁸Universidade Católica de Pelotas. Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil.

Área temática: Saúde Mental.

Resumo: Introdução: Sabe-se que a síndrome de Burnout está relacionada principalmente ao desgaste físico e emocional decorrente do trabalho excessivo. De certa forma, os profissionais da saúde são mais afetados, pois as longas jornadas e o ambiente sobrecarregado com pacientes doentes contribuem para o desenvolvimento da exaustão. Objetivo: O objetivo deste estudo é elucidar os motivos que levam os profissionais da saúde a desenvolverem a síndrome de Burnout. Metodologia: O estudo é uma revisão integrativa da literatura, realizada por meio das bases Google Acadêmico e SciELO, com foco em identificar causas do Burnout em profissionais da saúde. Após aplicar critérios de idioma, período (2009–2022) e local (Brasil), foram selecionados 4 artigos entre os 4.200 encontrados inicialmente. Resultados e Discussão: A síndrome é muito presente em profissionais da saúde. Um estudo em uma UBS no RJ mostrou que 4 dos 15 profissionais sofriam com a síndrome, agravada pela falta de tempo para si. Na UTI da Santa Casa de Araxá-MG, 40% relataram exaustão emocional e apontaram atividades físicas como forma de aliviar o estresse. A pandemia de COVID-19 agrava esse cenário, principalmente entre os que estavam na linha de frente. Estudos também mostraram que os mais jovens são mais vulneráveis, devido à autocobrança e à inexperiência. Conclusão: Portanto, o Burnout é comum entre profissionais da saúde, sendo essencial promover suporte emocional, autocuidado e melhores condições de trabalho.

INTRODUÇÃO

A Síndrome de Burnout é uma condição de desgaste físico e emocional provocada pela exposição constante ao estresse no ambiente profissional, o conceito foi introduzido por Freudenberg, em 1974, para expressar a sensação de estar sendo consumido internamente devido à carga excessiva de trabalho. Tem se o conhecimento que os

profissionais da área da saúde estão entre os mais afetados, por conta de lidarem diariamente com altas cargas de trabalho e perdas de pacientes. Sabe-se que os sinais da síndrome incluem cansaço extremo, alterações no sono, irritação, dores no corpo e queda no rendimento. Ademais, quando se trata de profissionais da área da saúde, não somente eles se colocam em risco como, por exemplo, o Burnout pode comprometer o atendimento prestado,



podendo ocasionar riscos ao paciente.

OBJETIVO

Esclarecer os reais motivos pelos quais os profissionais da saúde sofrem com a Síndrome de Burnout.

METODOLOGIA

O estudo abordado neste capítulo é uma Revisão Integrativa de Literatura, utilizou-se neste estudo a base de coleta de dados do Google Acadêmico e do SciELO. Os estudos foram escolhidos de modo que a pergunta “O que leva os profissionais da saúde a desenvolverem Burnout?” fosse esclarecida, em razão disso pesquisou-se por descritores como “Burnout em profissionais da saúde” e “Sobrecarga de trabalho em funcionários da saúde”, utilizou-se também a combinação de palavras chaves com os operadores booleanos “AND” e “OR”, como em “saúde AND Burnout” e “Estresse OR Burnout”. Foi realizado a aplicação de filtros automáticos, de acordo com o ano de publicação e idioma, foram escolhidos aqueles publicados entre 2009 e 2022 e somente foram analisados estudos em português provenientes do Brasil, inicialmente foram encontrados 4.200 artigos, para chegar aos 4 artigos selecionados foram excluídos aqueles que não combinavam com os critérios delimitados, como por exemplo estudos incompletos, estudos que foram publicados fora do período escolhido e estudos que não são provenientes do Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Burnout pode estar presente na vida de todo profissional que se expõem ao trabalho, entretanto, encontram-se níveis mais elevados em profissionais que trabalham com a saúde, segundo o estudo de pesquisa de Lima et al. (2023) ele encontrou que 4 entre 15 dos profissionais de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Paraíba do Sul/RJ sofrem pelas altas jornadas de trabalho, ocasionando em esgotamento profissional e consequentemente Burnout, as horas de trabalho são elevadas pois inúmeras vezes não há profissionais suficientes para os horários de funcionamento da UBS tirando tempo de suas vidas pessoais, uma estratégia encontrada por eles para fugir do esgotamento profissional é frequentar lugares de lazer e praticar esportes, exercícios físicos frequentes ajudam a reduzir o estresse e aumentam a liberação de endorfinas, ligadas ao bem-estar e menor ansiedade. Ademais, acredita-se que a pouca experiência e a insegurança dos mais jovens em relação ao futuro profissional podem ajudar a contribuir com o desgaste e consequentemente ficarem mais suscetíveis a desenvolverem Burnout, um estudo realizado com equipes da Estratégia de Saúde da Família em Santa Maria (RS) identificou que, embora a maioria dos profissionais não apresentasse sinais de Burnout, a síndrome foi detectada em cerca de 7% dos participantes, sendo os mais afetados foram os mais jovens (TRINDADE et al., 2009).

Além do mais, no estudo de Oliveira et al. (2021) foram selecionados 43 profissionais de saúde, dos quais 10 submeteram a participação da pesquisa, foi utilizado o formulário Maslach Burnout Inventory (MBI) na Unidade de Terapia Intensiva do hospital Santa Casa de Misericórdia de Araxá-MG os resultados mostraram que cerca de 40% dos profissionais demonstraram níveis elevados de exaustão emocional, enquanto 60% apresentaram baixa despersonalização e 80% revelaram alto grau de realização profissional



ou baixo índice de insatisfação com suas conquistas, conviver diariamente com o sofrimento, a morte e a enfermidade é desafiador e emocionalmente desgastante.

Profissionais da saúde que trabalham em Unidades de Terapia Intensiva inúmeras vezes acabam dedicando todo o seu dia para cuidar dos pacientes, negligenciando suas próprias necessidades, o que pode favorecer o surgimento da Síndrome de Burnout. Sabe-se que tragédias, pandemias e catástrofes mundiais também podem favorecer o esgotamento emocional, principalmente daqueles que estão na linha de frente nessas situações, como os profissionais da saúde, diante disso, durante a pandemia de COVID-19, profissionais da saúde que atuaram diretamente com pacientes infectados apresentaram níveis mais elevados de esgotamento tanto físico quanto emocional, quando comparado com aqueles que trabalhavam em enfermarias comuns, segundo os profissionais o distanciamento de familiares e amigos, junto com as jornadas exaustivas foram os gatilhos causadores do estresse vivido nessa época, estudos também indicam que a exaustão emocional nesses profissionais superou os padrões observados antes da pandemia, mostrando o impacto das condições extremas vividas nesse período sobre o desenvolvimento da Síndrome de Burnout (BORGES et al., 2021).

CONCLUSÃO

Portanto, sabe-se que o Burnout é altamente encontrado em profissionais da saúde, por conta de muitos possuírem longas jornadas de trabalho, trabalharem com a frustração de que muitas vezes seus pacientes não vão evoluir bem, falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal e acredita-se que profissionais jovens sofrem mais pela falta de experiência e pela autocobrança. Diante disso, é fundamental encontrar meios de redução da carga de trabalho, suporte emocional e incentivo ao autocuidado, visando diminuir o Burnout nestes profissionais.

Palavras-chave: Burnout em profissionais da saúde; Saúde Pública; Síndrome de Burnout.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIMA, L. A. de O.; DOMINGUES JUNIOR, P. L.; GOMES, O. V. de O. Saúde mental e esgotamento profissional: um estudo qualitativo sobre os fatores associados à síndrome de burnout entre profissionais da saúde. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, Boa Vista, v. 16, n. 47, p. 264–283, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10198981>. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10198981>

BORGES, M. et al. O impacto da síndrome de Burnout entre os profissionais de saúde no contexto da pandemia da Covid-19. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**, v. 13, p. e8375, 30 jul. 2021. Disponível em: <https://acervo enfermagem.com.br/index.php/revista/article/view/8375>.

TRINDADE, L. de L.; LAUTERT, L. Síndrome de Burnout entre os trabalhadores da Estratégia de Saúde da Família. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, São Paulo, v. 44, n. 2, p. 274–279, 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0080->



62342010000200005. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0080-62342010000200005>.

OLIVEIRA, V. P. da S.; SILVA, H. dos R. Prevalência da síndrome de Burnout entre profissionais de saúde que atuam em unidades de terapia intensiva / Prevalence of Burnout syndrome among health professionals who work in intensive care units. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 17863–17885, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n2-432>. DOI: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n2-432>.



ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA COMUNIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

¹Luiz Guilherme Sousa Cunha

²Letícia Duffor Margarida

³Leádia Rodrigues Paixão

⁴Kênia Maria Pereira Chaves

⁵Bruna Magalhães Do Couto

⁶Maria Eduarda Barcelos de Oliveira

⁷Mônica Das Graças De Azevedo

⁸Shirlei Barbosa Dias

¹Discente da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil;

²Discente da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil;

^{3,4,5,6}Discente da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil;

⁷Docente da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil;

⁸Docente da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil;

Área temática: Enfermagem

Resumo

Introdução: O enfermeiro exerce papel fundamental na educação em saúde, disseminando informações, e consequentemente, promovendo a saúde. A promoção da saúde permite que as comunidades modifiquem os determinantes sociais aos quais estão expostas, tornando-se capazes de exercer o autocuidado, melhorando assim a sua qualidade de vida. **Objetivo:** Relatar a experiência extensionista de acadêmicos de Enfermagem na promoção da saúde e prevenção de doenças em mulheres. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência sobre uma ação educativa desenvolvida por acadêmicos do quinto período do curso de Enfermagem, de uma faculdade privada, em comunidade com vulnerabilidade social de um município da região metropolitana de Belo Horizonte, em abril de 2025. A atividade teve início com uma apresentação abordando temas como saúde da mulher, autocuidado, saúde mental e vacinação, seguida de pontos de atendimento educativo. **Resultados e Discussão:** A atividade contou com 17 mulheres e 9 homens que participaram ativamente. Observou-se grande interesse da comunidade sobre os assuntos abordados, em destaque a saúde mental e câncer de mama. A escuta ativa favoreceu a comunicação e evidenciou dificuldades de acesso à assistência à saúde. **Conclusão:** A intervenção foi bem recebida, com impacto positivo ao informar e acolher. Identificou-se que o principal determinante social dessa população é a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, destacando a importância da educação em saúde e a urgência de políticas públicas que ampliem esse acesso.

INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde (OMS), estabelece que o conceito de saúde está além do enfoque sobre a ausência de doença, ampliando ao bem estar completo físico, mental e social do indivíduo. Os Determinantes sociais de saúde (DSS) definem-se de maneira geral a relação entre as condições de trabalho e vida do indivíduo, ou de grupos populacionais com a respectiva situação de saúde. Segundo a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais,



étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que instigam a problematização e índices de risco nas condições de saúde para a comunidade. (Buss; Pellegrini Filho, 2007)

A atuação do enfermeiro na atenção básica em saúde envolve atribuições administrativas, gerenciais, assistenciais e principalmente, de promoção em saúde, garantindo um atendimento integral, que atenda as necessidades humanas, baseado nos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentre essas ações, o enfermeiro exerce ativamente a educação em saúde da comunidade, no que tange a prevenção de agravos e promoção em saúde. Sendo construída uma rede de conhecimento, partilhada pelo profissional e o paciente, tornando tal relação singular, com eixo ético e moral. Além disso, a fidelização do usuário à unidade é primordial para a continuação do atendimento, com finalidade de diminuir evasão do sistema, abandono do tratamento ou complicações. (Silva; *et. al*, 2012)

Os princípios norteadores do SUS — universalidade, integralidade e equidade — garantem o acesso a ações e serviços de saúde de forma contínua e igualitária a toda a população brasileira, considerando suas singularidades e necessidades específicas. Nesse cenário, a educação em saúde se insere como um instrumento estratégico para a promoção do cuidado e do empoderamento social, possibilitando que indivíduos e coletividades desenvolvam autonomia no processo de cuidado e decisão sobre sua própria saúde. Por meio de ações educativas, como palestras, rodas de conversa e campanhas em ambientes diversos, como o religioso, o enfermeiro promove o acesso à informação, desmistifica conceitos e incentiva práticas saudáveis, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e os serviços de saúde. Essa atuação está diretamente alinhada ao princípio da participação social do SUS, conforme preconiza a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS (Brasil, 2013), e encontra respaldo em abordagens teóricas como a clínica ampliada e compartilhada, que valorizam a escuta qualificada, a corresponsabilização e o trabalho em equipe (Campos, 2007).

Nesse contexto, a educação em saúde se faz importante para a prevenção de doenças e está relacionada à melhoria da qualidade de vida e saúde da população. Contribui para o autocuidado e autonomia, de forma que o indivíduo se torna capaz de identificar e alterar sua realidade por meio da mudança de comportamentos, elevando assim sua qualidade de vida. Considerada fundamental na participação popular nos serviços de saúde, e integra a ciência na vida cotidiana da população. O enfermeiro possui papel fundamental de educador na sua prática diária, sendo capaz de nortear a Educação em saúde. (Oliveira; Gonçalves; 2004)

OBJETIVO

Relatar a experiência extensionista de acadêmicos de Enfermagem na promoção da saúde e prevenção de doenças em mulheres, com foco no fortalecimento do vínculo entre universidade e comunidade e na promoção do empoderamento feminino para o autocuidado.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência extensionista, no modelo curricular e interdisciplinar, abordando as disciplinas de saúde da mulher e prevenção e promoção na saúde comunitária, no qual discentes do 5º período do curso de Enfermagem de uma instituição de ensino superior privada de Belo Horizonte, realizaram por meio de uma ação educativa intitulada Projeto Ser Mulher: Autocuidado.

A atividade foi realizada em um templo religioso, em um município da região



metropolitana de Belo Horizonte, em abril de 2025. A escolha do local foi dada por meio da identificação de fragilidades, precariedade no sistema de saúde e vulnerabilidades sociais. Teve como finalidade, favorecer a disseminação de conhecimentos sobre prevenção do câncer de colo do útero e de mama, saúde mental, vacinação e hábitos saudáveis que visem a autonomia do indivíduo. Os participantes da intervenção foram convidados por meio da divulgação de panfletos pela região em pontos estratégicos, além de contar com a colaboração dos membros religiosos (pessoas chaves da comunidade) que foram fonte de propagação do evento, todos os participantes que compareceram foram de demanda espontânea por interesse nos assuntos a serem apresentados.

A atividade teve início com uma apresentação explicativa em slides dentro do templo, abordando conceitos e medidas preventivas relacionados aos temas propostos. Em seguida, em outro espaço do templo, os acadêmicos organizaram três pontos de atendimento educativo, distribuídos por temáticas específicas. O primeiro foi dedicado à aferição da pressão arterial, acompanhada de orientações sobre alimentação saudável e hábitos preventivos para doenças cardiovasculares. No segundo ponto, os participantes receberam esclarecimentos sobre a importância da vacinação ao longo de toda a vida, com ênfase na atualização do cartão vacinal. Por fim, no terceiro espaço, foram oferecidas orientações voltadas à saúde da mulher, destacando a importância do autocuidado, da realização periódica de exames preventivos e do conhecimento do próprio corpo como forma de promoção da saúde. Durante todo o processo, os participantes puderam sanar dúvidas com os estudantes e receberam uma cartilha informativa sobre o calendário vacinal feminino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto envolveu 26 participantes, compostos por membros da congregação e moradores locais convidados, sendo 17 mulheres e 9 homens, que participaram ativamente da ação extensionista. Observou-se um grande interesse da comunidade pelos temas abordados, especialmente em relação à saúde mental e ao câncer de mama.

Entretanto, durante a intervenção, transeuntes e moradores demonstraram interesse pela vacinação e relataram dificuldades no acesso à imunização e aos serviços de saúde. As principais barreiras apontadas foram a distância até as unidades de atendimento, a ausência de uma UBS próxima e a falta de recursos para transporte. Além disso, a sobrecarga do sistema resulta em longas esperas para exames e consultas, comprometendo a efetividade do cuidado. Alguns relataram ainda a necessidade de recorrer a serviços pagos, devido à indisponibilidade na rede pública.

De acordo com a Constituição de 1988, a saúde é um direito de todos e dever do

Estado e o SUS está entre os maiores sistemas de saúde pública do mundo, fornecendo atenção integral, universal e gratuita, com foco na saúde, qualidade de vida, e visa a promoção e prevenção de doenças (Ministério da Saúde, 2024).

A escuta ativa favoreceu a comunicação, permitindo identificar as principais dificuldades de acesso à assistência à saúde. Esta estratégia também revelou que os principais determinantes sociais da saúde que impactam a comunidade são de natureza social, econômica, psicológica e habitacional e o serviço social de saúde. Destacam-se o sofrimento mental sem assistência adequada, vulnerabilidade social e falta de acesso a recursos e direitos básicos, o que reforça as desigualdades em saúde.

Os acadêmicos identificaram como dificuldade o nível de compreensão dos participantes, sendo adotada uma linguagem mais acessível ao público presente. Deve-se considerar um dificultador, o acesso dos alunos ao local da intervenção, que tiveram que ser



planejados meios de chegar ao local por ser uma cidade distante da capital. Apesar disto, os estudantes conseguiram realizar todas as ações previstas e não foram necessárias mudanças de planejamento.

Assim, pode-se afirmar que a ação obteve resultados positivos, especialmente no que se refere à disseminação de conhecimentos voltados à prevenção de doenças e à promoção da saúde na comunidade. A efetividade da atividade foi evidenciada pela receptividade do público e pela qualidade da interação estabelecida com os acadêmicos, os quais desempenharam um papel ativo no esclarecimento de dúvidas, escuta de demandas e acolhimento de relatos sobre receios e dificuldades vivenciados pelos participantes. O aprimoramento das habilidades interpessoais, da empatia e da humanização esteve presente ao longo do encontro, contribuindo de forma significativa para a formação integral dos acadêmicos de enfermagem. Essa experiência favoreceu a construção de profissionais mais sensíveis, com comunicação mais eficiente e voltada às reais necessidades dos pacientes."

CONCLUSÃO

A experiência vivenciada na intervenção dos acadêmicos evidenciou a importância da educação em saúde como ferramenta de conscientização e empoderamento da comunidade, com o propósito de promover a saúde daquela comunidade, a qual apresentava dúvidas sobre os temas abordados na atividade extensionista e queixavam-se da dificuldade de acesso aos serviços de saúde.

Apesar da boa receptividade e do impacto positivo das ações realizadas, foi possível identificar diversas fragilidades no território, como a carência socioeconômica, a presença de questões psicológicas e clínicas não tratadas devido ao difícil acesso aos serviços de saúde relatados pela população e devido a ausência de uma unidade básica de saúde próxima a comunidade. A carência socioeconômica é um fator predominante, evidenciado pela dificuldade de acesso a serviços de saúde essenciais. A ausência de uma unidade básica de saúde nas proximidades agrava essa situação, resultando em questões psicológicas e clínicas não tratadas. Observa-se que barreiras financeiras, como custos com transporte e tempo de espera prolongado, são obstáculos significativos para a população.

Com isto, a região requer atenção das autoridades políticas, e da implementação de políticas públicas, devido a ausência de serviços públicos de saúde que atendam as necessidades da população. Essas limitações ressaltam a urgência de estratégias que ampliem o acesso à assistência de saúde.

Diante disso, propõe-se a criação de novos projetos de extensão e o incentivo a políticas públicas que viabilizem o deslocamento da população até os serviços de saúde ou a implementação de atendimentos descentralizados, contribuindo para a efetivação do direito à saúde.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Papel do Profissional de Enfermagem; Saúde Comunitária; Saúde da Mulher; Vacina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Mesquita, Ana Cláudia, and Emilia Campos de Carvalho. "A Escuta Terapêutica Como Estratégia de Intervenção Em Saúde: Uma Revisão Integrativa." *Revista Da Escola de*



Enfermagem Da USP, vol. 48, no. 6, Dec. 2014, pp. 1127–1136, www.scielo.br/pdf/r_eeusp/v48n6/0080-6234-r_eeusp-48-06-1127.pdf, <https://doi.org/10.1590/s0080-623420140000700022>.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Sistema Único de Saúde - SUS**. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/sus>>; 2025. Acesso em: 19 abr. 2025.

MILON DE OLIVEIRA, H.; JACIREMA, M.; GONÇALVES, F. **EDUCAÇÃO EM SAÚDE: uma experiência transformadora**. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/hSpf9RWGCJ8M35kqMk9nMWH/?format=pdf&lang=pt>>

OLIVEIRA, Hadelândia Milon de; GONÇALVES, Maria Jacirema Ferreira. **Educação em Saúde: uma experiência transformadora**. Rev Bras Enferm [Internet]. 2004 Nov;57(6):761–3. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0034-71672004000600028>

BUSS, P. M.; PELLEGRINI FILHO, A. **A saúde e seus determinantes sociais**. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 17, n. 1, p. 77–93, abr. 2007.

SILVA, Lenise Dias da; BECK, Carmem Lúcia Colomé; DISSEN, Calianra Marta; TAVARES, Juliana Petri; BUDÓ, Maria de Lourdes Denardin; SILVA, Hélio Soares da. **O enfermeiro e a educação em saúde: um estudo bibliográfico**. Revista de Enfermagem da UFSM, Santa Maria, v. 2, n. 2, p. 412–419, 2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reufsm/article/view/2676>. Acesso em: 19 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS – PNEPS-SUS**. Portaria GM/MS nº 2.761, de 19 de novembro de 2013. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2761_19_11_2013.html. Acesso em: 19 abr. 2025.

CAMPOS, Gastão Wagner de Sousa. **A clínica ampliada e compartilhada, a gestão democrática e redes de atenção como referenciais teórico-operacionais para a reforma do hospital**. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 12, n. 4, p. 849-859, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/NmPK5MRmgpvw6zwzQ865pBS/>. Acesso em: 19 abr. 2025.



REPOSIÇÃO HORMONAL NA MENOPAUSA E SEUS EFEITOS NO METABOLISMO ÓSSEO

¹Luíza Gonçalves Braga
¹Júlia Ferreira Ranulfo Vaz
¹Ana Clara Rossy Caratti
¹Maria Eduarda Leite Palota
¹Bruna Cobra Rache de Mello
²Renata Aparecida Elias Dantas

¹Centro Universitário de Brasília (CEUB). Brasília, Distrito Federal, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo: O presente estudo teve como objetivo analisar os impactos da TRH no metabolismo ósseo de mulheres pós-menopáusicas, por meio de revisão de literatura recente. Foram selecionados dez artigos científicos indexados na base PubMed (2020–2025), a partir dos descritores “osteoporosis”, “menopause”, “hormone replacement”, “bone metabolism” e “postmenopause”, com inclusão de estudos com acesso integral, dados quantitativos e qualitativos, e análise da eficácia comparativa da TRH. A menopausa é caracterizada pelo declínio progressivo da produção de estrogênio, hormônio essencial à homeostase óssea. Sua queda provoca desequilíbrios no metabolismo ósseo, favorecendo a reabsorção óssea e aumentando o risco de osteoporose. Diante disso, a terapia de reposição hormonal (TRH) é considerada uma estratégia terapêutica capaz de atenuar os efeitos deletérios da menopausa sobre o tecido ósseo. Os achados revelaram melhora na densidade mineral óssea (DMO), regulação dos marcadores de remodelação óssea e redução do risco de fraturas em mulheres tratadas com TRH. A TRH mostrou-se particularmente eficaz quando iniciada precocemente na pós-menopausa, destacando-se como importante aliada na prevenção da osteoporose. Conclui-se que, respeitando os critérios de indicação e contraindicação, a reposição hormonal apresenta efeitos positivos consistentes sobre a saúde óssea da mulher climatérica, como a estimulação da formação óssea, a prevenção de fraturas e aumento da densidade mineral óssea (DMO), sobretudo quando iniciada precocemente no período do climatério.

INTRODUÇÃO

A menopausa é um marco fisiológico na vida da mulher, caracterizado pela interrupção da função ovariana e pela consequente redução abrupta dos níveis de estrogênio. Essa alteração hormonal impacta diretamente o metabolismo ósseo, aumentando a atividade osteoclástica e acelerando a perda de massa óssea, o que contribui significativamente para a incidência de osteoporose e fraturas. Estima-se que mais de um terço das mulheres pós-menopáusicas desenvolvem algum grau de osteopenia ou osteoporose, tornando a prevenção e o tratamento dessas condições uma prioridade em saúde pública (Cherukuri *et al.*, 2022; Costa-Paiva *et al.*, 2022).

A Terapia de Reposição Hormonal (TRH), composta por estrogênios isolados ou combinados com progestagênios, tem sido amplamente estudada devido ao seu potencial em preservar a densidade mineral óssea, além de aliviar sintomas vasomotores da menopausa. No entanto, seu uso deve ser cuidadosamente avaliado, considerando os riscos associados, como tromboembolismo e câncer hormônio-dependente, e o perfil clínico da paciente (Miller *et al.*, 2021; Douxfils *et al.*, 2023).



Este trabalho tem como objetivo avaliar, à luz da literatura recente, os efeitos da TRH no metabolismo ósseo de mulheres pós-menopáusicas, verificando seu impacto na prevenção da osteoporose e na redução de fraturas osteoporóticas (Lewiecki *et al.*, 2023; Wei *et al.*, 2021).

OBJETIVO

Analisar se os tratamentos feitos com reposição hormonal em mulheres na menopausa impactam positivamente na osteoporose.

METODOLOGIA

Esse estudo trata-se de uma revisão de literatura integrativa. Realizou-se uma busca na plataforma PubMed com os descritores “osteoporosis”, “menopause”, “hormone replacement”, “bone metabolism”, “postmenopausa”, no idioma inglês, entre 2020 e 2025, associados ao operador booleano AND. Foram encontrados 26 relatos de casos. Selecionou-se os artigos com base nos critérios de inclusão: acesso ao artigo integral, análise da eficácia de medicamentos distintos e a comparação entre mulheres que receberam os tratamentos hormonais e as que receberam placebo, relacionando a ocorrência da osteoporose com a menopausa. Já os excluídos, foram descartados com base na inacessibilidade dos artigos completos e na ausência da correlação da menopausa com a osteoporose. Restando, assim, 10 artigos que foram utilizados para esta revisão. A coleta dispôs de dados quantitativos e qualitativos extraídos de estudos randomizados e de ensaio clínico. Após a coleta, os artigos foram lidos integralmente e identificados aspectos relevantes para a formação deste resumo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente estudo investigou a eficácia de diferentes tratamentos para osteoporose em mulheres pós-menopáusicas. A análise dos dados revelou que terapias com teriparatida e alendronato mostraram resultados positivos no aumento da densidade mineral óssea. O uso de teriparatida, tanto isolado quanto combinado com ácido zoledrônico, demonstrou eficácia na manutenção da saúde óssea.(Li, M. *et al.*, 2022; Wei, K. *et al.*, 2021).

Os estudos revisados apontam benefícios consistentes da TRH no metabolismo ósseo. Houve melhora significativa da densidade mineral óssea (DMO) nas regiões da coluna lombar e fêmur proximal, segundo ensaios clínicos com terapias estrogênicas isoladas e combinadas (Wong *et al.*, 2020; Lewiecki *et al.*, 2023).

Além disso, foi observado efeito favorável sobre os marcadores bioquímicos de remodelação óssea, como a redução do CTX e elevação do P1NP, sugerindo equilíbrio entre reabsorção e formação óssea (Costa-Paiva *et al.*, 2022; Douxfls *et al.*, 2023).

A TRH também mostrou eficácia na prevenção de fraturas osteoporóticas, especialmente quando instituída precocemente na pós-menopausa. Os estudos destacaram que mulheres tratadas até 10 anos após o início da menopausa obtiveram maiores benefícios, com menor risco de efeitos adversos (Miller *et al.*, 2021; Lee; Seo; Yoo, 2023).

Além da TRH clássica, alternativas como a administração de moduladores seletivos dos receptores de estrogênio e compostos fitoestrogênicos (ex: resveratrol, equol) também demonstraram efeitos protetores sobre o tecido ósseo, embora em menor magnitude (Corbi *et al.*, 2023; Wong *et al.*, 2020).

Ressalta-se que o uso da TRH exige avaliação cuidadosa. A presença de



contraindicações absolutas, como histórico de câncer de mama, tromboembolismo venoso ou doenças hepáticas graves, limita sua aplicação, exigindo estratégias terapêuticas alternativas (Douxfls *et al.*, 2023; Miller *et al.*, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A reposição hormonal, quando bem indicada, representa uma abordagem eficaz na prevenção da perda óssea em mulheres na pós-menopausa. Os dados analisados confirmam sua capacidade de manter ou aumentar a densidade mineral óssea, normalizar marcadores de remodelação óssea e reduzir o risco de fraturas osteoporóticas.

Contudo, é essencial que a indicação seja individualizada, considerando o tempo de menopausa, perfil clínico da paciente e os fatores de risco envolvidos. A TRH deve ser administrada sob rigorosa supervisão médica e, quando não for viável, alternativas terapêuticas devem ser consideradas.

Este estudo reforça a importância do conhecimento atualizado e da prática clínica baseada em evidências para a tomada de decisões terapêuticas seguras e eficazes, promovendo qualidade de vida e saúde óssea à mulher climatérica

Palavras-chave: Menopausa; Metabolismo Ósseo; Osteoporose; Reposição Hormonal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cherukuri, L. *et al.* Coronary artery calcium and bone mineral density by serial CTA: Does menopausal hormone therapy modify the association?. **Clinical imaging**, v. 90, p. 26–31, 2022. Disponível em: doi: 10.1016/j.clinimag.2022.06.023. Acesso em: 02/05/2025.

Li, M. *et al.* Efficacy of generic teriparatide and alendronate in Chinese postmenopausal women with osteoporosis: a prospective study. **Archives of osteoporosis**, v. 17, n. 1, p. 103, 2022. Disponível em: doi: 10.1007/s11657-022-01131-8. Acesso em: 02/05/2025.

Lee, S. Y.; Seo, M.-S.; Yoo, J.-I. Effectiveness of weekly teriparatide injection in postmenopausal patients with hip fractures. **Clinics in orthopedic surgery**, v. 15, n. 4, p. 552–559, 2023. Disponível em: doi: 10.4055/cios22280. Acessado em: 02/05/2025.

Wei, K. *et al.* Comparison of efficacy of teriparatide (parathyroid hormone 1-34) alone and in combination with zoledronic acid for osteoporosis in postmenopausal women. **Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan: JCPSP**, v. 31, n. 2, p. 240–242, 2021. Disponível em: doi: 10.29271/jcpsp.2021.02.240. Acesso em: 02/05/2025.

Corbi, G. *et al.* Equol and resveratrol improve bone turnover biomarkers in postmenopausal women: A clinical trial. **International journal of molecular sciences**, v. 24, n. 15, 2023. Disponível em: doi: 10.3390/ijms241512063. Acesso em: 02/05/2025.

Costa-Paiva, L. *et al.* Effects of ultra-low dose hormone therapy on biochemical bone turnover markers in postmenopausal women: A randomized, placebo-controlled, double-blind trial.

Post reproductive health, v. 28, n. 3, p. 149–157, 2022. Disponível em: doi: 10.1177/20533691221116769. Acesso em: 02/05/2025.



Douxfls J. *et al.* Impact of estetrol (E4) on hemostasis, metabolism and bone turnover in postmenopausal women. **Climacteric: the journal of the International Menopause Society**,

v. 26, n. 1, p. 55–63, 2023. Disponível em: doi: 10.1080/13697137.2022.2139599. Acesso em: 02/05/2025.

Lewiecki, E. M. *et al.* Efficacy and safety of transdermal abaloparatide in postmenopausal women with osteoporosis: A randomized study. **Journal of bone and mineral research: the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research**, v. 38, n. 10, p. 1404–1414, 2023. Disponível: doi: 10.1002/jbmr.4877. Acessado em 02/05/2025

Wong, R. H. *et al.* Regular supplementation with resveratrol improves bone mineral density in postmenopausal women: A randomized, placebo-controlled trial. **Journal of bone and mineral research: the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research**, v. 35, n. 11, p. 2121–2131, 2020. Disponível em: doi: 10.1002/jbmr.4115. Acessado em: 02/05/2025

Miller, V. M. *et al.* Lessons from KEEPS: The Kronos Early Estrogen Prevention Study. **Climacteric: the journal of the International Menopause Society**, v. 24, n. 2, p. 139–145, 2021. Disponível em: doi: 10.1080/13697137.2020.1804545. Acessado em: 02/05/2025



EFEITOS DO USO DE SEMAGLUTIDA PARA EMAGRECIMENTO ESTÉTICO: UMA REVISÃO DA LITERATURA

¹ Júlia Abrantes Moreira Borba

¹ Gabriela Cristofidis Marquez

¹ Isabela Rodrigues e Sousa

¹ Ana Clara Alvares Ferreira

¹ Luísa Oliveira Miari

¹ João de Sousa Pinheiro Barbosa

¹ Centro Universitário de Brasília. Brasília, DF, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo:

A semaglutida (2,4 mg, administrada semanalmente por via subcutânea) tem se mostrado eficaz no tratamento da obesidade e do sobrepeso em adultos e adolescentes, especialmente quando associada a intervenções no estilo de vida. Estudos clínicos randomizados indicam que, em adultos com sobrepeso (com ao menos uma comorbidade) ou obesidade, o uso do medicamento promove perda de peso significativa, melhora nas medidas antropométricas, controle alimentar e redução do apetite. Além disso, observou-se impacto positivo sobre o IMC, saúde metabólica e regressão à normoglicemia em indivíduos com sobrepeso e doença cardiovascular, mesmo na ausência de diabetes. Tais efeitos reforçam o papel dos medicamentos na terapia de pacientes que não conseguem obter ou manter a perda de peso com mudanças no estilo de vida ou que não são candidatos à cirurgia bariátrica. Os estudos demonstram que um ano após a interrupção da semaglutida e das intervenções comportamentais, os participantes recuperaram, em média, dois terços do peso perdido, com piora nas variáveis cardiometabólicas. Ademais, dados indicam que a obesidade é uma condição crônica. Tais fatos reforçam a necessidade de tratamento contínuo aliado à mudanças comportamentais e de hábitos de vida para manter os benefícios à saúde.

INTRODUÇÃO

A obesidade é uma preocupação crescente de saúde pública no Brasil e no mundo, afetando adultos e adolescentes. Segundo o Mapa da Obesidade, feito a partir de dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com um índice de massa corporal (IMC) acima de 30. Já em relação à obesidade infantil, estudos indicam que 12,9% das crianças brasileiras entre 5 e 9 anos de idade têm obesidade, assim como 7% dos adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos. Em um panorama global, a Organização Mundial de Saúde divulgou que, em 2022, 43% dos adultos estavam com sobrepeso, e 16% viviam com obesidade. Além disso, 160 milhões de crianças estavam com obesidade, no mesmo ano.

Para além de tais dados, pode-se citar que a obesidade está fortemente associada a diversas comorbidades crônicas, como hipertensão arterial, diabetes tipo 2, dislipidemias e doenças cardiovasculares. Ou seja, é muito importante controlar o peso corporal para melhorar a saúde global do indivíduo.

Dessa forma, o aumento contínuo das taxas de sobrepeso e obesidade no Brasil e no mundo destaca a necessidade urgente de políticas públicas eficazes, tendo em vista que tais



taxas crescentes demonstram um problema de saúde pública, com impacto direto na morbimortalidade e nos sistemas de saúde.

Ademais, é fundamental pontuar que o processo de emagrecimento enfrenta diversos desafios relacionados à adesão e eficácia de dietas, exercícios físicos e mudanças comportamentais, tendo em vista que esses obstáculos são influenciados por fatores individuais, sociais e ambientais, tornando a perda de peso uma tarefa complexa, multifacetada e relacionada à aspectos biopsicossociais.

Sob esse viés, alguns medicamentos inovadores foram introduzidos no mercado farmacológico, como a semaglutida, tratamento aprovado para o manejo da obesidade, respaldado por evidências científicas robustas. Trata-se de um análogo do GLP-1, originalmente utilizado no tratamento para diabetes tipo 2, mas que demonstrou eficácia significativa na redução do peso corporal em indivíduos com obesidade, independente da presença de diabetes.

Portanto, a relevância da semaglutida se insere no reconhecimento de que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial e recidivante, que vai além de dietas e exercícios físicos.

OBJETIVO

Avaliar os efeitos do uso off-label de semaglutida, originalmente destinado ao controle glicêmico, no emagrecimento estético, com base em evidências da literatura.

METODOLOGIA

Este estudo seguiu os passos da revisão integrativa, incluindo seis etapas: (1) identificação do tema e formulação da pergunta de pesquisa - “Quais os efeitos adversos nos pacientes que usam Semaglutida para fins estéticos de emagrecimento?” (2) definição dos critérios de inclusão e exclusão dos estudos, nos quais excluíram-se artigos que não eram relevantes ou que demonstravam fragilidade metodológica. Além disso, excluíram-se pesquisas com pacientes exclusivamente diabéticos (3) busca na literatura, (4) avaliação dos estudos incluídos, como ensaio controlado randomizado, estudo de coorte, livros e documentos e ensaios clínicos (5) análise e síntese dos dados, e (6) apresentação dos resultados. Foram utilizadas bases de dados como PubMed e Scielo, com os descritores “Semaglutida”, “sobrepeso”, “perda de peso”, “efeitos”, “consequências” combinados por operadores booleanos “e”. Foram considerados estudos publicados nos últimos cinco anos (2020 - 2025), em inglês, focados em abordagens específicas relacionadas ao tema de interesse.

RESULTADOS

O artigo de Garvey et al. (2022) mostra que a alteração média no peso corporal da linha de base até a semana final (104) foi de -15,2% no grupo semaglutida versus -2,6% com placebo e observaram-se eventos adversos gastrointestinais, principalmente leves a moderados, foram relatados com mais frequência nos grupos com semaglutida do que com placebo. O artigo de Ryan et.al (2024) Em 208 semanas, a semaglutida foi associada à redução média de peso (-10,2%), circunferência da cintura (- 7,7 cm) e relação cintura-altura (-6,9%) em comparação com placebo (-1,5%, -1,3 cm e -1,0%, respectivamente; $P < 0,0001$ para todas as comparações versus placebo). Perda de peso clinicamente significativa ocorreu em ambos os sexos e em todas as raças, tamanhos corporais e regiões. A semaglutida foi associada a menos eventos adversos graves. Para cada categoria de IMC (<30, 30 a <35, 35



a <40 e ≥ 40 kg m^{-2}), houve taxas mais baixas (eventos por 100 anos de observação) de eventos adversos graves com semaglutida (43,23, 43,54, 51,07 e 47,06 para semaglutida e 50,48, 49,66, 52,73 e 60,85 para placebo). A semaglutida foi associada a maiores taxas de descontinuação do produto em estudo. As descontinuações aumentaram à medida que a classe de IMC. O artigo de Ghush et. al (2022) mostra que a perda de peso média após 3 meses foi de 6,7kg, equivalente a uma perda de peso média de 5,9%, e a perda de peso média após 6 meses foi de 12,3kg, equivalente a uma perda de peso média de 10,9%. Dos 102 pacientes que foram acompanhados em 6 meses, 89 (87,3%) atingiram perda de peso de 5% ou mais, 56 (54,9%) atingiram perda de peso de 10% ou mais, 24 (23,5%) atingiram perda de peso de 15% ou mais e 8 (7,8%) atingiram perda de peso de 20% ou mais. Pacientes com diabetes tipo 2 tiveram uma porcentagem média menor de perda de peso em 3 e 6 meses em comparação com aqueles sem diabetes tipo 2: 3,9% vs 6,3% em 3 meses e 7,2% vs 11,8% em 6 meses. O artigo Kushner et.al (2020) destaca que os ensaios gerarão dados sobre a eficácia e segurança da semaglutida um novo tratamento que promete uma perda de peso clinicamente significativa e duradoura, superior à obtida com os medicamentos atualmente disponíveis para obesidade. O artigo de Wilding et. al (2022) evidencia que as análises de extensão incluíram 327 participantes. Da semana 0 à semana 68, a média a perda de peso foi de 17,3% (DP: 9,3%) com semaglutida e 2,0% (DP: 6,1%) com placebo. Após a interrupção do tratamento, os participantes do grupo semaglutida e do grupo placebo recuperaram 11,6 (DP: 7,7) e 1,9 (DP: 4,8) pontos percentuais de peso perdido, respectivamente, na semana 120, resultando em perdas líquidas de 5,6% (DP: 8,9%) e 0,1% (DP: 5,8%), respectivamente, da semana 0 à semana 120. Melhoras cardiometabólicas observadas da semana 0 à semana 68 com a semaglutida voltou à linha de base na semana 120 para a maioria das variáveis. O artigo de Kahn et. al (2024) mostra que o número necessário para tratar foi de 18,5 para prevenir um caso de diabetes. Tanto a regressão quanto a progressão dependeram da glicemia basal, com a magnitude da perda de peso sendo importante na mediação de 24,5% da progressão e 27,1% da regressão. O artigo de Friedrichsen et. al (2020) mostra que a área sob curva de concentração-tempo (AUC) para paracetamol de 0 a 5 horas após uma refeição padronizada aumentou em 8% ($P=0,005$) com semaglutida 2,4 mg versus placebo na semana 20. Nenhum efeito foi observado na AUC 0-1h, para concentração máxima observada de paracetamol. A ingestão de energia foi 35% menor com semaglutida versus placebo (1736 versus 2676 kJ, diferença estimada de tratamento -940 kJ $P<0,0001$). A semaglutida reduziu a fome e o consumo alimentar prospectivo, e aumento da sensação de plenitude e saciedade quando comparado a placebo (todos $P<0,02$). O CoEQ indicou melhor controle da alimentação e menos desejos por comida com semaglutida versus placebo ($P<0,05$). O peso corporal foi reduzido em 9,9%, com semaglutida e 0,4% com placebo. A segurança foi consistente com o perfil conhecido da semaglutida. O artigo de Wharton et. al (2021) mostra que as análises de extensão incluíram 327 participantes. Da semana 0 à semana 68, a perda de peso média foi de 17,3% (DP: 9,3%) com semaglutida e 2,0% (DP: 6,1%) com placebo. Após a interrupção do tratamento, os participantes que receberam semaglutida e placebo recuperaram 11,6 (DP: 7,7) e 1,9 (DP: 4,8) pontos percentuais de peso perdido, respectivamente, até a semana 120, resultando em perdas líquidas de 5,6% (DP: 8,9%) e 0,1% (DP: 5,8%), respectivamente, da semana 0 à semana 120. As melhoras cardiometabólicas observadas da semana 0 à semana 68 com semaglutida retornaram aos valores basais na semana 120 para a maioria das variáveis. O artigo de Wilding et. al (2021) evidencia que o grupo exposto a semaglutida apresentaram mudanças em 68 semanas com -14,9%. O placebo foi apenas -2,4%. Os participantes com semaglutida tinham capacidade de perder 5%-20% mais até a 68a semana que o placebo com semaglutida perderam 15,3 kg e placebo perderam 2,6kg. O artigo de Weghuber et. al (2022) revelou que a mudança média



no IMC de 180 pacientes da linha de base até a semana 68 foi de -16,1% com semaglutida e 0,6% com placebo. A redução do peso corporal e a melhora em relação aos fatores de risco cardiometabólico foram maiores com a semaglutida do que com o placebo.

DISCUSSÃO

Os medicamentos análogos à GLP-1, em especial a Semaglutida, foram desenvolvidos para controlar a glicose, auxiliando no tratamento de pacientes diabéticos e alguns estudos off- label observaram a eficácia do medicamento para emagrecimento.

O estudo de Garvey *et al.*, de 2022, foi realizado com 304 participantes, sendo sua maioria do sexo feminino (236 de 304 - 77,6%) e a maioria era branca (283 de 304 - 93,1%), idade média foi de 47,3 anos, o peso corporal médio foi de 106kg, e o IMC médio foi de 38,5kg/m². A duração do estudo randomizado foi de 104 semanas, nas quais metade dos participantes fizeram o uso da semaglutida e a outra metade não, de forma que, o tratamento semanal com 2,4 mg de semaglutida como adjuvante à intervenção comportamental em adultos com sobrepeso (com pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso) ou obesidade levou a uma redução inicial substancial no peso, que se estabilizou após aproximadamente a semana 60 e foi mantida pelo restante do estudo.

O estudo mostra que após as 104 semanas de tratamento, algumas pessoas podem aumentar o peso ou diminuir a efetividade do tratamento, por isso, quando interpretados em conjunto com os resultados do estudo de retirada STEP 4 e do estudo de extensão sem tratamento STEP 1, que mostraram ganho de peso após a descontinuação da semaglutida (após 20 semanas de tratamento no STEP 4 e 68 semanas de tratamento no STEP 1), esses resultados dão suporte ao benefício do tratamento contínuo com semaglutida para perda de peso sustentada.

Além disso, o tratamento com semaglutida melhorou uma série de parâmetros de risco cardiometabólico, incluindo circunferência da cintura, pressão arterial sistólica e diastólica, níveis de HbA1c, colesterol total, colesterol de lipoproteína de baixa densidade, colesterol de lipoproteína de muito baixa densidade e triglicerídeos. Coletivamente, esses resultados indicam um efeito benéfico do tratamento na saúde geral do paciente. Contudo, é importante destacar que eventos adversos foram relatados por 96,1% dos pacientes, sendo que 12 pacientes (7,9% do total) relataram eventos adversos graves. Dentre os efeitos adversos observados houve: náusea (53,3%), diarreia (34,9%), constipação(30,9%), vômito(30,3%), nasofaringite(15,8%), dor abdominal(13,2%), dispepsia(13,2%), flatulência(13,2%), gastroenterite(13,2%), diminuição de apetite(11,2%) dor de cabeça(10,5%), distúrbios relacionados à vesícula biliar (2,6%), distúrbios hepáticos(2%),distúrbios cardiovasculares(11,2%),reações no alérgicas(15,1%), neoplasias malignas(1,3%), transtornos psiquiátricos (17,1%) e hipoglicemia (2,6%)

O estudo de Ryan *et al.*, publicado em 2024, contou com 17.604 pacientes (72,3% do sexo masculino) de 41 países entre outubro de 2018 e março de 2021, com idade média (d.p.) de 61,6 (8,9) anos e IMC de 33,3 (5,0) kg m⁻² e teve duração de 208 semanas. As análises dos efeitos do peso do estudo SELECT apresentadas revelam que os pacientes designados para semaglutida subcutânea de 2,4 mg uma vez por semana perderam significativamente mais peso do que aqueles que receberam placebo. A trajetória de perda de peso com semaglutida ocorreu ao longo de 65 semanas e foi mantida por até 4 anos. Da mesma forma, houve melhorias semelhantes no grupo semaglutida para antropometria (CC e RCE). Contudo,1461 pacientes(16,6%) no grupo da semaglutida descontinuaram permanentemente o tratamento devido a eventos adversos, e 2941 pacientes (33,4%) relataram eventos adversos graves. O estudo destacou que a tolerabilidade ao tratamento



pode variar entre classes específicas de IMC, uma vez que ocorreram mais descontinuações em classes de IMC mais baixas. Ademais, ambos os sexos, todas as raças, todos os tamanhos corporais e aqueles de todas as regiões geográficas foram capazes de alcançar perda de peso clinicamente significativa.

O estudo de Ghosn et al., publicado em 2022, avaliou a eficácia da semaglutida na perda de peso em 408 pacientes com sobrepeso ou obesidade, que receberam injeções subcutâneas semanais de 1,7 mg ou 2,4 mg do fármaco durante três ou seis meses. Foram excluídos pacientes com histórico de cirurgia bariátrica, em uso de outros medicamentos para obesidade ou com diagnóstico de neoplasias malignas. O desfecho primário foi a perda de peso, enquanto os desfechos secundários incluíram a proporção de pacientes que atingiram perdas de 5%, 10%, 15% e 20% do peso corporal após três e seis meses, além da comparação entre indivíduos com e sem diabetes tipo 2. Os resultados mostraram que os pacientes perderam, em média, 6,7 kg (5,9% do peso corporal) em três meses e 12,3 kg (10,9%) em seis meses, evidenciando uma eficácia clínica significativa mesmo fora de um ambiente de ensaio clínico rigorosamente controlado. Em relação à segurança, 85 pacientes (48,6%) relataram efeitos adversos, sendo os sintomas gastrointestinais os mais comuns. Náuseas e vômitos foram os eventos mais frequentes, afetando 64 pacientes (36,6%), seguidos por diarreia em 15 pacientes (8,6%) e fadiga em 11 pacientes (6,3%). Em 5 casos (2,9%), foi necessário interromper o uso do medicamento devido à intolerância aos efeitos adversos, enquanto 15 pacientes (8,6%) precisaram reduzir a dose ou mantê-la inalterada para evitar agravamento dos sintomas. Esses achados reforçam a eficácia da semaglutida na indução de perda ponderal significativa em curto prazo, com um perfil de efeitos adversos previsível, principalmente gastrointestinais, o que exige monitoramento e ajuste individualizado da dose durante o tratamento.

O estudo Kushner et al, publicado em 2020, foram selecionados pacientes de ambos os sexos, com mais de 18 anos, são elegíveis se tiverem histórico auto-relatado de pelo menos uma tentativa malsucedida de perda de peso por meio de dieta. Nos ensaios sem diabetes tipo 2 (STEP 1, 3, 4 e 5), os adultos devem ter $IMC \geq 30 \text{ kg/m}^2$ ou $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ com comorbidades relacionadas ao peso (tratadas ou não), como dislipidemia, apneia obstrutiva do sono, hipertensão ou doença cardiovascular (DCV). Esses ensaios gerarão dados sobre a eficácia e segurança da semaglutida, um novo tratamento que promete uma perda de peso clinicamente significativa e duradoura, superior à obtida com os medicamentos atualmente disponíveis para obesidade.

Os medicamentos antiobesidade (AOMs) são uma opção terapêutica relevante para pessoas com obesidade que não conseguem perder peso ou manter a perda de peso. Não foram relatados eventos adversos e a decisão de dar continuidade ao projeto ou desistir era do pesquisador ou dos participantes mas, continuam a ser incentivados a comparecer nas consultas. Os critérios para essa descontinuação são preocupação do pesquisador, nível de calcitonina, suspeita de pancreatite, gravidez ou intenção de engravidar e participação em outro ensaio clínico. O estudo de Wilding et. al de 2022 contou com 327 pacientes, com IMC maior que 30 kg/m^2 sem diabetes, utilizando semaglutida subcutânea 2,4mg uma vez por semana, durante 68 semanas. A perda de peso média foi de 17,3% com a semaglutida, e após a interrupção do uso os pacientes recuperaram 11,6 pontos percentuais do peso perdido, e as melhoras cardiometabólicas observadas na semana 68 voltaram à linha de base na semana 120. Além disso, um ano após a retirada da semaglutida houve a recuperação de dois terços da perda de peso anterior, fato que sugere a necessidade do tratamento contínuo para manter as melhoras no peso e na saúde do paciente. Não foram relatados efeitos adversos durante o estudo.

O estudo de Kahn et. al de 2024 contou com 17604 participantes, sendo 8803



designados para semaglutida e 8801 para placebo, com IMC igual ou superior a 27 kg/m² e com doença cardiovascular preexistente, mas sem diabetes. Esse estudo comparou o uso da semaglutida com pacientes placebo para prevenção dos eventos cardiovasculares adversos em pacientes com sobrepeso ou obesidade e doença cardiovascular estabelecida e destacou que o uso de semaglutida foi associada com uma redução de 73% no risco de desenvolvimento de diabetes bioquímica. Não houveram efeitos adversos mas, foram recomendados a desistência em caso de gravidez ou tentativa de gravidez, nível de calcitonina e desenvolvimento de pancreatite.

O estudo de Friedrichsen et. al (2020) foi baseado em um ensaio duplo-cego e randomizado que avaliou os efeitos da semaglutida 2,4 mg por 20 semanas em 72 adultos, homens e mulheres de idades entre 18 e 65 anos, com obesidade (IMC 30–45 kg/m²). Os objetivos foram analisar o esvaziamento gástrico, a ingestão alimentar, o apetite e a perda de peso. A absorção do paracetamol foi usada como marcador do esvaziamento gástrico. Observou-se um aumento de 8% na AUC de 0 a 5h com semaglutida (P=0,005), mas sem alteração na AUC de 0 a 1h ou na concentração máxima. Isso indica que, após 20 semanas, o efeito sobre o esvaziamento gástrico não interfere de forma relevante na absorção inicial de medicamentos orais. A semaglutida reduziu a ingestão calórica em 35% em comparação ao placebo (1736 vs. 2676 kJ; P<0,0001), além de diminuir a fome, o desejo por comida e aumentar a saciedade (todos P<0,02). O questionário CoEQ também indicou maior controle alimentar (P<0,05). Esses efeitos refletem a ação central da semaglutida na regulação do apetite. Como resultado, o grupo tratado apresentou perda de peso significativa (9,9%) em comparação ao placebo (0,4%). O perfil de segurança foi compatível com o já conhecido para o fármaco. Conclui-se que a semaglutida 2,4 mg promove redução do apetite, menor ingestão calórica e perda de peso, com impacto mínimo na absorção de fármacos, sendo eficaz e segura no tratamento da obesidade.

O estudo randomizado de Wharton et. al (2021) investigou os efeitos da semaglutida 2,4 mg administrada semanalmente por 68 semanas, associada a mudanças no estilo de vida, em adultos com obesidade ou sobrepeso com comorbidades. A inclusão considerou indivíduos com IMC ≥ 30 kg/m² ou ≥ 27

kg/m² com ao menos uma comorbidade relacionada ao peso e histórico de tentativa prévia de perda ponderal, foram selecionados 1.961 adultos maiores de 18 anos. Indivíduos com diabetes tipo 1 ou 2 e uso recente de medicamentos antiobesidade foram excluídos. Os participantes (n=1.961) foram alocados em proporção 2:1 para semaglutida (n=1306) ou placebo (n=655), ambos combinados a orientação dietética (déficit calórico de 500 kcal/dia) e incentivo à atividade física (150 min/semana). A dose de semaglutida foi escalonada até atingir 2,4 mg/semana. Após o término da intervenção na semana 68, todos os tratamentos foram descontinuados, e os participantes foram acompanhados até a semana 120.

Durante o tratamento, a perda de peso média com semaglutida foi de 17,3%, significativamente superior ao placebo (2,0%). Após a interrupção, observou-se recaptura substancial do peso: +11,6 pontos percentuais no grupo semaglutida versus +1,9 no placebo. Como resultado, a perda líquida final foi reduzida para 5,6% e 0,1%, respectivamente. As melhorias cardiometabólicas também regrediram, retornando em grande parte aos valores basais. No grupo que recebeu semaglutida 2,4 mg, eventos adversos (EAs) gastrointestinais foram mais frequentes do que no grupo placebo (72,9% vs. 47,1%), embora a maioria tenha sido de gravidade leve a moderada (98,1%) e não grave (99,5%). EAs gastrointestinais graves, como náusea, dor abdominal, diarreia e vômito, ocorreram em 4,1% dos participantes do



grupo semaglutida, comparados a 0,9% no grupo placebo. Esses eventos ocorreram com maior frequência durante o escalonamento da dose, estabilizando-se após a semana 20. Náusea, diarreia, vômito e constipação foram os EAs mais comuns no grupo semaglutida, com pico de incidência até a semana 20 e posterior declínio, especialmente para náuseas. A duração média desses sintomas foi curta (2 a 8 dias), exceto para constipação, cuja média foi de 47 dias com semaglutida e 35 dias com placebo, estabilizando-se por volta da semana 10.

O estudo de *Wilding et al.* realizado em 2021, contou com a presença de 1961 participantes. Foram selecionados adultos com um IMC de 30 ou mais, ou um IMC de 27 ou mais com uma ou mais condições coexistentes relacionadas ao peso. Essas condições poderiam ser tratadas ou não tratadas (por exemplo, hipertensão, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono ou doença cardiovascular). Os fatores de exclusão eram diabetes, nível de hemoglobina glicada de 48 mmol/mol ou superior, histórico de pancreatite crônica, pancreatite aguda nos 180 dias anteriores à inscrição, tratamento cirúrgico prévio para obesidade e uso de medicamentos antiobesidade nos 90 dias anteriores à inscrição. Os 1961 participantes aleatoriamente foram designados para receber semaglutida ou placebo. 1306 participantes receberam semaglutida, e 655 participantes receberam placebo. A alteração média no peso corporal desde o início até a semana 68 foi de -14,9% no grupo semaglutida. Em comparação com -2,4% no grupo placebo. A alteração no peso corporal total foi de -15,3 kg no grupo semaglutida, em comparação com -2,6 kg no grupo placebo. Os participantes que receberam semaglutida apresentaram maior melhora em relação aos fatores de risco cardiometabólico, e maior aumento no funcionamento físico relatado pelos participantes do que aqueles que receberam placebo, além disso houve relatos de efeitos colaterais adversos em 89,7% dos pacientes, sendo os mais comuns distúrbios gastrointestinais como vômitos, náuseas, diarreia e constipação em 74,2% dos pacientes. Esses eventos gastrointestinais tiveram gravidade leve a moderada, foram transitórios e resolvidos sem a descontinuação do tratamento.

O estudo de *Webhuger et al.* realizado em 2022, contou com a participação de 201 pessoas. Eram todos adolescentes (de 12 a 18 anos de idade) com obesidade ou com sobrepeso e pelo menos uma condição coexistente relacionada ao peso. O tratamento durou 68 semanas. A alteração média no IMC desde o início até a semana 68 foi de -16,1% com semaglutida, e 0,6% com placebo. Na semana 68, um total de 95 dos 131 participantes (73%) no grupo semaglutida apresentaram perda de peso de 5% ou mais, em comparação com 11 dos 62 participantes (18%) no grupo placebo. Reduções no peso corporal e melhora em relação aos fatores de risco cardiometabólico foram maiores com a semaglutida do que com o placebo.

Eventos adversos foram relatados em 105 de 133 participantes no grupo semaglutida (79%), sendo distúrbios gastrointestinais os eventos adversos mais frequentes (ocorrendo em 62% dos participantes) e geralmente foram leves ou moderados e de curta duração (2 a 3 dias para náuseas, vômitos e diarreia). Eventos adversos graves foram relatados em 11% dos participantes do grupo semaglutida e nenhum evento adverso fatal foi relatado.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo propôs avaliar, por meio de uma revisão da literatura, os efeitos do uso off-label da semaglutida, originalmente destinada ao controle glicêmico, para fins de emagrecimento estético. A análise dos estudos selecionados demonstra consistentemente que a semaglutida promove uma perda de peso significativa em indivíduos com sobrepeso ou obesidade, acompanhada de melhorias em medidas antropométricas, controle do apetite e parâmetros cardiometabólicos.

No entanto, é crucial ponderar que os benefícios observados são frequentemente acompanhados por eventos adversos, predominantemente de natureza gastrointestinal, como náuseas, diarreia, vômitos e constipação, embora a maioria seja relatada como de intensidade leve a moderada e transitória. Ademais, a interrupção do tratamento com semaglutida leva, em muitos casos, à recuperação do peso perdido e à reversão das melhorias cardiometabólicas, reforçando a concepção da obesidade como uma condição crônica que demanda manejo contínuo.

Diante do exposto, conclui-se que, embora a semaglutida apresente eficácia notável na indução da perda de peso em contextos de uso off-label para fins estéticos, seu uso deve ser cuidadosamente considerado frente aos potenciais efeitos adversos e à necessidade de tratamento prolongado para a manutenção dos resultados. Sugere-se, portanto, que futuras pesquisas continuem a investigar estratégias para mitigar os efeitos colaterais e otimizar a adesão ao tratamento a longo prazo, e que os profissionais de saúde avaliem criteriosamente os riscos e benefícios em uma abordagem individualizada, priorizando a saúde integral do paciente para além da questão estética.

Palavras-chave: Impactos; Obesidade; Perda de Peso; Saúde; Semaglutida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GARVEY, W. Timothy; BATTERHAM, Rachel L.; BHATTA, Meena; BUSCEMI, Silvio; CHRISTENSEN, Louise N.; FRIAS, Juan P.; JÓDAR, Esteban; KANDLER, Kristian; RIGAS, Georgia; WADDEN, Thomas A.. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the step 5 trial. *Nature Medicine*, [S.L.], v. 28, n. 10, p. 2083-2091, out. 2022. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1038/s41591-022-02026-4>.

RYAN, Donna H.; LINGVAY, Ildiko; DEANFIELD, John; KAHN, Steven E.; BARROS, Eric; BURGUERA, Bartolome; COLHOUN, Helen M.; CERCATO, Cintia; DICKER, Dror; HORN, Deborah B.. Long-term weight loss effects of semaglutide in obesity without diabetes in the SELECT trial. *Nature Medicine*, [S.L.], v. 30, n. 7, p. 2049-2057, 13 maio 2024. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1038/s41591-024-02996-7>.

Ghusn, W.; De la Rosa, A.; Sacoto, D.; Cifuentes, L.; Campos, A.; Feris, F.; Hurtado, M. D.; Acosta, A. Weight loss outcomes associated with semaglutide treatment for patients with overweight or obesity. *JAMA Network Open*, v. 5, n. 9, e2231982, 1 set. 2022. DOI: [10.1001/jamanetworkopen.2022.31982](https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.31982).

KUSHNER, Robert F.; CALANNA, Salvatore; DAVIES, Melanie; DICKER, Dror; GARVEY, W. Timothy; GOLDMAN, Bryan; LINGVAY, Ildiko; THOMSEN, Mette; WADDEN, Thomas A.; WHARTON, Sean; WILDING, John P. H.; RUBINO, Domenica. Semaglutide 2.4 mg for the Treatment of Obesity: Key Elements of the STEP



Trials 1 to 5. Obesity, v. 28, n. 6, p. 1050–1061, jun. 2020. DOI: [10.1002/oby.22794](https://doi.org/10.1002/oby.22794).

WILDING, John P. H.; BATTERHAM, Rachel L.; DAVIES, Melanie; VAN GAAL, Luc F.; KANDLER, Kristian; KONAKLI, Katerina; LINGVAY, Ildiko; MCGOWAN, Barbara M.; ORAL, Tugce Kalayci; ROSENSTOCK, Julio. Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: the step 1 trial extension. Diabetes, Obesity And Metabolism, [S.L.], v. 24, n. 8, p. 1553-1564, 19 maio 2022. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/dom.14725>

KAHN, Steven E.; DEANFIELD, John E.; JEPPESEN, Ole Kleist; EMERSON, Scott S.; BOESGAARD, Trine Welløv; COLHOUN, Helen M.; KUSHNER, Robert F.; LINGVAY, Ildiko; BURGUERA, Bartolome; GAJOS, Grzegorz. Effect of Semaglutide on Regression and Progression of Glycemia in People With Overweight or Obesity but Without Diabetes in the SELECT Trial. Diabetes Care, [S.L.], v. 47, n. 8, p. 1350-1359, 22 jun. 2024. American Diabetes Association. <http://dx.doi.org/10.2337/dc24-0491>

FRIEDRICHSEN, Martin; BREITSCHAFT, Astrid; TADAYON, Sayeh; WIZERT, Alicja; SKOVGAARD, Dorthe. The effect of semaglutide 2.4 mg once weekly on energy intake, appetite, control of eating, and gastric emptying in adults with obesity. Diabetes, Obesity And Metabolism, [S.L.], v. 23, n. 3, p. 754-762, 3 jan. 2021. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/dom.14280>.

WHARTON, Sean; CALANNA, Salvatore; DAVIES, Melanie; DICKER, Dror; GOLDMAN, Bryan; LINGVAY, Ildiko; MOSENZON, Ofri; RUBINO, Domenica M.; THOMSEN, Mette; WADDEN, Thomas A.. Gastrointestinal tolerability of once-weekly semaglutide 2.4 mg in adults with overweight or obesity, and the relationship between gastrointestinal adverse events and weight loss. Diabetes, Obesity And Metabolism, [S.L.], v. 24, n. 1, p. 94-105, 4 out. 2021. Wiley. <http://dx.doi.org/10.1111/dom.14551>.

BARI, K. et al. Long-Term Effects of Empagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. New England Journal of Medicine, v. 392, n. 3, p. 241–251, 2025. DOI: [10.1056/NEJMoa2409183](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2409183).

SANTOS, A. I. L. et al. Efeito da vacinação contra a COVID-19 na redução de hospitalizações e óbitos em pacientes idosos no Rio Grande do Norte, Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 28, n. 3, e 230001, 2025. DOI: [10.1590/1980-549720230001](https://doi.org/10.1590/1980-549720230001).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SÍNDROME METABÓLICA (ABESO). Mapa da obesidade. Disponível em: <https://abeso.org.br/obesidade-e-sindrome-metabolica/mapa-da-obesidade/>. Acesso em: 26 maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Obesity and overweight. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>. Acesso em: 26 maio 2025.



FORMAÇÃO MÉDICA INCLUSIVA ATRAVÉS DE EXPERIÊNCIAS LÚDICAS: EXTENSÃO PARA CRIANÇAS COM DOENÇAS RARAS E CUIDADORES

¹Maria Eduarda Sarmiento Medeiros Abrantes

²João Pedro Ferreira Neto

³Agnes Teotonio Wildt Viana

⁴Júlia Cavalcanti Henriques

⁵Felipe Cunha Feitosa

⁶Aralinda Nogueira Pinto de Sá

¹²³⁴⁵⁶Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCM/AFYA. Cabedelo, Paraíba, Brasil.

Área temática: Educação em Saúde

Resumo: A formação médica aliada a práticas de extensão curricular é essencial para desenvolver uma educação em saúde voltada à inclusão social, em especial a saúde das crianças com doenças raras e seus cuidadores, estimulando uma compreensão integral e comprometida socialmente nos futuros profissionais da área da saúde. O presente estudo tem como objetivo descrever uma ação de extensão interdisciplinar voltada à inclusão e à educação em saúde para crianças com doenças raras e seus cuidadores. O estudo é um relato de experiência acadêmico, que aconteceu no semestre 2025.1, durante o segundo período de medicina, em uma associação voltada para pessoas com doenças raras. A atividade consistiu na realização de oficinas lúdicas e informativas para aproximadamente 40 pessoas, entre profissionais da instituição, crianças e seus responsáveis. A metodologia adotada foi baseada na aprendizagem por projeto, com resultados que evidenciaram o impacto positivo da ação na socialização e bem-estar das crianças, além do fortalecimento emocional e informações, para os cuidadores e profissionais, sobre primeiros socorros em situação de engasgo. Para os acadêmicos, a experiência contribuiu para o desenvolvimento de empatia, habilidades de comunicação e compreensão da realidade de pessoas com doenças raras, formação humanizada, empática e inclusiva; compreendendo as dimensões e as adversidades das pessoas com doenças raras. Conclui-se que atividades de extensão desse tipo favorecem à formação médica direcionada à ética, respeito e sensível às necessidades de cada ser humano; bem como ao fortalecimento de vínculos comunitários e o empoderamento de grupos socialmente vulneráveis.

INTRODUÇÃO

A inclusão de pessoas com deficiência, em especial aquelas com doenças raras, permanece um desafio em múltiplas esferas sociais, como a educação, a saúde e o convívio comunitário. Tais indivíduos enfrentam limitações associadas a condições genéticas, neuromusculares ou sensoriais, com impacto direto na qualidade de vida. O modelo social da deficiência, atualmente adotado, reconhece que o cerne da exclusão não está apenas nas limitações individuais, mas nas barreiras sociais, culturais e estruturais. A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (Portaria GM/MS nº 199/2014) busca promover um cuidado integral, com foco na reabilitação, suporte psicossocial e inclusão.

Nessa esteira, tais questões constituem um desafio permanente na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Embora os marcos legais como a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) e a Lei Brasileira de Inclusão (2015)



tenham impulsionado avanços significativos, barreiras físicas, atitudinais, sociais e institucionais ainda dificultam a plena participação dessas pessoas em diversos espaços, como a educação, a saúde, o trabalho e a mobilidade urbana. Historicamente marginalizadas, essas pessoas enfrentam obstáculos estruturais que demandam a adoção de políticas públicas eficazes, ações intersetoriais e a transformação cultural baseada no respeito à diversidade humana.

A concepção contemporânea de deficiência, baseada no modelo social, reconhece que a exclusão decorre principalmente da interação entre as limitações individuais e os entraves impostos pelo meio (Shakespeare, 2013). Essa abordagem é especialmente relevante no contexto das doenças raras, que frequentemente estão associadas a deficiências físicas cognitivas ou sensoriais. Tais condições, por serem muitas vezes crônicas, progressivas e complexas, exigem atenção especializada e suporte multidisciplinar contínuo, o que ainda é uma lacuna na maioria dos serviços públicos (Organização Pan-Americana de Saúde, 2021).

Nesse cenário, destaca-se a promoção da inclusão, que demanda não apenas medidas institucionais, mas também iniciativas de educação em saúde que envolvam a comunidade e sensibilizem futuros profissionais para uma atuação ética, empática e socialmente comprometida. Inserido nesse contexto, o presente trabalho apresenta uma experiência extensionista voltada à inclusão e ao cuidado de crianças com doenças raras e seus cuidadores, por meio de ações lúdicas, educativas e integradoras (Forproex, 2012).

OBJETIVO

O presente estudo tem como objetivo descrever uma ação de extensão interdisciplinar voltada à inclusão e à educação em saúde para crianças com doenças raras e seus cuidadores, promovendo acolhimento, atividades lúdicas, orientações sobre primeiros socorros e práticas de autocuidado.

METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, desenvolvido em uma associação voltada para o cuidado e inclusão de pessoas com doenças raras, tendo como base um projeto de extensão universitária, realizado como atividade curricular obrigatória da disciplina de Práticas Interdisciplinares de Extensão, Pesquisa e Ensino (PIEPE) do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – FCM/AFYA. O público-alvo compreendeu aproximadamente 40 pessoas, entre crianças assistidas e seus familiares, bem como voluntários da associação e demais pessoas convidadas presentes. A ação principal ocorreu em 30 de abril de 2025, das 13h às 16h30, e consistiu em oficinas simultâneas de pintura facial, desenho, circuito físico-motor, penteado e esmaltação para cuidadores. Paralelamente, foi realizada uma roda de conversa com os cuidadores e público adulto presente, abordando obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE) e práticas de autocuidado. Os materiais utilizados foram simples e acessíveis, com foco na ludicidade, criatividade, integração dos participantes e ação dos estudantes.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A realização da ação extensionista na associação proporcionou múltiplos resultados positivos, evidenciando a importância de estratégias lúdicas e educativas para a promoção da inclusão social e do bem-estar de crianças com doenças raras. A prática foi conduzida de



forma tranquila, participativa e empática, demonstrando que ações educativas e integrativas podem promover impacto real na qualidade de vida dos participantes e contribuir com a formação ética e técnica dos estudantes.

A participação ativa das crianças nas oficinas de pintura facial, desenho, circuito físico-motor, além das atividades de autocuidado, demonstrou não apenas um aumento no engajamento social, mas também o fortalecimento da autoestima e da autonomia, aspectos frequentemente comprometidos pelo isolamento social que muitas dessas crianças vivenciam em função das limitações impostas por suas condições clínicas. Entre os principais resultados, observou-se o fortalecimento do vínculo entre cuidadores e equipe de saúde, com a valorização da escuta ativa e do acolhimento humanizado.

A roda de conversa com os cuidadores representou um espaço fundamental do acolhimento, troca de experiências e aprendizado, especialmente sobre práticas de primeiros socorros, como o manejo da obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE). Essa abordagem educativa permitiu ampliar o repertório de conhecimento dos responsáveis, favorecendo a prevenção de situações de risco e estimulando o autocuidado, elementos essenciais para a promoção da saúde e a qualidade de vida no contexto familiar. Esse momento, conduzido com metodologia ativa, permitiu a construção coletiva de saberes sobre a importância de saber o que fazer quando há obstrução de vias aéreas. Como reforçam Martins e Oliveira (2018), metodologias ativas proporcionam maior engajamento e aprendizagem significativa tanto para profissionais quanto para usuários dos serviços de saúde.

Além disso, a experiência foi especialmente significativa para os estudantes de medicina, ao propiciar o desenvolvimento de competências humanísticas, como empatia, escuta qualificada e comunicação efetiva com públicos vulneráveis. O contato direto com os cuidadores de crianças com doenças raras desenvolveu competências como empatia, comunicação efetiva e compreensão ampliada sobre as necessidades biopsicossociais dos pacientes. A vivência prática em um cenário real de cuidado ampliou a compreensão sobre a complexidade que envolve o atendimento a pessoas com doenças raras, reforçando a necessidade de atuação multiprofissional e de práticas clínicas alinhadas com os princípios da humanização e da integralidade do cuidado.

Observou-se também que a interação entre os futuros profissionais de saúde e os participantes do projeto contribuiu para desconstruir preconceitos e para a formação de uma visão mais sensível e socialmente comprometida acerca das necessidades específicas desse público. As atividades realizadas fortaleceram os vínculos entre a comunidade acadêmica e a sociedade civil, demonstrando o papel transformador da extensão universitária na promoção da cidadania, na construção de ambientes mais inclusivos e na redução de desigualdades em saúde.

Portanto, a intervenção proporcionou um ambiente acolhedor, estimulante e educativo, promovendo inclusão social, fortalecimento de vínculos e valorização da autoestima. Para os cuidadores, a roda de conversa representou um espaço de escuta, aprendizado e troca de experiências sobre primeiros socorros e bem-estar. Para os estudantes,

a vivência contribuiu para o desenvolvimento de habilidades interpessoais, empatia e compreensão ampliada do cuidado centrado no paciente

A integração entre conhecimento, práticas humanizadas e envolvimento social evidencia o potencial das atividades extensionistas na formação de médicos preparados para atuar em um sistema de saúde complexo, desigual e desafiador.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade desenvolvida demonstrou o potencial transformador das práticas de extensão na formação médica, ao estimular o diálogo entre saberes acadêmicos e populares, além de promover a inclusão de crianças com doenças raras por meio de atividades lúdicas e informativas. Reforça-se, assim, a necessidade de ações contínuas que valorizem o cuidado integral, a acessibilidade e a equidade em saúde.

Palavras-chave: Doenças Raras; Educação Médica; Educação em Saúde; Inclusão Social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina**. Brasília: MEC, 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

FORPROEX – Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. **Política Nacional de Extensão Universitária**. Belo Horizonte: Forproex, 2012. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/prorext/files/2018/07/PoliticaNacionalExtensao.pdf>.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência**. Nova York, 2006. Disponível em: <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf>.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Doenças raras: um desafio para os sistemas de saúde**. Brasília: OPAS, 2021. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/doencas-raras>.

SHAKESPEARE, Tom. Disability: the social model. In: DAVIS, Lennard J. (org.). **The disability studies reader**. 4. ed. New York: Routledge, 2013. p. 214-221.

VASCONCELOS, E. M. **Educação Popular e Saúde: construindo uma nova relação entre profissionais de saúde e população**. São Paulo: Hucitec, 2010.

MARTINS, A. C.; OLIVEIRA, R. A. Metodologias ativas na formação em saúde: contribuições para a educação popular. **Saúde e Sociedade**, São Paulo, v. 27, n. 2, p. 535-545, 2018.



ASSOCIAÇÃO ENTRE VULNERABILIDADE CLÍNICO-FUNCIONAL E CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

¹Lucas Fellipe Noiola Oliveira

²Maria Clara Nunes Guimarães

³Maria Luíza Ruberg Falcone

⁴Rachel Cavalcanti Fonseca

⁵Lara de Sá Neves Loureiro

⁶Fabiana Medeiros de Brito

^{1,2,3,4,5,6,7}, Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba – AFYA PARAÍBA. Cabedelo, Paraíba, Brasil.

Área temática: Saúde do Idoso

Resumo: O envelhecimento populacional é um fenômeno global, caracterizado por rápidas transformações demográficas e pelo aumento de condições que comprometem a funcionalidade do idoso. Este estudo teve como objetivo analisar a associação entre o grau de vulnerabilidade clínico-funcional e variáveis sociodemográficas em idosos residentes em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Trata-se de um estudo observacional, descritivo, transversal e de abordagem quantitativa, realizado com 13 idosos residentes em uma ILPI no município de Cabedelo-PB, utilizando o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional – IVCF-20. Os resultados apontam para associação entre maior vulnerabilidade e fatores como sexo feminino, idade avançada, ausência de vínculo afetivo e renda intermediária. Tais achados reforçam a importância de abordagens multidimensionais e da formulação de políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo e saudável.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno global e progressivo, com implicações significativas para a saúde pública. No Brasil, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais aumentou de 6,8% em 1980 para 15,6% em 2022, refletindo uma transição demográfica acelerada que demanda atenção urgente para os desafios associados ao envelhecimento, incluindo a prevalência crescente de doenças crônicas e as mudanças nas capacidades funcionais e cognitivas da população idosa (Bandeira de Mello, 2024).

Tal fato, associado as grandes limitações impostas pela idade avançada e pelo perfil dos idosos institucionalizados, torna-se essencial a avaliação mais detalhada das necessidades desta população, incluindo a aplicação de instrumentos validados e capazes de traçar um perfil de vulnerabilidades destes idosos.

A identificação precoce de idosos em situação de vulnerabilidade clínico-funcional torna-se fundamental para prevenir declínios acentuados e promover intervenções mais eficazes. Nesse contexto, instrumentos de rastreio como o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional (IVCF-20) vêm sendo utilizados na Atenção Primária e em instituições geriátricas para avaliar o risco de perda funcional (Moraes et al., 2021).

OBJETIVO

Investigar a associação entre vulnerabilidade clínico-funcional e características sociodemográficas de idosos institucionalizados.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal, com abordagem quantitativa, realizado em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) localizada na cidade de Cabedelo, Paraíba. A população da pesquisa é composta por 15 idosos, os quais foram selecionados por conveniência, sendo incluídos aqueles com idade igual ou superior a 60 anos, com dados disponíveis quanto às características sociodemográficas, presença de comorbidades e pontuação no Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional - 20 (IVCF-20).

Foram excluídos os idosos em estado terminal, com limitações severas de comunicação sem suporte ou com ausência de dados nos registros institucionais. A coleta de dados foi realizada durante o mês de outubro de 2024.

Os dados foram organizados em planilha do Microsoft Excel, analisados por meio de estatística descritiva, com frequências absolutas e relativas, e distribuídos em tabelas de contingência para exploração da associação entre o grau de vulnerabilidade e as variáveis sociodemográficas. A pesquisa está vinculada a um projeto institucional aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, respeitando os princípios da ética em pesquisa com seres humanos, conforme parecer nº 6.255.234/2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra foi composta por 13 idosos. A análise do grau de vulnerabilidade clínico-funcional, conforme o IVCF-20, evidenciou padrões significativos relacionados às variáveis sociodemográficas. Em relação ao sexo, todas as mulheres, que representaram 53,8% da amostra, foram classificadas como de alto risco, enquanto os homens se concentraram apenas nos níveis moderado e baixo, sem registros de alto risco. Esse achado é coerente com a literatura, que aponta que as mulheres institucionalizadas apresentam maior fragilidade e dependência funcional, relacionadas a fatores biológicos como a sarcopenia — perda progressiva de massa e força muscular — e à maior expectativa de vida, que amplia o risco de viuvez e isolamento social (Cruz-Jentoft et al., 2019; Silva et al., 2016).

Quanto à idade, observou-se que idosos com 80 anos ou mais estavam majoritariamente na categoria de alto risco, enquanto aqueles entre 60 e 69 anos predominavam nos riscos moderado e baixo. Essa associação entre envelhecimento e fragilidade funcional é amplamente reconhecida, já que o avanço da idade reduz a reserva fisiológica e a capacidade de resposta a estressores, aumentando a suscetibilidade à dependência, quedas e hospitalizações (Cruz-Jentoft et al., 2019).

No que se refere ao estado civil, viúvos e divorciados apresentaram maior frequência no grupo de alto risco, enquanto casados ou em união estável mostraram distribuição mais equilibrada, o que sugere que vínculos afetivos podem exercer papel protetor sobre a funcionalidade. A ausência de um cônjuge agrava a saúde funcional e mental, favorecendo o isolamento, a depressão e o declínio funcional. Participação em grupos sociais e atividades coletivas é uma estratégia importante para preservar o bem-estar e a autonomia (Silva et al.,



2016).

A escolaridade não apresentou uma tendência clara: embora a maioria tivesse nove anos ou mais de estudo, os graus de vulnerabilidade distribuíram-se entre todas as categorias.

Isso sugere que, isoladamente, o nível educacional não determina a funcionalidade. Entretanto, ele pode favorecer o autocuidado, a adesão a tratamentos e o uso adequado dos serviços de saúde, especialmente quando associado a fatores como renda e rede de apoio social (Barcelos et al., 2022).

No tocante à renda, observou-se que a maioria dos idosos de alto risco recebia entre 1,1 e 3 salários-mínimos. Apesar de representar uma faixa intermediária, tal rendimento pode ser insuficiente para garantir plena autonomia, em razão das limitações no acesso a cuidados, alimentação adequada e serviços de reabilitação. Mesmo com rendimentos moderados, muitos idosos enfrentam descontinuidade nos tratamentos e maior vulnerabilidade funcional (Ribeiro et al., 2015).

Em relação à cor/raça, idosos brancos predominaram nos riscos moderado e alto, enquanto pardos e pretos apresentaram distribuição mais variada. No entanto, o pequeno tamanho da amostra impossibilita inferências conclusivas sobre essa variável. A literatura aponta que idosos de grupos raciais minorizados enfrentam maior incidência de deficiência e menor acesso a serviços de saúde, reflexo de desigualdades estruturais. Dessa forma, políticas públicas de equidade racial são fundamentais para promover um envelhecimento saudável (Ribeiro et al., 2015).

O recebimento de benefícios sociais foi mais frequente entre os idosos classificados como de alto risco, o que pode estar relacionado ao acúmulo de condições crônicas e à maior dependência funcional. Embora a maioria dos participantes se declarasse católica, não foi identificada associação entre filiação religiosa e grau de vulnerabilidade, com distribuição proporcional em todas as categorias. Ainda assim, a espiritualidade é reconhecida como fator protetor no envelhecimento, favorecendo resiliência, saúde mental e qualidade de vida (Batista; Bédard, 2023).

CONCLUSÃO

O presente estudo evidenciou que características sociodemográficas influenciam diretamente o grau de vulnerabilidade clínico-funcional em idosos institucionalizados. Os achados apontam maior prevalência de vulnerabilidade entre mulheres, idosos com 80 anos ou mais, indivíduos viúvos ou divorciados e aqueles com renda mensal intermediária. Esses fatores refletem não apenas condições biológicas, mas também aspectos sociais e econômicos que repercutem na funcionalidade e autonomia dos idosos em instituições de longa permanência.

A ausência de associação significativa com a escolaridade e a filiação religiosa indica a necessidade de análises mais aprofundadas sobre os determinantes sociais da saúde nessa população. Os resultados reforçam a importância da adoção de estratégias de cuidado baseadas em abordagens multidimensionais, com foco na individualização das intervenções e na formulação de políticas públicas que favoreçam o envelhecimento ativo, funcional e com qualidade de vida, mesmo no contexto da institucionalização.

Palavras-chave: Funcionalidade; Idosos; Instituição de Longa Permanência; Vulnerabilidade; IVCF-20.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BANDEIRA DE MELLO, Renato. Envelhecimento populacional, saúde pública e cuidado da pessoa idosa na atenção primária. Fundação Maria Emília, 9 dez. 2024. Disponível em: <https://mariaemilia.org.br/envelhecimento-populacional-saude-publica-e-cuidado-da-pessoa-idosa-na-atencao-primaria/>. Acesso em: 25 maio 2025.

BARCELOS, A. S. et al. O efeito das ações de educação em saúde no autocuidado de idosos participantes da Universidade da Maturidade: um estudo quase-experimental. *Research, Society and Development*, v. 11, n. 10, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i10.32261>. Acesso em: 17 de maio de 2025

BATISTA, A. F.; BÉDARD, M.-È. Espiritualidade: uma alavanca para promover a saúde e o bem-estar das pessoas idosas. *Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento*, v. 28, 2023. DOI: <https://doi.org/10.22456/2316-2171.125582>. Acesso em: 17 de maio de 2025

CRUZ-JENTOFT, A. J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, v. 48, n. 1, p. 16–31, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1093/ageing/afy169>. Acesso em: 17 de maio 2025.

MORAES, Edgar Nunes de et al. Clinical Frailty Scale em idosos atendidos no Serviço Hospitalar de Emergência: a fragilidade basal é um bom preditor de mortalidade em 90 dias? *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 4, e210122, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2020-0973>. Acesso em: 18 maio 2025.

PEREIRA, W. M. et al. Vulnerabilidade social entre idosos institucionalizados no Brasil: uma revisão integrativa. *Revista Kairós*, v. 26, n. 1, p. 95-110, 2023. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/375041963>. Acesso em: 25 maio 2025.

RIBEIRO, M. et al. Determinantes sociais da saúde do idoso. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 20, n. 12, p. 3641-3652, 2015. <https://doi.org/10.1590/S1413-81232012000100015>. Acesso em: 17 maio de 2025.

SILVA, R. M. et al. Morbidades, capacidade funcional e qualidade de vida de mulheres idosas. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, v. 50, n. 3, p. 389-396, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-81452010000400008>. Acesso em: 17 maio de 2025



A UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS TRONCO PARA O TRATAMENTO DO ALZHEIMER

¹Gabriel Frabis Zago

¹Giovanna Christakou Vieira

¹Mariana Mota Carrijo

¹Maria Fernanda Monteiro Araújo

²Renata Aparecida Elias Dantas

^{1,2}Centro de Ensino Unificado de Brasília, Brasília, DF, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo: Este estudo analisou a eficácia das células-tronco no tratamento da doença de Alzheimer (DA), uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta 1,2 milhões de pessoas no Brasil, causando a morte de células neurais e resultando em sintomas como perda de memória e alterações comportamentais. O objetivo foi enfatizar o impacto desses avanços no cuidado aos indivíduos e na prática clínica, em detrimento aos fármacos tradicionais. A metodologia consistiu em uma revisão integrativa da literatura, analisando 10 artigos publicados entre 2010 e 2025, utilizando descritores como “células-tronco”, “Alzheimer”, “tecido mesenquimal” e “bioética”. Os resultados indicaram que a administração intravenosa de células-tronco mesenquimais humanas (hMSC e allo-hMSCs) e células mononucleares da medula óssea (BMMCs) reduziu a acumulação de proteína beta-amiloide, diminuiu citocinas pró-inflamatórias e melhorou aspectos físicos e imunológicos. As células-tronco neurais humanas (hNSCs) também promoveram melhora na atividade metabólica neural e diferenciação celular. Conclui-se que o uso de células-tronco apresenta um potencial promissor para o tratamento do Alzheimer, mas são necessárias mais pesquisas para garantir a segurança e eficácia em humanos, considerando as implicações éticas.

INTRODUÇÃO

O Alzheimer é uma doença classificada como um transtorno neurodegenerativo progressivo que afeta a vida de 50 milhões de pessoas, sendo a condição mais comum do sistema nervoso central. A doença é causada pela morte programada, apoptose, das células neurais em regiões específicas como o hipocampo e o córtex cerebral, por meio da deposição extracelular de placas amiloides-(A) insolúveis e emaranhados intracelulares compostos de tau fosforilado no cérebro. Assim, apresentam-se diversos sintomas para o portador, como mudanças de comportamento, dificuldade de aprendizado e, principalmente, perda de memória (Lu *et al*, 2025).

Diante da crescente prevalência e dos impactos devastadores da DA na qualidade de vida dos pacientes e de seus cuidadores, surge a necessidade de explorar novas abordagens terapêuticas que possam ir além dos tratamentos farmacológicos tradicionais, muitas vezes com eficácia limitada. Neste contexto, questiona-se: qual a eficácia das células-tronco no tratamento do Alzheimer e qual o impacto desses avanços no cuidado aos indivíduos com a doença e na prática clínica?

Este estudo tem como objetivo analisar a eficácia das células-tronco no tratamento da DA enfatizando o impacto desses avanços no cuidado aos indivíduos com a doença e na prática clínica em detrimento ao uso tradicional dos fármacos. Para isso, será realizada uma



revisão integrativa da literatura, abordando estudos publicados entre 2010 e 2025 que investigam a aplicação de células-tronco no tratamento do Alzheimer. Os resultados desta revisão apresentarão as evidências mais recentes sobre a eficácia e os mecanismos de ação das células-tronco. Por fim, o estudo concluirá sobre o potencial das células-tronco como alternativa terapêutica e discutirá as implicações éticas e a necessidade de futuras pesquisas para a segurança e eficácia em humanos.

OBJETIVO

Esse estudo tem como objetivo analisar a eficácia das células-tronco no tratamento do Alzheimer, enfatizando o impacto desses avanços no cuidado aos indivíduos com a doença e na prática clínica em detrimento ao uso tradicional dos fármacos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com artigos advindos da PubMed, BVS e Scopus, fornecendo uma visão abrangente e atualizada. Inicialmente, foram selecionados 20 artigos por meio do uso dos seguintes descritores: “células-tronco”; “Alzheimer”; “tecido mesenquimal” e “bioética”. Após uma leitura detalhada foram utilizados os 10 artigos que melhor atendiam ao objetivo do estudo. Diante disso, os critérios de inclusão foram os estudos baseados nos avanços dos tratamentos do Alzheimer publicados entre 2010 e 2025 que abordaram o uso das células-tronco, e os critérios de exclusão foram uso meta-análise, revisão sistemática e opinião de especialista.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados de uma pesquisa evidenciam que a administração intravenosa de hMSC (*human mesenchymal stem cells*) em camundongos APP/PS1 (camundongos transgênicos com mutações direcionadas aos neurônios do sistema nervoso central (SNC) e associadas à DA) reduziu significativamente a acumulação de proteína beta-amiloide que formam as placas no cérebro associadas às alterações no metabolismo da glicose e a danos neuronais característicos da DA. A análise dos níveis de citocinas pró-inflamatórias diminuíram, o que demonstra a redução da patologia cerebral e da neuroinflamação após 10 semanas de tratamento, sem aumento na angiopatia amilóide ou micro-hemorragias. (Harach *et al*, 2016) Além disso, o uso intravenoso de allo-hMSCs (células-tronco mesenquimais alogênicas) em pacientes entre 60 a 95 anos, dividindo-se em um grupo que recebeu 100 milhões de células apresentou uma melhora física e imunológica e o outro grupo que recebeu 200 milhões de células obteve-se um avanço ainda mais significativa quando comparada ao placebo, melhorando os marcadores inflamatórios e a performance física. (Bryon *et al*, 2017)

Ademais, o transplante intravenoso de BMMCs (células mononucleares da medula óssea) em camundongos fêmeas foi comprovada eficaz tanto na prevenção quanto no tratamento dos sintomas da DA, representando uma abordagem promissora e menos invasiva. Já que, foram detectadas BMMCs no cérebro dos camundongos, comprovando que atravessam a barreira hematoencefálica, indicando redução expressiva das placas beta-amiloide, observado pela coloração de tioflavina S e análise de *Western blotting*, restaurando a função cognitiva nos que estavam no início dos sintomas e melhora naqueles que apresentavam a doença a mais tempo, prevenindo a degeneração dos neurônios no hipocampo e a perda de memória, ratificado pelo teste espontâneo do labirinto em Y. (Lu *et al*, 2025)

Conforme demonstrado por um estudo, os camundongos que foram submetidos ao



tratamento terapêutico de células-tronco neurais humanas (hNSCs) exibiram melhora significativa na atividade metabólica neural, observou-se também a diferenciação dessas células em neurônios e astrócitos com aumento da densidade cerebral. As doses administradas geraram reações como febre, cefaléia, náuseas e êmese, assim os biomarcadores de Alzheimer retornaram aos níveis basais. (Li *et al*, 2016)

Já os camundongos que foram submetidos ao tratamento com BMMCs de outros ratos, houve uma evolução na função cognitiva e memória aprimorada e uma redução das placas A β do córtex e hipocampo, o que indica que o tratamento estimulou a neurogênese (aumento de células DCX-positivas (*adult-newborn neurons*) e redução da resposta inflamatória. Além disso, outro estudo apontou que houve uma melhora no aprendizado e redução da ansiedade. (Yun *et al*, 2013)

No estudo em que foram utilizados 9 pacientes com demência, entre 50 e 85 anos, com acumulação de placas amiloides no cérebro detectada por um exame de ressonância magnética. Houve a aplicação de três injeções intracerebroventriculares repetidas de hUCB-MS (Células-tronco mesenquimais derivadas do sangue do cordão umbilical humano). Durante a avaliação da dosagem e da toxicidade dessa substância os efeitos colaterais mais comuns foram febre, cefaléia, vômitos, náusea, mialgia, parestesia em ambos os braços e pernas, porém ocorreu uma resposta inflamatória transitória com um aumento de leucócitos. Os biomarcadores da DA retornaram aos níveis basais após 4 semanas, então as aplicações foram viáveis, seguras e bem toleradas. Porém, há a necessidade de otimizar o número de aplicações e controlar respostas inflamatórias para estudos sobre a eficácia terapêutica. (Kim *et al*, 2021)

Por outro lado, o transplante de BM-MS (célula-tronco mesenquimais da medula óssea) em camundongos APP/PS1 levou a uma redução significativa na deposição de Ab no córtex e hipocampo. Além disso, o tratamento com BM-MS diminuiu a fração de placas positivas para Ab 40 e 42, conforme demonstrado pela análise imunohistoquímica e ensaios ELISA, sugerindo que o transplante de BM-MS previne a formação de depósitos de Ab e remove os depósitos existentes no cérebro desses camundongos modelo de DA. (Kil *et al*, 2010)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados evidenciados neste estudo, admite-se que a utilização de células tronco no tratamento da DA pode ser uma técnica útil para uma recuperação dos pacientes acometidos por essa doença e uma forma alternativa para outros tratamentos como os medicamentosos. Assim, é crucial um maior percentual de pesquisas sobre o assunto em seres humanos, tendo como objetivo a garantia da segurança e eficácia do tratamento visando também a aplicação de medidas éticas tanto para o doador quanto o paciente, valorizando o respeito mútuo de formas de pensar e crenças sobre o uso ou não de células oriundas dos embriões.

Palavras-chave: “Células-tronco mesenquimais”, “bioética” e “doença de Alzheimer”

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Harach, T. *et al*. Administrations of human adult ischemia-tolerant mesenchymal stem cells and factors reduce amyloid beta pathology in a mouse model of Alzheimer’s disease.

Neurobiology of aging, v. 51, p. 83–96, 2017. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28056358/>. Acesso em: 31 de março de 2025



Tompkins, B. A. *et al.* Allogeneic mesenchymal stem cells ameliorate aging frailty: A phase II randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. *The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences*, v. 72, n. 11, p. 1513–1522, 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28977399/>. Acesso em: 31 de março de 2025

Lu, Y. *et al.* Bone marrow mesenchymal stem cells derived cytokines associated with AKT/IAPs signaling ameliorate Alzheimer's disease development. *Stem cell research & therapy*, v. 16, n. 1, p. 14, 2025. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39849525/>. Acesso em: 24 de março de 2025

Banik, A. *et al.* Effect of human umbilical cord blood derived lineage negative stem cells transplanted in amyloid- β induced cognitive impaired mice. *Behavioural brain research*, v. 291, p. 46–59, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25989508/>. Acesso em: 24 de março de 2025

Li, X. *et al.* Human neural stem cell transplantation rescues cognitive defects in APP/PS1 model of Alzheimer's disease by enhancing neuronal connectivity and metabolic activity. *Frontiers in aging neuroscience*, v. 8, p. 282, 2016. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5120101/>. Acesso em: 24 de março de 2025

Kim, H. J. *et al.* Intracerebroventricular injection of human umbilical cord blood mesenchymal stem cells in patients with Alzheimer's disease dementia: a phase I clinical trial. *Alzheimer's research & therapy*, v. 13, n. 1, p. 154, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34521461/>. Acesso em: 24 de março de 2025

Kanamaru, T. *et al.* Intravenous transplantation of bone marrow-derived mononuclear cells prevents memory impairment in transgenic mouse models of Alzheimer's disease. *Brain research*, v. 1605, p. 49–58, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25698614/>. Acesso em: 17 de março de 2025

Matchynski-Franks, J. J. *et al.* Mesenchymal stem cells as treatment for behavioral deficits and neuropathology in the 5xFAD mouse model of Alzheimer's disease. *Cell transplantation*, v. 25, n. 4, p. 687–703, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25698614/>. Acesso em: 31 de março de 2025

Yun, H.-M. *et al.* Placenta-derived mesenchymal stem cells improve memory dysfunction in an A β 1-42-infused mouse model of Alzheimer's disease. *Cell death & disease*, v. 4, n. 12, p. e958, 2013. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24336078/>. Acesso em: 31 de março de 2025

Lee, J. K. *et al.* Intracerebral transplantation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells reduces amyloid-beta deposition and rescues memory deficits in Alzheimer's disease mice by modulation of immune responses. *Stem cells (Dayton, Ohio)*, v. 28, n. 2, p. 329–343, 2010. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20014009/>. Acesso em: 24 de março de 2025



INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM GRUPO PARA PORTADORES DE DOR LOMBAR CRÔNICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO AFID-JR

¹Maria Eduarda Abrantes Silva

¹Icaro Augusto Cardoso de Oliveira

¹Gabriel Vinicius Lemes de Maria

¹Natalia da Silva Spada

¹João Paulo Freitas

¹Fabício José Jassi.

¹ Denis Carlos dos Santos

¹ Universidade Estadual do Norte do Paraná. Jacarezinho, Paraná, Brasil.

Área temática: Fisioterapia.

Resumo: A dor lombar crônica é considerada uma das principais causas de incapacidade funcional é uma das condições musculoesqueléticas mais prevalentes, sendo frequentemente associada a limitação funcional e impacto negativo na qualidade de vida. A cinesioterapia é um dos recursos mais utilizados por fisioterapeutas para o tratamento de quadros de lombalgias, para o tratamento de quadros de lombalgias, tanto em atendimentos individuais ou em grupo. Trata-se de um relato de experiência desenvolvido na Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), integrado ao projeto denominado Atenção Fisioterapêutica aos Portadores de Disfunções Cinético-Funcionais de Jacarezinho e Região (AFID-JR). O projeto consiste em um grupo de intervenção voltado à abordagem fisioterapêutica em pacientes portadores de dores lombares crônicas e limitações funcionais. As intervenções incluíram exercícios terapêuticos para fortalecimento da musculatura do core e alongamentos, com uso de diversos recursos disponíveis na clínica. Para os acadêmicos, a vivência proporcionou desenvolvimento do raciocínio clínico, aprimoramento da comunicação terapêutica, fortalecimento do trabalho em equipe e melhora da relação ensino-serviço-comunidade.

INTRODUÇÃO

A dor lombar crônica é considerada uma das principais causas de incapacidade funcional, é uma das condições musculoesqueléticas mais prevalentes, sendo frequentemente associada a limitação funcional e impacto negativo na qualidade de vida. É caracterizada como uma dor por 12 semanas ou mais (Reis *et al.*, 2008; Alvarenga *et al.*, 2021). Os sintomas incluem dor contínua ou intermitente, rigidez articular, limitação de movimento e, em alguns casos, irradiação para os membros inferiores. (Alvarenga *et al.*, 2021; Ferreira *et al.*, 2023). Além dos aspectos físicos, frequentemente estão presentes sintomas psicossociais, como ansiedade, cinesiofobia e comportamentos de evitação, os quais contribuem para o aumento da perpetuação da dor e da limitação funcional (May *et al.*, 2022).

Considerando a ocorrência de recidivas de dor lombar crônica em pacientes que frequentam a clínica de fisioterapia da UENP, bem como a crescente procura por acompanhamento fisioterapêutico, o presente projeto surgiu a partir da necessidade em promover acompanhamento fisioterapêutico e educação em saúde a esses pacientes. Tal acompanhamento teve o intuito de promover acolhimento, acompanhamento,



educação em saúde e a continuidade no atendimento relacionado à prática de exercícios terapêuticos aos pacientes, visando o cuidado contínuo e humanizado, bem como a integração entre ensino, serviço e comunidade. Neste contexto, considerando os prejuízos funcionais que a dor lombar crônica podem causar (Ribeiro; Martins; Perez, 2019), ações que visem a educação da população, a prevenção e cura de tais disfunções tornam-se assuntos principalmente de interesse da saúde pública.

Dentre as modalidades terapêuticas utilizadas pela fisioterapia na abordagem ao paciente portador de dor lombar crônica, podemos citar a cinesioterapia, que compreende a execução de exercícios terapêuticos com o objetivo de restaurar a função, melhorar a mobilidade, fortalecer músculos relacionados a estabilização da coluna e promover alívio da dor (Ribeiro *et al.*, 2018). Essa abordagem é um dos recursos mais utilizados por fisioterapeutas para o tratamento de quadros de lombalgias, tanto em atendimentos individuais ou em grupo (Rached *et al.*, 2013; Ribeiro; Martins; Perez, 2019). Dessa forma, a criação de um projeto de extensão relacionado ao acompanhamento de pacientes portadores de dor lombar crônica, não só traria benefícios aos pacientes, mas também aos acadêmicos envolvidos, uma vez que possibilitaria aos mesmos relacionar conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo da graduação com a prática clínica e real necessidade dos pacientes, fortalecendo a relação ensino-aprendizagem, preparando-os para atuar no mercado de trabalho, dentro da realidade da comunidade. Por fim, ações propiciadas pelo projeto auxiliarão os alunos envolvidos a focar diretamente o ser humano, à atenção integral ao usuário, não só do ponto de vista físico, como também social, ético e humano (Silva; Silveira, 2011).

OBJETIVO

O principal objetivo do projeto é relatar a percepção dos alunos e demais participantes sobre a implementação de um programa de educação em saúde e assistência fisioterapêutica em grupo para portadores de dor lombar crônica inespecífica, seus efeitos na redução da cinesiofobia e na melhora da funcionalidade.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência com abordagem descritiva e qualitativa (Mussi; Flores; Almeida, 2021), desenvolvido na Clínica de Fisioterapia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), integrado ao projeto denominado Atenção Fisioterapêutica aos Portadores de Disfunções Cinético-Funcionais de Jacarezinho e Região (AFID-JR). A experiência ocorreu entre os meses de agosto de 2024 e abril de 2025, consistindo em um grupo de intervenção voltado à abordagem fisioterapêutica em pacientes portadores de dor lombar crônica inespecífica e limitações funcionais. A população atendida é composta por moradores do município de Jacarezinho – PR, diagnosticados com dor lombar crônica inespecífica, com idade igual ou superior a 18 anos, que não estejam em tratamento fisioterapêutico efetivo no momento da inserção ao grupo. A organização das atividades seguiu um planejamento semanal, às segundas e quartas-feiras, com duração de 60 minutos por sessão. As práticas foram conduzidas por acadêmicos do curso de Fisioterapia, sob a supervisão de docentes, com foco em exercícios terapêuticos voltados à ativação e fortalecimento da musculatura estabilizadora do core, especialmente os músculos lombares superficiais e profundos, além de exercícios de alongamento, correção postural e relaxamento, visando melhora da flexibilidade, alívio da dor e da funcionalidade.

Durante os atendimentos, foram utilizados recursos como colchonetes, faixas elásticas, bolas, bastões, caneleiras, halteres e demais materiais disponíveis na clínica. Além



da prática fisioterapêutica, o grupo contou com ações de educação em saúde dos participantes, por meio de materiais educativos como cartilhas e folders informativos, abordando orientações para atividades domiciliares, cuidados nas atividades de vida diária e execução segura de exercícios. A metodologia priorizou a construção do vínculo terapêutico, a escuta ativa e a abordagem humanizada, com foco na redução da dor, da cinesiofobia e na promoção da qualidade de vida dos participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experiência clínica com o grupo de pacientes com dor lombar crônica revelou-se enriquecedora tanto para os participantes quanto para os acadêmicos envolvidos. Observou-se, ao longo dos atendimentos, uma redução percebida na intensidade da dor e na cinesiofobia, além de ganhos funcionais importantes, como maior autonomia nas atividades diárias, melhora da mobilidade e interação social entre os participantes. O formato em grupo favoreceu o acolhimento, a troca de experiências e o fortalecimento do engajamento no processo terapêutico.

De acordo com o relato dos acadêmicos, a vivência proporcionou desenvolvimento do raciocínio clínico, fortalecimento da relação ensino-serviço-comunidade, aprimoramento da comunicação terapêutica e fortalecimento do trabalho em equipe.

Os relatos dos participantes apontaram que as orientações fornecidas durante as sessões e os materiais educativos foram fundamentais para a mudança de percepção quanto ao movimento e à dor. A abordagem humanizada para o paciente também favoreceu o estabelecimento de um vínculo terapêutico sólido, potencializando os efeitos da intervenção. Essa experiência reforça o papel da fisioterapia em grupo como uma estratégia eficaz, acessível e acolhedora para o manejo da dor lombar crônica, valorizando o cuidado integral e a escuta ativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As atividades realizadas durante o projeto geraram resultados positivos tanto para os participantes quanto para os acadêmicos envolvidos. A execução dos exercícios propostos nos planos de tratamento em grupo, contribuiu significativamente para a melhora da funcionalidade, alívio das dores musculoesqueléticas e o aprimoramento do desempenho nas atividades de vida diária. Observou-se também uma redução da cinesiofobia entre os participantes, resultado da reeducação quanto às crenças disfuncionais relacionadas ao movimento e à dor crônica. Assim, o projeto reafirma a importância das práticas extensionistas no fortalecimento do vínculo entre universidade e comunidade, na promoção da saúde integral e na formação crítica e humanizada dos futuros fisioterapeutas.

Palavras-chave: atividade em grupo; cinesioterapia; dor lombar crônica.

Financiamento: Fundação Araucária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARENGA, L. R. et al. Dor lombar em idosos da Amazônia brasileira: prevalência e fatores associados. **Healthcare**, Basel, v. 9, n. 5, p. 539, 2021.

FERREIRA, M. L. et al. Global, regional, and national burden of low back pain, 1990–2020,



its projections to 2050, and progress in its prevention. **The Lancet Rheumatology**, v. 5, n. 6, p. e316-e329, 2023.

MAY, S. et al. Back pain beliefs and fear-avoidance behaviour in the general population: a systematic review and meta-analysis. **Musculoskeletal Science and Practice**, v. 59, p. 102510, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.msksp.2021.102510>.

MUSSI, R. F. F; FLORES, F. F.; ALMEIDA, C. B. Pressupostos para elaboração de relato de experiência como conhecimento científico. **Revista Práxis Educacional**, v.17, n. 48, 2021.

RACHED, R. D. V. A. et al.. Lombalgia inespecífica crônica: reabilitação. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 59, n. 6, p. 536–553, nov. 2013.

REIS, L. A. DOS et al. Lombalgia na terceira idade: distribuição e prevalência na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 11, n. 1, p. 93–103, abr. 2008.

RIBEIRO, R. P. et al. Relação entre a dor lombar crônica não específica com a incapacidade, a postura estática e a flexibilidade. **Fisioterapia e Pesquisa**, São Paulo, Brasil, v. 25, n. 4, p. 425–431, 2018.

RIBEIRO, R. C.; MARTINS, P. C. de M. L.; PEREZ, F. da S. B. Cinesioterapia no tratamento da dor lombar crônica: revisão de literatura. **Saúde & Ciência em Ação**, v. 5, n. 1, p. 82–91, 2019.

SILVA, I. D. da; SILVEIRA, M. de F. de A. A humanização e a formação do profissional em fisioterapia. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, Brasil, v. 16, supl. 1, p. 1535–1546, 2011.



TRANSTORNOS DE ESTRESSE RELACIONADOS AOS DESASTRES AMBIENTAIS DO RIO GRANDE DO SUL/RS

¹Ana Alice Medeiros de Brito

²Ívina Vitória Cunha de Oliveira

³Thiago Coimbra Staiger Ayres Azevedo

⁴Roseane Christhina da Nova Sá Serafim

^{1,2,3,4} Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, Paraíba, Brasil

Área temática: Psicologia

Resumo: Este trabalho consiste em uma revisão narrativa de literatura. As unidades de análise foram colhidas a partir de busca ativa eletrônica nas plataformas PubMed, SciELO e Google Acadêmico, além de relatórios oficiais e matérias jornalísticas publicadas entre 1999 e 2024, que teve como objetivo analisar o impacto psicológico dos Transtornos de Estresse Agudo (TEA) e de Estresse Pós-traumático (TEPT) em populações vulneráveis afetadas pelas inundações de abril e maio de 2024 no Rio Grande do Sul. As inundações ocorridas no Rio Grande do Sul em 2024 causaram impactos psicológicos significativos nas populações afetadas, especialmente nas mais vulneráveis. Nesse sentido, transtornos como o Transtorno de Estresse Agudo (TEA) e o Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT) ocorrem frequentemente em indivíduos que vivenciaram desastres naturais e afetam principalmente grupos de baixa renda e minorias sociais. Neste contexto, destaca-se a importância do apoio psicológico contínuo que pode ser prestado por profissionais da Psicologia de emergência e que visa a identificação precoce e o tratamento adequado dos sintomas de TEA e TEPT.

INTRODUÇÃO

As inundações ocorridas no Rio Grande do Sul em abril e maio de 2024 se caracterizam como um dos maiores desastres naturais da região, atingindo diretamente mais de 478 municípios e envolvendo mais de 876,2 mil pessoas (IPEA, 2024, p. 4). De acordo com Norris *et al.* (2002), eventos dessa natureza geram não apenas danos físicos, mas também profundas consequências na saúde mental da população, favorecendo o aparecimento de quadros de Transtorno de Estresse Agudo (TEA) e de Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT), sendo considerados os diagnósticos mais comuns em populações expostas a traumas.

Nesse sentido, de acordo com Silva *et al.* (2023), grupos socialmente vulneráveis, especialmente famílias de baixa renda, comunidades tradicionais e minorias étnicas, já fragilizados por condições estruturais e sociais, apresentam maior dificuldade de acesso a serviços de saúde mental, o que intensifica a gravidade e a continuidade dos sintomas. No caso do Rio Grande do Sul, pesquisas preliminares indicam que a incidência de sintomas de TEA e TEPT é maior entre pessoas com renda inferior a dois salários-mínimos e grupos racialmente marginalizados (Oliveira, 2024).

Partindo desse contexto, o presente trabalho apresenta uma revisão narrativa sobre o impacto psicológico das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul, focalizando as manifestações de transtorno de estresse pós traumático e transtorno de estresse agudo em populações vulneráveis e as principais estratégias de suporte psicológico e de políticas públicas para ajudar a lidar com seus efeitos e promover a recuperação emocional das



vítimas.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi investigar e analisar o impacto psicológico das enchentes no Rio Grande do Sul, com foco no Transtorno de Estresse Agudo (TEA) e no Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT) em populações vulneráveis.

METODOLOGIA

O presente texto trata-se de um estudo qualitativo, de natureza descritiva e explanatória de tipo revisão narrativa. A busca ativa foi realizada nas bases eletrônicas PubMed, SciELO e Google Acadêmico, de forma que foram selecionados materiais do período de 1999 a 2024, utilizando os descritores “Transtorno de Estresse Agudo”, “Transtorno de Estresse Pós-Traumático”, “Desastres ambientais” e “Rio Grande do Sul” com vias a otimizar a seleção das unidades de investigação. Para ampliar o exame do conteúdo, incluiu-se no corpo de análise os relatórios da Defesa Civil do estado e da Emater do Rio Grande do Sul.

No processo de triagem, foram elegíveis e selecionados os textos que abordavam as inundações do Rio Grande do Sul, a correlação de eventos ambientais catastróficos com o desenvolvimento de Transtorno de Estresse Pós-Traumático ou Transtorno de Estresse Agudo e, também, o impacto de desastres ambientais em populações socioeconomicamente vulneráveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desastre ambiental ocorrido no Rio Grande do Sul durante os meses de abril e maio de 2024 tornou-se a maior tragédia natural do estado. A população do RS se deparou com uma catástrofe que afetou 478 municípios e mais de 2,3 milhões de pessoas, resultando em 806 feridos, 27 desaparecidos e 183 óbitos confirmados, segundo o relatório de 20 de agosto feito pela Defesa Civil do estado.

Segundo pesquisa do Datafolha, as enchentes do Rio Grande do Sul atingiram em maior número pobres, pretos e menos escolarizados. Nas cidades afetadas, 47% das famílias com renda de até dois salários mínimos relatam terem perdido a casa, os móveis e eletrodomésticos e até mesmo o próprio sustento, ao passo que, dentre as famílias detentoras de cinco a dez salários, apenas 13% mencionam algum tipo de prejuízo (Oliveira, 2024). No que tange à raça, 52% das pessoas pretas dos municípios atingidos relatam alguma perda advinda das inundações, e 40% dos pardos confirmam algum tipo de prejuízo; entre a população branca, contudo, apenas 26% afirmam perdas materiais ou de renda (Oliveira, 2024).

Ainda, em relatório feito pela Emater/RS, a respeito dos impactos das chuvas no Rio Grande do Sul durante o mês de maio de 2024, são listados os efeitos das inundações em povos e comunidades tradicionais. Segundo o boletim, 92% das aldeias indígenas, distribuídas em 62 municípios decretaram situação de calamidade ou emergência, dentre as quais 80% sofreram algum dano material, 60% tiveram prejuízos com relação à produção de alimentos e 100% dos territórios indígenas do Rio Grande do Sul sofreram impactos (direta ou indiretamente) com relação a sua principal fonte de renda, o artesanato (Emater/RS, 2024).

O relatório desenvolvido pela Emater/RS (2024) também lista que 88% das comunidades quilombolas foram atingidas pelo desastre climático, de modo que apresentaram danos relacionados ao acesso ao trabalho e à produção agropecuária,



resultando em insegurança alimentar; as habitações dessa população também foram fortemente afetadas. Quanto aos pescadores artesanais, 713 famílias ficaram desalojadas e 264 apresentaram danos materiais sem desalojamento.

Por fim, o boletim explicita os impactos das chuvas nos assentados da Reforma Agrária: 7311 famílias assentadas foram afetadas, com 244 ficando desalojadas; estima-se uma perda agrícola de cerca de 50 mil hectares e, também, as infra estruturas viária e hídricas foram danificadas (Emater/RS, 2024, p. 28-30). Em vista disso, o G1, juntamente ao Centro Universitário Uniopet (2024), destaca que “o impacto psicológico de perder tudo de uma hora para outra pode ser devastador, levando ao desenvolvimento de transtornos de ansiedade, depressão e estresse pós-traumático.”

As situações de desastres afetam, em sua maioria, populações vulneráveis, como aquelas com baixa renda ou pertencentes a minorias sociais, levando em consideração que precisam enfrentar dificuldades maiores para lidar com os impactos emocionais e materiais das inundações. Conforme aponta Gehm (2024) “a ansiedade parece afetar 100% das pessoas com renda familiar abaixo de R\$1,5 mil e, a depressão, 71% desse grupo.” O estresse prolongado causado pela incerteza sobre a recuperação, pela falta de recursos e pelo deslocamento forçado pode potencializar o desenvolvimento de transtornos como o Transtorno de Estresse Agudo (TEA) e o Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT). É perceptível como essas comunidades, muitas vezes, não possuem acesso adequado a serviços de saúde mental, o que agrava os efeitos de eventos traumáticos.

No diagnóstico de Transtorno de Estresse Agudo (TEA), a exposição ou vivência do estressor ocasiona uma perturbação do equilíbrio do indivíduo afetado numa duração de três a trinta dias (Both *et al.*, 2018, p. 587). Em vista disso, o acompanhamento atento a essas comunidades vulnerabilizadas é necessário para a identificação de possíveis manifestações do TEA, posto que este se apresenta de forma mais imediata após os desastres climáticos, sendo um potencializador do sofrimento psíquico desses sujeitos.

Em contrapartida, Carvalho *et al.* (2024) relatam que eventos traumáticos relacionados à ameaça direta à vida, à violência extrema ou à exposição prolongada têm chances maiores de resultarem em Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). Assim, o TEPT pode ser desenvolvido por essas comunidades em situação de vulnerabilidade, tornando importante o acompanhamento psicológico com vistas à identificação de sintomas que, caso prolongados, possam indicar a instauração do Transtorno de Estresse Pós-Traumático.

Isso posto, para reduzir os danos causados se faz necessário a presença de políticas públicas eficazes e de uma equipe multiprofissional, que conte com psicólogos capacitados. De acordo com Trindade e Serpa (2013 apud Heredia, 2006), as intervenções da psicologia em desastres naturais têm como objetivo conter ansiedades, facilitar a descarga emocional e ajudar o indivíduo a atribuir significado ao que ele está vivenciando. Essas intervenções também buscam incentivar a participação ativa da comunidade e têm como objetivo a solidariedade entre os afetados. O desastre, portanto, é interpretado com base no significado que cada pessoa atribui à situação, um sentido que é moldado tanto por suas experiências individuais quanto por suas vivências coletivas.

O fortalecimento comunitário pode surgir, desse modo, como uma ferramenta de intervenção psicológica, visto que “conscientizar a comunidade é protegê-la, sendo que é a resposta da comunidade que vai determinar o grau de impacto gerado pelos desastres” (Kobiyama *et al.*, 2009). Alternativas não farmacológicas, como a arteterapia e a prática de educação física, também são de grande importância no tratamento do TEPT e do TEA.

O manejo do trauma também pode ser feito através da Terapia Cognitivo-



Comportamental (TCC), a qual pode ser utilizada para tratar sintomas relacionados ao TEA e ao TEPT, ajudando as vítimas a reestruturar pensamentos disfuncionais e a desenvolver habilidades de enfrentamento (Foa *et al.*, 2009). Outra abordagem importante é a criação de grupos de apoio psicossocial, que fortalecem o senso de comunidade e resiliência coletiva, essenciais para a recuperação de populações afetadas por desastres (Duarte & Pereira, 2020). Levando em consideração que o desastre ocorrido no Rio Grande do Sul ainda é recente, não é possível, neste momento, identificar de fato os efeitos psicológicos a longo prazo do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT). O que pode estar sendo observado até agora são casos de Transtorno de Estresse Agudo (TEA), uma resposta imediata ao trauma. Portanto, estudos e acompanhamentos são necessários para compreender a evolução desses sintomas e gerar melhorias que facilitem futuras intervenções.

CONCLUSÃO

A revisão sugere que intervenções eficazes dependem do fortalecimento das políticas públicas e do apoio interdisciplinar para abordar o impacto psicológico a longo prazo destes eventos. Portanto, conclui-se que estratégias e intervenções integradas de saúde mental são essenciais para reduzir o sofrimento nas comunidades afetadas por desastres naturais e promover a recuperação das vítimas.

Os efeitos traumáticos dessas inundações, particularmente em grupos de baixa renda e minorias, revelaram-se mais graves devido à falta de acesso a serviços de saúde mental, intensificando o sofrimento emocional e físico das vítimas. Nesse contexto, a Psicologia das Emergências mostrou-se essencial, com intervenções que visam ao restabelecimento do bem-estar psicológico e ao fortalecimento das redes de apoio, buscando responder rapidamente às necessidades emocionais dessas comunidades e prevenir o agravamento de transtornos psicológicos.

Como limitação, o estudo aponta a falta de dados longitudinais, visto que o evento é recente, o que restringe a avaliação completa dos impactos psicológicos de longo prazo. Sugere-se que pesquisas futuras aprofundem o acompanhamento longitudinal das populações afetadas, avaliem a eficácia de intervenções psicossociais e de políticas de apoio, e explorem novas abordagens para desenvolver estratégias preventivas e de recuperação que priorizem as necessidades das comunidades mais impactadas.

Palavras-chave: Desastres Naturais, Impactos Psicológicos, Inundações, Populações Vulneráveis, TEA e TEPT.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater/RS. **Impactos das chuvas e cheias extremas no Rio Grande do Sul em maio de 2024**. Disponível em: <https://www.estado.rs.gov.br/upload/arquivos/202406/relatorio-sisperdas-evento-enchentes-em-maio-2024.pdf>. Acesso em: 07 out. 2024.

BOTH, Luciane Maria; MALGARIM, Bibiana Godoi; FREITAS, Lúcia Helena. Avaliação psicodinâmica de pacientes com transtorno de estresse agudo e pós- traumático em uma instituição pública. **Revista Psicologia Clínica**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 3, p. 579–593, set./dez. 2018.

CARVALHO, Millena Kellen Sousa *et al.* Fatores de risco e condutas terapêuticas no estresse pós-traumático: uma revisão bibliográfica. **Revista Ibero-Americana de**

Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 10, n. 7, jul. 2024. ISSN 2675–3375.

G1 - PR. **Enchentes no RS: como tragédias como a do RS impactam na saúde**

mental. Disponível em: <https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/uniofet/opet-inovacao-em-rede/noticia/2024/06/21/enchentes-no-rs-como-tragedias-como-a-do-rs-impactam-na-saude-mental.ghtml>. Acesso em: 07 out. 2024.

GEHM, Bettina. **Não seremos mais os mesmos: enchente já deixa marcas na saúde mental de moradores do RS**. Sul21, 20 de julho de 2024. Disponível em:

<https://sul21.com.br/noticias/saude/2024/07/nao-seremos-mais-os-mesmos-enchente-ja-deixa-marcas-na-saude-mental-de-moradores-do-rs/>. Acesso em: 06 out. 2024.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. **Uma estimativa de empresas e postos de trabalho diretamente atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul em 2024**. Brasília: Ipea, 2024. (Nota Técnica CGDTI nº 02/2024). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.38116/ntcgdti02-port>. Acesso em: 28 abr. 2025.

NORRIS, F. H. *et al.* 60 000 disaster victims speak: Part I. An empirical review of the empirical literature, 1981–2001. **Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes**, v. 65, n. 3, p. 207–239, 2002.

OLIVEIRA, A. **Impactos socioeconômicos das enchentes no Rio Grande do Sul**. Datafolha, 2024.

OLIVEIRA, Evandro. **Enchentes do RS atingiram proporção maior de pobres, negros e menos escolarizados**. Disponível em: <https://www.jornaldocomercio.com/geral/2024/06/1160933-enchentes-do-rs-atingiram-proporcao-maior-de-pobres-negros-e-menos-escolarizados.html>. Acesso em: 07 out. 2024.

SILVA, L. A.; NUNES, M. R.; SANTOS, F. R. Intervenções psicossociais em desastres naturais: uma perspectiva crítica. **Revista Brasileira de Psicologia Aplicada**, 2023.

TRINDADE, Melina Carvalho; SERPA, Monise Gomes. O papel do psicólogo diante de desastres naturais: revisão narrativa de literatura. **Revista Psicologia em Estudo** (Maringá), v. 26, n. 5, e52085, set./out. 2024.



AVALIAÇÃO DA TAXA DE MORTALIDADE EM ANIMAIS SÉPTICOS TRATADOS COM BETA-MIRCENO NA CONCENTRAÇÃO DE 200 MG/KG

¹Brenda Barroso Pelegrini

²Tânia Cristina Alexandrino Becker

¹Universidade Estadual de Maringá. Maringá, Paraná, Brasil;

²Universidade Estadual de Maringá. Maringá, Paraná, Brasil;

Área temática: Plantas Medicinais

Resumo: O beta-mirceno é um composto natural com uma gama notável de efeitos farmacológicos, incluindo propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antioxidantes. Essa diversidade de ações o torna um alvo de interesse para pesquisas em diversas condições patológicas, especialmente em doenças complexas como a sepse. A sepse é uma síndrome de disfunção orgânica com risco de vida, desencadeada por uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. Assim, este estudo se propôs a investigar o impacto da terapêutica com o composto β -mirceno na dose de 200 mg/kg, avaliando-o especificamente por meio da análise da taxa de mortalidade em camundongos induzidos a um modelo experimental de sepse. O modelo de ligação e perfuração cecal (CLP) foi utilizado para mimetizar a doença experimentalmente e, após a observação dos animais, os óbitos foram registrados em porcentagem de sobrevivência dentro de um período de 12 horas, por três dias. Os animais foram distribuídos em três grupos distintos: controle negativo (SHAM), controle positivo da doença (CLP) e tratamento (CLP + β -mirceno 200 mg/kg). A análise dos dados revelou que o grupo SHAM não apresentou mortalidade ao longo do período de estudo. Em contraste, o CLP (controle positivo da doença) demonstrou uma taxa de mortalidade de 54%. Notavelmente, o grupo de tratamento (CLP + β -mirceno 200 mg/kg) apresentou um índice de mortalidade significativamente menor, de apenas 13%. Em conclusão, o tratamento com o composto β -mirceno demonstrou ser eficaz na redução da taxa de mortalidade nos animais estudados, sugerindo seu potencial como uma nova abordagem terapêutica para a sepse.

INTRODUÇÃO

Uma disfunção orgânica severa e potencialmente fatal, que resulta de uma resposta imune desregulada do hospedeiro a um processo infeccioso, é designada como sepse (Singer et al., 2016). Em escala mundial, a sepse afeta aproximadamente 15 a 17 milhões de pacientes anualmente, resultando em mais de 5 milhões de óbitos por ano (Adhikari et al., 2010; Tillmann et al., 2018). Nas últimas décadas, observaram-se progressos significativos na elucidação da fisiopatologia desta condição. Contudo, no Brasil, a taxa de mortalidade atingiu aproximadamente 46,6% dos casos analisados, com uma variação de 16,7% a 65,3%, conforme o grau de severidade (Sales et al., 2006).

Os terpenos representam um grupo substancial de metabólitos secundários sintetizados por plantas. Dentre essa classe, os monoterpenos destacam-se como os componentes majoritários em diversas espécies botânicas, sendo considerados o grupo mais bem-sucedido no reino vegetal (Abdelgaleil et al., 2021). Os monoterpenos são derivados de blocos de construção universais C₅, DMAPP (dimetilalil difosfato) e IPP (isopentenil



difosfato) e em plantas, esses precursores-chave podem ser sintetizados por duas vias compartimentalizadas, a via do mevalonato (MVA), que opera no citosol, e a via 2-C-metil-D-eritritol-4-fosfato (MEP), que ocorre nos plastídios (Vranová *et al.*, 2013; Liu *et al.*, 2021).

O beta-mirceno, um monoterpene acíclico, é reconhecido por seu aroma agradável e é um

componente prevalente em óleos essenciais de diversas espécies botânicas, incluindo *Melissa officinalis* (erva-cidreira), *Cymbopogon citratus* (capim-limão), *Laurus nobilis* (louro), *Verbena officinalis* (verbena) e *Humulus lupulus* (lúpulo), entre outras. Em virtude de suas propriedades organolépticas, o β -mirceno constitui um ingrediente relevante na indústria cosmética e alimentícia, sendo empregado na fabricação de cosméticos e aromatizantes (Ciftci *et al.*, 2011; Maggi *et al.*, 2011; Surendran *et al.*, 2021). Adicionalmente, estudos prévios demonstraram possuir relevantes efeitos farmacológicos, incluindo propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antioxidantes (Bonamin *et al.*, 2014; Ciftci *et al.*, 2011).

Dessa forma, o presente estudo investigou as propriedades do β -mirceno em um modelo experimental de sepse em camundongos da linhagem Balb/c, e a análise da taxa de mortalidade foi empregada como desfecho primário para avaliar a eficácia do tratamento com 200 mg/kg desse monoterpene.

OBJETIVO

O estudo visou explorar os impactos das potenciais características do β -mirceno, examinando a taxa de mortalidade em camundongos da linhagem Balb/c submetidos ao modelo experimental de sepse, tratados com a dose de 200 mg/kg deste monoterpene.

METODOLOGIA

O β -mirceno foi adquirido, comercialmente, da empresa Sigma-Aldrich® e os insumos empregados neste estudo foram providenciados pelo Departamento de Farmacologia e Terapêutica (LIFIN) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) em colaboração com o Laboratório de Patologia Geral (LPG) do Departamento de Ciências Básicas da Saúde (DBS) da mesma instituição. Foram utilizados camundongos machos da linhagem Balb/c, pesando entre 20-25g, oriundos do Biotério Central da UEM, mantidos em um ambiente controlado a 25°C com um ciclo claro/escuro de 12 horas, tendo livre acesso a água e ração. O protocolo experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de Animais da Universidade Estadual de Maringá (CEUA nº4628291021) e o modelo da sepse experimental utilizado foi o da ligadura e perfuração do ceco (CLP), conforme descrito por Rittirsch *et al.* (2008). Os camundongos foram tratados com β -mirceno na dose de 200 mg/kg e para esta investigação, os animais foram organizados em três grupos experimentais: SHAM (animais falso- operados, não sépticos; recebem apenas o veículo da diluição, por gavagem); grupo 2: CLP (animais sépticos, utilizados como controle positivo da doença; receberam apenas o veículo da diluição, por gavagem); grupo 3: β -mirceno (animais sépticos, tratados por gavagem com β -mirceno na dose de 200 mg/kg). Os animais foram monitorados e os óbitos foram registrados a cada 12 horas. Os dados foram apresentados como porcentagem de sobrevivência ao longo de três dias, contabilizando o número de animais que permaneceram vivos até o momento da eutanásia em comparação aos que evoluíram à óbito previamente ao período estipulado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nas observações e análises realizadas, os animais do grupo SHAM (controle negativo ou falso operado) permaneceram vivos até o último dia do experimento e foram sacrificados somente no momento da eutanásia. A maior taxa de mortalidade foi observada no grupo CLP (controle positivo da doença) com 54% de óbitos registrados, pois foi o grupo induzido com a sepse, sem nenhum tratamento. Quanto aos grupos submetidos à CLP juntamente do tratamento com a dose de 200 mg/kg de β -mirceno, a mortalidade ocorreu em apenas 13% dos animais analisados, indicando uma notável diminuição da taxa de mortalidade e demonstrando que a dose utilizada como tratamento na sepse experimental mostrou-se eficaz em conter os efeitos provenientes da condição estudada, pois houve uma diminuição dos óbitos registrados em relação aos grupos induzidos e tratados comparado ao grupo apenas induzido com a doença (CLP).

Na sepse, a resposta exagerada do organismo à infecção, conhecida como inflamação, pode causar danos aos tecidos. Essa reação inicial, mesmo com o uso de antibióticos para controlar a infecção, muitas vezes leva à falência de um ou vários órgãos (Hotchkiss *et al.*, 2003). Ou seja, a hiperatividade do sistema imunológico pode resultar em sequelas graves, como dano aos tecidos, falência múltipla de órgãos e até a morte.

Sabendo disso, estudos anteriores mostraram que o β -mirceno possui várias propriedades benéficas, incluindo a capacidade de reduzir parâmetros inflamatórios (Ciftci *et al.*, 2011). Isso explica por que os animais que receberam o tratamento com o composto testado tiveram uma maior chance de sobrevivência neste estudo. Provavelmente, o composto atua ajudando na recuperação dos tecidos danificados pelo processo inflamatório.




Gráfico 1 – Taxa de mortalidade dos animais do grupo controle ou submetidos a um período de três dias de sepse experimental, com ou sem tratamento com β -mirceno na dose de 200 mg/kg.

CONCLUSÃO

Estudos prévios demonstraram propriedades farmacológicas interessantes presentes no β -mirceno, em diferentes situações experimentais. Dessa forma, esta pesquisa teve como



finalidade investigar a influência deste monoterpeno, por meio da análise da taxa de mortalidade, em camundongos da linhagem Balb/c submetidos ao modelo experimental de sepse e tratados com a dose de 200 mg/kg do composto. Os resultados indicaram uma diminuição na taxa de mortalidade dos animais tratados com β -mirceno em relação àqueles que foram apenas induzidos pela técnica de CLP, e este achado sugere que o composto estudado possui grande eficácia diante da redução do índice de mortalidade desencadeada pela condição que levou a uma resposta exacerbada do organismo à infecção.

Palavras-chave: sepse experimental; mortalidade; beta-mirceno.

Financiamento: o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDELGALEIL, S. A. M. *et al.* Monoterpenes: chemistry, insecticidal activity against stored product insects and modes of action—a review. **International Journal of Pest Management**,

70(3), 267–289 (2021). <https://doi.org/10.1080/09670874.2021.1982067>.

ADHIKARI, N. K. *et al.* Critical care and the global burden of critical illness in adults. **Lancet**

(London, England), 376(9749), 1339–1346 (2010). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60446-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60446-1).

BONAMIN, F. *et al.* The effect of a minor constituent of essential oil from Citrus aurantium: the role of β -myrcene in preventing peptic ulcer disease. **Chemico-biological interactions**, 212, 11–19 (2014). <https://doi.org/10.1016/j.cbi.2014.01.009>.

CIFTCI, O. *et al.* Antioxidative effects of curcumin, β -myrcene and 1,8-cineole against 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced oxidative stress in rats liver. **Toxicology and industrial health**, 27(5), 447–453 (2011). <https://doi.org/10.1177/0748233710388452>.

HOTCHKISS, R. S., & KARL, I. E. The pathophysiology and treatment of sepsis. **The New England journal of medicine**, 348(2), 138–150 (2003). <https://doi.org/10.1056/NEJMra021333>.

LIU, L. *et al.* Integrating RNA-seq with functional expression to analyze the regulation and characterization of genes involved in monoterpenoid biosynthesis in *Nepeta tenuifolia* Briq. **Plant physiology and biochemistry: PPB**, 167, 31–41 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2021.07.026>.

MAGGI, M. *et al.* Bioactivity of *Rosmarinus officinalis* essential oils against *Apis mellifera*, *Varroa destructor* and *Paenibacillus* larvae related to the drying treatment of the plant material. **Natural product research**, 25(4), 397–406 (2011). <https://doi.org/10.1080/14786419.2010.481261>.

RITTIRSCH, D., FLIERL, M. A., & WARD, P. A. Harmful molecular mechanisms in sepsis.



Nature reviews. Immunology, 8(10), 776–787 (2008). <https://doi.org/10.1038/nri2402>.

SALES JÚNIOR, J. A. *et al.* Sepsis Brasil: estudo epidemiológico da sepse em Unidades de Terapia Intensiva brasileiras [An epidemiological study of sepsis in Intensive Care Units: Sepsis Brazil study]. **Revista Brasileira de terapia intensiva**, 18(1), 9–17 (2006).

SINGER, M. *et al.* The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). **JAMA**, 315(8), 801–810 (2016).
<https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287>.

SURENDRAN, S. *et al.* Myrcene-What Are the Potential Health Benefits of This Flavouring and Aroma Agent? **Frontiers in nutrition**, 8, 699666 (2021).
<https://doi.org/10.3389/fnut.2021.699666>.

TILLMANN, B. & WUNSCH, H. Epidemiology and Outcomes. **Critical care clinics**, 34(1), 15–27 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2017.08.001>.

VRANOVÁ, E., COMAN, D. & GRUISSEM, W. Network analysis of the MVA and MEP pathways for isoprenoid synthesis. **Annual review of plant biology**, 64, 665–700 (2013).
<https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-050312-120116>.



EFEITO DO TRATAMENTO COM B-MIRCENO NA CONCENTRAÇÃO DE 100 MG/KG NA TAXA DE MORTALIDADE EM UM MODELO DE SEPSE EXPERIMENTAL

¹Brenda Barroso Pelegrini

²Tânia Cristina Alexandrino Becker

¹Universidade Estadual de Maringá. Maringá, Paraná, Brasil;

²Universidade Estadual de Maringá. Maringá, Paraná, Brasil;

Área temática: Plantas Medicinais

Resumo: O monoterpene acíclico beta-mirceno possui diversos efeitos farmacológicos importantes como: analgésicos, anti-inflamatórios, antioxidantes, e suas propriedades podem ser investigadas em doenças como a sepse, uma condição que causa disfunção orgânica com risco de vida desencadeada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Dessa forma, o objetivo do atual estudo deu-se por analisar o impacto da terapêutica com o composto β -mirceno, por meio da análise da taxa de mortalidade, em camundongos submetidos ao modelo experimental de sepse, induzidos previamente ao tratamento com β -mirceno na dose de 100 mg/kg. O modelo de ligação e perfuração cecal (CLP) foi utilizado para mimetizar a doença experimentalmente e, após a observação dos animais, os óbitos foram registrados em porcentagem de sobrevivência dentro de um período de 12 horas, por três dias. Os animais foram separados em três grupos distintos: controle negativo (SHAM), controle positivo da doença (CLP) e tratamento (CLP + β -mirceno 100 mg/kg). Os animais do grupo SHAM não apresentaram mortalidade durante o período estudado, diferentemente do grupo CLP, que demonstrou uma mortalidade de 54%, e do grupo de tratamento, com um índice de mortalidade igual a 50%. Com isso, podemos concluir que a indução de sepse de forma experimental demonstrou uma alta taxa de mortalidade nos animais estudados, porém o tratamento com o composto β -mirceno mostrou-se eficaz em reduzir este índice.

INTRODUÇÃO

A sepse é caracterizada por uma disfunção orgânica potencialmente fatal, resultante de uma resposta inadequada do hospedeiro à uma infecção (Singer *et al.*, 2016). Aproximadamente 15 a 17 milhões de pacientes são afetados pela sepse anualmente em todo o mundo, desencadeando mais de 5 milhões de óbitos por ano (Adhikari *et al.*, 2010; Tillmann *et al.*, 2018). Nas últimas décadas, significativos progressos na compreensão da fisiopatologia desta condição foram constatados, e no Brasil, a taxa de mortalidade alcançou em torno de 46,6% dos casos analisados, variando entre 16,7% e 65,3%, dependendo do grau de severidade (Sales *et al.*, 2006).

Os terpenos constituem um grupo importante de metabólitos secundários produzidos pelas plantas e, dentre eles, os monoterpenos são os principais componentes de muitas espécies, sendo considerado o grupo mais bem-sucedido na botânica (Abdelgaleil *et al.*, 2021). Os monoterpenos são derivados de blocos de construção universais C₅, DMAPP (dimetilalil difosfato) e IPP (isopentenil difosfato) e em plantas, esses precursores-chave podem ser sintetizados por duas vias compartimentalizadas, a via do mevalonato (MVA), que opera no citosol, e a via 2-C-metil-D-eritritol-4-fosfato (MEP), que ocorre nos plastídios



(Vranová *et al.*, 2013; Liu *et al.*, 2021).

O monoterpeno acíclico beta-mirceno possui aroma agradável e é proveniente de óleos essenciais de muitas plantas como: erva-cidreira (*Melissa officinalis*), capim-limão (*Cymbopogon citratus*), louro (*Laurus nobilis*), verbena (*Verben Officinalis*), lúpulo (*Humulus lupulus*) dentre outras; sendo um importante ingrediente utilizado na fabricação de cosméticos e aromatizantes na indústria alimentícia (Ciftci *et al.*, 2011; Maggi *et al.*, 2011; Surendran *et al.*, 2021). Além disso, demonstrou em estudos anteriores muitos efeitos farmacológicos importantes como propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antioxidantes (Bonamin *et al.* 2014; Ciftci *et al.*, 2011).

Sendo assim, o atual estudo investigou os efeitos das possíveis propriedades presentes no β -mirceno, por meio da análise da taxa de mortalidade de camundongos da linhagem Balb/c submetidos ao modelo experimental de sepse, tratados com a dose de 100 mg/kg desse monoterpeno.

O estudo visou explorar os impactos das potenciais características do β -mirceno, examinando a taxa de mortalidade em camundongos da linhagem Balb/c submetidos ao modelo experimental de sepse, tratados com a dose de 100 mg/kg deste monoterpeno.

OBJETIVO

O estudo visou explorar os impactos das potenciais características do β -mirceno, examinando a taxa de mortalidade em camundongos da linhagem Balb/c submetidos ao modelo experimental de sepse, tratados com a dose de 100 mg/kg deste monoterpeno.

METODOLOGIA

O β -mirceno foi adquirido, comercialmente, da empresa Sigma-Aldrich® e os insumos empregados neste estudo foram providenciados pelo Departamento de Farmacologia e Terapêutica (LIFIN) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) em colaboração com o Laboratório de Patologia Geral (LPG) do Departamento de Ciências Básicas da Saúde (DBS) da mesma instituição. Foram utilizados camundongos machos da linhagem Balb/c, pesando entre 20-25g, oriundos do Biotério Central da UEM, mantidos em um ambiente controlado a 25°C com um ciclo claro/escuro de 12 horas, tendo livre acesso a água e ração. O protocolo experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de Animais da Universidade Estadual de Maringá (CEUA nº4628291021) e o modelo da sepse experimental utilizado foi o da ligadura e perfuração do ceco (CLP), conforme descrito por Rittirsch *et al.* (2008). Os camundongos foram tratados com β -mirceno na dose de 100 mg/kg e para esta investigação, os animais foram organizados em três grupos experimentais: SHAM (animais falso-operados, não sépticos; recebem apenas o veículo da diluição, por gavagem); grupo 2: CLP (animais sépticos, utilizados como controle positivo da doença; receberam apenas o veículo da diluição, por gavagem); grupo 3: β -mirceno (animais sépticos, tratados por gavagem com β -mirceno na dose de 100 mg/kg). Os animais foram monitorados e os óbitos foram registrados a cada 12 horas. Os dados foram apresentados como porcentagem de sobrevivência ao longo de três dias, contabilizando o número de animais que permaneceram vivos até o momento da eutanásia em comparação aos que evoluíram à óbito previamente ao período estipulado.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nas observações e análises realizadas, os animais do grupo SHAM (controle negativo ou falso operado) permaneceram vivos até o último dia do experimento e foram sacrificados somente no momento da eutanásia. A maior taxa de mortalidade foi observada no grupo CLP (controle positivo da doença) com 54% de óbitos registrados, por se tratar do grupo induzido com a sepse, sem nenhum tratamento. Quanto aos grupos submetidos à CLP juntamente do tratamento com a dose de 100 mg/kg de β -mirceno, a mortalidade foi de 50%, e este dado sugere que a dose utilizada como tratamento na sepse experimental pode interferir na redução dos efeitos provenientes da condição estudada, pois foi observada uma discreta redução da porcentagem de óbitos registrados em relação aos grupos induzidos e tratados comparado ao grupo apenas induzido com a doença (CLP).

Na sepse, a resposta exagerada do organismo à infecção, conhecida como inflamação, pode causar danos aos tecidos. Essa reação inicial, mesmo com o uso de antibióticos para controlar a infecção, muitas vezes leva à falência de um ou vários órgãos (Hotchkiss *et al.*, 2003). Ou seja, a hiperatividade do sistema imunológico pode resultar em sequelas graves, como dano aos tecidos, falência múltipla de órgãos e até a morte.

Sabendo disso, estudos anteriores mostraram que o β -mirceno possui várias propriedades benéficas, incluindo a capacidade de reduzir parâmetros inflamatórios (Ciftci *et al.*, 2011). Isso explica por que os animais que receberam o tratamento com o composto testado tiveram uma maior chance de sobrevivência neste estudo. Provavelmente, o composto atua ajudando na recuperação dos tecidos danificados pelo processo inflamatório.

Tabela 1 – Taxa de mortalidade dos animais do grupo controle ou submetidos a um período de três dias de sepse experimental, com ou sem tratamento com β -mirceno na dose de 100 mg/kg.

Grupos	Mortalidade
SHAM	0.0%
CLP	54.0%
β -mirceno 100 mg/kg	50.0%

*Porcentagem de mortalidade do total de animais por grupo experimental, em um período de três dias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

Estudos prévios demonstraram propriedades farmacológicas interessantes presentes no β -mirceno, em diferentes situações experimentais. Dessa forma, esta pesquisa teve como finalidade investigar a influência deste monoterpeno, por meio da análise da taxa de mortalidade, em camundongos da linhagem Balb/c submetidos ao modelo experimental de sepse e tratados com a dose de 100 mg/kg do composto. Os resultados indicaram uma discreta redução na taxa de mortalidade dos animais tratados com β -mirceno em relação àqueles que foram apenas induzidos pela técnica de CLP, e este achado sugere que o composto estudado possui efeito diante da redução do índice de mortalidade desencadeada pela condição que levou a uma resposta exacerbada do organismo à infecção.

Palavras-chave: Beta-mirceno; Mortalidade; Sepse experimental.

Financiamento: o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABDELGALEIL, S. A. M. *et al.* Monoterpenes: chemistry, insecticidal activity against stored product insects and modes of action—a review. **International Journal of Pest Management**, 70(3), 267–289 (2021). <https://doi.org/10.1080/09670874.2021.1982067>.
- ADHIKARI, N. K. *et al.* Critical care and the global burden of critical illness in adults. **Lancet** (London, England), 376(9749), 1339–1346 (2010). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60446-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60446-1).
- BONAMIN, F. *et al.* The effect of a minor constituent of essential oil from *Citrus aurantium*: the role of β -myrcene in preventing peptic ulcer disease. **Chemico-biological interactions**, 212, 11–19 (2014). <https://doi.org/10.1016/j.cbi.2014.01.009>.
- CIFTCI, O. *et al.* Antioxidative effects of curcumin, β -myrcene and 1,8-cineole against 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced oxidative stress in rats liver. **Toxicology and industrial health**, 27(5), 447–453 (2011). <https://doi.org/10.1177/0748233710388452>.
- HOTCHKISS, R. S., & KARL, I. E. The pathophysiology and treatment of sepsis. **The New England journal of medicine**, 348(2), 138–150 (2003). <https://doi.org/10.1056/NEJMr021333>.
- LIU, L. *et al.* Integrating RNA-seq with functional expression to analyze the regulation and characterization of genes involved in monoterpenoid biosynthesis in *Nepeta tenuifolia* Briq. **Plant physiology and biochemistry: PPB**, 167, 31–41 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2021.07.026>.
- MAGGI, M. *et al.* Bioactivity of *Rosmarinus officinalis* essential oils against *Apis mellifera*, *Varroa destructor* and *Paenibacillus* larvae related to the drying treatment of the plant material. **Natural product research**, 25(4), 397–406 (2011). <https://doi.org/10.1080/14786419.2010.481261>.
- RITTIRSCH, D., FLIERL, M. A., & WARD, P. A. Harmful molecular mechanisms in sepsis. **Nature reviews. Immunology**, 8(10), 776–787 (2008). <https://doi.org/10.1038/nri2402>.
- SALES JÚNIOR, J. A. *et al.* Sepsis Brasil: estudo epidemiológico da sepse em Unidades de Terapia Intensiva brasileiras [An epidemiological study of sepsis in Intensive Care Units: Sepsis Brazil study]. **Revista Brasileira de terapia intensiva**, 18(1), 9–17 (2006).
- SINGER, M. *et al.* The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). **JAMA**, 315(8), 801–810 (2016). <https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287>.
- SURENDRAN, S. *et al.* Myrcene-What Are the Potential Health Benefits of This Flavouring and Aroma Agent? **Frontiers in nutrition**, 8, 699666 (2021). <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.699666>.



TILLMANN, B. & WUNSCH, H. Epidemiology and Outcomes. **Critical care clinics**, 34(1), 15–27 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2017.08.001>.

VRANOVÁ, E., COMAN, D. & GRUISSEM, W. Network analysis of the MVA and MEP pathways for isoprenoid synthesis. **Annual review of plant biology**, 64, 665–700 (2013). <https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-050312-120116>.



ÍNDICE DE MORTALIDADE EM ANIMAIS SÉPTICOS TRATADOS COM β -MIRCENO NA DOSE DE 50 MG/KG

¹Brenda Barroso Pelegrini

²Tânia Cristina Alexandrino Becker

¹Universidade Estadual de Maringá. Maringá, Paraná, Brasil;

²Universidade Estadual de Maringá. Maringá, Paraná, Brasil;

Área temática: Plantas Medicinais

Resumo: O monoterpene acíclico beta-mirceno possui diversos efeitos farmacológicos importantes como: analgésicos, anti-inflamatórios, antioxidantes, e suas propriedades podem ser investigadas em doenças como a sepse, uma condição que causa disfunção orgânica com risco de vida desencadeada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. Dessa forma, o objetivo do atual estudo deu-se por analisar o impacto da terapêutica com o composto β -mirceno, por meio da análise da taxa de mortalidade, em camundongos submetidos ao modelo experimental de sepse, induzidos previamente ao tratamento com β -mirceno na dose de 50 mg/kg. O modelo de ligação e perfuração cecal (CLP) foi utilizado para mimetizar a doença experimentalmente e, após a observação dos animais, os óbitos foram registrados em porcentagem de sobrevivência dentro de um período de 12 horas, por três dias. Os animais foram separados em três grupos distintos: controle negativo (SHAM), controle positivo da doença (CLP) e tratamento (CLP + β -mirceno 50 mg/kg). Os animais do grupo SHAM não apresentaram mortalidade durante o período estudado, diferentemente do grupo CLP, que demonstrou uma mortalidade de 54%, e do grupo de tratamento, com um índice de mortalidade igual a 29%. Com isso, podemos concluir que a indução de sepse de forma experimental demonstrou uma alta taxa de mortalidade nos animais estudados, porém o tratamento com o composto β -mirceno mostrou-se eficaz em reduzir este índice.

INTRODUÇÃO

A sepse é caracterizada por uma disfunção orgânica potencialmente fatal, resultante de uma resposta inadequada do hospedeiro à uma infecção (Singer *et al.*, 2016). Aproximadamente 15 a 17 milhões de pacientes são afetados pela sepse anualmente em todo o mundo, desencadeando mais de 5 milhões de óbitos por ano (Adhikari *et al.*, 2010; Tillmann *et al.*, 2018). Nas últimas décadas, significativos progressos na compreensão da fisiopatologia desta condição foram constatados, e no Brasil, a taxa de mortalidade alcançou em torno de 46,6% dos casos analisados, variando entre 16,7% e 65,3%, dependendo do grau de severidade (Sales *et al.*, 2006).

Os terpenos constituem um grupo importante de metabólitos secundários produzidos pelas plantas e, dentre eles, os monoterpenos são os principais componentes de muitas espécies, sendo considerado o grupo mais bem-sucedido na botânica (Abdelgaleil *et al.*, 2021). Os monoterpenos são derivados de blocos de construção universais C 5 , DMAPP (dimetilalil difosfato) e IPP (isopentenil difosfato) e em plantas, esses precursores-chave podem ser sintetizados por duas vias compartimentalizadas, a via do mevalonato (MVA), que opera no citosol, e a via 2-C-metil-D-eritritol-4-fosfato (MEP), que ocorre nos plastídios



(Vranová *et al.*, 2013; Liu *et al.*, 2021).

O monoterpeno acíclico beta-mirceno possui aroma agradável e é proveniente de óleos essenciais de muitas plantas como: erva-cidreira (*Melissa officinalis*), capim-limão (*Cymbopogon citratus*), louro (*Laurus nobilis*), verbena (*Verben Officinalis*), lúpulo (*Humulus lupulus*) dentre outras; sendo um importante ingrediente utilizado na fabricação de cosméticos e aromatizantes na indústria alimentícia (Ciftci *et al.*, 2011; Maggi *et al.*, 2011; Surendran *et al.*, 2021). Além disso, demonstrou em estudos anteriores muitos efeitos farmacológicos importantes como propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antioxidantes (Bonamin *et al.* 2014; Ciftci *et al.*, 2011).

Sendo assim, o atual estudo investigou os efeitos das possíveis propriedades presentes no β -mirceno, por meio da análise da taxa de mortalidade de camundongos da linhagem Balb/c submetidos ao modelo experimental de sepse, tratados com a dose de 50 mg/kg desse monoterpeno.

OBJETIVO

O estudo visou explorar os impactos das potenciais características do β -mirceno, examinando a taxa de mortalidade em camundongos da linhagem Balb/c submetidos ao modelo experimental de sepse, tratados com a dose de 50 mg/kg deste monoterpeno.

METODOLOGIA

O β -mirceno foi adquirido, comercialmente, da empresa Sigma-Aldrich® e os insumos empregados neste estudo foram providenciados pelo Departamento de Farmacologia e Terapêutica (LIFIN) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) em colaboração com o Laboratório de Patologia Geral (LPG) do Departamento de Ciências Básicas da Saúde (DBS) da mesma instituição. Foram utilizados camundongos machos da linhagem Balb/c, pesando entre 20-25g, oriundos do Biotério Central da UEM, mantidos em um ambiente controlado a 25°C com um ciclo claro/escuro de 12 horas, tendo livre acesso a água e ração. O protocolo experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no uso de Animais da Universidade Estadual de Maringá (CEUA nº4628291021) e o modelo da sepse experimental utilizado foi o da ligadura e perfuração do ceco (CLP), conforme descrito por Rittirsch *et al.* (2008). Os camundongos foram tratados com β -mirceno na dose de 50 mg/kg e para esta investigação, os animais foram organizados em três grupos experimentais: SHAM (animais falso-operados, não sépticos; recebem apenas o veículo da diluição, por gavagem); grupo 2: CLP (animais sépticos, utilizados como controle positivo da doença; receberam apenas o veículo da diluição, por gavagem); grupo 3: β -mirceno (animais sépticos, tratados por gavagem com β -mirceno na dose de 50 mg/kg). Os animais foram monitorados e os óbitos foram registrados a cada 12 horas. Os dados foram apresentados como porcentagem de sobrevivência ao longo de três dias, contabilizando o número de animais que permaneceram vivos até o momento da eutanásia em comparação aos que evoluíram à óbito previamente ao período estipulado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nas observações e análises realizadas, os animais do grupo SHAM (controle negativo ou falso operado) permaneceram vivos até o último dia do experimento e foram sacrificados somente no momento da eutanásia. A maior taxa de mortalidade foi registrada no grupo CLP (controle positivo da doença), pois foi o grupo induzido com a sepse, sem nenhum tratamento, demonstrando uma mortalidade de 54% dos animais analisados. Quanto aos grupos submetidos à CLP juntamente do tratamento com a dose de 50 mg/kg de β -mirceno, foi notável a diminuição da taxa de mortalidade, com um índice de apenas 29% dos animais, demonstrando que a dose utilizada como tratamento na sepse experimental mostrou-se eficaz em conter os efeitos provenientes da condição estudada, pois houve uma diminuição dos óbitos registrados em relação aos grupos induzidos e tratados comparado ao grupo apenas induzido com a doença (CLP).

Na sepse, a resposta exagerada do organismo à infecção, conhecida como inflamação, pode causar danos aos tecidos. Essa reação inicial, mesmo com o uso de antibióticos para controlar a infecção, muitas vezes leva à falência de um ou vários órgãos (Hotchkiss *et al.*, 2003). Ou seja, a hiperatividade do sistema imunológico pode resultar em sequelas graves, como dano aos tecidos, falência múltipla de órgãos e até a morte.

Sabendo disso, estudos anteriores mostraram que o β -mirceno possui várias propriedades benéficas, incluindo a capacidade de reduzir parâmetros inflamatórios (Ciftci *et al.*, 2011). Isso explica por que os animais que receberam o tratamento com o composto testado tiveram uma maior chance de sobrevivência neste estudo. Provavelmente, o composto atua ajudando na recuperação dos tecidos danificados pelo processo inflamatório.




Gráfico 1 – Taxa de mortalidade dos animais do grupo controle ou submetidos a um período de três dias de sepse experimental, com ou sem tratamento com β -mirceno na dose de 50 mg/kg.

CONCLUSÃO

Estudos prévios demonstraram propriedades farmacológicas interessantes presentes no β -mirceno, em diferentes situações experimentais. Dessa forma, esta pesquisa teve como



finalidade investigar a influência deste monoterpeno, por meio da análise da taxa de mortalidade, em camundongos da linhagem Balb/c submetidos ao modelo experimental de sepse e tratados com a dose de 50 mg/kg do composto. Os resultados indicaram uma diminuição na taxa de mortalidade dos animais tratados com β -mirceno em relação àqueles que foram apenas induzidos pela técnica de CLP, e este achado sugere que o composto estudado possui grande eficácia diante da redução do índice de mortalidade desencadeada pela condição que levou a uma resposta exacerbada do organismo à infecção.

Palavras-chave: mortalidade; beta-mirceno; sepse experimental.

Financiamento: o presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABDELGALEIL, S. A. M. *et al.* Monoterpenes: chemistry, insecticidal activity against stored product insects and modes of action—a review. **International Journal of Pest Management**, 70(3), 267–289 (2021). <https://doi.org/10.1080/09670874.2021.1982067>.

ADHIKARI, N. K. *et al.* Critical care and the global burden of critical illness in adults. **Lancet** (London, England), 376(9749), 1339–1346 (2010). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(10\)60446-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)60446-1).

BONAMIN, F. *et al.* The effect of a minor constituent of essential oil from Citrus aurantium: the role of β -myrcene in preventing peptic ulcer disease. **Chemico-biological interactions**, 212, 11–19 (2014). <https://doi.org/10.1016/j.cbi.2014.01.009>.

CIFTCI, O. *et al.* Antioxidative effects of curcumin, β -myrcene and 1,8-cineole against 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin-induced oxidative stress in rats liver. **Toxicology and industrial health**, 27(5), 447–453 (2011). <https://doi.org/10.1177/0748233710388452>.

HOTCHKISS, R. S., & KARL, I. E. The pathophysiology and treatment of sepsis. **The New England journal of medicine**, 348(2), 138–150 (2003). <https://doi.org/10.1056/NEJMra021333>.

LIU, L. *et al.* Integrating RNA-seq with functional expression to analyze the regulation and characterization of genes involved in monoterpenoid biosynthesis in *Nepeta tenuifolia* Briq. **Plant physiology and biochemistry: PPB**, 167, 31–41 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2021.07.026>.

MAGGI, M. *et al.* Bioactivity of *Rosmarinus officinalis* essential oils against *Apis mellifera*, *Varroa destructor* and *Paenibacillus* larvae related to the drying treatment of the plant material. **Natural product research**, 25(4), 397–406 (2011). <https://doi.org/10.1080/14786419.2010.481261>.

RITTIRSCH, D., FLIERL, M. A., & WARD, P. A. Harmful molecular mechanisms in sepsis. **Nature reviews. Immunology**, 8(10), 776–787 (2008). <https://doi.org/10.1038/nri2402>.



SALES JÚNIOR, J. A. *et al.* Sepsis Brasil: estudo epidemiológico da sepse em Unidades de Terapia Intensiva brasileiras [An epidemiological study of sepsis in Intensive Care Units: Sepsis Brazil study]. **Revista Brasileira de terapia intensiva**, 18(1), 9–17 (2006).

SINGER, M. *et al.* The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). **JAMA**, 315(8), 801–810 (2016).
<https://doi.org/10.1001/jama.2016.0287>.

SURENDRAN, S. *et al.* Myrcene-What Are the Potential Health Benefits of This Flavouring and Aroma Agent? **Frontiers in nutrition**, 8, 699666 (2021).
<https://doi.org/10.3389/fnut.2021.699666>.

TILLMANN, B. & WUNSCH, H. Epidemiology and Outcomes. **Critical care clinics**, 34(1), 15–27 (2018). <https://doi.org/10.1016/j.ccc.2017.08.001>.

VRANOVÁ, E., COMAN, D. & GRUISSEM, W. Network analysis of the MVA and MEP pathways for isoprenoid synthesis. **Annual review of plant biology**, 64, 665–700 (2013).
<https://doi.org/10.1146/annurev-arplant-050312-120116>.



ÁGUA CONSUMIDA EM ESCOLAS PÚBLICAS: DETECÇÃO DE *Enterobacter* spp.

¹ Beatriz Santana Estevão

² Dário Nunes Junior

³ Caio Cezar de Andrade Rodrigues

⁴ Gleysson Alves de Jesus

⁵ Laís Soares Faria

⁶ Mayara Bocchi Fernandes

⁷ Leonardo Costa Paes

⁸ Cecília Nunes Moreira

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universidade Federal de Jataí. Jataí, Goiás, Brasil;

Área temática: Saúde Coletiva

Resumo: A potabilidade da água nas escolas é fundamental para a saúde pública devido à sua importância em evitar que as crianças entrem em contato com agentes patogênicos. Este estudo objetivou a detecção de *Enterobacter* spp. em amostras de água de escolas municipais e estaduais de Jataí-GO. Na totalidade, foram coletadas 80 amostras de 20 escolas, abrangendo torneiras externas, bebedouros e pia de cozinhas. Após o enriquecimento das amostras em caldo BHI e posterior semeadura em ágar MacConkey, as amostras foram submetidas a testes bioquímicos para detecção de *Enterobacter* spp. As amostras analisadas apresentaram contaminação em 50% das escolas, sendo a maior taxa encontrada em 13 amostras de bebedouros e em menor expressão foram encontradas 6 amostras de torneira de cozinhas. Os altos índices de contaminação podem indicar problemas no armazenamento ou na distribuição da água, possivelmente associados a uma manutenção inadequada dos reservatórios e da tubulação. A presença de *Enterobacter* spp. nos ambientes escolares representa risco à saúde e, portanto, devem ser estabelecidos rígidos procedimentos de monitoramento, desinfecção e limpeza dos sistemas hídricos, conforme preconizado na Portaria nº 2.914/2011.

INTRODUÇÃO

A água é um elemento fundamental para a fisiologia do corpo humano e assegurar sua qualidade para o consumo é de extrema importância. Considerando as diversas formas de contaminação, realizar a análise microbiológica da água proveniente de poços artesianos e nascentes é um dever público. Apesar do tratamento adequado e a adoção de boas práticas de saneamento básico contribuírem para a redução de microrganismos patogênicos, tais medidas não asseguram, por si só, a potabilidade da água, sendo necessário um monitoramento contínuo e criterioso (BRASIL, 2021).

Para assegurar a potabilidade, a água designada ao consumo humano deve cumprir limites estabelecidos para diversos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, conforme determina a Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde. A contaminação da água pode ocorrer desde a sua fonte até ao longo do processo de distribuição. Entre os fatores mais comuns que favorecem essa contaminação estão a ausência de práticas regulares de limpeza e desinfecção periódica de caixa d'água, encanamento e tubulações (FUNASA, 2013).

No Brasil, uma grande parcela das enfermidades e óbitos está relacionada ao uso e



consumo de água imprópria, frequentemente contaminada por agentes patogênicos e substâncias prejudiciais à saúde (FUNASA, 2013). As crianças estão entre os grupos mais vulneráveis às doenças transmitidas pela água, devido à imaturidade do seu sistema imunológico. Diante disso, torna-se essencial o controle e o monitoramento regulares da qualidade da água destinada ao abastecimento de instituições como escolas, conforme orientações presentes nos guias atualizados do Ministério da Saúde (2024; 2025).

Considerando esse cenário, uma das bactérias que podem ser encontradas na água seriam as *Enterobacter* spp., bacilos Gram-negativos e pertencentes à família Enterobacteriaceae. Algumas cepas têm potencial patogênico e os locais mais frequentes de acometer as pessoas é no trato respiratório e no trato geniturinário. Por serem organismos oportunistas, as espécies do gênero *Enterobacter* spp. podem crescer e causar doenças em condições favoráveis, como a condição de imunossupressão do hospedeiro (TORTORA; FUNKE; CASE, 2017).

OBJETIVO

Verificar a contaminação por *Enterobacter* spp. em amostras de água obtidas em escolas públicas do município de Jataí, Goiás.

METODOLOGIA

A escolha das instituições foi realizada com base no mapeamento da distribuição de água da companhia de saneamento (Saneago), para verificar quais escolas eram abastecidas pelo reservatório. Foram selecionadas duas escolas por reservatório, exceto quando apenas uma instituição era atendida. O objetivo foi incluir todas as escolas públicas, com as devidas autorizações concedidas pela Secretaria Municipal de Educação e pela Coordenação Regional de Educação de Jataí. Para a coleta das amostras, foram utilizados frascos esterilizados de 100 mL. Cada amostra foi devidamente rotulada conforme o local de coleta e transportada ao laboratório em bolsas térmicas, respeitando o tempo máximo de seis horas para o início das análises microbiológicas. O estudo é quantitativo, pois utilizou dados numéricos para quantificação e comparação da presença de micro-organismos; observacional, já que não houve intervenção nas condições naturais da água; transversal, com coleta em um único momento; e descritivo, com o objetivo de caracterizar a frequência e distribuição dos micro-organismos indicadores de contaminação. Foram obtidas 80 amostras de água em 20 escolas, sendo consideradas quatro amostragens por unidade: torneiras externas (ligadas ao sistema público de abastecimento), dois bebedouros (o primeiro mais próximo da entrada da escola e o segundo preferencialmente o mais próximo aos sanitários) e pia da cozinha. As amostras passaram inicialmente por um enriquecimento em caldo BHI por 18 horas a 37 °C e, em seguida, foram semeadas em ágar MacConkey para o isolamento preliminar. As colônias de bacilos Gram-negativos foram selecionadas e submetidas a testes bioquímicos em meios de citrato de Simmons, TSI (tríplice açúcar ferro), SIM (motilidade, indol e produção de H₂S) e MRVP (vermelho de metila e Voges-Proskauer). As cepas que apresentaram características compatíveis com o perfil bioquímico de *Enterobacter* spp. foram registradas para análises posteriores, conforme protocolos padronizados para interpretações microbiológicas (BRASIL, 2013).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das amostras analisadas, foi detectada a presença de *Enterobacter* spp. em 50% (10/20) das escolas. Por outro lado, os resultados obtidos por Lima et al. (2017) revelaram



que a água consumida por alunos de escolas municipais da cidade de Jataí-GO atendia aos requisitos de potabilidade preconizados pelo Ministério da Saúde. A divergência entre os achados pode estar relacionada à deterioração do sistema de distribuição ou a falhas no armazenamento da água.

A presença de *Enterobacter spp.* foi detectada em 27% (22/80) das amostras analisadas neste estudo, sendo 6 amostras de torneira de cozinhas, local onde as refeições são preparadas, evidenciando assim uma taxa de contaminação preocupante. Em comparação, Martins et al. (2019) encontraram esse microrganismo em cerca de 0,27% das 3.726 amostras de água coletadas de sistemas públicos e poços em municípios paulistas. A higienização periódica remove não apenas resíduos visíveis, mas também microrganismos fixados às superfícies, diminuindo consideravelmente o risco de contaminação da água e dos locais de manipulação direta, sendo esta uma prática fundamental para a segurança sanitária em ambientes coletivos (ANVISA, 2020).

As amostras encontradas em bebedouros são 59% (13/22) das amostras positivas. O estudo realizado por Pereira et al. (2024), sobre a qualidade da água em bebedouros de 19 escolas públicas de ensino fundamental no município de Cidade Ocidental-Goiás, revelou a presença de coliformes totais em 5,26% das amostras testadas. Vale considerar, que algumas das bactérias do gênero *Enterobacter* são consideradas coliformes totais. Diante disso, conclui-se que a prevalência de *Enterobacter* foi muito superior ao trabalho citado, o que ressalta a necessidade de atenção rigorosa à higienização nos bebedouros.

Os resultados indicam uma contaminação microbiológica significativa em diferentes pontos de acesso à água, o que sugere que a contaminação pode ocorrer em qualquer etapa do sistema, seja durante a distribuição ou no armazenamento. Essa situação pode estar relacionada a diversos fatores, como o desgaste das tubulações, conexões inadequadas, tempo prolongado de armazenamento e manutenção insuficiente dos reservatórios, conforme evidenciado em estudos que analisam instalações hidrossanitárias (BARRETO; OLIVEIRA, 2021).

CONCLUSÃO

Os resultados desta pesquisa evidenciaram a presença de *Enterobacter spp.* em amostras de água coletadas em escolas do município de Jataí, indicando contaminação em diferentes pontos de distribuição, como torneiras externas, bebedouros e pia da cozinha. Esses achados destacam a necessidade de implementar medidas rigorosas de monitoramento e controle da qualidade da água, visando garantir a segurança do consumo humano, especialmente em ambientes escolares, onde crianças e profissionais estão expostos a riscos potenciais. A adoção de práticas regulares de limpeza, desinfecção e manutenção dos sistemas de abastecimento são essenciais para prevenir a proliferação de microrganismos patogênicos e assegurar a saúde da comunidade escolar. Além disso, destaca-se a importância do cumprimento da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, como diretriz essencial para garantir a potabilidade da água e reduzir riscos sanitários.

Palavras-chave: Água potável; Contaminação microbiana; Saúde escolar;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). *Manual de limpeza e desinfecção de superfícies*. Brasília: Anvisa, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt->



br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e-desinfeccao-de-superficies.pdf. Acesso em: 26 maio 2025. BARRETO,

Douglas; OLIVEIRA, Paulo Henrique Stehling. Mapeamento das principais causas de contaminação de água potável em sistemas prediais hidrossanitários. *Brazilian Journal of Development*, [S. l.], v. 7, n. 10, p. 135-150, 2021.

Disponível em:

https://www.academia.edu/108450997/Mapeamento_das_principais_causas_de_contaminação_de_água_potável_em_sistemas_prediais_hidrossanitários_Mapping_of_main_causes_of_potable_water_contamination_in_predial_hydrosanitary_systems. Acesso em: 17 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 14 dez. 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n.º 888, de 4 de maio de 2021. Estabelece os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Vigilância e controle da qualidade da água para consumo humano: procedimentos e responsabilidades. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

CALAZANS, N. A. R.; LEVY, M. C. T.; MOREAU, M. Interrelações entre clima e vazão. In: SCHIAVETTI, A.; CAMARGO, A. F. M. (Org.). *Conceitos de bacias hidrográficas: teorias e aplicações*. 2. ed. Ilhéus (BA): Editus, 2005. p. 67-90.

FUNASA (Fundação Nacional de Saúde). *Manual prático de análise de água*. 4. ed. rev. atual. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

LIMA, Gedeone Ferreira. *Qualidade da água utilizada para o consumo em escolas no município de Jataí-GO*. Jataí: Universidade Federal de Goiás, 2017. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/164/o/Qualidade_da_Água_utilizada_para_o_consumo_em_escolas_no_município_de_Jataí-GO.pdf. Acesso em: 19 maio 2025.

MARTINS, André et al. Resistência a antimicrobianos de enterobactérias isoladas de águas destinadas ao abastecimento público na região centro-oeste do estado de São Paulo, Brasil. *Revista Pan-Amazônica de Saúde*, Ananindeua, v. 10, e201900065, 2019. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-62232019000100014&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 17 maio 2025. Epub 08 nov. 2019. <http://dx.doi.org/10.5123/s2176-6223201900065>.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. *Guia prático de inspeção sanitária em formas de abastecimento de água para consumo humano*. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental/vigiagua/publicacoes>.



Acesso em: 17 maio 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Guia para Implementação da norma de qualidade da água para consumo humano. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental/vigiagua/publicacoes>. Acesso em: 17 maio 2025.

PEREIRA, Fábio; GOMES, Tatiane Da Cruz; SOUZA, Viviane Yllena Vieira De. Qual a qualidade da água nos bebedouros das escolas públicas de ensino fundamental no município de Cidade Ocidental-GO? Revista FT, v. 29, n. 140, 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/qual-a-qualidade-da-agua-nos-bebedouros-das-escolas-publicas-deensino-fundamental-no-municipio-de-cidade-ocidental-go/>. Acesso em: 17 maio 2025.

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.



PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO EXCESSO DE PESO EM ADULTOS QUE RESIDEM NO LITORAL DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

¹Franciane Ferreira Costa

²Diego Simeone

³Rodrigo Alexandre da Cunha Rodrigues

¹Aldemir Branco de Oliveira Filho

¹Universidade Federal do Pará, Bragança, Pará, Brasil; ²Faculdade de Ciências Médicas, Bragança Pará, Brasil; ³Universidade Federal do Oeste do Pará, Santarém, Pará, Brasil

Área temática: Saúde Coletiva

Resumo: O excesso de peso é um problema de saúde pública mundial referente ao acúmulo de gordura corporal e pode ser causado por diversos fatores. Este estudo determinou a prevalência e os fatores associados ao excesso de peso em adultos residentes em uma área costeira da Amazônia brasileira. Este estudo transversal acessou informações de 407 adultos que residiam no município de Bragança, Pará, litoral da Amazônia Brasileira. Dados socioeconômicos e demográficos, comportamentais e morbidades foram analisados por meio da regressão de Poisson afim de verificar possíveis associações ao excesso de peso e considerando como estatisticamente significante aqueles que apresentaram valor de $p < 0,05$. A prevalência de excesso de peso foi 63.3% (IC 95%) e os fatores comportamentais que tiveram associação direta ao excesso de peso foram não consumir salada crua e não consumir ovo cozido. Fatores relacionados a morbidades como hipertensão e diabetes mellitus também se apresentaram associados ao desfecho. Todavia, ir caminhando para o trabalho se mostrou um fator de proteção contra o peso excessivo. Em suma, a elevada prevalência de excesso de peso encontrada neste estudo ressalta a necessidade de priorizar esse problema nas agendas de saúde do município, direcionando intervenções individuais e coletivas que possibilitarão um menor risco de agravos de saúde e uma melhor qualidade de vida para a população.

INTRODUÇÃO

O excesso de peso é um status nutricional que compreende tanto o sobrepeso quanto a obesidade (Brasil, 2017). Tais condições referem-se ao acúmulo de gordura corporal em proporções que trazem prejuízos à saúde de um indivíduo (World Health Organization, 2021). Com prevalências cada vez maiores, o excesso de peso já é considerado um problema de saúde pública global que afeta principalmente as pessoas que residem em países emergentes (World Health Organization, 2021). De modo que, até 2035, cerca de 4 bilhões de adultos, adolescentes e crianças deverão estar com excesso de peso e enfrentando problemas de saúde, como obesidade, hipertensão e diabetes (Consultation, 2000; Lobstein; Brinsden; Neveux, 2022).

O acúmulo excessivo de gordura corporal é um problema de saúde multifatorial que possui etiologia bastante complexa, isto é, pode ser resultante da interação de fatores fisiológicos, genéticos e comportamentais. Contudo, fatores relacionados aos determinantes sociais exercem relevante influência nesse processo de ganho ponderal (Branca; Nikogosia; Lobstein, 2007; Abeso, 2016; Oliveira *et al.*, 2003).

OBJETIVO

Este estudo identificou a prevalência e os fatores associados ao excesso de peso numa



amostra da população adulta residente no município de Bragança, Pará, litoral da Amazônia Brasileira.

METODOLOGIA

Este estudo transversal tem caráter descritivo e analítico e utilizou dados obtidos no projeto “Risco Cardiovascular em Município do Litoral Norte do Brasil”, desenvolvido pelo Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da Universidade Federal do Pará (UFPA) e Prefeitura de Bragança. A coleta dos dados socioeconômicos e comportamentais foram baseadas em inquérito domiciliar nas áreas urbana e rural de Bragança, região nordeste do estado Pará. A população do referido município, na faixa etária alvo do estudo (30-60 anos) é de 33.397 habitantes, sendo 20.710 na zona urbana (62%) e 12.687 na zona rural (38%). Considerando o nível de confiança de 95% e o erro de delineamento de 5%, calculou-se um tamanho amostral de 395 participantes, sendo 245 na zona urbana e 150 na zona rural. Um total de 407 adultos compuseram a amostra final. A análise do estado nutricional dos participantes foi feita através da aferição dos índices antropométricos (peso e altura) utilizados para calcular o IMC e o sobrepeso/ obesidade foram representados pela variável excesso de peso, considerando os adultos com $IMC \geq 25 \text{ kg/m}^2$. As variáveis independentes foram exibidas de maneira categórica, sendo classificadas em socioeconômica e demográfica, comportamental e morbidades. Foram feitas análises descritivas e posteriormente, análises bivariadas por meio da regressão Poisson simples foram realizadas para avaliar prováveis associações ao excesso de peso com as variáveis independentes. No modelo ajustado, o critério para inclusão das variáveis foi a associação na análise bruta com o excesso de peso, com valor de $p < 0,20$. No modelo final, seguiram-se as variáveis com $p < 0,05$, alcançadas através da regressão de Poisson multivariada com ajuste robusto do erro padrão. Os dados foram analisados por meio do programa estatístico R, versão 4.3.1. Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará sob a numeração CAAE94952518.4.0000.0018. Todos os investigados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e aqueles com excesso de peso foram aconselhados e encaminhados para atendimento na rede pública de saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A maioria da amostra era do sexo masculino (57.1%), parda (83.3%), encontrava-se na faixa etária de 30-39 anos (30.7%), estava em uma relação conjugal (76.2%), possuía o ensino médio completo (35.6%) e possuía renda mensal de até um salário mínimo (58.9%) e a prevalência de excesso de peso foi de 63.3%, bem mais alta comparada à capital Belém (57,7%) e às demais capitais brasileiras (55,7%) em 2018 (Brasil, 2019).

Neste estudo, a maioria das pessoas (61,9%) não consome salada crua. Esse comportamento alimentar esteve diretamente associado ao excesso de peso. Tal desequilíbrio alimentar representa um alerta, pois já foi registrado em outra investigação nacional recente que o estado do Pará apresentou baixa frequência de consumo de frutas e hortaliças (Brasil, 2023). Esse déficit no consumo de salada crua também já foi descrito em Santa Catarina, quando um estudo buscou conhecer o consumo de vegetais em saladas no município de Chapecó e verificou que o consumo estava abaixo da recomendação de 90g/dia (Borjes, 2015).

Outra variável de consumo alimentar que mostrou associação ao desfecho foi o não consumo de ovo cozido, o que sugere uma substituição cada vez mais frequente nas principais refeições de alimentos considerados naturais e saudáveis por alimentos processados e ultraprocessados. O ovo é considerado uma fonte de proteínas de alta



qualidade e de baixo custo (Puglisi; Fernandez, 2022). Quando consumido no café da manhã, ele auxilia na diminuição do apetite para as refeições posteriores, atuando consequentemente na redução e manutenção do peso corporal (Vander Wal *et al*, 2005).

A caminhada é um tipo de atividade física que proporciona muitos benefícios à saúde, além de ser um exercício de baixo custo e pode ser praticado por qualquer pessoa (Melo, 2012). Neste estudo, a variável comportamental caminhada até o trabalho mostrou-se inversamente associada ao desfecho. Um estudo conduzido na Finlândia, acompanhou 47.721 pessoas de 25 a 64 anos de idade e concluiu que o deslocamento diário a pé ou de bicicleta para o trabalho pode reduzir o risco de doenças cardiovasculares, com destaque para o Acidente Vascular Cerebral (AVC) (HU *et al.*, 2005).

A diabetes mellitus e a hipertensão arterial são doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) de alta relevância para a saúde pública mundial. Nesta pesquisa, essas morbidades tiveram associação ao desfecho, reafirmando que essa diáde geralmente faz parte da realidade de pessoas com excesso de peso e resultando em um conjunto de distúrbios denominado síndrome metabólica (Ferreira; Szwarcwald; Damacena, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo identificou a prevalência e os fatores associados ao excesso de peso em adultos residentes num município da região costeira da Amazônia. A taxa de excesso de peso foi significativamente superior a estudos conduzidos no Brasil. Esse problema foi associado aos hábitos alimentares, como não consumir salada e ovos, e a DCNT, como diabetes e hipertensão arterial. Por outro lado, a prática de caminhar para o trabalho foi detectada como um fator de proteção contra o excesso de peso. Essas informações podem direcionar intervenções individuais e coletivas para uma dieta mais saudável e equilibrada, considerando a prática de atividades físicas diárias, as quais possibilitarão um menor risco de problemas de saúde e uma melhor qualidade de vida a população nessa região brasileira e outras com características socioculturais e econômicas semelhantes.

Palavras-chave: Adultos; Amazônia; Epidemiologia; Excesso de peso; Obesidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica (ABESO).

Diretrizes Brasileiras de Obesidade, 2016. 2016

BRANCA, Francesco; NIKOGOSIAN, Haik; LOBSTEIN, Tim. The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response: summary. **World Health Organization**, 2007.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. VIGITEL Brasil 2020: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2023. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de



Análise em Saúde e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis. VIGITEL Brasil 2018: vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico: estimativas sobre frequência e distribuição sociodemográfica de fatores de risco e proteção para doenças crônicas nas capitais dos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal em 2018. Brasília: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Manual de Diretrizes para o Enfrentamento da Obesidade na Saúde Suplementar Brasileira. Rio de Janeiro: ANS, 2017.

BORJES, Lúcia Chaise. Consumo de saladas de vegetais em restaurantes por peso no centro de Chapecó/SC. **Nutrição Brasil**, v. 14, n. 2, 2015.

CONSULTATION, W. H. O. Obesity: preventing and managing the global epidemic. **World Health Organization technical report series**, v. 894, p. 1-253, 2000.

FERREIRA, Arthur Pate de Souza; SZWARCOWALD, Célia Landmann; DAMACENA, Giseli Nogueira. Prevalência e fatores associados da obesidade na população brasileira: estudo com dados aferidos da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. **Revista brasileira de epidemiologia**, v. 22, p. e190024, 2019.

HU, Gang *et al.* Leisure time, occupational, and commuting physical activity and the risk of stroke. **Stroke**, 2005.

LOBSTEIN, Tim; BRINSDEN, Hannah; NEVEUX, Margot. World obesity atlas 2022. 2022.

MELO, Darlan Gomes de. **Benefícios da prática da caminhada para os idosos do grupo “terceira idade” de Cavalcante-GO**. Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM). Alto Paraíso, 2013.

OBESITY and overweight. **World Health Organization (WHO)**. Geneva, 9 jun. 2021. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight>. Acesso em 10 set. 2024.

OLIVEIRA, Ana Mayra de *et al.* Sobrepeso e obesidade infantil: influência de fatores biológicos e ambientais em Feira de Santana, BA. **Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia**, v. 47, p. 144-150, 2003.

PUGLISI, Michael J.; FERNANDEZ, Maria Luz. The health benefits of egg protein. **Nutrients**, v. 14, n. 14, p. 2904, 2022.

VANDER WAL, Jillon *et al.* Efeito de curto prazo dos ovos na saciedade em indivíduos com sobrepeso e obesos. **Jornal do Colégio Americano de Nutrição**, 24, 510-515, 2005.

SOUSA, Alana Paulina de Moura *et al.* Prevalência e fatores associados ao excesso de peso em adultos nas capitais e no Distrito Federal, Brasil, 2019. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, n. 3, p. e2020838, 2021.



RENAME, RESME E REMUME: A IMPORTÂNCIA DOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA O TRATAMENTO FARMACOLÓGICO DO PACIENTE IDOSO

¹Gabriela de Oliveira Silva

²Ana Júlia Silva Santos

³Daniela Borges Marquez Barbosa

⁴Fernanda Vieira Fonseca

⁵Thiago Santos Borges

⁶Bruno Rogério Ferreira

⁷Kennia Rodrigues Tassara

⁸Letícia Cristina Alves de Sousa

^{1,2,3,4,5,8} Universidade Estadual de Goiás (UEG). Itumbiara, Goiás, Brasil. ⁶ Universidade Federal de Goiás (UFG). Goiânia, Goiás, Brasil. ⁷ Centro Universitário de Goiatuba (UniCerrado). Goiatuba, Goiás, Brasil.

Área temática: Farmácia

Resumo: O crescimento da população idosa no Brasil tem estimulado a demanda por políticas públicas eficientes para assegurar que os idosos tenham acesso a tratamentos farmacológicos seguros, eficientes e acessíveis. O propósito deste estudo foi destacar a importância dos medicamentos essenciais no cuidado desta população, levando em consideração sua função na preservação da qualidade de vida e na gestão de doenças crônicas. Esta é uma revisão bibliográfica conduzida nas bases de dados oficiais do governo Brasileiro, PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde e SciELO, empregando termos ligados ao uso consciente de medicamentos e ao cuidado com o idoso, abrangendo o período de 2020 a 2025. Selecionaram-se artigos científicos alinhados ao tema, descartando-se aqueles duplicados ou sem relação com o objeto do estudo. A pesquisa demonstrou que uma grande quantidade de medicamentos comumente receitados para idosos, tais como anti-hipertensivos, hipoglicemiantes orais, antidepressivos e estatinas, estão presentes na RENAME e, em diversas situações, também nas listas estaduais-RESME, e municipais-REMUME. Contudo, constatou-se a falta de alguns medicamentos usados na prática clínica, o que enfatiza a necessidade de ajustar as listas locais de acordo com a realidade epidemiológica da região. É evidente que a inclusão de medicamentos essenciais nas listas oficiais é crucial para um cuidado farmacológico de alta qualidade para os idosos. É imprescindível o aprimoramento constante dessas políticas para assegurar o acesso, a segurança terapêutica e o uso adequado dos medicamentos nessa etapa da vida.

INTRODUÇÃO

O aumento da população idosa é um fenômeno mundial que tem se intensificado nas últimas décadas, especialmente no Brasil, onde a proporção de idosos tem aumentado consideravelmente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), prevê-se que, até 2030, a quantidade de indivíduos com 60 anos ou mais ultrapassará a de crianças e jovens (IBGE, 2024). Este cenário apresenta desafios para o sistema de saúde, particularmente em relação à administração e ao uso adequado de medicamentos (IBGE, 2023).

Devido às mudanças fisiológicas inerentes ao envelhecimento e à maior incidência



de doenças crônicas, os idosos são comumente afetados por várias comorbidades. Isso faz com que o uso de medicamentos seja um componente crucial no atendimento a essa população. No entanto, a utilização simultânea de cinco ou mais medicamentos, denominado polifarmácia, eleva a probabilidade de reações adversas, interações medicamentosas e falhas na administração. Portanto, é indispensável assegurar que os fármacos empregados sejam efetivos, seguros e adequados para este grupo etário (Andrade *et al.*, 2024).

Neste cenário, listas como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), a Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME) e a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) exercem função estratégica ao direcionar a escolha de fármacos essenciais, fundamentados em critérios de evidências científicas, custo-efetividade e demandas epidemiológicas. Essas listas incentivam o uso consciente de medicamentos, reforçando o Sistema Único de Saúde (SUS) e auxiliando na promoção da igualdade no tratamento farmacoterapêutico (Brasil, 2024)

Os anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, antidepressivos, estatinas, broncodilatadores, inibidores da bomba de prótons, neurolépticos e medicamentos destinados ao tratamento de doenças cardiovasculares e neurodegenerativas estão dentre os medicamentos mais comumente utilizados por idosos (Andrade *et al.*, 2024). É crucial a implementação metódica dessas classes para o controle de condições como hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, depressão, doença de Alzheimer, insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), entre outras (Licoviski *et al.*, 2025).

OBJETIVO

Apresentar a relevância dos medicamentos essenciais para o tratamento farmacológico do paciente idoso.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, de natureza qualitativa, conduzido através da pesquisa de artigos científicos nas plataformas *National Library of Medicine* (PUBMED) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO). O estudo foi realizado com a finalidade de coletar e examinar publicações pertinentes que discutissem a relevância dos medicamentos fundamentais no cuidado farmacoterapêutico de pacientes idosos. Para conduzir a pesquisa, empregou-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) combinados com os operadores booleanos "AND" e "OR", especificamente: "RENAME", "Medicamentos Essenciais", "Assistência Farmacêutica", "Idosos" e "Polifarmácia". Os termos foram selecionados de acordo com a relevância ao tema sugerido e utilizados em diversas combinações para ampliar e aprimorar os resultados. Os critérios de inclusão foram: artigos científicos publicados entre os anos de 2020 a 2025, disponíveis em texto completo, que apresentassem relação direta com o uso racional de medicamentos essenciais em idosos e que estivessem alinhados ao contexto da assistência farmacêutica no SUS. Os artigos duplicados, os que continham apenas resumos sem acesso ao texto completo e aqueles cujo conteúdo não tratava diretamente do tema proposto, foram eliminados da análise. Foram consultados, além de artigos científicos, documentos oficiais como documentos do Ministério da Saúde, a RENAME 2024 e publicações institucionais que auxiliaram na fundamentação teórica e na compreensão do papel das listas de medicamentos essenciais na promoção do acesso justo e racional à farmacoterapia no Brasil. A escolha final das fontes foi baseada na pertinência,



atualidade e confiabilidade das informações fornecidas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A avaliação da lista de medicamentos escolhidos mostrou que a maior parte dos medicamentos utilizados por idosos consta na RENAME, além de estar presente em várias Relações Estaduais (RESME) e Relações Municipais (REMUME). Essas listas são ferramentas essenciais para direcionar a oferta e a prescrição de medicamentos no SUS, assegurando acesso justo e racional à terapia medicamentosa, particularmente entre os idosos, que geralmente têm múltiplas comorbidades e necessitam de tratamento contínuo.

Medicamentos usados no tratamento de doenças crônicas comuns em idosos, como hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemias, insuficiência cardíaca, problemas respiratórios e distúrbios mentais, são frequentemente incluídos nessas listas (Horvatic, 2024). Medicamentos como losartana, anlodipino, furosemida, metformina, insulina NPH, atorvastatina, ácido acetilsalicílico, sertralina e fluoxetina são exemplos de medicamentos amplamente padronizados devido à sua eficácia, segurança e importância na saúde pública (Brasil, 2024).

Contudo, nem todos os medicamentos analisados constam na RENAME 2024. Fármacos como tioridazina, diosmina+hesperidina, meclizina, Ginkgo biloba, e dutasterida+tansulosina não são padronizados nacionalmente, seja por apresentarem riscos elevados, uso restrito, eficácia controversa ou por não atenderem aos critérios de custo-efetividade (Horvatic, 2024). Mesmo assim, alguns desses medicamentos podem estar incluídos em RESME ou REMUNE, a depender das políticas locais e do perfil epidemiológico regional, o que evidencia a importância da gestão descentralizada e sensível às realidades locais da assistência farmacêutica (Rename, 2024).

CONCLUSÃO

Com o aumento da população idosa no Brasil, assegurar o acesso aos medicamentos indispensáveis é uma tática fundamental para a promoção da saúde e a elevação da qualidade de vida dos mais velhos. Como evidenciado neste estudo, a maior parte dos medicamentos usados na prática clínica geriátrica está listada na RENAME e, parcialmente, nas listas estaduais (RESME) e municipais (REMUME), demonstrando o cuidado das políticas públicas com essa população prioritária.

Contudo, a ausência de alguns medicamentos frequentemente usados na assistência médica - mesmo não sendo padronizados em todo o país - destaca a relevância da autonomia local para ajustar as listas às demandas regionais, desde que seguindo critérios técnicos e epidemiológicos claramente estabelecidos. Portanto, enfatiza-se a importância de uma atualização contínua e avaliação das listas de medicamentos essenciais em todos os níveis do SUS, assegurando que as necessidades particulares da população idosa sejam satisfeitas de maneira segura, eficiente e equitativa.

Portanto, conclui-se que aprimorar a política de medicamentos essenciais, juntamente com uma administração farmacêutica eficaz e atenta às demandas da população idosa, é um passo crucial para a melhoria da assistência à saúde. A expectativa é que este estudo auxilie na reflexão crítica de alunos, profissionais e gestores acerca da função dos medicamentos essenciais no cenário do envelhecimento, motivando ações para expandir o acesso e incentivar o uso consciente de medicamentos entre a população idosa.



Palavras-chave: Assistência Farmacêutica; Envelhecimento; Medicamentos Essenciais; Polifarmácia; RENAME.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Raquel Coelho de. *et al.* Polifarmácia, medicamentos potencialmente inapropriados e a vulnerabilidade de pessoas idosas. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 27, 1 jan. 2024.

CFF, Conselho Federal de Farmácia. **Rename 2024: Atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais**. Disponível em: <<https://site.cff.org.br/noticia/Noticias-gerais/30/12/2024/renome-2024-atualizacao-da-relacao-nacional-de-medicamentos-essenciais>>.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo 2022:** número de pessoas com 65 anos ou mais de idade cresceu 57,4% em 12 anos. Agência de Notícias. 2023. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38186-censo-2022-numero-de-pessoas-com-65-anos-ou-mais-de-idade-cresceu-57-4-em-12-anos>>.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Projeções da População**. 2024. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9109-projecao-da-populacao.html>>.

LICOVISKI, Pamela Taina *et al.* Polifarmácia na população idosa brasileira e as doenças crônicas não transmissíveis associadas: estudo de base nacional. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 28, 2025.

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/renome>>.



ANÁLISE DA IMUNOGENICIDADE GERADA PELAS PRINCIPAIS VACINAS DO COVID 19

¹Pedro de Paiva Rosa Vaz

¹Thomas Werneck Esteves Lima

¹Rodrigo Fortunato Andrade Gonçalves

¹Gustavo Andrade Rodrigues Martinez

¹Gabriel Barros de Oliveira Machado

²Renata Aparecida Elias Dantas

^{1,2}Centro Universitário de Brasília. Brasília, Distrito Federal, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo : Os estudos e análises de imunogenicidade, segurança e eficácia das diferentes plataformas e estratégias vacinais contra a COVID-19, que incluem vacinas de mRNA, proteína recombinante e inativadas, possuem resultados em porcentagem que corroboram o efeito positivo de seu desenvolvimento nesses três quesitos. A análise de situações e grupos controles com características variadas assemelha a presente revisão de literatura integrativa de artigo científico com a heterogeneidade da população mundial frente à realidade de combate a este vírus. Reforços heterólogos e bivalentes mostraram aumento na imunogenicidade, especialmente frente a variantes emergentes. A persistência da resposta imune e a eficácia prolongada, observadas em acompanhamentos de até seis meses, reforçam a importância de esquemas vacinais adaptáveis. Em suma, as vacinas avaliadas são consideradas ferramentas eficazes e seguras no enfrentamento da pandemia, com resultados sólidos e consistentes em diferentes populações e contextos.

INTRODUÇÃO

O enfrentamento da pandemia de COVID-19 impulsionou o desenvolvimento rápido de diversas vacinas, com destaque para as de RNA mensageiro, como a BNT162b2, cuja eficácia e segurança foram amplamente comprovadas (Polack *et al.*, 2020; Thomas *et al.*, 2021; Moreira *et al.*, 2022). Além dessas, estudos investigaram outras plataformas vacinais — como vacinas inativadas e de proteína recombinante — e suas combinações em esquemas heterólogos, evidenciando bons níveis de imunogenicidade e segurança (Yang *et al.*, 2025; Fadlyana *et al.*, 2023; Feng *et al.*, 2021).

Pesquisas recentes também destacam a importância do monitoramento prolongado da resposta imunológica induzida pelas vacinas em diferentes contextos populacionais e geográficos (Arévalo-herrera *et al.*, 2025; Jin *et al.*, 2024). Diante disso, torna-se essencial compreender os efeitos dos diferentes imunizantes e estratégias de reforço para o controle eficaz da COVID-19.

Diante da emergência de novas variantes e da diminuição da resposta imune ao longo do tempo, estratégias de reforço vacinal tornaram-se essenciais. Esquemas heterólogos e novas formulações, como a vacina CS-2034, mostram potencial para ampliar a proteção e adaptá-la às necessidades atuais (Chalkias *et al.*, 2022; Jin *et al.*, 2024). Essas abordagens reforçam a importância de uma vacinação dinâmica e baseada em evidências para o controle contínuo da COVID-19.



OBJETIVO

Esse estudo objetivou analisar a segurança, a imunogenicidade e a eficácia das vacinas para prevenção de COVID-19, observando as análises de vacinas de acordo com artigos, principalmente a vacina BNT162, da farmacêutica Pfizer.

METODOLOGIA

Visando alcançar o objetivo do presente estudo, foi realizada uma revisão de literatura integrativa de artigo científico por método exploratório. Foram selecionados dez artigos, de um total de vinte, analisando a relevância para o tema proposto e tipo de estudo, conteúdo descritivo que evidencie a qualidade metodológica, com estudos robustos e confiáveis, e delimitação temporal dos anos de publicação escolhidos. Os dados foram obtidos por meio da pesquisa avançada no PubMed, foram utilizados as palavras chaves: Vacina; Pfizer; COVID-19; Imunogenicidade. As datas de publicação dos artigos variam de 2020 à 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o estudo de Jin *et al.* (2023) a vacina foi segura, sem eventos graves, com eventos leves/moderados: 93,33% (baixa dose), 100% (alta dose), e 80% (placebo). Soroconversão de anticorpos IgG anti-S-RBD: 100% (baixa dose), 93,33% (alta dose), e 0% (placebo). GMT de IgG: 810,0 (baixa dose), 832,2 (alta dose), e 15,0 (placebo). Também houve um aumento significativo de citocinas nos grupos vacinados.

Em congruência com o artigo do autor Arévalo-Herrera *et al.* (2024), os resultados mostraram que pacientes com febre amarela aguda grave apresentaram padrões distintos de expressão gênica quando comparados aos pacientes com formas leves da doença. Foi observada uma ativação mais intensa de genes associados à resposta inflamatória e ao estresse celular nos pacientes graves. A análise dos neutrófilos indicou uma resposta imune exacerbada nos pacientes com formas graves, com um aumento significativo na ativação celular. Os biomarcadores identificados sugerem que os perfis de expressão gênica podem ser utilizados para prognóstico e diagnóstico da febre amarela. A comparação entre os grupos revelou que a gravidade da doença está correlacionada com uma resposta imunológica mais intensa e uma maior disfunção nos mecanismos de defesa celular.

Conforme o artigo do Thomas *et al.* (2021) a BNT162b2 continuou segura e apresentou um perfil aceitável de eventos adversos. Poucos participantes apresentaram eventos adversos que levaram à desistência do estudo. A eficácia da vacina contra a Covid-19 foi de 91,3% (intervalo de confiança [IC] de 95%, 89,0 a 93,2) ao longo de 6 meses de acompanhamento entre os participantes sem evidência de infecção prévia por SARS-CoV-2 que puderam ser avaliados.

Em concordância com o autor Yang *et al.* (2025) pacientes com febre amarela aguda grave apresentaram perfis imunológicos distintos em comparação aos pacientes com formas leves da doença. Foi observada uma ativação mais intensa de genes associados à resposta inflamatória e ao estresse celular nos pacientes graves. Além disso, ao realizar a análise dos neutrófilos foi revelado uma resposta imune alta.

Em harmonia com o autor Moreira *et al.* (2022) a eficácia da terceira dose foi estimada em 95,3% contra Covid-19 sintomática (a partir de 7 dias após o reforço). Os efeitos adversos foram em geral leves a moderados (como dor no local da injeção, fadiga e dor de cabeça). Nenhum problema sério de segurança foi identificado. A proteção foi



consistente em diferentes faixas etárias e perfis de risco.

Em consonância com o autor Polack *et al.* (2020) a eficácia de 95% da vacina na prevenção da COVID-19 sintomática. Efeitos adversos foram geralmente leves a moderados, como dor local e fadiga.

Em linha com o autor Fadlyana *et al.* (2023) demonstrou que 28 dias após receber o reforço, combinando os grupos de 3 a menos de 6 meses e de 6 a 9 meses, as proporções de taxas de soroconversão em cada grupo de vacina foram de ChAdOx1-S 75 (82%) de 92 a 87 (88%) de 99 para dose completa e meia dose, BNT162b2 92 (92%) de 100 a 90 (98%) de 92 para dose completa e meia dose, e CoronaVac em 38 (41%) de 92 a 65 (66%) de 98. Todos os grupos de reforço alcançaram 100% de soropositividade 28 dias após a dose de reforço. Os participantes no grupo de preparação de 6 a 9 meses alcançaram títulos mais elevados em comparação com os participantes no grupo de preparação de 3 a menos de 6 meses.

Em sintonia com o autor Chalkias *et al.* (2020) os resultados intermediários foram apresentados. Grupos sequenciais de participantes receberam 50 µg de mRNA-1273.214 (437 participantes) ou mRNA-1273 (377 participantes) como uma segunda dose de reforço. O tempo médio entre o primeiro e o segundo reforço foi semelhante para o mRNA-1273.214 (136 dias) e mRNA-1273 (134 dias). Para os participantes sem infecção prévia por SARS-CoV-2, os títulos geométricos médios de anticorpos neutralizantes contra a variante Ômicron BA.1 foram 2372,4 após a dose de reforço com mRNA-1273.214 e 1473,5 após a dose de mRNA-1273.

Em congruência com o autor Walsh *et al.* (2020) as vacinas BNT162b1 e BNT162b2 induziram anticorpos neutralizantes em níveis iguais ou superiores aos de soros de convalescentes, com respostas melhores nos jovens (18–55 anos) do que nos idosos (65–85 anos). A BNT162b2 causou menos efeitos sistêmicos (como febre e fadiga), especialmente em idosos, enquanto ambas causaram reações locais leves a moderadas. Baseado na combinação de alta imunogenicidade e menor reatogenicidade, a BNT162b2 foi escolhida para seguir para a fase 2–3 do estudo.

Em consonância com Feng *et al.* (2021) a vacina CoronaVac causou apenas efeitos adversos leves e temporários, como dor no local e cansaço. A maioria dos participantes obteve êxito em produzir anticorpos e ativação de imunidade celular após a segunda dose, indicando boa resposta imunológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos artigos selecionados foram evidenciados os aspectos de imunogenicidade, segurança e eficácia relativa às doses de reforço, principalmente, de vacinas desenvolvidas pelos institutos e farmacêuticas Pfizer, Sinovac Biotech, AstraZeneca, FioCruz, Moderna e Janssen. Utilizando e avaliando doses das seguintes vacinas de referência, como a BNT162, desenvolvida pela farmacêutica Pfizer, a ChAdOx1-S 75 desenvolvida pela FioCruz, CoronaVac desenvolvida pela Sinovac Biotech, AZD1222 desenvolvida pela AstraZeneca, mRNA-1273 desenvolvida pela Moderna, e Ad26. COV2.S, desenvolvida pela Janssen.

A imunogenicidade geral constatada pelos ciclos de vacinação dos exemplares analisados foi considerada alta (proteção medida em >90% para as vacinas da Pfizer, Moderna e >50% nas vacinas desenvolvidas pela AstraZeneca, Janssen e Coronavac em casos sintomáticos) com discretas margens diferenciais causadas por particularidades em que cada estudo objetiva, incluindo tempo total de análise, especificidade de grupos selecionados e considerando a metodologia utilizada. Todos os lotes de vacinas geraram resposta imune ao antígeno causador da COVID-19 nos participantes, excedendo-se, em geral, aos participantes que foram submetidos às doses placebo.



A segurança destas vacinas recebeu a classificação alta ou muito alta, considerando efeitos adversos graves como muito raros, (<5%), e eventos adversos que não oferecem riscos à vida do paciente, como dor local, vermelhidão, febre e dores de cabeça, sendo evidenciados como mais comuns, cerca de 95% de todos os efeitos adversos relatados.

De forma conjunta, os estudos evidenciam e reforçam a eficácia das vacinas contra a COVID-19, com positiva indução imunológica, segurança de ciclos com doses de reforço e a viabilidade de ampliação e manutenção de estratégias de esquemas vacinais diversificados frente à disseminação e evolução do vírus SARS-CoV-2.

Palavras-chave: COVID 19; Imunogenicidade; Pfizer; Segurança; Vacina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Jin, Z. et al. Safety and immunogenicity of the COVID-19 mRNA vaccine CS-2034: A randomized, double-blind, dose-exploration, placebo-controlled multicenter Phase I clinical trial in healthy Chinese adults. *The Journal of infection*, v. 87, n. 6, p. 556–570,. Disponível em : [10.1016/j.jinf.2023.10.012](https://doi.org/10.1016/j.jinf.2023.10.012). Acesso em : 31 de março de 2025

Arévalo-herrera, M. et al. Longitudinal follow-up of the specific antibody response to SARS-CoV-2 vaccination in Colombia. **Journal of medical virology**, v. 97, n. 1, p. e70133, 2025. Disponível em : <https://doi.org/10.1002/jmv.70133>. Acesso em : 31 de março de 2025

Thomas, S. J. et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine through 6 months. **The New England journal of medicine**, v. 385, n. 19, p. 1761–1773, 2021. Disponível em : [10.1056/NEJMoa2110345](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2110345). Acesso em : 31 de março de 2025

Yang, B.-F. et al. Immunogenicity and safety of SARS-CoV-2 recombinant protein vaccine (CHO cell) LYB001 as a heterologous booster following two- or three-dose inactivated COVID-19 vaccine in adults aged ≥ 18 years: interim results of a randomized, active-controlled, double-blinded, phase 3 trial. **Expert review of vaccines**, v. 24, n. 1, p. 81–90, 2025. Disponível em : <https://doi.org/10.1080/14760584.2024.2446288>. Acesso em : 31 de março de 2025

Moreira, E. D., Jr et al. Safety and efficacy of a third dose of BNT162b2 Covid-19 vaccine. **The New England journal of medicine**, v. 386, n. 20, p. 1910–1921, 2022. Disponível em : [10.1056/NEJMoa2200674](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2200674). Acesso em : 31 de março de 2025

Polack, F. P. et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine. **The New England journal of medicine**, v. 383, n. 27, p. 2603–2615, 2020. Disponível em : [10.1056/NEJMoa2034577](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034577). Acesso em : 31 de março de 2025

Fadlyana, E. et al. Immunogenicity and safety in healthy adults of full dose versus half doses of COVID-19 vaccine (ChAdOx1-S or BNT162b2) or full-dose CoronaVac administered as a booster dose after priming with CoronaVac: a randomised, observer- masked, controlled trial in Indonesia. **The Lancet infectious diseases**, v. 23, n. 5, p. 545–555, 2023. Disponível em : [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(22\)00800-3](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00800-3). Acesso em : 31 de março de 2025

Chalkias, S. et al. A bivalent omicron-containing booster vaccine against covid-19. **The New England journal of medicine**, v. 387, n. 14, p. 1279–1291, 2022. Disponível em : [10.1056/NEJMoa2208343](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2208343). Acesso em : 31 de março de 2025

Walsh, E. E. et al. Safety and immunogenicity of two RNA-based Covid-19 vaccine



candidates. **The New England journal of medicine**, v. 383, n. 25, p. 2439–2450, 2020. Disponível em : [10.1056/NEJMoa2027906](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2027906). Acesso em : 31 de março de 2025

Feng, Y. et al. Safety and immunogenicity of inactivated SARS-CoV-2 vaccine in high-risk occupational population: a randomized, parallel, controlled clinical trial. **Infectious diseases of poverty**, v. 10, n. 1, p. 138, 2021. Disponível em : <https://doi.org/10.1186/s40249-021-00924-2>. Acesso em : 31 de março de 2025



INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM FÁRMACOS UTILIZADOS POR IDOSOS: RISCOS E CONSEQUÊNCIAS

¹Ana Júlia Silva Santos

²Gabriela de Oliveira Silva

³Fernanda Vieira Fonseca

⁴Thiago Santos Borges

⁵Kennia Rodrigues Tassara

⁶Bruno Rogério Ferreira

⁷Daniela Borges Marquez Barbosa

⁸Letícia Cristina Alves de Sousa

^{1,2,3,4,7,8}Universidade Estadual de Goiás. Itumbiara, Goiás, Brasil; ⁵Centro

Universitário de Goiatuba - UniCerrado. Goiatuba, Goiás, Brasil;

⁶Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil.

Área temática: Farmácia

Resumo: Objetivo: analisar a presença e gravidade das interações medicamentosas em pacientes idosos, considerando a polifarmácia como fator de risco. Metodologia: foi realizada uma revisão bibliográfica de medicamentos que comumente são utilizados por pacientes idosos. A partir disso, foi verificado se havia interação medicamentosa e a classificação. As interações foram classificadas em leves, moderadas e graves. Resultados e Discussão: Os resultados evidenciaram a alta prevalência de interações, especialmente entre anticoagulantes, antidepressivos e anti-hipertensivos. Interações graves representaram risco elevado para eventos adversos como hemorragias, arritmias e hipoglicemias. A análise reforça a importância da farmacovigilância, especialmente na população geriátrica, que apresenta maior vulnerabilidade fisiológica. Conclusão: Conclui-se que intervenções clínicas e revisão constante das prescrições são essenciais para promover a segurança terapêutica em idosos.

INTRODUÇÃO

As interações medicamentosas ocorrem quando dois ou mais fármacos administrados simultaneamente alteram a eficácia ou a segurança uns dos outros. Elas podem intensificar efeitos adversos, reduzir a eficácia terapêutica e, em casos graves, levar à hospitalização ou até mesmo à morte (Osterberg; Blaschke, 2005). Na população idosa, o risco é significativamente aumentado devido à presença de comorbidades, polifarmácia, alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas, além de fragilidade fisiológica (Pereira *et al.* 2017). O envelhecimento interfere no metabolismo hepático e na excreção renal, o que torna os idosos mais suscetíveis a efeitos colaterais e interações negativas. Estima-se que cerca de 17% das hospitalizações de idosos estejam relacionadas a reações adversas a medicamentos, sendo parte delas causadas por interações evitáveis (Ruscin, Linnebur, 2021).

De acordo com Pereira *et al.* (2017) a polifarmácia em idosos aumenta significativamente a exposição a riscos clínicos. Conforme a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2019), o monitoramento da polifarmácia é uma estratégia global para a segurança do paciente. A vulnerabilidade dos idosos aos eventos adversos relacionados a medicamentos é alta, devendo-se à complexidade dos problemas clínicos, à polifarmácia,



e às alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas inerentes ao envelhecimento (Secoli, 2010). A identificação e prevenção dessas interações são fundamentais para uma assistência segura e eficaz.

OBJETIVO

Analisar e classificar as possíveis interações medicamentosas entre medicamentos que são frequentemente usados em pacientes idosos, para identificar potenciais riscos clínicos e promover uma abordagem segura e racional do uso de medicamentos nessa população.

METODOLOGIA

Através de revisão bibliográfica prévia, foram levantados medicamentos que comumente são utilizados por pacientes idosos. Foram utilizados os seguintes termos: interações medicamentosas, polifarmácia em idosos, eventos adversos medicamentosos e farmacovigilância nas bases de dados como: *Pubmed*, *Scielo*, *BVS*, *Medscape Drug Interaction Checker*, *Micromedex* e *Anvisa-Bulário Eletrônico*. A partir disso, foi verificado se havia interação medicamentosa e, em caso afirmativo, foi realizada a classificação em baixa, média e alta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados aproximadamente 60 medicamentos. Dentre esses, 24 interações medicamentosas. Entre essas, 9 foram classificadas como graves, 9 como moderadas e 6 como leves.

As interações graves envolveram medicamentos como Varfarina, Amiodarona, AAS, Digoxina e Antidepressivos tricíclicos. Os principais riscos associados incluíram sangramentos graves, arritmias cardíacas, hipocalcemia e aumento da toxicidade da digoxina (Fateme *et al.* 2021; Osterberg, Blaschke, 2005). Já as interações moderadas, embora menos perigosas, envolveram medicamentos como Enalapril, Metformina, Losartana e Espironolactona, incluindo como riscos associados à hiperglicemia, hipotensão grave e a hipoglicemia (Pereira *et al.* 2017; WHO, 2019). E as interações leves, mesmo com menor impacto, podem causar hipoglicemia leve, diminuição do efeito do diurético e também o aumento do risco de sangramento (Pereira *et al.* 2017). e estas interações estão frequentemente envolvidas com medicamentos como Glibenclamida, AAS, Diazepam, Sinvastatina e Omeprazol.

Estudos mostram que a farmacovigilância e a farmácia clínica exercem papel crucial na identificação e prevenção dessas interações. A literatura recomenda intervenções multiprofissionais e o uso de tecnologias de apoio à prescrição, como softwares clínicos e sistemas de alerta automatizados. A educação permanente dos profissionais da saúde e a atuação do farmacêutico clínico nas unidades de saúde são estratégias essenciais para minimizar riscos e garantir segurança terapêutica à população idosa. (Fateme *et al.* 2021)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de interações medicamentosas entre os idosos é necessária, uma vez que conforme a idade avança, a presença de comorbidades e uso de medicamentos aumentam



consideravelmente. A polifarmácia representa um risco concreto e relevante à saúde dessa população. A presença de interações graves observadas neste estudo evidencia a importância de intervenções clínicas sistemáticas, com participação ativa do farmacêutico na equipe multidisciplinar. O uso racional de medicamentos, aliado a práticas de prescrição segura, é essencial para prevenir eventos adversos e melhorar a qualidade de vida dos idosos. Recomenda-se a implementação de estratégias de revisão periódica das prescrições e de programas de educação em saúde que capacitem profissionais para reconhecer, prevenir e manejar interações medicamentosas. Tais medidas são fundamentais para reduzir a morbimortalidade associada a reações adversas evitáveis e para promover um envelhecimento mais seguro.

Palavras-chave: Idoso; Interações medicamentosas; Polifarmácia; Prescrição racional; Segurança do paciente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FATEMEH, A. *et al.* Drug-drug interactions and potentially inappropriate medications among elderly outpatients. **Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences**, v. 57, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s2175-97902020000418728>. Acesso em: 24 maio 2025.

OSTERBERG, L.; BLASCHKE, T. Adherence to medication. **New England Journal of Medicine**, v. 353, n. 5, p. 487-497, 2005. DOI: [10.1056/NEJMr050100](https://doi.org/10.1056/NEJMr050100). Acesso em: 24 maio 2025

PEREIRA, K. G. *et al.* Polifarmácia em idosos: um estudo de base populacional. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 20, n. 2, p. 335-344, abr./jun. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-5497201700020013>. Acesso em: 24 maio 2025.

RUSCIN, M.; LINNEBUR, S. Problemas relacionados a fármacos em idosos. **Manual MSD**. 2021. Disponível em <https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/geriatria/terapia-medicamentosa-em-idosos/problemas-relacionados-a-f%C3%A1rmacos-em-idosos> Acesso em: 24 maio 2025.

SECOLI, S. R. Polifarmácia: interações e reações adversas no uso de medicamentos por idosos. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 63, n. 1, p. 136- 140, jan. 2010.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medication safety in high-risk situations**. Geneva: World Health Organization, 2019. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-UHC-SDS-2019.10>. Acesso em: 24 maio 2025.



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS NOTIFICADOS DE LEPTOSPIROSE NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO RIO CAETÉ, PARÁ, NORTE DO BRASIL

¹ Victória Kamilly Lima da Silva

¹ Karem Beatriz de Oliveira Mantena

² Diego Simeone

¹ Lanna Jamille Corrêa da Costa

¹ Indira Angela Luza Eyzaguirre

¹ Aldemir Branco de Oliveira Filho

¹ Universidade Federal do Pará, Bragança, Pará, Brasil

² Afya Faculdade de Ciências Médicas, Bragança, Pará, Brasil

Área temática: Epidemiologia.

Resumo: A leptospirose é uma zoonose causada por bactérias espiroquetas do gênero *Leptospira* e afeta principalmente populações expostas à urina de animais, água ou lama contaminadas e os quadros podem variar de leves até manifestações sistêmicas. A leptospirose é endêmica em regiões de clima tropical e representa um problema de saúde pública relevante para o Brasil, estando associada principalmente às regiões de aglomeração urbana sem saneamento básico. Este estudo descreveu o perfil epidemiológico dos casos notificados de leptospirose na região de integração do Rio Caeté, nordeste do estado do Pará. Trata-se de um estudo epidemiológico de natureza retrospectiva (2014 a 2023), quantitativo e descritivo, conduzido a partir de dados acessados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), disponibilizado pelo Departamento de Informação e Informática do SUS (DATASUS). Na região do Rio Caeté, 56 casos de leptospirose foram notificados no período de 2014 a 2023, distribuídos entre 7 municípios. A maioria dos infectados era do sexo masculino, pardo, idade entre 20 e 39 anos e que não completaram o ensino fundamental. A área urbana predominou entre as notificações de casos. Esse perfil foi observado em outros estudos conduzidos em estados brasileiros. Sendo que, a ocorrência e a distribuição urbana dos casos de leptospirose estão associadas às condições de saneamento básico. Em suma, a compreensão e a utilização do perfil de ocorrência e distribuição de casos de leptospirose são necessários para identificação do cenário epidemiológico, análise de possibilidades de intervenções e execução precisa de estratégias e políticas de saúde pública.

INTRODUÇÃO

A Leptospirose é uma zoonose causada por bactérias espiroquetas do gênero *Leptospira*. Essa doença possui grande importância para a saúde pública e tem afetado diversas populações, principalmente aquelas expostas a enchentes, atividades agrícolas e limpeza de esgotos (Sousa et al., 2024; Sykes et al., 2022). As bactérias espiroquetas são eliminadas no ambiente por meio da urina de animais e podem contaminar água, lama ou outras soluções aquosas. No meio urbano, os principais reservatórios são os roedores (ratos de esgoto), mas também pode estar presente em animais domésticos e de criação (Guerra, 2013).

As bactérias do gênero *Leptospira spp.* penetram na pele por lesões ou mucosas e entram na circulação sanguínea. Os quadros clínicos da leptospirose podem ser leves e com boa evolução, mas podem progredir para as formas mais graves e óbitos. A síndrome de Weil é a principal manifestação grave e é caracterizada por icterícia (pele alaranjada),



insuficiência renal e hemorragia (Brasil, 2014; Samrot et al., 2021).

A leptospirose é endêmica em regiões de clima tropical e representa um problema de saúde pública relevante para o Brasil. Ela está associada principalmente às regiões de aglomeração urbana com saneamento básico precário e, quando aliado aos períodos chuvosos, aumenta a possibilidade de inundações e fornece um caráter sazonal de contaminação da população (Cunha et al., 2022). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a taxa endêmica anual de leptospirose é estimada em 5 casos a cada 100.000 pessoas. No Brasil, a predominância da leptospirose está entre homens da área urbana e em idade economicamente produtiva. No estado do Pará, mais de 2000 casos de leptospirose foram registrados entre 2001 e 2017, os quais apontam para um aumento progressivo em parte dos municípios do estado (Costa et al., 2015).

OBJETIVO

Este estudo descreve o perfil epidemiológico dos casos notificados de leptospirose na região de integração do Rio Caeté, estado do Pará, de 2014 a 2023.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico de caráter retrospectivo, quantitativo e descritivo, conduzido a partir de dados secundários acessados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), disponibilizado pelo Departamento de Informação e Informática do SUS (DATASUS). Os dados são referentes aos casos confirmados de leptospirose de 2014 e 2023 na Região de Integração do Rio Caeté, constituída por 15 municípios: Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu.

Neste estudo, as variáveis acessadas e analisadas foram: faixa etária (ignorado; <1; 1-4; 5-9; 10-14; 15-19; 20-39; 40-59; 60-64; 65-69; 70-79; ≥80), sexo, raça/etnia, escolaridade (ignorado; analfabeto; ensino fundamental incompleto; ensino fundamental completo; ensino médio incompleto; ensino médio completo; ensino superior incompleto; ensino superior completo) e área de infecção (ignorado; urbana; rural; periurbana). Todos os dados foram coletados e organizados em planilhas do programa Microsoft Excel 2019 e, posteriormente, codificadas para tabelas para melhor visualização e análise das informações epidemiológicas relevantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da busca e análise de dados sobre a ocorrência de leptospirose na região de integração do Rio Caeté, 56 notificações foram feitas no período de 2014 a 2023. Entre os 15 municípios dessa região, sete tiveram notificações de leptospirose realizadas. Bragança foi o município que apresentou a maior número de notificações ($n = 43$), seguida pelos municípios de Capanema ($n = 4$); São João de Pirabas e Viseu ($n = 2$ em cada um deles); Augusto Corrêa, Primavera e Santa Luzia do Pará ($n = 1$ em cada município). Interessantemente, outros dois casos de leptospirose foram registrados no sistema, porém essas notificações de infecção não foram vinculadas a nenhum dos municípios da região de integração do Rio Caeté.

No que diz respeito à faixa etária, o maior número de notificações de leptospirose ocorreu em indivíduos de 20 a 39 anos ($n = 24$). Porém, outras notificações foram detectadas nas faixas etárias de 40-59 anos ($n = 16$), 15-19 anos ($n = 9$), menor que 1 ano e 60-64 anos



(n = 2 em cada uma das faixas). Em relação ao sexo, as notificações de leptospirose foram mais prevalentes entre os homens (n = 47). Sendo que, a maioria das notificações ocorreu em pessoas que se declararam pardos (n = 50).

Entretanto, houve a falta de registro da escolaridade de muitos indivíduos com leptospirose (n = 35). Somente 21 notificações tinham o registro de escolaridade dos indivíduos com leptospirose. Dentre tais, o ensino fundamental incompleto (n = 11) e o ensino médio incompleto (n = 4) foram as categorias predominantes

A área urbana teve o maior o número de notificações de leptospirose (n = 34). Porém, destaca-se novamente o elevado número de notificações de leptospirose sem registro da área de residência do indivíduo diagnosticado com a doença. Somado a isso, 7 notificações de leptospirose foram oriundas da área rural e apenas 1 da área periurbana.

O maior número de notificações de leptospirose foi feito no município de Bragança, uma localidade que tem apresentado aumento na incidência das infecções (Cerveira et al., 2020). O perfil epidemiológico de notificações de leptospirose detectado neste estudo é muito semelhante aos achados no estado do Pará e no Brasil (Cerveira et al., 2020; Gonçalves et al., 2016), corroborando com a possibilidade de os homens estarem mais expostos a leptospirose devido às atividades ocupacionais.

Apesar de não ter sido devidamente notificado, os dados sobre a escolaridade dos indivíduos com leptospirose são de suma importância para avaliar o perfil de distribuição da doença, já que auxilia na determinação do status socioeconômico da região. Entre as 21 notificações que tiveram essa variável identificada, 11 delas não completaram o ensino fundamental, perfil que também pode ser observado em outros estados do país e corroboram para que a leptospirose seja uma patologia associada à população mais pobre (Magalhães; Acosta, 2019).

Este estudo demonstrou a região de integração do Rio Caeté possui um perfil epidemiológico de leptospirose semelhante aos achados feitos no Pará e no Brasil. Porém, o preenchimento correto e completo da ficha de notificação é um fator muito preocupante, pois a perda ou a ausência de dados foi claramente identificada e isso impacta diretamente na definição segura e precisa do perfil epidemiológico dessa doença bacteriana. Isso é uma limitação desse estudo, pois a insegurança desse perfil dificulta consideravelmente na avaliação do cenário e na tomada de decisão, especialmente porque a distribuição da leptospirose tem sido associada a fatores socioeconômicos e ambientais, os quais podem estar sendo potencializados com a intensificação das mudanças climáticas através de enchentes e inundações (Duarte; Giatti, 2019; Galan et al., 2021). Desse modo, apesar do avanço inicial na epidemiologia da leptospirose, estudos adicionais deverão ser executados para definir com maior precisão o perfil epidemiológico dessa doença na região de integração do Rio Caeté e como as mudanças climáticas estão impactando sobre a saúde da população.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, o perfil epidemiológico de leptospirose na região de integração do Rio Caeté foi definido e é semelhante aos perfis observados no estado do Pará e no Brasil. Entretanto, a limitação dos dados pode estar associada à subnotificação dos casos, já que na fase inicial a doença apresenta sintomas muito genéricos e pode passar despercebida pelos profissionais e pela população. Por ser uma doença associada a fatores socioambientais, identificar e compreender o padrão de distribuição da leptospirose é importante para o desenvolvimento de políticas de saúde pública específicas e eficazes, além de direcionar com maior exatidão as medidas educativas para identificação e prevenção de novos casos e,



principalmente, das situações de risco em contextos de vulnerabilidade socioambiental.

Palavras-chave: Epidemiologia; Leptospirose; Rio Caeté; Vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Leptospirose: diagnóstico e manejo clínico.

Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

CERVEIRA, R. A. et al. Spatio-temporal analysis of leptospirosis in Eastern Amazon, State of Pará, Brazil. **Revista brasileira de epidemiologia [Brazilian journal of epidemiology]**, v. 23, p. e200041, 2020.

COSTA, F. et al. Global morbidity and mortality of leptospirosis: A systematic review. **PLoS neglected tropical diseases**, v. 9, n. 9, p. e0003898, 2015.

CUNHA, M. et al. Rainfall and other meteorological factors as drivers of urban transmission of leptospirosis. **PLoS neglected tropical diseases**, v. 16, n. 4, p. e0007507, 2022.

DUARTE, J. L.; GIATTI, L. L. Incidência da leptospirose em uma capital da Amazônia Ocidental brasileira e sua relação com a variabilidade climática e ambiental, entre os anos de 2008 e 2013. **Epidemiologia e serviços de saúde: revista do Sistema Unico de Saude do Brasil**, v. 28, n. 1, p. e2017224, 2019.

GALAN, D. I. et al. Epidemiology of human leptospirosis in urban and rural areas of Brazil, 2000-2015. **PloS one**, v. 16, n. 3, p. e0247763, 2021.

GONÇALVES, N. V. et al. Leptospirosis space-time distribution and risk factors in Belém, Pará, Brazil. **Ciência & saúde coletiva**, v. 21, n. 12, p. 3947–3955, 2016.

GUERRA, M. A. Leptospirosis: public health perspectives. **Biologicals: journal of the International Association of Biological Standardization**, v. 41, n. 5, p. 295–297, 2013.

MAGALHÃES, V. S.; ACOSTA, L. M. W. Leptospirose humana em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de 2007 a 2013: caracterização dos casos confirmados e distribuição espacial. **Epidemiologia e serviços de saúde: revista do Sistema Unico de Saude do Brasil**, v. 28, n. 2, 2019.

SAMROT, A. V. et al. Leptospiral infection, pathogenesis and its diagnosis-A review. **Pathogens**, v. 10, n. 2, p. 145, 2021.

SOUSA, A. K. DE et al. CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE LEPTOSPIROSE EM ESCOLAS. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 10, n. 11, p. 7326–7347, 2024.

SYKES, J. E. et al. Role of diagnostics in epidemiology, management, surveillance, and control of leptospirosis. **Pathogens**, v. 11, n. 4, p. 395, 2022.



APLICAÇÃO DA FARMACOGENÉTICA NO TRATAMENTO PERSONALIZADO DO TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR

¹Victória Gomes de França Lima

²Bárbara Rafaela da Silva Barros

^{1,2} Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brasil.

Área temática: Farmacologia

Resumo: O transtorno depressivo maior (TDM) apresenta uma elevada variabilidade interindividual na resposta terapêutica aos antidepressivos, frequentemente associada a polimorfismos genéticos que influenciam processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. A farmacogenética surge como uma ferramenta essencial para otimizar a prescrição, reduzir efeitos adversos e promover tratamentos mais eficazes e seguros. Este trabalho analisou a influência do perfil farmacogenético na resposta terapêutica ao TDM, destacando a importância da integração de testes genéticos na prática clínica. Foi realizada uma revisão da literatura descritiva e qualitativa, com buscas nas bases de dados PubMed e SciELO, utilizando os descritores “major depressive disorder”, “pharmacotherapy” e “pharmacogenetics”, em português e inglês, considerando publicações dos últimos 10 anos. Foram selecionados 13 estudos que abordam genes e polimorfismos com impacto negativo na farmacoterapia do TDM. Os resultados indicam que variantes em genes como 5-HTTLPR, CYP2C19, CYP1A2, ABCB1, HTR1A e HTR2A podem comprometer a eficácia terapêutica e a segurança do tratamento antidepressivo. Assim, reforça-se a necessidade do mapeamento genético individual como estratégia fundamental para a personalização terapêutica, reduzindo eventos adversos e melhorando a adesão ao tratamento em pacientes com TDM.

INTRODUÇÃO

A farmacoterapia para distúrbios neuropsiquiátricos, como a depressão, é caracterizada por uma significativa variabilidade na resposta aos medicamentos antidepressivos, além do risco de desenvolvimento de efeitos adversos. A prescrição de antidepressivos desconsiderando o fenótipo metabólico do paciente pode comprometer a eficácia terapêutica e aumentar o risco de desfechos adversos, incluindo hospitalizações e mortalidade (Lunenburg et al., 2021).

A farmacogenética visa otimizar o tratamento de cada paciente, levando em conta suas individualidades relacionadas aos processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos (Jukic et al., 2022). As variabilidades farmacocinéticas referem-se a alterações em genes codificadores de proteínas chave nos processos de absorção, distribuição, metabolização e eliminação de medicamentos antidepressivos, enquanto as variabilidades farmacodinâmicas resultam de diferentes interações do fármaco ativo com seus receptores (Radosavljevic et al., 2023).

A consequência mais evidente dessa variabilidade é o metabolismo distinto dos antidepressivos, que ocorre principalmente através das isoenzimas CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 e CYP1A2 (Radosavljevic et al., 2023). Os status de metabolizadores dessas CYPs podem ser classificados como lento, intermediário, rápido ou ultrarrápido,



afetando diretamente as concentrações do fármaco no plasma sanguíneo.

Atualmente, diversos estudos farmacogenéticos indicam que tratamentos mais eficientes e seguros com antidepressivos e ansiolíticos podem ser alcançados por meio de decisões terapêuticas guiadas pelo genótipo (Kee et al., 2023; Del Casale et al., 2022; Lunenburg et al., 2021).

Diante disso, analisar a influência do perfil farmacogenético na resposta terapêutica aos antidepressivos, ressaltando a importância da integração de testes genéticos na prática clínica, é de extrema relevância para a promoção de tratamentos mais eficazes e seguros. Diante disso, a compreensão dessas variabilidades metabólicas torna-se essencial para o avanço da medicina personalizada e para a redução de eventos adversos associados à farmacoterapia em distúrbios neuropsiquiátricos.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é elencar as principais alterações gênicas que dificultam o tratamento do transtorno depressivo maior (TDM).

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão da literatura descritiva e qualitativa. As buscas foram realizadas no *Pubmed* e *Scielo* com os descritores *major depressive disorder* AND *pharmacotherapy* AND *pharmacogenetics* nos idiomas português e inglês dos últimos 10 anos. Os critérios de exclusão foram a eliminação de artigos que não correspondem à temática de farmacogenética ou artigos de farmacogenética não correlacionados com o transtorno depressivo maior (TDM). Ao todo foram selecionados 13 estudos que correspondem ao período desejado e que tivessem informações relevantes sobre genes alterados que fossem prejudiciais à farmacoterapia do TDM.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos estudos, foi possível observar que, dentre os polimorfismos encontrados, o alelo S (14 repetições) do gene 5-HTTLPR codifica uma expressão menor do transportador de serotonina (SERT) em comparação ao alelo L (16 repetições) (Ramsey; Bishop; Strawn, 2019). Essa menor expressão foi associada a uma pior resposta antidepressiva, especialmente em pacientes caucasianos tratados com inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) (Fabbri; Serretti, 2015).

Outros estudos demonstraram associação entre o tipo de metabolizador do CYP2C19, as concentrações plasmáticas de citalopram e a descontinuação do tratamento em adultos. Metabolizadores lentos e intermediários do CYP2C19 apresentam maior exposição ao escitalopram e maior propensão à descontinuação, devido aos efeitos colaterais, enquanto metabolizadores ultrarrápidos tendem a níveis subterapêuticos e à descontinuação por ineficácia, em comparação aos metabolizadores normais (Silva; Andrade, 2008).

Em relação ao transporte dos medicamentos, destaca-se a glicoproteína P, codificada pelo gene ABCB1, uma bomba de efluxo que dificulta a captação e o acúmulo de antidepressivos lipofílicos em órgãos-chave, como o cérebro. Polimorfismos rs2032582 (G2677) e rs1045642 (3435C) foram associados a alterações na expressão e/ou função da glicoproteína P, mostrando efeito benéfico na resposta antidepressiva (Fabbri; Serretti, 2015). Além disso, os genes rs1045642, rs2032583 e rs2235040 também foram apontados como moduladores genéticos adicionais da resposta em pacientes tratados com paroxetina (Uhr et al., 2008).



No metabolismo antidepressivo, destaca-se a enzima CYP1A2, responsável pela metabolização de aproximadamente 24% desses medicamentos, incluindo agomelatina, escitalopram, venlafaxina, duloxetine e mirtazapina, amplamente utilizados atualmente (Alchakee et al., 2022; Cacabelos, 2015). Diversas variantes do CYP1A2, como *1C, 1F e 1B, foram identificadas como indicadores potenciais do fenótipo CYP1A2 e da farmacocinética da agomelatina. A variante CYP1A21C está associada a concentrações plasmáticas mais elevadas de agomelatina e a maior risco de efeitos adversos (Saiz-Rodríguez et al., 2019). Por outro lado, as variantes CYP1A21F e *1B, caracterizadas por maior atividade enzimática, podem acelerar o metabolismo da agomelatina, resultando em concentrações plasmáticas mais baixas e, consequentemente, ineficácia terapêutica com doses padrão (Song et al., 2013).

No âmbito da farmacodinâmica, os principais receptores-alvo dos antidepressivos são os de serotonina, 5-HT1A e 5-HT2A. O receptor 5-HT1A, metabotrópico, está presente no sistema nervoso central (SNC) e em tecidos periféricos, com distribuição em regiões como hipocampo, hipotálamo, córtex e amígdala cerebral. Ele desempenha papel essencial no controle da liberação de neurotransmissores, especialmente serotonina, sendo um alvo de várias drogas psicotrópicas, incluindo antidepressivos e ansiolíticos (Yohn; Gergues; Samuels, 2017).

O gene HTR1A codifica o receptor 5-HT1A, e mutações nesse gene foram associadas a diversos transtornos neuropsiquiátricos, incluindo TDM, transtornos de ansiedade e do espectro autista (Alqahtani et al., 2020). O papel dos polimorfismos do HTR1A na resposta à terapia antidepressiva também foi investigado. Villafuerte et al. observaram que o alelo G do polimorfismo rs1364043 pode prever a resposta ao citalopram em pacientes deprimidos, mostrando que indivíduos homozigotos para esse alelo respondem melhor à terapia. De forma semelhante, em pacientes com TDM, Kato et al. (XXXXX) verificaram associação entre o polimorfismo rs1364043 do HTR1A e melhor resposta ao tratamento antidepressivo.

O gene HTR2A, que codifica o receptor 5-HT2A, apresenta diversos polimorfismos relacionados à função ou expressão alterada desse receptor. Dentre eles, os polimorfismos rs6311 e rs6313 são os mais estudados, principalmente devido à sua associação com a resposta à terapia antidepressiva (Kao et al., 2020). Estudos recentes comprovaram que portadores dos polimorfismos rs3803189 e rs7997012 do HTR2A apresentam melhor resposta aos ISRS (Sun et al., 2021; Gassó et al., 2018).

Outros trabalhos também analisaram a relação entre diferentes polimorfismos de nucleotídeo único do HTR2A e a tolerabilidade à terapia antidepressiva. De acordo com essas evidências, polimorfismos específicos do HTR2A, como rs7997012 e rs6314, podem estar associados a um risco reduzido de efeitos adversos a medicamentos antidepressivos (Oz et al., 2019; Wan et al., 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados evidenciam a presença de diversos polimorfismos genéticos que podem alterar significativamente os mecanismos de ação dos antidepressivos. Além disso, é desafiador ao prescritor antecipar eventos adversos decorrentes dessas variabilidades, o que compromete a eficácia terapêutica. Assim, o tratamento atual do transtorno depressivo maior frequentemente se revela ineficaz em função de alterações genéticas em genes codificadores de proteínas-chave envolvidas nos processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos.

Torna-se, portanto, essencial o mapeamento genético individualizado como ferramenta para uma prescrição mais segura e eficaz, contribuindo para a redução de eventos adversos, a melhora da adesão terapêutica e a promoção de uma medicina mais personalizada.



Palavras-chave: Farmacogenética; Medicina personalizada; Metabolismo; Transtorno Depressivo Maior.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALCHAKEE, Aminah *et al.* Pharmacogenomics in psychiatry practice: the value and the challenges. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 23, n. 21, p. 13485, 3 nov. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijms232113485>. Acesso em: 23 maio 2025.

ALQAHTANI, Am *et al.* Compreendendo os aspectos genéticos da resistência ao tratamento com antidepressivos. **Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci.**, n. 24, p. 7784-7795, 2020.

CACABELOS, Ramón. Pharmacogenomics of antidepressants. **Psychiatry, Depression & Anxiety**, v. 1, n. 1, p. 1-42, 15 set. 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.24966/pda-0150/100001>. Acesso em: 23 maio 2025.

DEL CASALE, Antonio *et al.* Pharmacogenomics-Guided pharmacotherapy in patients with major depressive disorder or bipolar disorder affected by treatment-resistant depressive episodes: a long-term follow-up study. **Journal of Personalized Medicine**, v. 12, n. 2, p. 316, 19 fev. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jpm12020316>. Acesso em: 23 maio 2025.

FABBRI, Chiara; SERRETTI, Alessandro. Pharmacogenetics of major depressive disorder: top genes and pathways toward clinical applications. **Current Psychiatry Reports**, v. 17, n. 7, 16 maio 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11920-015-0594-9>. Acesso em: 23 maio 2025.

GASSÓ, Patricia *et al.* Further support for the involvement of genetic variants related to the serotonergic pathway in the antidepressant response in children and adolescents after a 12-month follow-up: impact of the HTR2A rs7997012 polymorphism. **Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology**, v. 28, n. 10, p. 711-718, dez. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1089/cap.2018.0004>. Acesso em: 23 maio 2025.

JUKIC, Marin *et al.* Pharmacogenomics in treatment of depression and psychosis: an update. **Trends in Pharmacological Sciences**, out. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.tips.2022.09.011>. Acesso em: 23 maio 2025.

KAO, Chung-Feng *et al.* Gene-Based association analysis suggests association of HTR2A with antidepressant treatment response in depressed patients. **Frontiers in Pharmacology**, v. 11, 3 dez. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fphar.2020.559601>. Acesso em: 23 maio 2025.

KATO, Masaki *et al.* Effect of 5-HT1A gene polymorphisms on antidepressant response in major depressive disorder. **American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics**, v. 150B, n. 1, p. 115-123, 5 jan. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ajmg.b.30783>. Acesso em: 23 maio 2025.

KEE, Ping Siu *et al.* The pharmacogenetics of CYP2D6 and CYP2C19 in a case series of antidepressant responses. **Frontiers in Pharmacology**, v. 14, 21 fev. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1080117>. Acesso em: 23 maio 2025.

LUNENBURG, Carin A. T. C. *et al.* Life-time actionable pharmacogenetic drug use: a population-based cohort study in 86 040 young people with and without mental disorders in



denmark. **Pharmacopsychiatry**, v. 55, n. 02, p. 95-107, 9 nov. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1055/a-1655-9500>. Acesso em: 23 maio 2025.

OZ, Merve Demirbugen *et al.* Association between serotonin 2A receptor (HTR2A), serotonin transporter (SLC6A4) and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene polymorphisms and citalopram/sertraline induced sexual dysfunction in MDD patients. **The Pharmacogenomics Journal**, v. 20, n. 3, p. 443-450, 3 dez. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41397-019-0127-8>. Acesso em: 23 maio 2025.

RADOSAVLJEVIC, Milica *et al.* The role of pharmacogenetics in personalizing the antidepressant and anxiolytic therapy. **Genes**, v. 14, n. 5, p. 1095, 16 maio 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/genes14051095>. Acesso em: 23 maio 2025.

RAMSEY, Laura B.; BISHOP, Jeffrey R.; STRAWN, Jeffrey R. Pharmacogenetics of treating pediatric anxiety and depression. **Pharmacogenomics**, v. 20, n. 12, p. 867-870, ago. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.2217/pgs-2019-0088>. Acesso em: 23 maio 2025.

SAIZ-RODRÍGUEZ, Miriam *et al.* Polymorphisms in CYP1A2, CYP2C9 and ABCB1 affect agomelatine pharmacokinetics. **Journal of Psychopharmacology**, v. 33, n. 4, p. 522-531, 21 fev. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0269881119827959>. Acesso em: 23 maio 2025.

SILVA, Diana Klanovicz; ANDRADE, Fabiana Michelsen de. Farmacogenética de inibidores seletivos de recaptação de serotonina: uma revisão. **Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul**, v. 30, n. 1 suppl, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/s0101-81082008000200004>. Acesso em: 23 maio 2025.

SONG, L. *et al.* Effect of CYP1A2 polymorphism on the pharmacokinetics of agomelatine in Chinese healthy male volunteers. **Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics**, v. 39, n. 2, p. 204-209, 27 dez. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/jcpt.12118>. Acesso em: 23 maio 2025.

SUN, Yurong *et al.* Serotonin 2A receptor polymorphism rs3803189 mediated by dynamics of default mode network: a potential biomarker for antidepressant early response. **Journal of Affective Disorders**, v. 283, p. 130-138, mar. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.01.047>. Acesso em: 23 maio 2025.

UHR, Manfred *et al.* Polymorphisms in the drug transporter gene ABCB1 predict antidepressant treatment response in depression. **Neuron**, v. 57, n. 2, p. 203-209, jan. 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2007.11.017>. Acesso em: 23 maio 2025.

VILLAFUERTE, Sandra M. *et al.* SSRI response in depression may be influenced by SNPs in HTR1B and HTR1A. **Psychiatric Genetics**, v. 19, n. 6, p. 281-291, dez. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/ypg.0b013e32832a506e>. Acesso em: 23 maio 2025.

WAN, Yuan-sheng *et al.* Associations between the 1438A/G, 102T/C, and rs7997012G/A polymorphisms of HTR2A and the safety and efficacy of antidepressants in depression: a meta-analysis. **The Pharmacogenomics Journal**, 23 out. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41397-020-00197-2>. Acesso em: 23 maio 2025.

YOHN, Christine N.; GERGUES, Mark M.; SAMUELS, Benjamin Adam. The role of 5-HT receptors in depression. **Molecular Brain**, v. 10, n. 1, 24 jun. 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13041-017-0306-y>. Acesso em: 23 maio 2025.



TUBERCULOSE HUMANA NO BRASIL: UMA ANÁLISE DO PARALELISMO EPIDEMIOLÓGICO E SEUS IMPACTOS PARA A SAÚDE PÚBLICA

¹Arthur Augusto Araújo

²Paulo Otávio Bizinotto

³Marcos Corrêa Franco

⁴Cristiane Inês Queiroz

⁵Deborah Borges Palis

⁶Lohan Gonçalves Santos

⁷Vinícius José de Oliveira

¹²³⁴⁵⁶⁷Faculdade Mais de Ituiutaba. Ituiutaba, Minas Gerais, Brasil.

Área temática: Saúde Pública

Resumo: Este estudo teve como objetivo descrever o perfil epidemiológico da tuberculose no Brasil entre 2014 e 2024, com base em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Trata-se de uma pesquisa descritiva, retrospectiva e quantitativa, fundamentada na análise de dados secundários públicos, considerando variáveis como sexo, faixa etária, escolaridade, região, forma clínica, comorbidades, coinfeção por HIV, teste de sensibilidade e desfechos. No período analisado, foram notificados 1.048.714 casos confirmados da doença, com pico em 2023. A maior concentração ocorreu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, enquanto Tocantins, Roraima e Amapá apresentaram os menores registros. A maioria dos casos acometeu homens jovens, autodeclarados pardos, com baixa escolaridade, evidenciando as desigualdades sociais e raciais. Destacou-se a predominância da forma pulmonar (84,3%), além da relevante associação com alcoolismo (19,1%), tabagismo (23%) e coinfeção por HIV (10,9%). A realização de testes de sensibilidade foi baixa, e a taxa de abandono do tratamento chegou a 13,7%. Os resultados apontam que fatores sociodemográficos, comportamentais e estruturais influenciam diretamente a carga da tuberculose no país. Conclui-se que a persistência da doença reflete falhas no acesso aos serviços de saúde e nas políticas públicas de prevenção e controle. Reforça-se a urgência de estratégias integradas de vigilância, testagem, adesão terapêutica e educação em saúde, especialmente voltadas a populações em maior situação de vulnerabilidade.

INTRODUÇÃO

A tuberculose é uma enfermidade infecciosa, transmissível, com potencial de prevenção e cura, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*. A transmissão ocorre principalmente por meio da inalação de partículas expelidas por indivíduos infectados, especialmente ao tossirem. Em 2023, essa infecção voltou a figurar como uma das principais causas de mortalidade por um único agente infeccioso, superando em mais do que o dobro as mortes provocadas pelo HIV/AIDS. Estima-se que, anualmente, cerca de 10 milhões de pessoas contraíam a doença, com tendência de aumento desde 2021 (Who, 2024).

Os índices de incidência e mortalidade por tuberculose estão profundamente ligados aos determinantes sociais da saúde. Aspectos como condições de vida precárias, desigualdade econômica, fatores ambientais e culturais contribuem tanto para a exposição ao bacilo quanto para a dificuldade de acesso a diagnóstico precoce e tratamento eficaz.



Dessa forma, compreender a tuberculose exige uma abordagem que vá além da clínica, incorporando a análise das desigualdades sociais que mantêm a doença concentrada em grupos mais vulneráveis da população (Hargreaves et al., 2011; Pinheiro et al., 2013).

Além dos fatores sociais, características biológicas individuais também influenciam a suscetibilidade à doença. Crianças pequenas, pessoas que vivem com HIV ou com diabetes mellitus, por exemplo, tendem a apresentar maior fragilidade imunológica frente ao *Mycobacterium tuberculosis*. Do mesmo modo, condições como pobreza, insegurança alimentar, moradia inadequada, dificuldades de acesso aos serviços de saúde e privação de liberdade contribuem para a amplificação do risco de infecção e adoecimento (Santos et al., 2021).

No Brasil, essas vulnerabilidades sociais se tornam ainda mais evidentes. Estudos apontam que a baixa renda, a escolaridade limitada e o acesso irregular aos serviços de saúde – em especial no que se refere ao acompanhamento médico contínuo – são fatores que aumentam significativamente o risco de desenvolver tuberculose. Isso reforça a necessidade urgente de políticas públicas integradas e equitativas, capazes de enfrentar as desigualdades estruturais e melhorar as condições de vida das populações mais atingidas (Pinheiro et al., 2013).

OBJETIVO

O objetivo deste estudo foi descrever o perfil epidemiológico dos casos confirmados de tuberculose no Brasil entre os anos de 2014 e 2024, com base em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), identificando padrões de ocorrência segundo variáveis sociodemográficas, clínicas e fatores associados.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e de abordagem quantitativa, baseado na análise de dados secundários obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponível no portal do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram incluídos todos os casos confirmados de tuberculose registrados no Brasil entre os anos de 2014 e 2024. As variáveis analisadas compreenderam o número de casos por ano, unidade federativa, sexo, faixa etária, tipo de entrada, forma clínica, associação com alcoolismo e tabagismo, coinfecção por HIV, realização de teste de sensibilidade e evolução dos casos. Os dados foram organizados em tabelas do Excel obtidas diretamente da plataforma e interpretados de forma descritiva, considerando frequências absolutas e relativas. O estudo utilizou exclusivamente dados públicos e anonimizados, não sendo necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2016).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre 2014 e 2024, o Brasil notificou 1.048.714 casos confirmados de tuberculose no SINAN. O maior número foi registrado em 2023, com 114.266 casos (10,9% do total), seguido de 2022 (102.777; 9,8%) e 2019 (96.833; 9,2%). Em contraste, o menor número de notificações ocorreu em 2014, com 82.348 casos (7,9%). Observa-se um aumento progressivo das notificações a partir de 2021.

O avanço no controle da tuberculose, em determinados períodos, esteve vinculado a um ambiente de crescimento econômico aliado à redução das desigualdades sociais. Esse contexto foi favorecido por iniciativas governamentais que promoveram a inclusão social, a



ampliação da cobertura da atenção primária e o fortalecimento da estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) (Hone et al., 2017).

Em 2020, houve uma redução significativa — estimada em cerca de 25% — nas notificações de casos de tuberculose. Esse declínio está relacionado, em grande parte, às medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, como o distanciamento social e a limitação da circulação de pessoas, que dificultaram o acesso da população aos serviços de saúde. Como consequência, houve atraso no diagnóstico e interrupções no tratamento da tuberculose, resultando em subnotificações e descontinuidade do cuidado adequado (Calixto et al., 2023).

Os dados por unidade federativa mostram que São Paulo lidera as notificações de tuberculose no Brasil, com 239.546 casos (22,8% do total nacional). Em seguida, destacam-se o Rio de Janeiro (163.078; 15,5%) e a Bahia (59.491; 5,7%). Já os menores registros ocorreram no Tocantins (2.470; 0,2%), Roraima (3.269; 0,3%) e Amapá (4.024; 0,4%). O Distrito Federal registrou 5.333 casos (0,5%) e o item “ignorado/exterior” apenas 2 casos.

A distribuição evidencia desigualdades regionais na carga da doença.

Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia concentram a maioria das notificações, refletindo não apenas a densidade populacional, mas também fatores socioeconômicos e estruturais que influenciam a incidência da doença. Estudos apontam que regiões com maior urbanização e desigualdade social apresentam taxas mais elevadas de tuberculose, devido a condições de vida precárias e acesso limitado aos serviços de saúde (Paim et al., 2023; Maciel et al., 2020).

Do total de casos confirmados de tuberculose, 727.538 (69,9%) ocorreram em indivíduos do sexo masculino, 313.248 (30,1%) no sexo feminino e 88 casos (0,01%) com sexo ignorado. Quanto à faixa etária, o grupo mais acometido foi o de 20 a 39 anos, com 474.885 casos (45,3%), seguido pelo de 40 a 59 anos (329.055; 31,4%). Em contraste, os menores registros ocorreram entre menores de 1 ano (4.843; 0,5%) e pessoas com 80 anos ou mais (17.583; 1,7%).

A predominância de casos entre homens jovens, especialmente na faixa etária de 20 a 39 anos, destaca a vulnerabilidade desse grupo à tuberculose. Fatores como maior exposição a ambientes de risco, hábitos de vida e barreiras no acesso aos serviços de saúde contribuem para essa tendência (Castro et al., 2024; Santos et al., 2021). Tais achados indicam a necessidade de intervenções específicas voltadas para a população masculina economicamente ativa.

Em relação à cor/raça, a população autodeclarada parda concentrou o maior número de casos confirmados de tuberculose no Brasil, totalizando 514.286 registros (49,4%), seguida pela população branca com 293.819 casos (28,2%) e preta com 138.253 (13,3%). Em 2024, destaca-se o maior número de casos totais (111.521), sendo os pardos novamente o grupo mais afetado (58.812).

A maior incidência de tuberculose entre indivíduos autodeclarados pardos evidencia as disparidades raciais na saúde pública brasileira. Essa população frequentemente enfrenta condições socioeconômicas desfavoráveis, como baixa escolaridade e acesso limitado aos serviços de saúde, fatores que aumentam a susceptibilidade à doença (Moura et al., 2022; Oliveira et al., 2023). A interseccionalidade entre raça, classe e saúde pública permanece um desafio crítico a ser enfrentado no combate à tuberculose.

No período de 2014 a 2024, a maioria dos casos confirmados de tuberculose foi registrada entre indivíduos com baixa escolaridade, especialmente aqueles com ensino fundamental incompleto (193.565; 18,6%) e ensino médio incompleto (130.980; 12,6%). Destacam-se também os casos em pessoas analfabetas (65.957; 6,3%) e entre os que



cursaram de 1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental (107.517; 10,3%). O padrão evidencia relação inversa entre escolaridade e ocorrência da doença, reforçando a vulnerabilidade social como fator determinante.

Entre os casos confirmados de tuberculose, 823.214 (78,5%) foram classificados como casos novos, seguidos por reinfecção após abandono (99.553; 9,5%) e recidivas (77.888; 7,4%). Quanto à forma clínica, a apresentação pulmonar foi predominante, com 883.930 casos (84,3%), enquanto a forma extrapulmonar representou 123.837 (11,8%) e a associação de ambas totalizou 32.673 casos (3,1%). Apenas 434 notificações (0,04%) não especificaram a forma clínica.

Entre os casos confirmados de tuberculose, 197.933 (19,1%) apresentavam associação com alcoolismo, enquanto 772.710 (74%) não relataram essa condição, e 70.231 (6,7%) não tiveram essa informação registrada. Em relação ao tabagismo, 241.237 (23%) dos pacientes eram tabagistas, 685.218 (65,3%) não faziam uso de tabaco e 114.419 (10,9%) tiveram esse dado ignorado ou em branco. Os resultados indicam a relevância dessas comorbidades no contexto da tuberculose, sobretudo o tabagismo como fator de risco expressivo.

A associação significativa entre tuberculose, alcoolismo e tabagismo ressalta a importância de abordar essas comorbidades no manejo da doença. Estudos demonstram que o consumo de álcool e tabaco está relacionado a piores desfechos no tratamento da tuberculose, incluindo maior taxa de abandono e mortalidade (Barreto et al., 2023; Lima et al., 2020).

Dos casos confirmados de tuberculose, 114.047 (10,9%) apresentaram coinfeção com HIV. Os dados evidenciam a relevância da coinfeção TB-HIV no Brasil e indicam a necessidade de ampliar a testagem entre os pacientes com tuberculose. Indivíduos que vivem com HIV têm risco significativamente aumentado de desenvolver tuberculose, tanto por infecção primária quanto por reativação de infecção latente.

Dos casos de tuberculose confirmados, 127.579 (12,2%) apresentaram sensibilidade às drogas testadas, enquanto 4.347 (0,4%) mostraram resistência à isoniazida, 2.193 (0,2%) à rifampicina, 2.498 (0,2%) a ambas e 3.066 (0,3%) a outras drogas de primeira linha. Em contrapartida, 361.073 (34,4%) não realizaram teste de sensibilidade e 524.596 (50%) tiveram essa informação em branco. Quanto ao desfecho, 643.289 pacientes (61,3%) evoluíram para cura, 143.337 (13,7%) abandonaram o tratamento, e 40.618 (3,9%) foram a óbito por tuberculose.

A resistência a medicamentos, especialmente à isoniazida e rifampicina, representa um desafio significativo no controle da tuberculose. A detecção de casos de tuberculose multirresistente requer vigilância constante e estratégias de tratamento eficazes. Além disso, os desfechos do tratamento, como taxas de cura e abandono, variam conforme fatores sociodemográficos e comorbidades (Oliveira et al., 2024; Santos; Villa, 2021).

CONCLUSÃO

Conclui-se que a tuberculose permanece como um grave problema de saúde pública no Brasil, com crescimento expressivo nas notificações entre 2021 e 2023, especialmente nas regiões Sudeste e Nordeste. Os dados evidenciam uma predominância em adultos jovens do sexo masculino, com associação significativa ao tabagismo, alcoolismo e coinfeção pelo HIV. Observou-se também baixa realização de testes de sensibilidade e alta proporção de abandono do tratamento, fatores que dificultam o controle da doença. Tais achados reforçam a necessidade de políticas públicas integradas, voltadas ao rastreamento precoce, à ampliação da testagem e ao fortalecimento da adesão terapêutica. Além disso, sugere-se o



investimento em ações educativas e preventivas nos grupos mais vulneráveis. Portanto, os resultados apresentados podem subsidiar estratégias mais efetivas de vigilância, manejo clínico e redução da carga da tuberculose no país.

Palavras-chave: Desigualdade social; Epidemiologia; Saúde pública; Tuberculose; Vulnerabilidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARRETO, Mario L.; ALMEIDA, Fátima de Cássia S.; RIBEIRO, Igor M. Fatores associados à coinfeção tuberculose e alcoolismo no Brasil: revisão sistemática. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 57, p. 102-111, 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. *Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016*. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 24 maio 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf/view>. Acesso em: 25 maio 2025.

CALIXTO, M. A. Impactos da pandemia da COVID-19 no controle da tuberculose no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 39, n. 1, 2023.

CASTRO, Aline B. de; FERREIRA, Luana M.; NASCIMENTO, José R. Tuberculose em jovens adultos no Brasil: perfil clínico e implicações sociais. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, São Paulo, v. 27, p. e230049, 2024.

HARGREAVES, J. R. et al. The social determinants of tuberculosis: from evidence to action. *American Journal of Public Health*, Washington, v. 101, n. 4, p. 654–656, 2011.

HONE, T. et al. Large reductions in amenable mortality associated with Brazil's primary care expansion and strong health governance. *Health Affairs (Millwood)*, Bethesda, v. 36, n. 1, p. 149–158, 2017.

LIMA, Danielle C.; SOUSA, Heleno A.; MATTOS, Juliana R. Tabagismo e tuberculose: implicações clínicas e epidemiológicas. *Cadernos de Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, p. 235-241, 2020.

MACIEL, Ethel L. N.; DIAS, Marly C.; ANDRADE, Bianca M. Desigualdades socioespaciais e a incidência de tuberculose no Brasil. *Revista Panamericana de Salud Pública*, Washington, v. 44, p. e19, 2020.

MOURA, Tayná F.; ANDRADE, João P.; ALBUQUERQUE, Amanda R. Disparidades raciais e tuberculose: uma análise da população parda e preta no Brasil. *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 46, n. esp4, p. 75-86, 2022.

OLIVEIRA, Jéssica M. et al. Perfil da tuberculose resistente no Brasil: panorama entre 2018 e 2023. *Brazilian Journal of Infectious Diseases*, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 33-41, 2024.

OLIVEIRA, Mariana A. S.; SILVA, Renata G.; FERREIRA, Bruno T. Determinantes sociais da tuberculose em comunidades negras brasileiras. *Revista Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 28, n. 5, p. 1551-1562, 2023.

PAIM, Jairnilson S.; TRAVASSOS, Claudia; ALMEIDA, Celia M. Regionalização, pobreza e tuberculose no Brasil: desafios da equidade. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 57, p. e21, 2023.

PINHEIRO, R. S. et al. Determinantes sociais e autorrelato de tuberculose nas regiões metropolitanas conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Brasil. *Revista Panamericana de Salud Pública*, Washington, v. 34, n. 6, p. 446–451, 2013.

SANTOS, Ana C.; MENEZES, Pedro R. Perfil sociodemográfico e fatores associados à tuberculose em homens no Brasil. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 43, p. 2891, 2021.

SANTOS, Vinícius R.; VILLA, Túlio F. Fatores associados ao abandono do tratamento da



tuberculose em grandes centros urbanos. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, Brasília, v. 47, n. 4, p. e20210023, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Global tuberculosis report 2024*. Geneva: World Health Organization, 2024. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/379339/9789240101531-eng.pdf?sequence=1>. Acesso em: 20 maio 2025.



AVALIAÇÃO DO POTENCIAL TERAPÊUTICO DO DISSULFIRAM, UM INIBIDOR DA GASDERMINA D, NA SEPSE EXPERIMENTAL

¹Isaac Alef Barbosa Gomes

¹Beatriz de Carvalho Oliveira

¹Sabrine Vitória dos Santos Ramos

¹Antonio Vinicius Vieira Araujo

¹Universidade Federal do Delta do Parnaíba - UFDPAr. Parnaíba, Piauí, Brasil.

Área temática: Farmologia

Resumo: A gasdermina D (GSDMD) é uma proteína formadora de poros envolvida na piroptose, um tipo de morte celular inflamatória que contribui para a resposta imune na sepse. No entanto, sua ativação exacerbada leva à inflamação sistêmica e danos multiorgânicos durante a sepse. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito terapêutico do dissulfiram (DSF), um inibidor da GSDMD, na sepse experimental. Para isso, foi realizada uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados PubMed, Web of Science, Embase e Scopus, utilizando os descritores “Sepsis” AND “Disulfiram” AND “Gasdermin D”. Foram incluídos artigos originais, publicados entre 2020 e 2025, em inglês, com texto completo disponível, e que avaliaram o DSF em monoterapia em modelos de sepse. Estudos duplicados, revisões ou que utilizaram outros inibidores foram excluídos. A triagem sistemática e análise crítica permitiram selecionar os artigos mais relevantes. Os resultados demonstraram que o DSF inibe a ativação da GSDMD, reduzindo a formação de poros e, consequentemente, a liberação de proteínas inflamatórias como eCRIP e citocinas, bem como inibe a formação de armadilhas extracelulares de neutrófilos. Esses efeitos foram associados à diminuição da inflamação sistêmica, preservação da função orgânica e aumento da sobrevivência em modelos murinos. Conclui-se que o DSF apresenta potencial terapêutico promissor na sepse ao modular vias inflamatórias dependentes da GSDMD.

INTRODUÇÃO

A gasdermina D (GSDMD) é uma proteína formadora de poros, mediando subsequentemente a piroptose, uma forma especializada de morte celular inflamatória (Wang; He, 2023). A formação de poros mediada pela GSDMD na membrana celular compromete a integridade da membrana plasmática, causando lise celular e liberação do conteúdo citoplasmático que amplifica os sinais inflamatórios (Dai *et al.*, 2023). Embora a piroptose induzida pela GSDMD represente um mecanismo de defesa contra patógenos, a ativação anormal da GSDMD resulta em inflamação persistente que tem sido implicada na fisiopatologia de uma miríade de doenças, incluindo a sepse (Zhu *et al.*, 2024).

Nesse cenário, destaca-se a sepse, uma síndrome caracterizada por uma resposta exacerbada do hospedeiro frente a uma infecção, levando a uma resposta inflamatória desregulada, disfunção de múltiplos órgãos e risco significativo de mortalidade (Singer *et al.*, 2016). Apesar dos avanços, o tratamento da sepse ainda apresenta progressos limitados, em grande parte devido à complexidade de seus mecanismos patogênicos (Kuang *et al.*, 2024). Nesse contexto, compreender os processos moleculares subjacentes à sepse é essencial para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas.



A inflamação mediada pela GSDMD desempenha um papel crucial na patogênese da sepse. Em camundongos nocautes, a deleção genética de GSDMD resultou em redução significativa do dano tecidual, redução da disfunção de múltiplos órgãos e diminuição da mortalidade (Kayagai *et al.*, 2015; Ratheky *et al.*, 2018). Com base nesses achados, inibidores da GSDMD, como a necrosulfonamida e o dissulfiram (DSF), têm demonstrado efeitos promissores no tratamento da sepse (Humphries *et al.*, 2020; Ratheky *et al.*, 2018).

O DSF é um medicamento aprovado pelo *Food And Drug Administration* para o tratamento do alcoolismo há mais de 6 décadas que recentemente foi descrito como um potente anti-inflamatório capaz de inibir a GSDMD (Hu *et al.*, 2020). De fato, estudos demonstraram o potencial do DSF em inibir o processo inflamatório e a lesão tecidual em modelos de doença de Parkinson e diabetes, dentre outros (Yang *et al.*, 2023; Zhang *et al.*, 2024). Na sepse, as evidências apontam que o DSF exerce efeito terapêutico significativo ao reduzir a disfunção de múltiplos órgãos e a mortalidade, por meio da inibição de mecanismos inflamatórios a jusante da GSDMD, o que reforça seu potencial como uma estratégia promissora no manejo dessa condição complexa (Hu *et al.*, 2020; Silva *et al.*, 2020).

OBJETIVO

Avaliar, por meio de revisão de literatura, o efeito terapêutico do DSF, um inibidor da GSDMD, na sepse experimental.

METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem de análise integrativa da literatura, fundamentada em periódicos publicados nas bases de dados internacionais PubMed, Web of Science e Biblioteca Virtual em Saúde, com o objetivo de investigar o efeito do DSF no tratamento da sepse experimental. A busca bibliográfica foi conduzida utilizando os descritores “Sepsis” AND “Disulfiram” AND “Gasdermin D”. Para a seleção dos estudos incluídos nesta revisão, foram adotados critérios de inclusão que consideraram: (I) Artigos originais; (II) Publicações em inglês; (III) A disponibilidade do texto completo para análise; (IV) Estudos publicados entre 2020-2025; (V) Artigos utilizando o DSF em monoterapia. Como critérios de exclusão, foram desconsiderados: (I) Artigos duplicados encontrados em diferentes bases de dados; (II) Cujo foco não se relacionava com a temática; (III) Revisão e artigos sem dados primário; (IV) Trabalhos com outros inibidores da GSDMD. Após a identificação inicial, os estudos passaram por um processo de triagem sistemática. Posteriormente, foi conduzida uma análise crítica, visando identificar padrões recorrentes, lacunas na literatura e possíveis direcionamentos para futuras investigações. A adoção dessa abordagem metodológica permitiu uma análise abrangente e criteriosa da literatura, garantindo robustez na fundamentação teórica, e a definição dos critérios de inclusão e exclusão visou assegurar a relevância, atualidade e adequação dos estudos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca inicial resultou na identificação de 12 periódicos na Web of Science, 9 na PubMed, 24 na EMBASE e 21 na Scopus. A avaliação foi conduzida em duas etapas: inicialmente, os títulos e resumos foram analisados com base nos critérios de elegibilidade, resultando em 23 artigos elegíveis, entre os quais 6 publicações foram identificadas no PubMed, 5 na Web of Science, 6 na EMBASE e 6 no Scopus. Contudo, os artigos encontrados as bases eram comuns entre as plataformas; além disso, 1 artigo foi identificado

em todas as bases de dados utilizadas. Dessa forma, após a remoção das duplicatas, apenas 6 artigos foram analisados na íntegra, todos descritos na **Tabela 1**.

Tabela 1 – Estudos do Potencial Terapêutico do DSF na Sepse Experimental

Autor	Objetivo	Modelo
Hu <i>et al.</i> , 2021	Avaliar o papel de microvesículas derivadas de macrófagos piroptóticos na formação de armadilhas extracelulares de neutrófilos por meio da transferência mitocondrial que expressa GSDMD durante a sepse	Toxemia Ligadura e punção cecal (LPC)
Ou <i>et al.</i> , 2021	Desenvolver nanopartículas de lactoferrina carregadas com DSF para tratamento de doenças inflamatórias	Toxemia
Silva <i>et al.</i> , 2021	Avaliar o efeito da inibição da GSDMD na disfunção de múltiplos órgãos na sepse por meio do bloqueio da formação de NETs	Toxemia LPC
Ng <i>et al.</i> , 2024	Avaliar o efeito do DSF na inibição da formação de poros pela GSDMD sua capacidade de bloquear a piroptose e a liberação de citocinas inflamatórias, e seu potencial protetor em camundongos sépticos	Toxemia LPC
Yang <i>et al.</i> , 2025	Avaliar o efeito terapêutico do DSF isolado e combinado com resatorvid na sepse em camundongos sépticos	Toxemia LPC
Tan <i>et al.</i> , 2023	Determinar o efeito da liberação ativa de eCIRP via canais de GSDMD na indução da inflamação na sepse	Toxemia LPC

Os modelos animais têm sido amplamente utilizados na pesquisa pré-clínica para o estudo da patogênese da sepse e a identificação de potenciais terapias (Vintrych *et al.*, 2023). Dentre os principais modelos destacam-se: a toxemia por administração de endotoxinas, como o lipopolissacarídeo (LPS), a inoculação direta de microrganismos e o modelo de LPC (Buras, Holzmann e Sitkovsky, 2005). Nos seis estudos analisados, a infusão de LPS foi o método empregado para a indução da sepse (**Tabela 1**). No entanto, como nenhum modelo isolado é capaz de reproduzir, de forma integral, a complexidade da condição séptica, a combinação de modelos é considerada a abordagem mais adequada (Buras, Holzmann e



Sitkovsky, 2005). Dessa forma, cinco dos estudos incluídos na presente revisão utilizaram o modelo de LPC como método complementar (**Tabela 1**).

Na sepse, a liberação excessiva de padrões moleculares associados a patógenos e a danos celulares (DAMPs) é reconhecida por células imunes, resultando na ativação dos inflamassomas canônico e não canônico, mediados, respectivamente, pelas caspases-1 e -11 (Zheng; Liwinski, T; Elinav, 2020). Esse processo culmina na ativação da GSDMD, cuja porção N-terminal transloca-se para a membrana plasmática, formando poros e induzindo piroptose em macrófagos e monócitos (Zhu *et al.*, 2024). Dessa forma, a modulação da piroptose dependente de GSDMD em monócitos e macrófagos pelo DSF tem demonstrado benefícios na sepse experimental, reduzindo a disfunção de múltiplos órgãos e a liberação de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina-6 e -1 beta, promovendo melhora na sobrevida dos camundongos sépticos (Hu *et al.*, 2020; Ou *et al.*, 2021; Yang *et al.*, 2025).

Durante a piroptose, além da liberação de citocinas pró-inflamatórias, ocorre a liberação do conteúdo intracelular, que atua como DAMPs e intensifica a resposta inflamatória (Field; Gordon, 2022). Nesse contexto, Tan e colaboradores (2023) demonstraram que entre esses componentes inclui a proteína extracelular induzível pelo frio (eCRIP), que se transloca do núcleo para o citoplasma, liga-se à GSDMD e é liberada através dos poros formados de maneira GSDMD-dependente e que o DSF é capaz de inibir a liberação de eCRIP e citocinas pró-inflamatórias, atuando como um modulador da piroptose e apresentando potencial terapêutico na sepse.

Em neutrófilos, a GSDMD induz um tipo distinto de morte celular: a NETose lítica, caracterizada pela liberação de estruturas semelhantes a teias, compostas por conteúdo intracelular, que capturam e eliminam patógenos, as armadilhas extracelulares de neutrófilos (NETs) (Chen *et al.*, 2018). Nesse sentido, Silva e colaboradores (2021) observaram que a inibição da formação de NETs dependente de GSDMD com DSF previne a progressão da sepse, reduzindo a disfunção de múltiplos órgãos, o processo inflamatório e a mortalidade em camundongos sépticos. Além da ação direta em neutrófilos, Kuang e colaboradores (2024) demonstraram que o DSF inibe a formação de NETs mediada por mitocôndrias que expressam GSDMD liberadas em microvesículas por macrófagos piroptóticos, contribuindo para a melhora da sobrevida dos camundongos sépticos.

CONCLUSÃO

A GSDMD desempenha um papel central na resposta inflamatória da sepse por meio da piroptose e formação de NETs. A inibição dessa via pelo DSF, tem se mostrado promissora na redução da inflamação, disfunção orgânica e mortalidade em modelos experimentais, configurando-se como uma potencial estratégia terapêutica na sepse.

Palavras-chave: Inflamação; Piroptose; Sepse.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BURAS, J.; HOLZMANN, B.; SITKOVSKY, M. Animal Models of sepsis: setting the stage. **Nat Rev Drug Discov**, v. 4, n. 854–865, 2005.

CHEN, K. W. *et al.* Noncanonical inflammasome signaling elicits gasdermin D-dependent neutrophil extracellular traps. **Science Immunology**, v. 3, n. 26, p. eaar6676, 2018.

DAI, Z. *et al.* Gasdermin D-mediated pyroptosis: mechanisms, diseases, and inhibitors.



Front Immunol, v. 14, p. 1178662, 2023.

FIELD, J. T.; GORDON, J.W. BNIP3 and Nix: Atypical regulators of cell fate. **Biochim Biophys Acta Mol Cell Res**, v. 1869, n. 10, p. 119325, 2022.

HU, J. J. *et al.* FDA-approved disulfiram inhibits pyroptosis by blocking gasdermin D pore formation. **Nat Immunol**, v. 21, n. 7, p. 736-745, 2020.

HUMPHRIES, F. *et al.* Succination inactivates gasdermin D and blocks pyroptosis. **Science**, v. 369, n. 6511, p. 1633-1637, 2020.

KAYAGAKI N, *et al.* Caspase-11 cleaves gasdermin D for non-canonical inflammasome signalling. **Nature**, v. 526, p. 666–671, 2015.

KUANG, L. *et al.* Pyroptotic Macrophage-Derived Microvesicles Accelerate Formation of Neutrophil Extracellular Traps via GSDMD-N-expressing Mitochondrial Transfer during Sepsis. **Int J Biol Sci**, v. 20, n. 2, p. 733-750, 2024.

OU, A. T. *et al.* Disulfiram-loaded lactoferrin nanoparticles for treating inflammatory diseases. **Acta Pharmacol Sin**, v. 42, n. 11, p. 1913-1920, 2021.

RATHKEY, J. K. *et al.* Chemical disruption of the pyroptotic pore-forming protein gasdermin d inhibits inflammatory cell death and sepsis. **Sci Immunol**, 3, n. 26, p. eaat2738, 2018.

SILVA, C. M. S. *et al.* Gasdermin D inhibition prevents multiple organ dysfunction during sepsis by blocking NET formation. **Blood**, v. 138, n. 25, p. 2702-2713, 2021.

SINGER, M. *et al.* The third international consensus definitions for 492 sepsis and septic shock (Sepsis-3). **JAMA**, v. 315, n. 801-810, 2016.

TAN, C. *et al.* Active Release of eCIRP via Gasdermin D Channels to Induce Inflammation in Sepsis. **J Immunol**, v. 208, n. 9, p. 2184-2195, 2022.

VINTRYCH, P. *et al.* Modeling sepsis, with a special focus on large animal models of porcine peritonitis and bacteremia. **Front Physiol**, v. 13, p. 1094199, 2023.

WANG, W.; HE, Z. Gasdermins in sepsis. **Front Immunol**, v. 14, p. 1203687, 2023.

YANG, L. *et al.* Effect of co-treatment with disulfiram and resatorvid on the pyroptosis of monocytes in sepsis. **Biochim Biophys Acta Mol Basis Dis**, v.1 871, n. 3, p. 167704, 2025.

YANG, S. *et al.* Disulfiram accelerates diabetic foot ulcer healing by blocking NET formation via suppressing the NLRP3/Caspase-1/GSDMD pathway. **Transl Res**, 254, p. 115-127, 2023.

ZHANG, X. *et al.* Pyroptosis-mediator GSDMD promotes Parkinson's disease pathology via microglial activation and dopaminergic neuronal death. **Brain Behav Immun**, v. 119, p. 129-145, 2024.

ZHENG, D.; LIWINSKI, T.; ELINAV, E. Inflammasome activation and regulation: toward



a better understanding of complex mechanisms. **Cell Discov**, v. 6, p. 36, 2020.

ZHU, C. *et al.* The gasdermin family: emerging therapeutic targets in diseases. **Signal Transduct Target Ther**, v. 9, n. 1, p. 87, 2024.



ORIENTAÇÕES PARA O MANEJO NÃO-FARMACOLÓGICO DA DOR CRÔNICA EM SALA DE ESPERA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

¹Erike Tadeu Tavares e Silva

¹Gabriel Souza de Paula

¹Gabrielle Modesto Rodrigues

¹Mariana Souza Amorim

¹Tafnes Alves Ferreira de Andrade

²Lucineide Alves Vieira

²Rachel Cavalcanti Fonsceca

¹Afya Paraíba. João Pessoa, Paraíba, Brasil; ²Afya Paraíba. João Pessoa, Paraíba, Brasil;

Área temática: Educação em Saúde

Resumo: A dor crônica, definida como uma experiência sensorial desagradável que persiste por mais de três meses, é um problema de saúde pública ainda cercado de desconhecimento e a Atenção Primária à Saúde é imprescindível em seu diagnóstico e manejo. Este relato descreve uma ação educativa realizada na sala de espera de uma Unidade de Saúde da Família (USF) em João Pessoa, PB, com o objetivo de informar usuários sobre estratégias não farmacológicas para o manejo desse tipo de dor, como fisioterapia, terapia cognitivo-comportamental e práticas integrativas. Os participantes demonstraram interesse, revelando desconhecimento sobre dor crônica e tratamentos não medicamentosos. A ação reforçou a importância da educação em saúde na APS para reduzir a subnotificação, o uso excessivo de analgésicos, além de promover o autocuidado. Destacou-se também a necessidade de acolhimento dos pacientes que apresentam esse quadro e uma abordagem multiprofissional. A experiência evidenciou a eficácia de intervenções breves em espaços comunitários, contribuindo para a formação médica e o fortalecimento do SUS. Recomenda-se a replicação de ações semelhantes, integrando educação em saúde e manejo multidisciplinar da dor crônica para promoção de cuidado integral.

INTRODUÇÃO

A dor crônica é um tema amplo e relevante para grande parte da população, embora ainda envolto em desconhecimento, especialmente quanto aos direitos dos pacientes e às formas de tratamento disponíveis. Com base nessa realidade, realizamos uma ação educativa rápida e objetiva na sala de espera de uma Unidade de Saúde da Família (USF), com o objetivo de dialogar com os usuários sobre o manejo não farmacológico da dor crônica.

Esse tipo de manejo inclui diversas abordagens, como terapias físicas, técnicas cognitivo-comportamentais, relaxamento, exercícios físicos e acupuntura. Dentre essas opções, destacam-se a fisioterapia e a terapia cognitivo-comportamental, amplamente utilizadas e com respaldo científico. “A dor, por sua vez, é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, modulada por fatores biopsicossociais e subjetivos. Quando persiste por um período superior a três meses, é classificada como crônica” (Ministério da Saúde, 2024).

O estigma e a negligência em relação à dor crônica tendem a agravar seu impacto, tanto na vida do paciente quanto nos custos para o sistema de saúde pública, que, por sua vez, oferece alternativas terapêuticas para seu manejo. Nesse contexto, a Atenção Primária à Saúde (APS) exerce papel fundamental no diagnóstico precoce, encaminhamento e



tratamento adequado dos casos de dor crônica (Brasil, 2024).

OBJETIVO

Relatar uma experiência acadêmica envolvendo o manejo não-farmacológico da dor crônica com os usuários presentes em uma sala de espera de uma USF no município de João Pessoa, Paraíba.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa do tipo relato de experiência vivenciado por acadêmicos de Medicina da Afya Paraíba, no contexto de uma atividade de extensão universitária realizada em uma Unidade de Saúde da Família (USF), localizada em João Pessoa – PB.

A ação foi desenvolvida na sala de espera da unidade, com foco em práticas educativas voltadas ao manejo não-farmacológico da dor crônica. A atividade foi previamente planejada e estruturada com base em uma abordagem dialógica e participativa, utilizando a metodologia da problematização como eixo central.

A intervenção teve duração média de 30 minutos e contou com a participação espontânea dos usuários presentes na sala de espera, alcançando no total uma média de quinze pessoas. O conteúdo abordado incluiu estratégias não-medicamentosas para o alívio da dor crônica, como terapias físicas, técnicas de respiração e relaxamento, práticas integrativas e complementares, além de orientações sobre aspectos emocionais e comportamentais que influenciam a percepção da dor.

Durante a ação, os discentes atuaram como facilitadores do diálogo, promovendo um ambiente acolhedor e horizontal, incentivando a escuta ativa e a troca de saberes entre os participantes. As percepções e contribuições dos usuários foram registradas de forma descritiva por meio de diário de campo, permitindo uma análise qualitativa da receptividade e da efetividade da atividade como ferramenta de educação em saúde.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade educativa realizada na sala de espera da Unidade de Saúde da Família foi bem recebida pelos usuários presentes. O grupo de alunos, de forma clara e acessível, compartilhou informações sobre o conceito de dor crônica e destacou estratégias de manejo não farmacológico disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). Observou-se, durante a ação, grande interesse dos participantes, evidenciado pelas perguntas frequentes, comentários sobre experiências pessoais com dor e busca por orientação quanto às terapias complementares.

Foi possível perceber que muitos usuários desconheciam a definição de dor crônica e a possibilidade de tratamentos que não envolvem medicamentos, como fisioterapia, práticas integrativas e terapia cognitivo-comportamental. Essa lacuna no conhecimento é coerente com dados da literatura, que apontam o baixo nível de informação da população sobre o tema, o que pode contribuir para a subnotificação, cronificação da dor e uso excessivo de analgésicos (Felix et al., 2020).

A discussão sobre o manejo da dor na APS mostrou-se fundamental, reforçando o papel da educação em saúde como ferramenta para a promoção do autocuidado e empoderamento dos usuários. Intervenções educativas breves, como a realizada, demonstram-se eficazes na sensibilização da população, além de fortalecerem o vínculo entre profissionais de saúde e comunidade (BRASIL, 2024). Também se destacou a importância do acolhimento, escuta qualificada e abordagem multiprofissional na atenção



aos portadores de dor crônica, condutas alinhadas às diretrizes da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (BRASIL, 2018).

Portanto, a experiência reforça a relevância da atuação discente em atividades de extensão voltadas à educação em saúde, contribuindo não apenas para a formação profissional dos alunos, mas também para o fortalecimento do SUS e da APS como espaços de cuidado integral.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, evidencia-se que a experiência vivenciada pelos discentes de Medicina durante a ação de extensão na USF reforçou a importância de abordar o manejo não farmacológico da dor crônica em espaços comunitários. A atividade permitiu não apenas disseminar conhecimentos essenciais sobre terapias complementares, como fisioterapia e técnicas cognitivo-comportamentais, mas também promover um diálogo direto com os usuários, reduzindo lacunas de informação e estigmas associados à condição.

Retomando os objetivos iniciais, o relato cumpriu seu propósito de descrever a vivência dos acadêmicos. A interação na sala de espera mostrou-se uma estratégia eficaz para sensibilizar a população, destacando o papel da APS como porta de entrada para o cuidado integral e humanizado.

Com isso, é evidente a necessidade de iniciativas semelhantes serem replicadas em outras unidades de saúde, uma vez que a educação em saúde é uma ferramenta fundamental para o empoderamento dos pacientes na melhoria da própria qualidade de vida. É possível concluir que ações extensionistas, como esta, fortalecem a formação médica ao integrar teoria e prática, além de reforçar o compromisso social da profissão.

Sugere-se, por fim, que profissionais e gestores incentivem projetos contínuos de educação em saúde, garantindo que o manejo da dor crônica seja abordado de forma multidisciplinar e acessível. Assim, será possível transformar realidades, mitigar sofrimentos desnecessários e promover saúde de maneira equânime e sustentável.

Palavras-chave: Educação em Saúde; Dor Crônica; Atenção Primária à Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, M. F. C. M. de; CORTEZ, P. J. O. Atualizações acerca do tratamento não farmacológico para o manejo da dor crônica: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 6, e6013645977, 2024. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/45977/36598/478231>. Acesso em: 13 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Dor crônica: diretrizes para atenção na Atenção Primária à Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde. Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas: Dor Crônica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/protocolos/dorcronica-1.pdf>. Acesso em: 8 maio 2025.



BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS: PNPIC - acesso ampliado**. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

FELIX, M. M. et al. Educação em saúde sobre dor crônica na atenção primária: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 6, p. e20190060, 2020.



SAÚDE ÚNICA: A POLUIÇÃO COMBINADA POR MICROPLÁSTICOS E METILMERCÚRIO COMO EXPRESSÃO DE INJUSTIÇA AMBIENTAL, RISCO SISTÊMICO E AMEAÇA À SUSTENTABILIDADE

¹Alan Aparecido da Silva Nunes

²Aldo Aparecido Proietti Junior

¹Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. São Paulo, São Paulo, Brasil

²Universidade Federal do Amapá. Macapá, Amapá, Brasil

Área temática: Toxicologia Ambiental

Resumo: A presença de microplásticos em ecossistemas aquáticos tem se intensificado como uma externalidade difusa da sociedade de consumo, representando um vetor relevante para a mobilização e persistência de contaminantes tóxicos, como o metilmercúrio. Essa interação agrava a bioacumulação e os efeitos celulares em organismos aquáticos, com potenciais repercussões na saúde ambiental e humana. Apesar da crescente produção científica sobre esses contaminantes de forma isolada, ainda é escassa a integração entre seus efeitos combinados nas abordagens normativas e sanitárias, o que configura uma lacuna crítica para a regulação ambiental e a vigilância em saúde. Este trabalho teve como objetivo analisar os impactos associados à presença simultânea de microplásticos e metilmercúrio, com foco nas consequências toxicológicas, ecológicas e sociais, e na articulação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3, 6, 10, 11, 12, 14 e 15. A metodologia consistiu em uma revisão bibliográfica direcionada, complementada por dados técnicos e institucionais atualizados, com seleção de estudos publicados entre 2018 e 2024. Os resultados indicam que os microplásticos intensificam a retenção e a toxicidade do metilmercúrio, ampliando a exposição humana por meio da cadeia alimentar. Populações tradicionalmente dependentes da pesca estão entre as mais vulneráveis, reforçando a necessidade de respostas intersetoriais. Conclui-se que a mitigação dessa forma emergente de contaminação demanda ações articuladas de vigilância, educação ambiental e políticas públicas baseadas na equidade e na Saúde Única. Este estudo busca contribuir para a produção de conhecimento aplicável, que subsidie políticas públicas e ações práticas voltadas à justiça ambiental e à proteção da vida.

Palavras-chave: Bioacumulação; Justiça ambiental; Metilmercúrio; Microplásticos; Saúde pública.

INTRODUÇÃO

A crescente presença de microplásticos (MPs) em ambientes naturais, especialmente nos ecossistemas aquáticos, consolidou esses polímeros sintéticos como importantes vetores de poluição difusa no século XXI. Sua relevância ultrapassa os impactos físicos: evidências científicas demonstram que MPs atuam como superfícies adsorventes para contaminantes tóxicos persistentes, como o metilmercúrio (MeHg), ampliando sua estabilidade no ambiente e seu potencial de toxicidade. O MeHg, por sua vez, é um metal pesado neurotóxico altamente perigoso, reconhecido internacionalmente por seu efeito cumulativo e pela capacidade de



biomagnificação ao longo da cadeia trófica.

A associação entre esses dois poluentes (MPs e MeHg) resulta em riscos significativos à saúde de organismos aquáticos e, por consequência, à saúde humana, especialmente em populações que dependem diretamente do consumo de pescado.

Apesar disso, ainda é limitada a integração entre os efeitos combinados de MPs e MeHg em abordagens regulatórias, sanitárias e de vigilância ambiental, evidenciando uma lacuna científica que compromete o reconhecimento dessa forma de contaminação como um risco sistêmico. Tal lacuna torna-se ainda mais preocupante diante da vulnerabilidade social de comunidades ribeirinhas e pescadores artesanais, muitas vezes expostos sem informação, monitoramento ou acesso a serviços adequados.

Essa problemática compromete não apenas a saúde ambiental, coletiva e pública, mas também viola os princípios da equidade e os compromissos assumidos no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), em especial os ODS 3, 6, 10, 11, 12, 14 e 15.

Diante disso, este trabalho busca responder: de que forma a associação entre MPs e MeHg compromete a saúde ambiental, coletiva e a efetivação dos ODSs?

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos associados à presença simultânea de MPs e MeHg em ambientes aquáticos, com foco nos efeitos toxicológicos, ecológicos e sociais decorrentes dessa contaminação antropogênica. A proposta envolve avaliar os mecanismos de bioacumulação e biomagnificação em organismos aquáticos, identificar os riscos à saúde pública e coletiva, especialmente em populações vulneráveis, e discutir as implicações dessa forma emergente de poluição para a efetividade dos ODSs, em especial os ODSs 3, 6, 10, 11, 12, 14 e 15.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão bibliográfica direcionada, com recorte temporal entre 2018 e 2025, priorizando estudos científicos que abordassem a interação entre MPs e metais pesados, especialmente o MeHg, no contexto da toxicologia ambiental, saúde pública, saúde coletiva e impactos ecotoxicológicos. As buscas foram conduzidas nas bases de dados Scopus e ScienceDirect, utilizando os descritores: *microplastics*, *methylmercury*, *bioaccumulation*, *toxicity*, *One Health* e *sustainable development goals*. Os critérios de inclusão envolveram: apresentação de dados sobre bioacumulação ou transporte de contaminantes por microplásticos; relação com os ODSs 3, 6, 10, 11, 12, 14 ou 15; e alinhamento com as áreas temáticas do evento. Além da literatura científica indexada, foram consultadas referências técnicas e dados institucionais provenientes de organismos internacionais e nacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e agências ambientais brasileiras, com o objetivo de complementar as evidências com diagnósticos atualizados sobre contaminação hídrica, bioacumulação e riscos à saúde humana e ambiental. Como limitação, reconhece-se que, por se tratar de uma revisão teórica, os achados estão condicionados à disponibilidade, abrangência e qualidade metodológica das fontes analisadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os MPs, por sua alta área superficial e propriedades hidrofóbicas, atuam como substrato para adsorção de contaminantes químicos como o MeHg, facilitando sua incorporação na cadeia trófica aquática (KOELMANS et al., 2016; HOLMES et al., 2012).



Estudos experimentais demonstram que a exposição conjunta a MPs e MeHg intensifica significativamente a bioacumulação do contaminante em organismos aquáticos. Em robalo (*Dicentrarchus labrax*), observou-se concentração hepática de até 8,16 µg/g de mercúrio e fator de bioacumulação (BAF) superior a 500, indicando forte retenção tóxica (BARBOZA et al., 2018). De acordo com diretrizes da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (USEPA), da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), concentrações superiores a 0,5–1,0 µg/g já são consideradas tóxicas para organismos aquáticos, e um BAF acima de 100 já caracteriza a substância como bioacumulativa.

Complementando essa análise, o estudo com *Danio rerio* revelou que os MPs agravam os efeitos celulares do MeHg. O grupo exposto à combinação MeHg + MPs apresentou níveis de malondialdeído (MDA) — marcador de estresse oxidativo — de 10,5 nmol/mg de proteína, valor 35% maior que o MeHg isolado e mais que o dobro do grupo controle (LEI et al., 2025). Esse dado reforça a ação sinérgica entre MPs e MeHg na intensificação de danos oxidativos, demonstrando o aumento nos níveis de MDA, complementa perfeitamente esse relação entre os micro contaminantes, ao mostrar o efeito celular causado pela bioacumulação medida em robalos.

Esses impactos tóxicos incluem alterações neurocomportamentais, imunossupressão, danos hepáticos e desregulação do metabolismo energético, afetando diretamente a biota marinha e na água doce. Quando transferidos pela cadeia alimentar, esses contaminantes representam risco real à saúde humana, violando diretamente o ODS 3 (Saúde e Bem-Estar).

Dados regionais evidenciam que essa ameaça não é teórica, os estudos no Rio Amazonas (Brasil) detectaram até 8.178 micropartículas/kg de sedimento contendo esses tipos de MPs (polietileno, polipropileno e poliestireno), enquanto a presença de mercúrio em peixes predadores alcançou níveis de até 2,45 mg/kg em *Cichla monoculus*, valor superior ao limite de segurança da ANVISA (1,0 mg/kg) (SILVA et al., 2024; SOUSA et al., 2024). Tais peixes compõem a base alimentar de populações ribeirinhas da Amazônia, que, devido à dependência direta de recursos hídricos e à ausência de monitoramento sanitário sistemático, estão expostas a riscos cumulativos e crônicos.

Essas comunidades — como pescadores artesanais e famílias ribeirinhas — enfrentam barreiras históricas no acesso à informação, saneamento e vigilância toxicológica, configurando uma situação de injustiça ambiental e violação do ODS 10 (Redução das Desigualdades).

No meio urbano, a má gestão de resíduos plásticos e a ausência de políticas públicas de controle de micro contaminantes evidenciam o descumprimento do ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). A persistência de padrões de produção e descarte insustentáveis também compromete o ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis). Do ponto de vista ecológico, os impactos se estendem à ODS 14 (Fauna Aquática) e também às áreas de transição entre o ambiente aquático e terrestre, como as margens de rios e zonas úmidas, que são essenciais para a conservação e compromete o ODS 15 (Biodiversidade Terrestre).

Diante desse cenário, os dados reafirmam a urgência de políticas baseadas na abordagem de Saúde Única, articulando saúde humana, animal e ambiental em estratégias preventivas, regulatórias e educativas que visem mitigar os efeitos da poluição difusa e proteger populações vulneráveis.

CONCLUSÃO

Este estudo analisou os impactos decorrentes da associação entre MPs e MeHg em ambientes aquáticos, demonstrando que essa contaminação antropogênica intensifica a bioacumulação de mercúrio, compromete a segurança alimentar e agrava desigualdades em



grupos historicamente vulneráveis, como ribeirinhos e pescadores artesanais. Esses efeitos ampliam os riscos à saúde ambiental, coletiva e pública, desafiando a efetividade dos ODSs, especialmente os ODSs 3, 6, 10, 11, 12, 14 e 15. Portanto, é urgente reconhecer essa problemática como uma prioridade sanitária e ambiental, exigindo ações intersetoriais baseadas na abordagem da Saúde Única, com ênfase na criação de políticas públicas específicas, no fortalecimento da vigilância toxicológica e no investimento em educação ambiental voltada à equidade. Este estudo busca contribuir para a produção de conhecimento aplicável, que não apenas revele os riscos envolvidos, mas também subsidie decisões políticas e sociais que promovam justiça ambiental, prevenção de danos e proteção da vida em todas as suas formas. Nesse sentido, reforça-se o compromisso com uma ética socioambiental alinhada aos ODS e à mitigação das desigualdades estruturais que atravessam a crise ecológica contemporânea.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOZA, L. G. A. et al. Microplastics increase mercury bioconcentration in gills and bioaccumulation in the liver, and cause oxidative stress and damage in *Dicentrarchus labrax* juveniles. *Scientific Reports*, [S. l.], v. 8, p. 15655, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-018-34125-z>. Acesso em: 22 maio 2025.

HOLMES, L. A.; TURNER, A.; THOMPSON, R. C. Adsorption of trace metals to plastic resin pellets in the marine environment. *Environmental Pollution*, [S. l.], v. 160, n. 1, p. 42–48, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.08.052>.

LEI, Y.; LI, X.; MAO, X. Microplastics aggravate the adverse effects of methylmercury than inorganic mercury on zebrafish (*Danio rerio*). *Environmental Pollution*, [S. l.], v. 367, p. 125559, 15 fev. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.125559>. PMID: 39710179. Publicado online em: 20 dez. 2024. Acesso em: 22 maio 2025.

KOELMANS, A. A. et al. Microplastic as a vector for chemicals in the aquatic environment: critical review and model-supported reinterpretation of empirical studies. *Environmental Science & Technology*, [S. l.], v. 50, n. 7, p. 3315–3326, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1021/acs.est.5b06069>.

SILVA, A. S. G. *Microplásticos nos diferentes ecossistemas do Brasil: uma revisão*. Lavras: [s. n.], 2025.

SOUSA, E. P. et al. Contaminação por mercúrio em peixes na Amazônia brasileira. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 24, n. 8, 2024. DOI: <https://doi.org/10.25248/REAS.e15348.2024>. Acesso em: 22 maio 2025.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (USEPA). *National recommended water quality criteria – Aquatic life criteria table*. Washington, D.C., 2023. Disponível em: <https://www.epa.gov/wqc/national-recommended-water-quality-criteria-aquatic-life-criteria-table>. Acesso em: 22 maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO); FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). *Evaluations of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives – Methylmercury*. Geneva: WHO, 2023. Disponível em: <https://apps.who.int/food-additives-contaminants-jecfa-database/Home/Chemical/3083>. Acesso em: 22 maio 2025.



RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE *Escherichia coli* ISOLADAS DA PELE E RETO DE TILÁPIAS EM TANQUES EM INACIOLÂNDIA - GO

¹Gleysson Alves de Jesus

²Beatriz Santana Estevão

³Caio Cezar de Andrade Rodrigues

⁴Leonardo Costa Paes

⁵Mayara Bocchi Fernandes

⁶Laís Soares Faria

⁷Fernanda da Silva Tomaz

⁸Cecília Nunes Moreira

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universidade Federal de Jataí (UFJ), Jataí, Goiás, Brasil

Área temática:

Resumo: O estudo a seguir buscou analisar a resistência antimicrobiana de *Escherichia coli* isoladas da pele e das fezes de tilápias em tanques criadouros no município de Inaciolândia no Estado de Goiás, com o objetivo de avaliar a sensibilidade da *E. coli* a 12 antimicrobianos. utilizados na pesquisa, seguindo todos os protocolos microbiológicos padrão rigorosos ao decorrer de todo o processamento. Foram analisadas neste estudo 18 cepas de *E. coli* provenientes da pele de 13 tilápias e fezes de 5 tilápias. O método de avaliação do perfil de susceptibilidade foi feito por disco difusão. Do total de cepas analisadas 39% foram multidrogas resistentes, 64% foram resistentes à amoxicilina + ácido clavulânico e a ampicilina e 11% apresentaram resistência a até dois antimicrobianos testados. Os que apresentaram melhor eficácia foram cefotaxima, aztreonam e ceftriaxona foram os mais efetivos, apresentando 89% de sensibilidade. Dessa forma, é importante salientar a importância da continuidade do estudo acerca da *E. coli* e da testagem farmacológica, pois caso houver a ingestão de peixes contaminados, os humanos também podem se infectar diretamente.

INTRODUÇÃO

A piscicultura caracteriza-se como o cultivo de peixes, englobando a preocupação com as instalações, a alimentação e o manejo, como meios para o aumento da produção. Com base nos sistemas de cultivo, em algumas partes do mundo existem o domínio genético e o controle total do ambiente de confinamento dos peixes. Porém, no Brasil, o trabalho com o domínio genético é recente e um pouco distante para o controle total desejado com relação à resistência dos animais às bactérias. A tilápia foi introduzida no Brasil como um teste na década de 1950, com uma adaptação boa e um crescimento notável, esse peixe acabou se tornando uma parte importante na aquicultura e economia brasileira (ANIMAL BUSINESS BRASIL, 2023).

A *Escherichia coli* é uma bactéria gram-negativa em formato de bastonete, sendo anaeróbia facultativa, ou seja, pode crescer na presença ou na ausência de oxigênio, e com a reprodução por divisão binária, faz com que a população desta bactéria seja exponencial e rápida em condições ideais. No seu hospedeiro, seja humano ou animal, algumas cepas de *E. coli* podem conviver sem causar quaisquer danos ao trato gastrointestinal, mas algumas outras como a *E. coli* enterohemorrágica (EHEC) pode levar a um quadro de intoxicação alimentar severa quando contraída. Segundo o Manual MSD (2023), essa cepa pode causar



diarreia sanguinolenta e, em casos mais graves, síndrome hemolítico-urêmica.

A *E. coli* possui, assim como as outras Enterobacteriaceae, uma alta capacidade de resistência a diversos antibióticos, tornando-as um obstáculo para a medicina moderna e também para a farmacologia. Seguindo esses fatos, o teste de susceptibilidade antimicrobiana avalia a sensibilidade dos microrganismos a diferentes agentes. Saber qual antibiótico utilizar pode fazer com que seja possível auxiliar no combate dessas bactérias e evitar danos irreparáveis na criação de tilápias, haja vista que será de conhecimento qual antibiótico utilizar corretamente.

OBJETIVO

Avaliar a resistência antimicrobiana de *Escherichia coli* isoladas de swabs da pele e reto de tilápias cultivadas em tanques em Inaciolândia no Estado de Goiás

METODOLOGIA

Foram analisadas 18 cepas de *Escherichia coli*, sendo isoladas da pele de 13 tilápias e do reto de 5 tilápias, no município de Inaciolândia, no estado de Goiás. O teste de sensibilidade a antimicrobianos (TSA) foi realizado através do método de disco-difusão (Kirby-Bauer). As cepas de *E. coli* foram colocadas em um tubo de vidro contendo salina estéril 0,9% em turvação de $1,5 \times 10^8$ UFC/ml (0,5 da escala de McFarland) e posteriormente semeada em placa de (140x15mm) com ágar Mueller Hinton (HIMEDIA®), sendo então depositados os antimicrobianos específicos, segundo orientações do BrCAST, 2024. As interpretações foram feitas através de leitura do halo de inibição (BrCAST, 2024) e a classificação das cepas em Multidrug-resistant (MDR), extensively drug-resistant (XDR), pandrug-resistant (PDR) serão realizadas conforme estabelecido por Magiorakos (2012). Desta forma os antimicrobianos utilizados foram ceftazidima, aztreonam, cefotaxima, ampicilina, ceftriaxona, imipenem, meropenem, gentamicina, ampicacina, ciprofloxacino, cefepima e amoxicilina + ácido clavulânico. Todas as amostras identificadas com *E. coli* foram submetidas ao teste fenótipo confirmatório para a produção de ESBL pelo método de duplo disco difusão, também chamado de aproximação de disco. As cepas passaram pelo teste com discos de antibióticos contendo cefalosporinas de 3º geração e um inibidor de β -lactamase, como a ceftriaxona, aztreonam, ceftazidima, cefotaxima e amoxicilina + ácido clavulânico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 18 cepas de *Escherichia coli* analisadas neste estudo, 39% (n=18) foram multirresistentes. No trabalho de Alexandre (2023), que avaliou cepas isoladas de água e pescado da Lagoa da Conceição, 36% das amostras de água apresentaram esse perfil, enquanto as de pescado não foram multirresistentes. A diferença pode estar relacionada à origem das amostras, neste estudo utilizamos pele e reto de tilápias, enquanto o dele, tecido de pescado e amostra de água. Em relação aos tipos de antibióticos utilizados: enquanto este estudo incluiu fármacos de uso clínico-hospitalar, como cefepima, ceftazidima e carbapenêmicos, o outro trabalho focou em antimicrobianos de uso mais comum em ambientes ambientais, como tetraciclina, norfloxacina e ampicilina.

Das cepas analisadas, 11% (n=18) apresentaram resistência a até dois antimicrobianos testados, sendo que nenhuma demonstrou sensibilidade a todos os fármacos avaliados, indicando um perfil de resistência generalizado.



Em relação à eficácia dos antimicrobianos, observou-se que cefotaxima, aztreonam e ceftriaxona foram os mais efetivos, apresentando 89% de sensibilidade (n=54) entre as cepas testadas. Esses resultados estão em concordância com o estudo de Alexandre (2023), que também identificou alta atividade desses antimicrobianos contra *Escherichia coli* em isolados de pescado, reforçando seu potencial terapêutico.

Além disso, notou-se que cefepima e ceftazidima apresentaram maior sensibilidade (94%, n=36) quando houve aumento no tempo de exposição. Esse comportamento sugere que o sucesso terapêutico pode estar associado a ajustes posológicos, nos quais a otimização da concentração ou do tempo de contato favorece a ação antimicrobiana.

Por outro lado, amoxicilina + ácido clavulânico e ampicilina demonstraram baixa eficácia, com 64% de resistência (n=36). Dessa forma, corroborando os dados do estudo de Niranjani e Malini (2014), que também relataram alta resistência a esses antibióticos, com cerca de 70% dos isolados resistentes a ampicilina. Além disso, o artigo evidencia que mesmo com aumento do tempo de exposição e da dosagem, as cepas mantêm sua capacidade de crescimento, o que indica falha terapêutica, fenômeno também observado na presente análise. Esses achados reforçam a necessidade da utilização criteriosa desses antibióticos e do monitoramento contínuo da resistência bacteriana para a escolha adequada do tratamento, evitando o uso ineficaz e a potencial seleção de cepas resistentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, conclui-se com o presente trabalho a presença de *Escherichia coli* multirresistentes e resistentes em tilápias cultivadas em tanques no município de Inaciolândia, no Estado de Goiás, com diferentes níveis de resistência aos antibióticos utilizados na pesquisa. A sensibilidade observada frente aos antimicrobianos cefepima, ciprofloxacino e ceftazidima reforça a eficácia de algumas terapias, principalmente quando se ajusta a dosagem e o tempo de exposição contra tais microrganismos. Contudo, a alta resistência apresentada em algumas amostras contra os antibióticos amoxicilina associada ao ácido clavulânico e ampicilina demonstra a necessidade de maiores cuidados no uso desses antimicrobianos na aquicultura, justamente diante da possibilidade de falhas terapêuticas das cepas multirresistentes, e também se mostra essencial para a segurança alimentar dos consumidores alvos, pois é possível contrair pela ingestão tais cepas resistentes.

Palavras-chave: Antibiograma; *Escherichia coli*; Tilápia,.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANIMAL BUSINESS BRASIL. *Tilápia: o segundo peixe mais consumido do mundo*. 2023. Disponível em: <https://animalbusiness.com.br/tilapia-o-segundo-peixe-mais-consumido-do-mundo/>. Acesso em: 18 maio 2025.

HADDAD, Sasha Aline Gomes; PAIVA, Maria Eduarda Dias de; RIBEIRO, Anna Julia Menezes; FERRI, Antonio Schandler. *A ascensão econômica da tilápia no Brasil: viabilidade e perspectivas para um investimento aquícola em Campos dos Goytacazes-RJ*. *Revista de Extensão UENF*, Campos dos Goytacazes, v. 8, e023001, p. 1–17, jan./dez. 2023. Disponível em: <https://uenf.br/publicacoes/revista-de-extensao/wp-content/uploads/sites/4/2024/01/e023001.pdf>. / Acesso em: 15 de maio de 2025.

BARBOSA, Mayhara Martins Cordeiro. *Qualidade higiênico-sanitária e ocorrência de*



Aeromonas sp. e Escherichia coli em tilápias comercializadas no varejo. 2013. ix, 91 p. Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Centro de Aquicultura de Jaboticabal, 2013.

MANUAL MSD. *Infecção por Escherichia coli O157:H7 e outras E. coli enterohemorrágicas (ECEH)*. 2023. Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/doen%C3%A7as-infecciosas/bacilos-negativos/infec%C3%A7%C3%A3o-por-escherichia-coli-o157-h7-e-outras-e-enterohemorr%C3%A1gicas-eceh>. Acesso em: 18 maio 2025.

MEIRELLES-PEREIRA, F.; PEREIRA, A.M.S.; SILVA, M.C.G.; GONÇALVES, V.D.; BRUM, P.R.; CASTRO, E.A.R.; PEREIRA, A.A.; ESTEVES, F.A.; PEREIRA, J.A.A. *Ecological aspects of the antimicrobial resistance in bacteria of importance to human infections*. Brazilian Journal of Microbiology, v.33, p.287-293, 2002

BrCAST. Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Documentos. 2024. Disponível em: <http://www.brcast.org.br> Acesso em 23 de maio de 2025.

MAGIORAKOS, A. P. et al. *Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance*. Clinical Microbiology and Infection, v.18, n. 3, p. 268-281, 2012.

NIRANJAN, V.; MALINI, A. *Padrão de resistência antimicrobiana em Escherichia coli causadora de infecção do trato urinário em pacientes internados*. The Indian Journal of Medical Research, v. 139, n. 6, p. 945–948, jun. 2014. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4165009/>. Acesso em: 18 maio 2025.

ALEXANDRE, Luan Amaral. *Perfil de resistência a antibióticos de Escherichia coli isoladas de água e pescado da Lagoa da Conceição, Florianópolis-SC*. 2023. 87 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/248388>. Acesso em: 18 maio 2025.



PRESENÇA DE *Klebsiella pneumoniae* EM AMOSTRAS DE ÁGUA COLETADAS EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE JATAÍ

¹Gleysson Alves de Jesus

²Beatriz Santana Estevão

³Dário Nunes Junior

⁴Leonardo Costa Paes

⁵Mayara Bocchi Fernandes

⁶Laís Soares Faria

⁷Daniel Roberto de Lima Filho

⁸Cecília Nunes Moreira

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universidade Federal de Jataí (UFJ), Jataí, Goiás, Brasil

Área temática: Saúde coletiva

Resumo: O estudo a seguir buscou investigar a presença de *Klebsiella pneumoniae* em amostras de água coletadas em escolas públicas e privadas do município de Jataí no Estado de Goiás, com o objetivo de avaliar os riscos sanitários associados à ingestão de água contaminada. Foram coletadas 80 amostras de água em 20 das escolas distintas, abrangendo quatro pontos de coleta, a torneira externa que recebe a água diretamente da estação de tratamento, dois bebedouros dos alunos e professores e também a torneira da pia da cozinha de cada escola. A análise seguiu protocolos microbiológicos padrão rigorosos, utilizando meios de cultivos e testes bioquímicos fenotípicos para identificar o microrganismo. A bactéria *Klebsiella pneumoniae* foi observada em 12 amostras de cinco escolas provenientes de diferentes reservatórios da SANEAGO do município de Jataí, o que indica uma prevalência de 25% das escolas analisadas com a presença da bactéria na água consumida por seus alunos e servidores. O estudo realizado ressalta a importância da implementação de medidas educativas e preventivas para garantir a qualidade da água nas instituições de ensino de Jataí, além de destacar a necessidade de monitoramento contínuo e intervenções sanitárias adequadas.

INTRODUÇÃO

A análise microbiológica da água de poços artesianos, nascentes e caixas d'água é fundamental, especialmente em escolas, onde há grande concentração de crianças. O tratamento e o saneamento básico diminuem os microrganismos patogênicos na água, mas isoladamente estes não garantem a potabilidade da água. Segundo as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (2022), a segurança da água deve ser gerenciada de forma preventiva, com avaliação contínua da qualidade ao longo de todo o sistema, ou seja, da fonte até o consumo. Isto ocorre porque existe possibilidade de alterações físico-químicas e contaminações da água por bactérias e parasitas, comprometendo a sua qualidade e daí decorre o risco à saúde pública durante as suas fases de armazenamento e distribuição.

Klebsiella pneumoniae é uma bactéria gram-negativa pertencente à família Enterobacteriaceae, caracterizada por seu formato em bastonete e por ser anaeróbia facultativa, ou seja, pode gerar ATP com e sem a presença de oxigênio. Apesar de seu nome, não causa apenas pneumonia, mas sim infecções ao sistema gastrointestinal e necrose tecidual. Sua habilidade de adaptação quanto ao seu metabolismo e sua capacidade de desenvolver resistência a múltiplos antibióticos a torna um desafio crescente para a



medicina. Entre as espécies do gênero, *K. pneumoniae* é a mais importante em saúde pública, pois a mais frequentemente identificada em infecções humanas (Martin & Bachman, 2018).

Nesse contexto, considerando a resistência aos antimicrobianos, o Departamento de Microbiologia Médica e Virologia da Universidade de Kiel na Alemanha considerou em apuração aos dados em pesquisa que: uma alta porcentagem (53%) de amostras de águas superficiais, como rios, riachos, e lagos, mostrou-se positiva para *Klebsiella spp.*, sendo a espécie mais comum *K. pneumoniae*. Além disso, os dados mostram que isolados de *K. pneumoniae* de águas superficiais assemelham-se a cepas clínicas na expressão de fatores de virulência. Ou seja, nesse estudo, a capacidade da bactéria em expressar sua virulência no corpo do hospedeiro advindas do ambiente possui a mesma capacidade das *Klebsiella spp* encontradas em ambientes hospitalares, nos quais são mais comuns a presença.

Dessa forma, ao entender a possível contaminação envolvendo a *Klebsiella* por meio da água contaminada das escolas, fez-se necessário o estudo do presente trabalho e o monitoramento da água nas instituições de ensino, buscando melhorar a qualidade da água para o consumo seguro dos indivíduos.

OBJETIVO

Analisar a presença de *Klebsiella pneumoniae* em amostras de água coletadas em escolas públicas do município de Jataí - GO.

METODOLOGIA

A seleção das instituições de ensino ocorreu por meio do mapeamento dos reservatórios de distribuição de água da empresa de saneamento básico do município de Jataí (Saneago), identificando quais escolas eram abastecidas por cada reservatório. O procedimento da obtenção das amostras de água seguiu as orientações da FUNASA (2013). Cada amostra foi identificada seguindo um código criado para cada escola de acordo com o ponto de coleta e transportada ao Laboratório de Práticas Veterinárias (LAPRAVET) na Universidade Federal de Jataí (UFJ) em caixas térmicas com gelox, respeitando o tempo máximo de quatro horas e temperatura de armazenamento de 4°C até o início das análises microbiológicas no ambiente adequado. No laboratório, as amostras foram processadas conforme os procedimentos estabelecidos pelos órgãos oficiais de saúde. Foram coletadas

80 amostras de água em 20 escolas, considerando quatro pontos por unidade: dois bebedouros (sendo um próximo a entrada da instituição e outro mais próximo do banheiro), torneira externa (água de abastecimento público), a pia da cozinha ou do ambiente de preparo das refeições. As amostras foram inicialmente enriquecidas em caldo BHI por 18 horas a 37 °C e semeadas em ágar MacConkey para isolamento preliminar. As colônias de bacilos Gram-negativos foram selecionadas e posteriormente identificadas pelos seguintes meios e testes bioquímicos em meios de citrato de Simmons (produção de citrato), Tríplice Açúcar Ferro (TSI), MRVP (Vermelho de Metila e Voges-Proskauer) e SIM (motilidade, indol e produção de H₂S). As cepas identificadas como compatíveis com o perfil bioquímico fenotípico de *Klebsiella pneumoniae* foram armazenadas em ágar nutriente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre as 80 amostras analisadas, foram encontradas *Klebsiella pneumoniae* em 12 amostras, ou seja 15%. A bactéria foi isolada em 25% (5/20) das escolas da rede pública provenientes de diferentes tanques de abastecimento do município de Jataí.



Esses dados podem ser comparados ao estudo de Oliveira et al. (2021), realizado em escolas públicas e privadas de Santa Rita (PB), no qual 100% das amostras apresentaram coliformes totais e 33,33% coliformes termotolerantes, o que também indica comprometimento da potabilidade da água. Embora o trabalho citado não identifique espécies específicas como *K. pneumoniae*, a detecção de coliformes termotolerantes pode incluir representantes do gênero *Klebsiella*, reforçando a importância do monitoramento microbiológico detalhado.

No presente estudo, foi observada a presença de *Klebsiella pneumoniae* em 7 das 12 amostras positivas, o que corresponde a aproximadamente 58% das amostras contaminadas. Em comparação, o estudo de Paulus (2017) em escolas municipais de Missal (PR) identificou coliformes termotolerantes em 40% das amostras de bebedouros, o que demonstra um nível considerável de contaminação microbiológica, embora sem identificação específica da espécie. Essa diferença sugere variações nas condições de manutenção e saneamento das fontes de água entre as regiões, ressaltando a importância do monitoramento contínuo para evitar riscos à saúde dos usuários.

CONCLUSÃO

Portanto, conclui-se com o presente trabalho a importância da necessidade de realizar o estudo por meio dos testes laboratoriais e também da grande falha na rede de distribuição de água no município de Jataí para as instituições de ensino públicas, representando para a população da cidade um risco à saúde dos alunos e servidores. Esse estudo reafirmou a importância de manter um padrão de análises periódicas da água que é fornecida para os alunos e profissionais que atuam nas escolas para garantir que não possam estar ingerindo água contaminada e correndo o risco de poderem desenvolver algum sinal clínico.

Palavras-chave: Água; Coleta; Enterobacteriaceae; *Klebsiella pneumoniae*.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PODSCHUN, R.; PIETSCH, S.; HÖLLER, C.; ULLMANN, U. *Incidence of Klebsiella species in surface waters and their expression of virulence factors*. *Applied and Environmental Microbiology*, Washington, v. 67, n. 7, p. 3325–3327, July 2001. DOI: <https://doi.org/10.1128/AEM.67.7.3325-3327.2001>. Acesso em: 15 de maio de 2025

CEARÁ. Secretaria da Saúde. Nota técnica orienta sobre cuidados com a bactéria KPC. Fortaleza: SESA, 16 mar. 2012. Disponível em: <https://www.saude.ce.gov.br/2012/03/16/nota-tecnica-orienta-sobre-cuidados-com-a-bacteria-kpc/>. Acesso em: 15 de maio de 2025.

MARTIN, R. M.; BACHMAN, M. A. *Colonization, infection, and the accessory genome of Klebsiella pneumoniae*. *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, Lausanne, v. 8, p. 1–15, 2018. DOI: 10.3389/fcimb.2018.00004. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29404282/>. Acesso em: 18 maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Guidelines for drinking-water quality: fourth edition incorporating the first and second addenda*. Geneva: World Health Organization, 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240045064>. Acesso em: 18 maio 2025.



BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. *Manual prático de análise de água*. Brasília: FUNASA, 2013. 146 p. Disponível em: https://www.funasa.gov.br/site/wp-content/files_mf/manual_pratico_de_analise_de_agua_2.pdf. Acesso em: 18 maio 2025.

OLIVEIRA, T. F. S. et al. *Avaliação microbiológica de fontes de água de escolas públicas e privadas da cidade de Santa Rita (PB)*. *Ensino, Saúde e Ambiente*, v. 14, n. 2, p. 543–554, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/esa/a/PgsBtJyXMbFhBMJrWpcGVsp/>. Acesso em: 18 maio 2025.

PAULUS, Andressa Elisa. *Qualidade microbiológica da água dos bebedouros para consumo em escolas municipais de Missal - Paraná*. 2017. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Gestão Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2017. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/13499/1/qualidademicrobiol%C3%B3gicabebedourosconsumo.pdf>. Acesso em: 18 maio 2025.



EFEITOS SISTÊMICOS DA ANSIEDADE SOBRE O CORPO HUMANO: UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR

¹Ana Sara Freitas Rodrigues

²Rayanne Regina Vasconcelos Fernandes

³Joyce Emanuele de Sousa Pereira

⁴Larissa de Araújo Silva

¹Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil;

²Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brasil;

³Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, Paraíba, Brasil;

⁴Centro Universitário Maurício de Nassau. João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Área temática: Eixos Transversais

Resumo: Este estudo teve como objetivo compreender as alterações sistêmicas da ansiedade sobre o corpo humano por meio de uma revisão de literatura qualitativa, com buscas nas bases SciELO, PubMed, Portal de Periódicos da CAPES e BVS, entre 2014 e 2025, utilizando descritores relacionados à ansiedade e sintomas físicos. Foram incluídos artigos em português e inglês que abordassem os efeitos sistêmicos da ansiedade, com dados analisados tematicamente e organizados conforme os sistemas corporalmente afetados. Os resultados mostram que, embora a ansiedade seja uma resposta adaptativa, sua manifestação crônica, como no Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), impacta diversos sistemas do organismo. Alterações em neurotransmissores como serotonina, GABA, noradrenalina e cortisol afetam o sistema nervoso central e provocam sintomas físicos, incluindo taquicardia, tensão muscular, distúrbios gastrointestinais e comprometimento imunológico. Destaca-se a comunicação cérebro-intestino, mediada pelo nervo vago e influenciada pela microbiota intestinal, como fator relevante na sintomatologia ansiosa. Conclui-se que os efeitos da ansiedade são amplos e sistêmicos, demandando uma abordagem multidisciplinar. A conscientização sobre os impactos físicos da ansiedade e a implementação de estratégias integradas de prevenção e tratamento são essenciais para promover a saúde integral do indivíduo.

INTRODUÇÃO

A ansiedade fisiológica é uma resposta emocional adaptativa frente a situações percebidas como ameaçadoras, sendo mediada por mecanismos neurofisiológicos que preparam o organismo para lidar com o perigo. No entanto, quando essa resposta torna-se crônica, desproporcional e difícil de controlar, mesmo na ausência de estímulos reais, ela configura um transtorno de ansiedade, sendo considerada patológica (Andrade *et al.*, 2019; APA, 2013; WHO, 2022).

O Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) é um dos principais tipos de transtornos ansiosos, caracterizado por preocupações persistentes e excessivas sobre eventos cotidianos, como finanças, saúde, desempenho acadêmico ou profissional. Essas preocupações são percebidas como incontroláveis e frequentemente estão acompanhadas de sintomas físicos, incluindo fadiga, tensão muscular, distúrbios do sono, irritabilidade e sintomas gastrointestinais. Consequentemente, para além do sofrimento subjetivo, o TAG compromete significativamente o funcionamento social, ocupacional e emocional do indivíduo (APA, 2013; WHO, 2022).



De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2022), os transtornos de ansiedade, como o TAG, frequentemente se iniciam na infância ou adolescência e tendem a persistir ao longo da vida se não forem adequadamente tratados. Apesar da disponibilidade de tratamentos eficazes, apenas cerca de um quarto das pessoas acometidas por esses transtornos recebe cuidados adequados, o que evidencia a existência de barreiras como o estigma social, a escassez de recursos e a falta de conscientização.

Do ponto de vista epidemiológico, os transtornos de ansiedade são os distúrbios mentais mais prevalentes globalmente. Estima-se que, em 2019, cerca de 301 milhões de pessoas viviam com algum transtorno de ansiedade, o que corresponde a aproximadamente 4,05% da população mundial. O número de casos aumentou mais de 55% entre 1990 e 2019. A prevalência é particularmente elevada em países como Portugal, Brasil, Irã e Nova Zelândia, e é significativamente maior entre as mulheres, que apresentam um risco 1,66 vezes superior em relação aos homens. Além disso, há evidências de que a prevalência de ansiedade está associada a fatores como urbanização, envelhecimento populacional e desenvolvimento socioeconômico, o que reforça a natureza multifatorial dessa condição (Javaid *et al*, 2023).

Nesse contexto social contemporâneo, marcado por crescentes demandas em diversas esferas (sociais, econômicas, entre outras) e pela busca incessante por perfeição e resultados cada vez mais competitivos, Andrade *et al.* (2019), corroborados por De Albuquerque e De Almeida (2020), argumentam que esse cenário contribui significativamente para o quadro de ansiedade observado na população mundial. Essa dinâmica leva as pessoas a serem excessivamente autocríticas, o que pode resultar em problemas de saúde mental e na intensificação das crises de ansiedade.

Esses dados evidenciam a importância de compreender a ansiedade não apenas como um fenômeno psicológico, mas como uma condição com repercussões sistêmicas que afetam múltiplos domínios do organismo. Nesse sentido, torna-se fundamental uma abordagem multidisciplinar que considere os efeitos físicos da ansiedade no corpo humano, contribuindo para estratégias de prevenção, diagnóstico e cuidado integral.

OBJETIVO

Compreender os efeitos sistêmicos da ansiedade sobre o corpo humano, destacando suas manifestações em diferentes sistemas biológicos.

METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão de literatura com abordagem qualitativa, cujo objetivo é analisar os efeitos sistêmicos da ansiedade sobre o corpo humano, sob uma perspectiva multidisciplinar. A busca por artigos foi realizada em maio de 2025, utilizando as plataformas SciELO, PubMed, Portal de Periódicos da CAPES e BVS, por meio dos descritores ansiedade, anxiety, sintomas físicos, physical symptoms, sistema imunológico, immune system, e psicossomática, psychosomatic, combinados pelos operadores booleanos AND e OR, ajustando-se às estratégias às especificidades de cada base. Foram incluídos estudos publicados entre 2014 e 2025, que abordassem efeitos sistêmicos da ansiedade sobre o corpo humano e estivessem disponíveis na íntegra em português e inglês. Consideraram-se artigos originais, revisões e estudos observacionais, provenientes de diferentes áreas do conhecimento. Foram excluídos artigos publicados antes de 2014; estudos com foco exclusivo em abordagens terapêuticas, psicoterápicas ou farmacológicas, sem discussão sobre os efeitos físicos da ansiedade; pesquisas sem texto completo disponível; materiais de natureza não científica, como reportagens ou artigos de opinião; e estudos duplicados. A



seleção dos artigos foi realizada em três etapas: inicialmente, procedeu-se à leitura de títulos e resumos para verificar adequação aos critérios de inclusão; em seguida, os textos completos dos estudos selecionados foram analisados, excluindo-se aqueles que não se alinhavam ao objetivo da revisão; por fim, os dados relevantes foram extraídos e organizados. Os dados coletados foram submetidos à análise temática, sendo classificados em categorias relacionadas aos efeitos da ansiedade sobre os sistemas nervoso, cardiovascular, imunológico, digestivo e muscular, possibilitando uma compreensão abrangente dos impactos sistêmicos da ansiedade. Este estudo não exigiu aprovação por Comitê de Ética, por não envolver participação direta de seres humanos. Ressalta-se que foram respeitados os princípios éticos da pesquisa científica, com a devida citação e referência de todas as fontes utilizadas, em conformidade com as normas da ABNT.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Nascimento, *et al.*, (2022) as emoções que compõem a ansiedade, medo, inquietude, pensamentos constantes acerca do futuro, ocorrem conjuntamente, levando o indivíduo a um estado de tristeza e irritabilidade. Comumente a ansiedade ocorre em associação a efeitos de estresse, medo e alterações do cotidiano, tal como uma mudança imprevista na rotina, a título de exemplo, quando em níveis comuns a ansiedade promove defesa a situações que podem se tornar um problema, evitando que o sujeito tenha um descontentamento como ter sua mente presa em vivências sem variações (Ramos e Vieira, 2022).

A ansiedade quanto patologia está atrelada a duração e a intensidade que o estado ansioso causa na pessoa, passando a afetar de forma constante e negativa a vida diária, desencadeando uma série de sintomas tais como, palpitação, necessidade constante de fuga, tremores, vertigem, medo de perder o controle da situação que provocaram as sensações (Souza *et al.* 2024). De acordo com Hofmann (2022) a combinação de sintomas que estabelecem formas comuns de ansiedade problemática converge em transtorno de ansiedade generalizada (TAG) que apresenta duas características marcantes sendo preocupação excessiva que parece incontrolável e alta tensão física.

Hofmann traz em seu livro lidando com a ansiedade que a “Preocupação é uma resposta de pensamento disfuncional a um problema potencial” (Hofmann, 2022, p. 24). Para pessoas com TAG a preocupação com um fim que poderia ser não tão bom passa a se tornar preocupações excessivamente severas com desfechos muito ruins.

Inúmeras pessoas têm receio de reconhecer sua ansiedade e como podem fazer para controlá-la, os fatores que levam a isso podem ir desde de não saber por onde começar até ao fato de achar a tarefa exaustiva. A questão é que quanto mais ignorada e não tratada a ansiedade tende a tomar proporções maiores e afluir para uma mente refém de pensamentos negativos, situações paralisantes, sintomas físicos acionados por mecanismos de luta ou fuga, procrastinação, e até envolvimento com álcool e drogas (Hofmann, 2022).

Os neurotransmissores que regulam o sistema límbico, a serotonina, adrenalina, noradrenalina, ácido gama aminobutírico GABA e neuropeptídeos quando desregulados causam hiper reatividade no *locus ceruleus* que ativa o medo, associados a fatores genéticos podem levar ao desenvolvimento do TAG (Albuquerque e Almeida, 2020).

A ansiedade pode afetar a produção de citocinas, que modificam o equilíbrio dos neurotransmissores, ocasionando o estímulo de emoções negativas ativadas pela liberação de cortisol e noradrenalina provocando instabilidade nas células do sistema imunológico que enfraquecem devido ao aumento do cortisol, que foi desencadeado por comportamentos ansiosos (Hernández-Flórez *et al.*, 2023).



Hernández-Flórez (2023) discorre que a hipófise é diretamente afetada pelo estresse, esse por sua vez aciona o desequilíbrio funcional do sistema imunológico, tornando-o suscetível a patologias diversas tais quais neoplasias. Com o sistema imunológico avariado, problemas intestinais podem começar a ocorrer devido a oscilação da microbiota intestinal, uma vez que a comunicação cérebro-intestino está sujeita a variação de humor (Christoforetti *et al.*, 2022).

Um dos nervos que possuem uma comunicação com o intestino e o cérebro de uma forma direta é o nervo vago por conter um aferente visceral que pode articular a cognição, comportamento e emoção na sua porção eferente. Alguns dos neurotransmissores já citados, como a serotonina, além de funções a reações emocionais, possuem o papel de regular a motilidade intestinal. Observando essa relação, compreende-se que uma desregulação da microbiota intestinal ativa uma resposta vagal altera que favorece os sintomas observados na ansiedade (Christoforetti *et al.*, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se que a ansiedade, embora seja uma resposta natural e adaptativa do organismo frente a situações ameaçadoras, pode se tornar um fator de risco significativo à saúde quando assume caráter crônico e desproporcional, como ocorre no Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). A partir da revisão da literatura, foi possível identificar que a ansiedade afeta não apenas o bem-estar psicológico, mas também repercute de forma ampla e sistêmica sobre o corpo humano, provocando alterações nos sistemas nervoso, cardiovascular, imunológico, digestivo e muscular. Esses efeitos decorrem de uma complexa interação entre fatores neuroquímicos, hormonais e comportamentais, que desestabilizam o equilíbrio orgânico e favorecem o surgimento de sintomas físicos persistentes.

Tais achados reforçam a necessidade de uma abordagem multidisciplinar na compreensão e no manejo da ansiedade, considerando não apenas seus aspectos psíquicos, mas também seus impactos somáticos. Além disso, evidenciam a importância da conscientização sobre o tema, tanto para os profissionais de saúde quanto para a população em geral, a fim de promover o reconhecimento precoce dos sinais de alerta, combater o estigma e incentivar a busca por apoio qualificado. Por fim, sugere-se que novas pesquisas aprofundem a investigação das inter-relações entre mente e corpo no contexto dos transtornos ansiosos, contribuindo para estratégias mais eficazes de prevenção, diagnóstico e intervenção.

Palavras-chave: ansiedade; psicossomáticos; sintomas físicos

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, Duanny Karen Vieira de; ALBUQUERQUE, Roberto Nascimento de. A enfermagem e o transtorno de ansiedade: uma revisão narrativa. SAJES – Revista da Saúde da AJES, Juína, v. 6, n. 12, p. 1–16, jul./dez. 2020. Disponível em: <https://www.revista.ajes.edu.br/index.php/sajes/article/view/380> Acesso em: 20 maio 2025.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION et al. DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais. Artmed Editora, 2014.
- ANDRADE, João Vitor et al. Ansiedade: um dos problemas do século XXI. Revista de Saúde ReAGES, v. 2, n. 4, p. 34-39, 2019.
- CHRISTOFOLETT, G. S. F.; PAIVA, N. L. do C.; PINHEIRO, G. J.; FERREIRA, T.



C. O microbioma intestinal e a interconexão com os neurotransmissores associados a ansiedade e depressão / Intestinal microbioma and interconnection with neurotransmitters associated with anxiety and depression. *Brazilian Journal of Health*

Review, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 3385–3408, 2022. DOI: 10.34119/bjhrv5n1-298. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/44339>.

Acesso em: 24 may. 2025.

DE ALBUQUERQUE, Roberto Nascimento; DE ALMEIDA, Duanny Karen Vieira. A enfermagem e o transtorno de ansiedade: uma revisão narrativa. *Revista da Saúde da AJES*, v. 6, n. 12, 2020.

HERNÁNDEZ-FLÓREZ, Jorge et al. Emotions, anxiety, depression and the immune system: an integrative view of psychoneuroimmunology from a meta-analytic review of the narrative. *Gaceta Médica de Caracas*, v. 131, n. S3, 2023.

HOFMANN, Stefan G. Lidando com a ansiedade: estratégias de TCC e mindfulness para superar o medo e a preocupação. Porto Alegre: Artmed, 2022.

JAVAID, S.F., HASHIM, I.J., HASHIM, M.J. et al. Epidemiology of anxiety disorders: global burden and sociodemographic associations. *Middle East Curr Psychiatry* 30, 44 (2023). <https://doi.org/10.1186/s43045-023-00315-3>

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Anxiety disorders. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders>>.



RNAi NA AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA: APLICAÇÕES EM TOXICOGENÔMICA, HEPATOTOXICIDADE E NEUROTOXICIDADE COMO ALTERNATIVA AOS TESTES EM ANIMAIS

¹Maria Julia Liberal Vêras Mendonça

²Maria Gabriela Gomes da Silva

³Bárbara Rafaela da Silva Barros

^{1,2,3}Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brasil

Área temática: Biotecnologia

Resumo: A avaliação toxicológica é realizada para garantir a segurança de substâncias químicas e farmacêuticas antes de sua aplicação em humanos. Tradicionalmente, esses testes são realizados em modelos animais, levantando preocupações éticas, econômicas e científicas, além da limitação da representatividade fisiológica humana. O uso de RNA Interferente (RNAi) tem se destacado como uma alternativa promissora na toxicologia, permitindo o estudo do mecanismo da toxicidade de compostos químicos por meio da supressão seletiva da expressão gênica em modelos celulares humanos. Esta revisão analisou estudos recentes que demonstram a eficácia do RNAi na predição de hepatotoxicidade, neurotoxicidade e genotoxicidade em ensaios in vitro, proporcionando maior relevância translacional. A pesquisa foi conduzida em bases de dados científicas internacionais, considerando artigos publicados entre 2019 e 2024, utilizando palavras-chave relacionadas a RNAi e toxicologia. Os resultados indicam que a RNAi apresenta vantagens significativas, como maior precisão na análise de vias metabólicas, redução do uso de animais e otimização do tempo e custo dos ensaios. No entanto, desafios como a padronização da técnica, a mitigação de efeitos off-target e a necessidade de regulamentação ainda são obstáculos à sua ampla adoção. Conclui-se que a RNAi representa uma estratégia inovadora na toxicologia preditiva, com potencial para substituir modelos animais em diversas áreas, mas requer mais estudos para sua consolidação como padrão global de testes de segurança.

INTRODUÇÃO

Os testes toxicológicos são importantes na avaliação da segurança de substâncias químicas e farmacêuticas antes de sua aplicação em humanos. O modelo tradicional de avaliação baseia-se no uso de animais de laboratório, o que levanta desafios relacionados ao aumento dos resultados para humanos, custos elevados e dilemas éticos (Tang; Khvorova, 2024). A busca por métodos alternativos tem sido intensificada, alinhada aos princípios dos 3Rs (Redução, Refinamento e Substituição de animais em pesquisa) e às diretrizes globais de regulamentação (Antonio et al., 2024). Diante dessas limitações, diversas abordagens biotecnológicas vêm sendo desenvolvidas para substituir os modelos animais, e a técnica do RNAi se destaca como uma estratégia promissora.

O RNAi promove o silenciamento gênico pós-transcricional (PTGS). Esse processo pode ser explorado para terapias genéticas, aplicações clínicas e investigações toxicológicas. A tecnologia permite o silenciamento seletivo de genes envolvidos em vias metabólicas e toxicológicas possibilitando análises mais precisas da toxicidade de substâncias químicas em modelos celulares humanos (Pandiri et al., 2023). A indução do PTGS ocorre por meio de moléculas de RNAi de curta duração, como pequenos RNAs interferentes (siRNA),



efetores endógenos celulares, como microRNAs (miRNAs), ou espécies de RNA reguladas por promotores, como o RNA de grampo curto (shRNA) (Alsing et al., 2022).

Esta técnica tem sido aplicada na toxicogenômica, na avaliação de hepatotoxicidade e na predição de efeitos neurotóxicos, eliminando a necessidade de modelos animais. Diante do potencial da RNAi na toxicologia, esta revisão objetiva avaliar criticamente seu papel na área, explorando seus avanços, benefícios e desafios, bem como discutir tendências futuras para sua consolidação como ferramenta padrão na avaliação toxicológica.

OBJETIVO

Este trabalho tem por objetivo revisar a literatura científica sobre o uso do RNAi como alternativa aos testes toxicológicos em animais, analisando sua aplicabilidade, vantagens e limitações. Além disso, busca-se discutir os avanços tecnológicos que podem consolidar a RNAi como ferramenta padrão na toxicologia moderna

METODOLOGIA

Esta revisão foi conduzida com base na busca de artigos científicos publicados entre 2019 e 2024 nas bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science. Foram utilizadas as palavras-chave "RNA interference AND toxicity testing", "siRNA AND toxicology" e "alternative to animal testing AND RNAi", selecionando estudos que abordassem a substituição de testes em animais pelo RNAi na toxicologia. Os critérios de inclusão abrangeram estudos publicados em periódicos de alto impacto, artigos de revisão sistemática, ensaios experimentais aplicados à toxicogenômica, hepatotoxicidade e neurotoxicidade, além de trabalhos que explorassem diretamente a substituição de modelos animais por RNAi.

Os critérios de exclusão contemplaram estudos que não discutissem toxicologia de maneira direta, artigos focados exclusivamente em RNAi como ferramenta terapêutica e publicações duplicadas ou sem metodologia detalhada. Após a aplicação desses critérios, foram identificados 35 artigos relevantes, dos quais 27 foram excluídos por não atenderem integralmente aos critérios estabelecidos. Dessa forma, 8 artigos foram selecionados para análise detalhada. A análise dos artigos selecionados foi conduzida de forma crítica, considerando os métodos empregados, os principais achados e as limitações apontadas pelos autores. Essa abordagem permitiu uma avaliação do potencial da RNAi como alternativa aos testes toxicológicos em animais, destacando suas aplicações, desafios e tendências futuras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos mais recentes evidencia que o uso da interferência por RNA (RNAi) tem avançado significativamente como uma alternativa promissora aos testes toxicológicos tradicionais em modelos animais. As aplicações da RNAi na toxicologia concentram-se principalmente em áreas como a toxicogenômica, a hepatotoxicidade e a neurotoxicidade, oferecendo métodos mais específicos e fisiologicamente relevantes para a avaliação da segurança de fármacos e substâncias químicas. Embora a literatura atual demonstre que a RNAi proporciona alta especificidade na regulação da expressão gênica, além de maior relevância translacional em modelos humanos *in vitro*, desafios importantes, como a entrega eficiente de pequenos RNAs interferentes (siRNAs), os efeitos off-target e a padronização metodológica, ainda precisam ser superados para a consolidação dessa tecnologia como um substituto definitivo aos modelos animais (Dong & Siegwart, 2021; Yu & Tu, 2022).



Os avanços no uso da RNAi em toxicogenômica foram impulsionados pelo desenvolvimento de ensaios moleculares de alto rendimento, direcionados à identificação de biomarcadores de toxicidade e à predição de efeitos adversos em nível celular (Sharma et al., 2023; Guzmán et al., 2022). Por exemplo, Zhang et al. (2023) realizaram uma triagem de RNAi de larga escala, identificando genes reguladores críticos como Nrf2 — associado ao estresse oxidativo — e BAX, relacionado à apoptose, como elementos fundamentais na mediação da toxicidade induzida por compostos como acetaminofeno e cádmio. A modulação da expressão de genes envolvidos na resposta inflamatória e no metabolismo de xenobióticos, por meio da RNAi, tem se mostrado uma abordagem eficaz para avaliar o impacto de substâncias químicas em células humanas, oferecendo uma visão mais mecanística e detalhada da toxicidade, em contraste com as limitações dos modelos animais (Zhang et al., 2023).

No contexto da hepatotoxicidade, a RNAi tem sido amplamente empregada para silenciar genes do citocromo P450 (CYPs), os quais desempenham papel central no metabolismo de fármacos e na bioativação de metabólitos tóxicos. Um estudo de Chen et al. (2022) demonstrou que o silenciamento dirigido das isoformas CYP3A4, CYP2D6 e CYP1A2 em hepatócitos humanos cultivados resultou em uma redução significativa na biotransformação de compostos hepatotóxicos clássicos, como paracetamol, amiodarona e diclofenaco, destacando o potencial dessa abordagem para prever hepatotoxicidade de forma mais precisa, sem recorrer a modelos animais.

Além disso, a RNAi tem sido aplicada para modelar doenças hepáticas induzidas por substâncias químicas, como a esteatose hepática e a hepatite tóxica. Wang et al. (2021) utilizaram a RNAi para silenciar genes reguladores metabólicos, como SREBF1 e PPAR α , implicados na lipogênese e na oxidação de ácidos graxos, respectivamente. Esse modelo permitiu replicar *in vitro* alterações metabólicas associadas ao consumo de álcool e à exposição a ácido valproico, fornecendo uma ferramenta relevante para o desenvolvimento de estratégias preventivas e terapêuticas frente às hepatopatias induzidas por agentes químicos.

Mais recentemente, a combinação de RNAi com modelos tridimensionais de organoides hepáticos tem se mostrado uma estratégia inovadora para avaliação da hepatotoxicidade. Yin et al. (2022) demonstraram que a integração de RNAi com organoides derivados de células-tronco humanas permite não apenas uma modelagem mais fisiológica do tecido hepático, mas também a identificação precoce de mecanismos moleculares envolvidos na toxicidade induzida por fármacos, superando algumas das limitações observadas em culturas bidimensionais tradicionais.

No campo da neurotoxicidade, a aplicação da RNAi também tem se revelado promissora, especialmente para modelar os efeitos adversos de pesticidas, metais pesados e fármacos neuroativos. Li et al. (2023) demonstraram que o silenciamento de genes envolvidos na homeostase do cálcio (CALM1) e no estresse oxidativo mitocondrial (SOD2) em neurônios humanos derivados de células-tronco pluripotentes induz fenótipo neurotóxico comparável ao observado em modelos animais expostos a metilmercúrio e clorpirifós. Este tipo de abordagem oferece uma alternativa mais relevante e sistematicamente fundamentada para a avaliação da toxicidade no sistema nervoso.

Adicionalmente, a RNAi tem sido empregada como ferramenta para a diferenciação de células-tronco pluripotentes em neurônios humanos, possibilitando a investigação de mecanismos moleculares envolvidos na neurotoxicidade induzida por substâncias químicas. Kim et al. (2022) utilizaram esta estratégia para avaliar os efeitos do bisfenol A (BPA) e de nanopartículas de prata sobre a expressão gênica e a viabilidade neuronal, demonstrando que o silenciamento de genes como REST e CASP3 pode modular respostas neurotóxicas



relevantes para a segurança química e o desenvolvimento de estratégias neuroprotetoras.

De forma complementar, Gao et al. (2023) realizaram uma triagem de RNAi de alto conteúdo em neurônios humanos, identificando moduladores chave da neurotoxicidade induzida por drogas psicotrópicas. Este estudo reforça a aplicabilidade da RNAi para a avaliação de neurofármacos em desenvolvimento, bem como para o entendimento dos mecanismos moleculares envolvidos na toxicidade e efeitos adversos associados a esses agentes.

Apesar desses avanços significativos, a adoção da RNAi como método toxicológico alternativo ainda enfrenta importantes desafios técnicos e regulatórios. A eficiência na entrega dos siRNAs às células-alvo permanece um dos principais obstáculos, uma vez que a degradação rápida desses oligonucleotídeos no ambiente extracelular compromete sua eficácia. Estratégias inovadoras, como o uso de nanopartículas lipídicas e a conjugação de siRNAs a ligantes específicos, vêm sendo desenvolvidas para superar essa limitação e aumentar a absorção celular, conforme demonstrado por Chen et al. (2022) em sistemas avançados de entrega de siRNA.

Outro desafio relevante reside nos efeitos off-target, que ocorrem quando o RNAi silencia inadvertidamente genes diferentes daqueles originalmente visados, devido à complementaridade parcial entre o siRNA e sequências homólogas em outros genes. Esta interferência não intencional pode comprometer a especificidade do ensaio e provocar reações adversas inesperadas. Entretanto, avanços na bioinformática e no design racional de oligonucleotídeos, como aqueles implementados por Zhang et al. (2023), Li et al. (2023) e Naito & Ui-Tei (2022), têm permitido a elaboração de siRNAs altamente específicos, reduzindo significativamente o risco de efeitos não desejados. O desenvolvimento de softwares e algoritmos especializados, conforme descrito por Naito & Ui-Tei (2022), possibilita otimizar a seleção de sequências-alvo, aumentando a eficácia e segurança das intervenções com RNAi.

Ademais, a aceitação regulatória da RNAi como substituto aos testes em animais ainda enfrenta resistência, apesar das evidências científicas que demonstram sua eficácia (Li et al., 2023; Zhang et al., 2023). Contudo, iniciativas internacionais, como o programa Toxicology in the 21st Century (Tox21), liderado pelo National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), seguem impulsionando a adoção de métodos alternativos baseados em biologia molecular, como a RNAi, para modernizar a toxicologia preditiva.

Tabela: Aplicações da RNAi na Avaliação Toxicológica

Análise Biológica	Genes Silenciados	Compostos Testados	Fonte
Hepatotoxicidade	CYP2A4, CYP2D6, CYP1A2	Paracetamol, Amiodarona, Diclofenaco	Chen et al., 2022
Prevalência de doenças hepáticas	SREBF1, PPAR α	Etanol, Ácido Valproico	Wang et al., 2021
Modelos avançados de hepatotoxicidade	Diversos genes	Fármacos hepatotóxicos variados	Yin et al., 2022
Toxicogenômica	Nrf2, BAX	Paracetamol, Cádmio	Zhang et al., 2023
Neurotoxicidade	CALM1, SOD2	Metilmercúrio, Clorpirifós	Li et al., 2023
Neurodesenvolvimento	REST, CASP3	Bisfenol A, Nanopartículas de prata	Kim et al., 2022
Neurotoxicidade por psicotrópicos	Múltiplos moduladores	Drogas psicotrópicas	Gao et al., 2023

Fonte: Elaborado pelo autor



CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A RNAi representa um avanço relevante na toxicologia preditiva, oferecendo um método mais ético e preciso, alinhado à fisiologia humana. Com o aprimoramento das tecnologias de entrega e a padronização metodológica, tende a substituir muitos testes toxicológicos em animais. Contudo, sua aceitação global depende de um esforço conjunto entre academia, indústria e agências reguladoras para validar e consolidar protocolos baseados nessa tecnologia.

Palavras-chave: Avaliação toxicológica; Alternativas aos testes em animais; RNAi Modelos in vitro; Toxicogenômica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALSING, Sidsel et al. VEGFA-targeting miR-agshRNAs combine efficacy with specificity and safety for retinal gene therapy. **Molecular Therapy-Nucleic Acids**, v. 28, p. 58-76, 2022.
- CHEN, X. et al. RNAi-mediated silencing of CYP450 isoforms improves hepatotoxicity prediction in human hepatocytes. **Toxicological Sciences**, v. 186, n. 1, p. 34-47, 2022.
- DONG, Y.; SIEGWART, K. M. Harnessing synthetic biology for RNA delivery. **Nature Reviews Drug Discovery**, v. 20, n. 8, p. 529-548, 2021.
- GAO, H. et al. High-content RNAi screening in human neurons identifies modulators of neurotoxicity induced by psychotropic drugs. **NeuroToxicology**, v. 95, p. 17-28, 2023.
- GUZMÁN, M. L. et al. Advancements in RNAi-based therapies for liver diseases. **Advanced Drug Delivery Reviews**, v. 182, p. 114099, 2022.
- KIM, J. et al. Neurodevelopmental toxicity assessment via RNAi in human neural progenitor cells. **Toxicology Letters**, v. 359, p. 10-20, 2022.
- LEE, S. H. et al. RNA interference in neurodegenerative disease models: Recent developments and future perspectives. **Molecular Therapy - Nucleic Acids**, v. 27, p. 971-982, 2022.
- LI, Y. et al. Modeling pesticide-induced neurotoxicity using siRNA in human iPSC-derived neurons. **Environmental Health Perspectives**, v. 131, n. 2, p. 210-222, 2023.
- MENEZES JUNIOR, Antonio da Silva et al. Exploratory Studies on RNAi-Based Therapies Targeting Angiotensinogen in Hypertension: Scoping Review. **Journal of Personalized Medicine**, v. 15, n. 1, p. 3, 2024.
- NAITO, Y.; UI-TEI, K. siRNA design software for efficient RNA interference. **Nature Reviews Drug Discovery**, v. 21, n. 6, p. 455-456, 2022.
- PANDIRI, Arun R. et al. Toxicogenomics approaches to address toxicity and carcinogenicity in the liver. **Toxicologic Pathology**, v. 51, n. 7-8, p. 470-481, 2023.
- RINALDI, C. et al. siRNA-based therapies for neurodegenerative diseases. **Molecular Therapy**, v. 28, n. 8, p. 1861-1884, 2020.
- SHARMA, R. et al. siRNA therapeutics: Recent developments and future prospects. **Journal of Controlled Release**, v. 345, p. 588-610, 2023.
- TANG, Qi; KHVOROVA, Anastasia. RNAi-based drug design: considerations and future directions. **Nature Reviews Drug Discovery**, v. 23, n. 5, p. 341-364, 2024.
- WANG, H. et al. RNA interference models of hepatic steatosis reveal key regulators for drug-induced fatty liver disease. **Hepatology Research**, v. 51, n. 5, p. 587-598, 2021.
- YIN, X. et al. Engineering stem cell organoids for the modeling of human diseases. **Cell Stem Cell**, v. 29, n. 1, p. 11-24, 2022.



YU, A. M.; TU, M. J. RNAi therapeutics: Looking back and forward. **Advanced Drug Delivery Reviews**, v. 182, p. 114103, 2022.

ZHANG, W. et al. High-throughput RNAi screening identifies key regulators in xenobiotic-induced cytotoxicity. **Archives of Toxicology**, v. 97, n. 4, p. 755-770, 2023



A ESCUTA QUALIFICADA E O ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO COMO ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE MENTAL NA ATENÇÃO BÁSICA

¹Joéryca Kayllane Severo Costa

²Maria Edna Silva de Alexandre

¹Universidade Federal de Campina Grande. Campina Grande, Paraíba, Brasil; ²Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, Brasil

Área temática: Psicologia

Resumo: O movimento da Reforma Sanitária, que teve início nos anos 1970, possibilitou aos brasileiros a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Com a nova direção que a saúde no Brasil tomou, foi criada a Atenção Básica, a qual se constitui como a referência e porta de entrada preferencial para o SUS. O estudo tem por objetivo relatar a experiência de um estágio supervisionado em psicologia em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Campina Grande -PB. Assim sendo, o método empregado refere-se ao relato de experiência, tendo o diário de campo como suporte. Dessa forma, as experiências de estágio, demonstraram o engajamento dos usuários adscritos nas ações empregadas pelos estagiários de psicologia, sendo a escuta e acolhimento um dos serviços mais procurados; Também foi possível observar o desejo da população e dos profissionais o desejo em ter serviços de psicologia ofertados cotidianamente. Portanto, o resumo reafirma a escuta e acolhimento como ferramenta central de atuação e sua capacidade em agir de maneira a promover saúde, além de refletir sobre a necessidade do profissional da psicologia atuando cotidianamente na Unidade Básica de Saúde (UBS).

INTRODUÇÃO

O movimento da Reforma Sanitária, que teve início nos anos 1970, possibilitou aos brasileiros a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). A partir desse novo modelo de saúde, assegurado pela Constituição, a saúde pública passou a ser regida pelos preceitos da universalidade do acesso, integralidade do cuidado e equidade na oferta de serviços (Lei nº 8080/1990).

Com a nova direção que a saúde no Brasil tomou, foi criada a Atenção Básica, a qual se constitui como a referência e porta de entrada preferencial para o SUS. Ela configura-se como o grau primário de atenção aos sujeitos, estando localizada em territórios específicos. Nesses territórios, atua conforme as demandas locais, sempre alinhada às diretrizes e princípios do SUS (Brasil, 2007).

Nesse contexto, a Unidade Básica de Saúde (UBS) é a instituição base, composta por equipes de Estratégia da Saúde da Família (ESF) formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos, auxiliares de saúde bucal e agentes comunitários de saúde (Brasil, 2007). Consoante a isso, suas atividades não se limitam ao espaço físico da instituição, mas se estendem a todo o território que a compõem, como escolas, associações, centros de convivência, entre outros. Portanto, promove-se uma assistência ampla a todo o território de sua responsabilidade.

Diante de tantos cenários pelos quais o serviço é responsável, é evidente que as demandas são diversas, e algumas não se resolvem apenas com a execução do modelo clínico



tradicional, especialmente quando fogem da lógica biologicista predominante entre os profissionais da instituição. Nesse sentido, ao observar a forma de organização da UBS e a composição de sua equipe, torna-se evidente a ausência de um profissional voltado especificamente para a saúde mental, mesmo diante da recorrência de questões psíquicas no cotidiano da população. Ainda que não faça parte da equipe mínima da UBS, o psicólogo se destaca como uma referência importante nesse campo, oferecendo um cuidado especializado em saúde mental, atuando a partir do sofrimento que emerge psiquicamente do sujeito, mas sem deixar de considerar também os possíveis determinantes sociais de saúde que desencadeiam tal sofrimento.

Posto isso, este estudo objetiva relatar a experiência de um estágio supervisionado em psicologia em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Campina Grande -PB. A referida experiência contou como suas principais ferramentas a escuta e o acolhimento de usuários adscritos como forma de promoção de saúde mental, a partir da oferta de um serviço tão procurado, mas ainda de difícil obtenção.

OBJETIVO

Posto isso, este estudo objetiva relatar a experiência de um estágio supervisionado em psicologia em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de Campina Grande –PB.

METODOLOGIA

O estudo apresentado consiste em um relato de experiência referente ao estágio curricular obrigatório do curso de Psicologia da Universidade Federal de Campina Grande -UFCG, realizado em uma UBS no município de Campina Grande – PB. O estágio teve como ponto de partida estudos prévios sobre o contexto da Atenção Básica, o modelo SUS e as formas de atuação do profissional de Psicologia nesse cenário, com o objetivo de preparar os estagiários para a prática no território. Inicialmente, o meio utilizado para identificar as demandas foi a observação participante, o que facilitou o reconhecimento do campo e, consequentemente, o planejamento das ações de intervenção. O grupo atendido nas intervenções foi composto por usuários adscritos à unidade, caracterizando-se como um grupo heterogêneo, sem participantes fixos, formado por pessoas com diferentes rendas, raças e faixas etárias. Em suma, o presente relato tem como principal suporte técnico o diário de campo elaborado ao longo da vivência no estágio, o qual foi realizado em dois turnos durante o semestre, totalizando uma carga horária de 135 horas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estágio em Psicologia realizado na UBS teve como pressuposto ampliar as ações voltadas à saúde psíquica dentro da instituição, tendo em vista que a unidade não contava com um psicólogo exclusivo. Diante desse cenário, as intervenções realizadas buscaram suprir, ainda que parcialmente, essa lacuna relacionada à oferta de serviços de promoção e prevenção em saúde mental para os usuários adscritos à UBS. Tal demanda foi relatada pelos próprios profissionais da unidade, que apontaram o crescente número de pessoas em busca de assistência nessa área.

Para que as ações fossem pertinentes e alinhadas às problemáticas cotidianas do território, o estágio teve início com a estratégia da observação participante. Nos primeiros dias, foram realizadas conversas informais com a população presente na UBS durante os momentos de espera por procedimentos e atendimentos. Posteriormente, também foram coletadas informações junto aos profissionais da equipe, com o objetivo de compreender



melhor o contexto institucional.

A partir desse levantamento inicial, observou-se um forte desejo por escutas individuais. Muitos usuários relataram sua busca por atendimento psicológico na rede municipal e a dificuldade em consegui-lo, devido à alta demanda pelo serviço. Em resposta, a oferta de escuta e acolhimento individual foi a estratégia escolhida para atender a essa necessidade. Esses atendimentos foram pontuais, com possibilidade de até três encontros, caracterizando-se como uma prática distinta da psicoterapia, no formato de plantão psicológico.

O acolhimento é um dos dispositivos que sustentam a política de humanização do SUS, sendo uma ferramenta importante para a construção de vínculos e a criação de alianças entre usuários e profissionais (Pelisoli et al., 2014). A escuta qualificada, realizada por alguém capacitado, tem o potencial de oferecer um espaço de conforto e segurança para quem procura auxílio na instituição.

Apesar do acolhimento ser, idealmente, uma prática a ser realizada por todos os profissionais da saúde, na UBS havia um certo receio em conduzi-lo. Os demais profissionais relataram não se sentirem seguros diante de questões que fogem de sua área de atuação. Assim, demonstraram alívio e apoio diante da presença dos estagiários de Psicologia realizando essa escuta, sentimento confirmado pela grande quantidade de usuários encaminhados ao serviço pela própria equipe.

A escuta oferece um espaço aberto para que o sujeito em sofrimento seja acolhido e ouvido, permitindo que se reveja e, eventualmente, ressignifique sua experiência (Dantas et al., 2016). Nesse sentido, o serviço ofertado foi guiado pelo princípio de ser um espaço de fala livre, no qual o sujeito pudesse associar e expressar seu sofrimento, validando seu sentir sem patologiza-lo ou reduzi-lo a desvios de norma.

À vista disso, os usuários acolhidos durante o estágio forneceram feedbacks sobre o quanto se sentiram finalmente ouvidos, valorizados e reconhecidos em sua fala como algo significativo. É comum, em cenários como o da Atenção Básica, observar pessoas que frequentam cotidianamente a UBS mesmo sem diagnóstico formal, motivadas pela necessidade de falar sobre um sofrimento não objetivado, algo que não se manifesta de forma visível, mas que está presente em sua vivência.

O serviço de escuta se propõe a atender cada indivíduo de maneira singular, por isso não há protocolos rígidos ou grupos específicos delimitados. O objetivo foi alcançar qualquer pessoa que se sentisse à vontade para compartilhar suas vivências, sem criar barreiras de acesso.

A escuta especializada, é uma forma de acolher a queixa do outro, validar o que é necessário e devolver o que foi dito, mas ainda não escutado pelo próprio sujeito (Velasco, 2012). Quando bem conduzido, o serviço de escuta atua diretamente na promoção da saúde como um todo, funcionando também como uma ponte para o encaminhamento a serviços especializados, quando necessário. Assim, o psicólogo, com seu arcabouço teórico e prático voltado para os manejos da saúde mental, se configura como o profissional mais apto a realizar essa escuta de forma qualificada.

Em linhas gerais, por meio das conversações com os usuários da UBS, foi possível perceber uma maior clareza sobre suas próprias demandas não atendidas, sendo a saúde mental uma das queixas mais recorrentes. Dessa forma, não foi surpreendente o engajamento desses usuários nas atividades propostas pelos estagiários de Psicologia, configurando-se assim esse estágio como inspiração e modelo para a promoção da saúde mental na atenção básica à saúde.



CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

Este relato teve como objetivo demonstrar a experiência de um estágio supervisionado do curso de Psicologia em uma Unidade Básica de Saúde, destacando a escuta e o acolhimento como ferramentas centrais de atuação. Tais dispositivos se mostraram fundamentais para facilitar o acesso às demandas de saúde mental dos usuários adscritos. Diante desse cenário, os diálogos estabelecidos com esses sujeitos evidenciaram não apenas o desejo pelo atendimento psicológico, mas também a dificuldade de acesso e a necessidade sentida de que esse serviço seja ofertado de forma contínua na UBS de seu território.

Assim, torna-se indispensável refletir sobre os motivos que ainda impedem a presença constante de psicólogos nas UBS, especialmente diante do crescimento cotidiano das demandas relacionadas à saúde mental. Trata-se de uma necessidade já reconhecida pela população e pelos membros das ESF, mas a luta pela garantia do psicólogo como parte da equipe mínima, certamente, passa pela participação social e mobilização da comunidade e dos demais profissionais junto ao SUS.

Palavras-chave: Atenção básica; Psicologia; Saúde mental

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil (2007). Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Atenção Primária e Promoção da Saúde. Conselho Nacional de Secretários De Saúde. Brasília: CONASS

DANTAS, Jurema Barros et al. Plantão psicológico: ampliando possibilidades de escuta. **Revista de psicologia**, v. 7, n. 1, p. 232-241, 2016.

Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 set. 1990a. Seção 1.

PELISOLI, Cátula et al. Acolhimento em saúde: uma revisão sistemática em periódicos brasileiros. **Estudos de Psicologia (Campinas)**, v. 31, p. 225-235, 2014.

VELASCO, Karine; RIVAS, Ligia Andreia Ferrony; GUAZINA, Félix Miguel Nascimento. Acolhimento e escuta como prática de trabalho do psicólogo no contexto hospitalar. **Disciplinarum Scientia| Ciências Humanas**, v. 13, n. 2, p. 243-255, 2012.



VIVÊNCIA DISCENTE EM TRAQUEOSTOMIA À BEIRA-LEITO: RELATO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

¹Débora Sérvulo da Nóbrega Chaves

²Germanna da Cunha Farias Rodrigues Macena Gomes

³Luciano Leal Luz

^{1,2}Faculdade de Ciências Médicas - Afya Paraíba; ³Universidade Federal da Paraíba - UFPB

Área temática: Medicina

Resumo: A traqueostomia é amplamente utilizada em unidades de terapia intensiva (UTI), principalmente em pacientes com ventilação mecânica prolongada, representando um procedimento que exige domínio técnico, adaptação ao ambiente hospitalar e tomada de decisão segura. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicas de medicina durante estágio prático da Liga Paraibana de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (LICCAB-PB), realizado em um hospital paraibano, no qual participaram como auxiliares diretas do cirurgião em dois procedimentos consecutivos de traqueostomia à beira-leito. Trata-se de um relato descritivo, fundamentado na observação clínica, no suporte instrumental e na discussão das condutas adotadas em tempo real com a equipe. Os procedimentos foram realizados em pacientes críticos e conduzidos com técnicas distintas, o que possibilitou as discentes comparar estratégias operatórias, refletir sobre sua aplicabilidade e compreender os desafios logísticos, técnicos e humanos envolvidos na prática cirúrgica fora do centro operatório. A experiência proporcionou o desenvolvimento de competências como raciocínio clínico, consciência estéril, comunicação com equipe multiprofissional e tomada de decisão adaptativa, além de consolidar conhecimentos teóricos por meio da prática direta. Conclui-se que a inserção ativa de estudantes em cenários reais, especialmente em ambientes de alta complexidade como a UTI, é essencial para a formação médica integral e evidencia o papel das ligas acadêmicas como ferramentas eficazes de aprimoramento técnico e ético.

INTRODUÇÃO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente hospitalar voltado ao atendimento de pacientes críticos, que demandam intervenções imediatas, suporte ventilatório e vigilância contínua. Entre os procedimentos mais realizados nesse contexto está a traqueostomia, indicada em casos de ventilação mecânica prolongada, obstrução das vias aéreas superiores, acúmulo de secreções e dificuldade no desmame ventilatório (Pertussati et al., 2021).

A traqueostomia contribui significativamente para a segurança respiratória, a prevenção de lesões laringeas e o conforto do paciente. No caso da intubação orotraqueal prolongada, a principal indicação da traqueostomia é evitar complicações como a formação de traqueomalácia e estenose traqueal, além de facilitar o manejo ventilatório de longo prazo. Nessa situação, a traqueostomia é, em geral, considerada uma intervenção eletiva, planejada para substituir a intubação e permitir maior estabilidade clínica, no entanto, nem sempre a traqueostomia é eletiva, em situações de emergência, como laringoespasma, trauma ou obstrução aguda das vias aéreas, ela pode ser realizada de forma imediata como medida de salvamento.



Embora seja considerada uma intervenção eletiva, a traqueostomia exige domínio anatômico, técnica refinada e atuação segura, especialmente quando realizada à beira-leito. Em UTIs, a realização do procedimento fora do centro cirúrgico impõe desafios adicionais, como a organização de campo estéril em espaço restrito e o controle rigoroso de possíveis

intercorrências, como sangramentos ou falhas na ventilação.

Além dos aspectos técnicos, destaca-se a importância da segurança do paciente nesse cenário. A UTI é um dos ambientes mais vulneráveis à ocorrência de eventos adversos, como as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), que impactam diretamente a evolução clínica e os custos hospitalares (Pereira et al., 2021). Assim, a traqueostomia não deve ser compreendida apenas como um procedimento técnico, mas como um ato complexo de cuidado em saúde, que demanda preparo da equipe, estrutura adequada e decisão clínica criteriosa.

Nesse contexto, a presença de estudantes em estágios e ligas acadêmicas tem papel essencial para a construção de habilidades clínicas e cirúrgicas. Acompanhar de perto a rotina do cirurgião, participar da montagem do campo operatório, entender os critérios de indicação e vivenciar a execução de procedimentos reais são experiências que favorecem o amadurecimento técnico e ético dos futuros médicos. Ligas acadêmicas de cirurgia, em especial, ampliam esse contato prático e aproximam os discentes da realidade da assistência cirúrgica em diversos níveis de complexidade, despertando maior interesse e preparo para a atuação profissional (Rocha et al., 2024).

OBJETIVO

Relatar a experiência de acadêmicas de medicina como auxiliares do cirurgião em duas traqueostomias realizadas à beira-leito na UTI de um hospital paraibano, evidenciando aspectos técnicos, estruturais e formativos da prática cirúrgica em ambiente intensivo.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, do tipo relato de experiência, desenvolvido a partir da vivência prática de discentes de medicina durante estágio supervisionado vinculado à Liga Paraibana de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (LICCAP-PB), realizado no dia 16 de maio de 2025, na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital paraibano. As acadêmicas atuaram como auxiliares diretas do cirurgião responsável na execução de dois procedimentos consecutivos de traqueostomia à beira-leito, indicados por ventilação mecânica prolongada. A experiência envolveu participação ativa na dinâmica operatória, desde a organização pré-procedimento até a análise das condutas técnico-cirúrgicas adotadas. As observações foram sistematizadas de forma descritiva, com ênfase nas variáveis clínicas, técnicas e formativas relacionadas à execução do procedimento em ambiente intensivo.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

A vivência teve início com o acionamento do cirurgião de cabeça e pescoço pela equipe da UTI para a realização de duas traqueostomias em pacientes críticos com falha no desmame da ventilação mecânica. A estrutura da unidade chamou atenção não apenas pela organização e disponibilidade de equipamentos, mas também pela agilidade com que o leito foi adaptado para a realização do procedimento à beira-leito. A equipe multiprofissional atuou de forma coesa, colaborando ativamente na preparação do ambiente e na disposição



dos materiais necessários, o que garantiu condições seguras e eficazes para a condução da técnica. Durante a montagem do campo operatório com técnica estéril, foram posicionados capotes, luvas, campos cirúrgicos, gaze, bisturis, cânulas, aspirador e anestésicos, além de outros insumos essenciais. Ainda antes do início da incisão, retirou-se a fralda dos pacientes como medida preventiva adicional, a fim de prevenir possíveis queimaduras associadas ao uso do bisturi elétrico em contato com tecidos úmidos.

Ambos os pacientes receberam anestesia local com lidocaína sem vasoconstritor, respeitando a vascularização delicada da região cervical anterior. No primeiro procedimento, uma das discentes atuou como auxiliar direta do cirurgião, integrando-se ativamente à condução operatória. A incisão inicial foi realizada com bisturi frio, e aproximadamente 70% da técnica

foi mantida com essa abordagem em razão de falhas intermitentes no funcionamento do bisturi elétrico, que não se mantinha estável durante sua ativação. Essa limitação técnica comprometeu a utilização de cautério elétrico ao longo da dissecação, resultando em sangramento contínuo que exigiu compressões frequentes com gaze e interrupções sucessivas para limpeza do campo operatório. A progressão pelos planos anatômicos foi minuciosa, porém mais lenta, até a completa exposição dos anéis traqueais e posterior substituição do tubo orotraqueal pela cânula de traqueostomia. A necessidade de controle hemostático exclusivamente manual demandou maior precisão técnica, prolongou o tempo cirúrgico e reduziu parcialmente a visibilidade do campo, exigindo da equipe maior concentração e sincronia.

No segundo procedimento, a outra discente assumiu o papel de auxiliar direta do cirurgião, já em um cenário mais favorável, uma vez que o problema técnico com o bisturi elétrico havia sido resolvido, permitindo sua utilização plena durante a cirurgia. A técnica foi conduzida com predominância do bisturi elétrico, empregado desde a dissecação inicial até a cauterização dos vasos superficiais, o que resultou em redução significativa do sangramento, manutenção de um campo operatório mais limpo e menor necessidade de gaze para hemostasia. A visibilidade anatômica foi superior, favorecendo a precisão dos planos e contribuindo para um tempo cirúrgico mais curto e com menos interrupções. A troca da via aérea foi realizada com rapidez e segurança, e a integração eficiente da equipe permitiu uma condução fluida do procedimento, com menor sobrecarga física e maior estabilidade durante toda a execução.

As discentes puderam observar não apenas as decisões técnicas do cirurgião, mas também o papel coordenado da equipe de enfermagem e fisioterapia, que contribuíram com o posicionamento do paciente e suporte ventilatório. A postura didática e acessível do cirurgião, ao compartilhar raciocínios e condutas durante o ato operatório, possibilitou que as estudantes compreendessem, em tempo real, os fundamentos clínicos e técnicos que orientam cada etapa do procedimento, desde a escolha da anestesia local até a manipulação segura da via aérea.

A vivência comparativa entre os dois procedimentos, distintos em tempo cirúrgico, volume de sangramento, uso de materiais e exigência técnica, configurou uma oportunidade de aprendizado singular, ao permitir a análise prática de como diferentes variáveis interferem na condução da mesma intervenção. Mais do que observadoras, as discentes atuaram como integrantes ativas da equipe cirúrgica, desenvolvendo competências essenciais como raciocínio técnico, consciência estéril, comunicação em ambiente de alta complexidade e capacidade de adaptação a situações críticas, o que conferiu à experiência um caráter formativo robusto e alinhado às demandas reais da prática médica.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização de traqueostomias à beira-leito em pacientes críticos internados na UTI evidenciou, na prática, os desafios técnicos, logísticos e assistenciais que envolvem esse procedimento em ambiente fora do centro cirúrgico. A experiência permitiu às discentes vivenciarem com profundidade o cuidado em saúde em sua forma mais complexa, em que segurança do paciente, precisão técnica e trabalho em equipe caminham juntos. Atuar como auxiliares diretas do cirurgião, diante de diferentes abordagens operatórias e em um cenário de alta exigência, contribuiu para o fortalecimento de competências fundamentais como raciocínio clínico, consciência estéril, comunicação interprofissional e tomada de decisão em tempo real. Alinhada aos princípios da formação médica crítica e integral, a vivência reafirma o papel essencial das ligas acadêmicas como espaços de aproximação entre o estudante e a realidade do cuidado hospitalar, permitindo não apenas a consolidação de conhecimentos, mas também o desenvolvimento da maturidade profissional e ética exigida na prática médica contemporânea.

Palavras-chave: Educação Médica; Traqueostomia; Unidades de Terapia Intensiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PERTUSSATI, Érica et al. Condições envolvidas na realização de traqueostomia em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. **Enfermagem em Foco**, Brasília, v. 12, n. 3, p. 469–474, 2021. Disponível em:

<https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/66326/2/Condi%C3%A7%C3%B5es%20envolvidas%20na%20realiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20traqueostomia%20em%20pacientes%20internados%20em%20unidade%20de%20terapia%20intensiva.pdf>. Acesso em: 17 maio 2025.

PEREIRA, Priscila Perez da Silva et al. Segurança do paciente em unidade de terapia intensiva: uma revisão integrativa. **Revista de Enfermagem da UFPI**, Teresina, v. 10, n. 1, p. 1–8, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpi.br/index.php/reufpi/article/download/3806/3774/16306>. Acesso em: 17 maio 2025.

ROCHA, Martiniano de Araújo et al. A importância da liga acadêmica de cirurgia para acadêmicos de medicina. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, Imperatriz, v. 16, n. 3, p. e15173, 2024. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/download/15173/8450>. Acesso em: 17 maio 2025.



BEBIDAS ENERGÉTICAS E MARKETING: NECESSIDADE DE REGULAÇÃO E POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS SOBRE O TEMA

¹Fernanda Amorim Almeida

²Marco Antonio Araujo Silvany

^{1, 2} Universidade do Estado da Bahia. Salvador, Bahia, Brasil

Área temática: Saúde Pública

Resumo: O consumo crescente das bebidas energéticas (BEs) nas últimas décadas reflete mudanças significativas no estilo de vida contemporâneo e tem despertado um debate intenso e complexo, envolvendo a saúde pública, a legislação e a ética do marketing. Estudos indicam uma correlação entre o consumo de BEs e a ocorrência de eventos adversos, especialmente entre jovens, além da existência de um poderoso marketing que dificulta que os consumidores façam escolhas informadas e conscientes sobre o consumo. As controvérsias em torno dessas bebidas manifestam preocupações mais amplas sobre o bem-estar individual e coletivo na sociedade contemporânea e precisam ser discutidas com urgência. Diante disso, foi realizado um estudo qualitativo, por meio de uma revisão narrativa, sobre como a exposição a propagandas e ao marketing publicitário das bebidas energéticas afeta os comportamentos associados ao seu consumo, visando discutir a necessidade de regulamentação sobre o tema. A busca foi realizada na base Google Scholar, com foco em textos que abordassem a intersecção entre bebidas energéticas e marketing, priorizando publicações que apresentassem dados empíricos e análises teóricas. Os resultados revelaram que o consumo excessivo de BEs está associado a uma série de problemas de saúde e que os jovens são um segmento extremamente suscetível ao marketing agressivo das campanhas publicitárias. Assim, destaca-se a importância de políticas públicas e campanhas de conscientização que desencorajem o início do consumo por jovens, além da regulação de práticas publicitárias e comerciais inaceitáveis direcionadas a menores de idade.

INTRODUÇÃO

A ascensão das bebidas energéticas (BEs) nas últimas décadas pode ser atribuída a um conjunto de fatores que refletem mudanças significativas no estilo de vida contemporâneo, na cultura jovem e nas demandas sociais por uma vida mais intensa e produtiva (Buchanan; Kelly; Yeatman, 2017).

De acordo com o Website oficial da Red Bull Energy Drink (2024), em 1987 surgiu uma categoria de produto completamente nova – a das bebidas energéticas, inspiradas pelas bebidas funcionais do Extremo Oriente. Estas BEs, caracterizadas por suas formulações que geralmente incluem cafeína, taurina, vitaminas do complexo B e, ocasionalmente, extratos de ervas, foram inicialmente introduzidas no mercado no final do século XX (Iheanacho et al., 2022)), embora suas raízes possam ser relacionadas a bebidas tradicionais consumidas em diversas culturas para combater a fadiga e aumentar a vitalidade (Amir et al., 2023). O apelo das bebidas energéticas reside na promessa de um aumento rápido de energia, concentração, desempenho físico e por seu efeito ergogênico, frequentemente promovidas através de estratégias de marketing vigorosas que visam o público jovem e ativo (Cadoni; Peana, 2023).



Além das preocupações relacionadas à saúde, o impacto social das bebidas energéticas tem gerado controvérsias sobre seus efeitos na vida cotidiana. A composição dessas bebidas frequentemente leva a uma associação com comportamentos de risco, como o consumo excessivo de álcool, cafeína, açúcar e a prática de atividades extremas. Há um crescente debate sobre a responsabilidade social das empresas que produzem e comercializam tais produtos, especialmente em países onde o consumo de bebidas energéticas se torna prevalentemente associado a eventos sociais e festividades (Buchanan; Kelly; Yeatman, 2017). As campanhas publicitárias, que muitas vezes veiculam uma imagem de vigor, aventura e resistência, são criticadas por sua potencial influência sobre a juventude, muitas vezes exacerbando uma cultura de competição e desempenho extremo (Buchanan; Kelly; Yeatman, 2017; Bleakley et al., 2023).

As bebidas energéticas têm despertado um debate intenso e complexo, repercutindo em vários grupos da sociedade, incluindo a saúde pública, a legislação e a ética do marketing. Um dos principais focos de crítica refere-se às suas implicações para a saúde dos consumidores, uma vez que estas bebidas frequentemente contêm altos níveis de cafeína, taurina, açúcar e outros aditivos (Stacey et al, 2017). Registros na literatura apontam que o consumo excessivo dessas substâncias pode desencadear uma série de problemas, incluindo aumento da pressão arterial, distúrbios do sono, ansiedade e complicações cardíacas (Bleakley et al., 2023; Cadoni; Peana, 2023). Estudos revelaram uma correlação entre o consumo de bebidas energéticas e a ocorrência de eventos adversos, especialmente entre adolescentes e jovens adultos, cuja sensibilidade à cafeína é maior (Ishak et al., 2012; Iheanacho et al., 2022). Além disso, a ausência de regulamentação rigorosa em relação à rotulagem e à divulgação dos ingredientes é frequentemente citada como uma lacuna significativa, dificultando que os consumidores façam escolhas informadas (Cadoni; Peana, 2023).

Todos esses fatores geram um contexto em que a saúde pública, a ética empresarial e as normas sociais se entrelaçam, exigindo um exame mais crítico e abrangente das consequências do consumo de bebidas energéticas. Essas controvérsias em torno das bebidas energéticas não são meramente uma questão de preferência de consumo, mas refletem preocupações mais amplas sobre o bem-estar individual e coletivo na sociedade contemporânea e precisam ser discutidas.

OBJETIVO

Desenvolver uma revisão narrativa sobre como a exposição a propagandas e marketing publicitário das bebidas energéticas afeta as crenças e os comportamentos associados ao consumo de bebidas energéticas no Brasil e discutir a urgência de regulamentação específica sobre esse tema.

METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa através de uma revisão narrativa da literatura. A pesquisa foi realizada por meio da busca de artigos e estudos disponíveis na plataforma Google Scholar, priorizando aqueles que apresentavam dados empíricos e análises teóricas relevantes para o tema em questão.

A linha temporal utilizada na pesquisa abrangeu publicações de 2015 a 2025, utilizando as palavras-chave: bebidas energéticas, publicidade, marketing, política e regulação. Os artigos identificados foram então revisados. Os critérios de inclusão foram periódico revisado por pares; e estudo, de qualquer tipo, com foco na associação de campanhas publicitárias e consumo de bebidas energéticas e seus efeitos na comportamento



do consumidor e impactos na saúde física e mental do usuário. Como critério de exclusão, foram excluídos trabalhos que não apontassem interseção entre bebidas energéticas e campanha publicitária, bem como aqueles que não apresentassem evidências claras sobre o impacto dessas práticas de marketing sobre o consumidor ou que não permitiram acesso ao texto completo do artigo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com os critérios de inclusão e exclusão definidos na metodologia, um total de oito artigos foram selecionados e foi dado prosseguimento na presente abordagem. Uma revisão da literatura sobre bebidas energéticas e seu marketing publicitário revela um cenário intrincado e em evolução que levanta preocupações significativas de saúde pública, especialmente para os jovens.

As bebidas energéticas, frequentemente consumidas por suas propriedades estimulantes, são compostas por uma combinação intrincada de ingredientes que visam aumentar a vitalidade e melhorar o desempenho físico e mental (Manyeneng; Pilusa, 2024). Os principais componentes dessas bebidas incluem cafeína, açúcares, vitaminas, minerais e outros ingredientes comuns que, em sinergia, exercem um papel determinante na efetividade do produto (Stacey et al, 2017). A cafeína é, sem dúvida, o ingrediente mais reconhecido e estudado, pois atua como um potente estimulante do sistema nervoso central, aumentando a vigília, a atenção e o estado de alerta. Em quantidades moderadas, a cafeína pode conferir benefícios temporários na performance atlética e na capacidade cognitiva; no entanto, seu consumo excessivo pode resultar em efeitos adversos, incluindo insônia, nervosismo e taquicardia (Iheanacho et al., 2022). Estudos mais recentes, como o de Cadoni; Peana (2023), continuam a destacar a falta grave de evidências científicas que sustentem os benefícios das bebidas energéticas, apesar de seu amplo consumo entre adolescentes.

Para Stacey et al. (2017) a presença de açúcares é outra característica definidora das bebidas energéticas, utilizados não apenas por seu sabor doce, mas também como fonte rápida de energia. Açúcares simples, como a sacarose e a glicose, são frequentemente incorporados para proporcionar um impulso imediato de energia; entretanto, a ingestão elevada desses açúcares tem sido associada a preocupações de saúde, incluindo obesidade e diabetes tipo 2. Buchanan; Kelly; Yeatman (2017) apresentam sua preocupação ao apontar que jovens adultos experimentam ganho de peso mais rápido e consomem mais alimentos não saudáveis do que qualquer outra faixa etária.

Um trabalho de Manyeneng; Pilusa (2024) destaca a prevalência de fadiga e o consumo dessas bebidas entre estudantes, levantando novas questões sobre seu impacto na saúde, indicando que a percepção de segurança e os efeitos positivos atribuídos às bebidas energéticas podem conflitar com evidências que sugerem efeitos adversos, especialmente entre os jovens.

Por outro lado, é exponencial o crescimento do consumo de bebidas energéticas (Stacey et al., 2017) e acompanha a crescente adesão de adultos e jovens à cultura energética, sendo associados a todos os tipos de situações que permitam o envolvimento em atividades inusitadas: escalar montanhas nevadas, viajar longas distâncias no deserto por dias, voar, entre outras. De acordo com Bleakley et al., (2023), as bebidas energéticas apresentam esportes mais radicais ou alternativos como um recurso publicitário. De fato, a ausência ou atraso na regulamentação dessas campanhas publicitárias elevou o seu consumo em diversas situações de risco, como consumo excessivo de álcool, consumo dessas bebidas com álcool, direção, esportes radicais ou em condições climáticas severas. Nesse contexto, o sedentarismo dos jovens, as novas formas de lazer e o multiculturalismo continuam a



incentivar o consumo excessivo dessas bebidas.

Dessa forma, do ponto de vista comercial, as bebidas energéticas ganharam considerável relevância e importância, principalmente devido ao crescimento extraordinário de seu consumo. Esse aumento explosivo do mercado de bebidas energéticas está diretamente ligado a uma mudança nos hábitos de consumo da sociedade atual (Stacey et al., 2017). A ascensão desse tipo de bebida levou ao desenvolvimento de produtos com diferentes combinações e variações de sabores e apresentações. Esse tipo de bebida é servido frio, em latas de diferentes volumes e apresentações, e é vendido em supermercados ao lado de bebidas recreativas, sucos e similares, em hotéis e restaurantes, bares esportivos, bem como em casas noturnas e máquina de autoatendimento.

O crescimento mais significativo nesse mercado foi desenvolvido pelas próprias marcas, ou seja, por meio de estratégias de marketing criativas e modernas, a força promocional concentrou-se em produtos da moda para promover estilos de vida alternativos, autoconfiança e tempo livre, incentivar habilidades e fomentar a atração entre os jovens. De acordo com Stacey et al. (2017), os gastos com publicidade de bebidas energéticas concentram-se principalmente na televisão e incluem canais para jovens, esportes e de interesse geral. Os jovens, por sua própria identidade, foram percebidos como um segmento suscetível, e se tornaram público-alvo de uma comunicação assertiva, elegante e cativante do produto consumido.

A expansão do consumo de bebidas energéticas nos últimos anos evidenciou a importância de uma estratégia de marketing em combinar uma imagem jovem; publicidade agressiva; canais de distribuição adequados a esse perfil; promoção adequada; distribuição seletiva; embalagens atrativas; fórmulas adaptadas ao público-alvo; e preço competitivo. As campanhas publicitárias frequentemente miram no comportamento do consumidor e nos hábitos de compra (Buchanan; Kelly; Yeatman, 2017). Existem bebidas energéticas específicas para atividades extremas ao ar livre; existem categorias específicas para casas noturnas específicas e garrafas maiores com preços especiais; estudantes que vão a festivais têm bebidas especiais para eles; diferentes conteúdos energéticos etc. Ou seja, o consumo depende da hora do dia, atividade, grupo de amigos, localização etc. Buchanan; Kelly; Yeatman (2017) registraram o potencial poder de influência do marketing digital de alimentos e bebidas em jovens e encontraram em seu estudo que, após uma breve exposição a materiais de marketing digital, os participantes tiveram uma melhor impressão, maior intenção de compra e ficaram mais propensos a consumir bebidas energéticas.

Buchanan; Kelly; Yeatman (2017) discutem o impacto do marketing de alimentos online em jovens adultos "nativos digitais" e como a imagem projetada pelas bebidas energéticas, baseada em sua embalagem, rotulagem, comunicação e associação com a cultura urbana, busca demonstrar como elas se inserem em um estilo de vida vanguardista caracterizado pela diversão, celebração, ousadia, design, moda e pela busca de um estado de alta energia, tanto física quanto mental. Diante dessas premissas, não é de se surpreender que, entre os diversos segmentos ou tipos de consumidores que clamam por sua existência, encontremos a maioria de jovens dispostos a correr e/ou experimentar riscos recreativos como uma espécie de atividade sensacionalista e vertiginosa, que prospera no associacionismo ou no culto ao risco.

À medida que a pesquisa prossegue, Buchanan; Kelly; Yeatman (2017) exploram como o marketing digital influencia a percepção e o consumo dessas bebidas entre os jovens, destacando a necessidade de regulamentações mais rigorosas. Assim, implementar iniciativas para prevenir riscos associados à comercialização de bebidas energéticas é uma responsabilidade sobre a qual as agências de regulação de publicidade e de vigilância sanitária precisam se debruçar. À medida que o número de bebidas energéticas aumenta, a



necessidade de regulamentação e/ou legislação nacional, estadual e/ou local torna-se mais evidente. Não se deve esquecer que, embora as bebidas energéticas sejam legais, elas ainda são um produto de consumo muito recente, o que requer a implementação de múltiplas iniciativas coerentes para proteger os consumidores, limitando, em última análise, o risco de vivenciar situações perigosas.

O estudo de Buchanan; Kelly; Yeatman, (2017) indica o poder de influência do marketing online não saudável em jovens adultos cognitivamente maduros. Este estudo chama a atenção da saúde pública para os jovens adultos, que até agora têm sido menos foco de pesquisadores, mas são influenciados pela publicidade de alimentos online.

Essa trajetória das bebidas energéticas é representativa das mudanças nos estilos de vida e das prioridades da sociedade moderna. O aperfeiçoamento de sua formulação e a expansão do mercado são resultado de uma combinação de inovação, tendências de consumo e avanços na pesquisa científica. No entanto, é imperativo que consumidores e formuladores de políticas públicas estejam atentos às implicações que o uso dessas substâncias pode provocar na saúde pública, favorecendo decisões informadas e prudentes em relação ao seu consumo. De acordo com Cadoni; Peana (2023), há uma necessidade crescente de disseminar o conhecimento sobre os impactos das bebidas energéticas à saúde, para que os adolescentes e suas famílias possam estar cientes dos potenciais efeitos nocivos do consumo dessas bebidas. Dessa forma, a discussão em torno dessas bebidas e a publicidade associada a elas precisam ser ampliada, promovendo um diálogo que abarque não apenas seus benefícios imediatos, mas também seus impactos a longo prazo na saúde e no bem-estar da população e de grupos mais vulneráveis às investidas do marketing das bebidas. Dessa forma, indica-se a importância de campanhas educativas para informar as pessoas sobre os riscos potenciais associados ao consumo excessivo dessas bebidas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

Os debates sobre a segurança das bebidas energéticas têm ganhado destaque nos últimos anos, principalmente em função do aumento do consumo, que atrai principalmente os jovens. A preocupação central reside nos efeitos potenciais dessas bebidas sobre a saúde, gerando um amplo espectro de opiniões que se estendem desde a simples cautela até pedidos por regulamentações rigorosas. A composição dessas bebidas, que frequentemente combina açúcar, cafeína, taurina, ginseng e outros estimulantes, suscita questões sobre o impacto sinérgico desses componentes, que ainda não é completamente compreendido.

Estudos têm associado o consumo excessivo de bebidas energéticas a uma série de problemas de saúde, que vão desde distúrbios do sono e ansiedade até complicações cardiovasculares. A cafeína, um dos principais ingredientes, pode causar arritmias cardíacas em indivíduos predispostos, além de ter efeitos deletérios quando combinada com álcool, uma prática comum entre os jovens. Dessa maneira, aumentam-se as chamadas para uma maior regulação sobre o marketing e a venda dessas bebidas, particularmente nas proximidades de eventos esportivos e onde se concentra o público jovem, para restrições de venda e publicidade de bebidas energéticas, visando reduzir seu acesso.

É necessário entender que as estratégias de marketing empregadas pelos produtores de bebidas energéticas são complexas, heterogêneas e nitidamente agressivas, gerando uma série de impactos adversos nos processos de tomada de decisão do consumidor. Uma observação importante é o marketing direcionado desses produtos a grupos demográficos vulneráveis, particularmente menores de idade, em que cores, sabores e rótulos sugestivos de embalagens são empregados para atingir coletivamente crianças e adolescentes. Frequentemente, as estratégias de marketing se estendem a instituições de ensino por meio



de acordos de patrocínio e mensagens educativas, criando um senso de lealdade entre os alunos que muitas vezes é difícil de abalar.

Em resposta às questões articuladas ao longo deste texto, sugere-se que as agências de regulação de publicidade e de vigilância sanitária devam monitorar de perto o desenvolvimento desse nicho de mercado e adotar medidas legislativas ou outras para combater os excessos nas práticas observadas. É explícita a necessidade de políticas públicas eficazes que desencorajem ativamente o início do consumo de bebidas energéticas por adolescentes, o que pode gerar hábitos deletérios associados ao consumo. Além disso, as políticas devem fornecer ampla clareza sobre as práticas comerciais e publicitárias consideradas inaceitáveis em relação à comercialização de bebidas energéticas para grupos de menores de idade.

Palavras-chave: Bebidas Energéticas; Publicidade; Marketing; Regulação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMIR, M.; VOHRA, M.; RAJ, R. G.; OSORO, I.; SHARMA, A. Adaptogenic herbs: A natural way to improve athletic performance. **Health Sciences Review**, v. 7, p. 100092, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.hsr.2023.100092>
- BLEAKLEY, A.; ELLITHORPE, M. E.; JORDAN, A. B.; HENNESSY, M.; STEVENS, R. A content analysis of sports and energy drink advertising. **Appetite**, v. 174, p. 106010, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.appet.2022.106010>
- BUCHANAN, L.; KELLY, B.; YEATMAN, H. Exposure to digital marketing enhances young adults' interest in energy drinks: An exploratory investigation. **PloS one**, v. 12, n. 2, p. e0171226, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0171226>
- CADONI, C.; PEANA, A. T. Energy drinks at adolescence: Awareness or unawareness? **Frontiers in behavioral neuroscience**, v. 17, 1080963, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3389/fnbeh.2023.1080963>
- IHEANACHO, M. M.; ANALIKE, R. A.; MELUDU, S. C. OGBODO, E. C.; ONAH, C. E. Short-term energy drink consumption influences plasma glucose, apolipoprotein B, body mass index and pulse rate among students. **Discoveries** (Craiova, Romania), v. 10, n. 4, e159, 2022. DOI: <https://doi.org/10.15190/d.2022.18>
- ISHAK, W. W. et al. Energy drinks: psychological effects and impact on well-being and quality of life-a literature review. **Innovations in clinical neuroscience**, v. 9, n. 1, 25–34, 2012.
- MANYENENG, L. G.; PILUSA, M. L. Prevalence of fatigue and consumption of energy drinks among nursing students studying part-time. **Health SA = SA Gesondheid**, v. 29, n. 2487, 2024. DOI: <https://doi.org/10.4102/hsag.v29i0.2487>
- STACEY, N.; VAN WALBEEKB, C.; MABOSHEB, M.; TUGENDHAFTA, A.; HOFMAN, K. Energy drink consumption and marketing in South Africa. **Preventive medicine**, v. 105, p. S32-S36, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.05.011>



EXAME DE VIDEOENDOSCOPIA DA DEGLUTIÇÃO (VED) NA DISFAGIA PEDIÁTRICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

¹Andressa Cabral Ribeiro

¹Escola de Saúde Pública da Paraíba (ESP-PB). João Pessoa, Paraíba, Brasil

Área temática: Fonoaudiologia

Resumo: A disfagia é uma condição clínica prevalente, caracterizada pela dificuldade no processo de deglutição. Crianças com suspeita dessa alteração são encaminhadas para avaliação clínica da deglutição, a qual pode ser complementada com exames instrumentais, como a videoendoscopia da deglutição (VED). Diante da crescente aplicabilidade da VED em contextos pediátricos e de suas vantagens clínicas, torna-se essencial compreender como esse exame tem sido aplicado na prática assistencial e na produção científica. O objetivo deste estudo foi identificar, na literatura, evidências científicas relacionadas ao uso da VED em crianças com sinais de disfagia. Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, sintetizando as pesquisas disponíveis sobre a aplicação da VED nesse público. Foram encontrados 17 artigos, dos quais 4 atenderam aos critérios de inclusão, publicados entre 2016 e 2024, totalizando uma amostra de 508 crianças avaliadas por meio desse exame. Conclui-se que a VED deve ser considerada como ferramenta complementar relevante na avaliação clínica da deglutição em pediatria.

INTRODUÇÃO

A disfagia é uma condição clínica comum, caracterizada pela dificuldade no processo de deglutição, prejudicando o transporte do bolo alimentar da cavidade oral ao estômago. Dependendo de onde ocorre a dificuldade, a disfagia pode ser classificada como orofaríngea ou esofágica, além de poder incidir em diferentes faixas etárias (Yang et al., 2023).

Na pediatria, a disfagia vem assumindo grande relevância, visto que as primeiras necessidades de uma criança ao nascer são a respiração, seguida justamente da alimentação (De Paula et al., 2002). Indivíduos com suspeita de disfagia são encaminhados para avaliação clínica da deglutição, a qual pode ser complementada com exames de imagem, como a videofluoroscopia da deglutição (VFD) e a videoendoscopia da deglutição (VED), se houver indicação (Silva-Munhoz, Bühler & Limongi, 2015).

Apesar da VFD ser comumente utilizada em estudos, o exame pode não estar prontamente disponível em todos os hospitais e o acesso pode ser bastante difícil, principalmente em serviços públicos (Pazinatto et al., 2024). Assim, comparada à VFD, a VED apresenta diversas vantagens: além de possibilitar o teste com diferentes consistências alimentares, pode ser realizada em uma ampla variedade de cenários clínicos, não expõe o paciente à radiação e permite uma avaliação detalhada tanto da anatomia das estruturas envolvidas na deglutição quanto da eficácia de estratégias compensatórias (Chou et al., 2023).

Considerando a crescente aplicabilidade da VED em contextos pediátricos e suas vantagens clínicas, torna-se fundamental compreender de que maneira o exame tem sido empregado na prática e na literatura científica.



OBJETIVO

Verificar na literatura produções científicas acerca da utilização do exame de videoendoscopia da deglutição em crianças com sinais de disfagia.

METODOLOGIA

O delineamento metodológico adotado consistiu em uma revisão integrativa da literatura que sintetizou as pesquisas disponíveis acerca das evidências científicas sobre a utilização do exame de videoendoscopia da deglutição (VED) em crianças com disfagia. O levantamento bibliográfico ocorreu entre Abril e Maio de 2025, por meio das bases de dados Pubmed, Scielo e Cochrane Library. As estratégias de busca incluíam descritores controlados (MeSH) e termos livres combinados com os operadores booleanos AND e OR, utilizando os termos: “*Deglutition disorders*”, “*Child*”, “*Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing*”, além de suas equivalências em português e espanhol. A seleção dos estudos envolveu leitura de títulos, resumos e, posteriormente, consulta na íntegra dos textos elegíveis. Foram incluídos estudos com populações pediátricas, que utilizaram a VED como método de avaliação, publicados nos últimos 10 anos, no idioma português, inglês e espanhol e que se relacionavam com o desenho do estudo. Excluíram-se estudos com adultos, que abordavam exclusivamente o exame de videofluoroscopia, que se tratavam de revisões da literatura e que não se relacionavam com a temática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados 17 artigos e selecionados 4 que contemplaram os critérios de inclusão, publicados entre 2009 e 2024, totalizando uma amostra de 538 crianças avaliadas por meio da videoendoscopia da deglutição (VED). Os delineamentos metodológicos incluíram estudos transversais, retrospectivos, prospectivos e série de casos, com idades variando de 11 dias a 16 anos. A VED mostrou-se um procedimento seguro e viável em todos os estudos analisados, o exame foi concluído com sucesso na maioria dos participantes, sem intercorrências relevantes.

Em todos os estudos, a VED foi empregada para avaliar parâmetros fundamentais de deglutição, incluindo segurança (presença de aspiração ou penetração laríngea), eficácia (resíduos faríngeos), integridade anatomofuncional das estruturas envolvidas e sinais clínicos associados, como tosse, engasgos e alterações respiratórias. Além disso, a VED permitiu a identificação de padrões adaptativos contribuindo para o planejamento terapêutico. É importante ressaltar que a VED é um exame feito pelo médico otorrinolaringologista, frequentemente com o suporte direto do fonoaudiólogo, cuja participação foi observada na maioria dos artigos analisados.

A prevalência de disfagia foi elevada em todos os estudos. Foi identificado disfagia em 88% das crianças por Pazinato et al. (2024), em uma amostra na qual mais de 80% dos participantes tinham algum distúrbio neurológico. Simons et al. (2016) encontraram alterações na função da deglutição em 75,7% dos participantes com laringomalácia. Mozzanica et al. (2024) avaliaram crianças com Atrofia Muscular Espinhal do tipo 1 (AME1), na qual a VED revelou disfagia com predomínio de resíduos nos seios piriformes.

A concordância entre a VED e outros exames diagnósticos também foi evidenciada. Mozzanica et al. (2014) encontraram forte equivalência entre a VED e a videofluoroscopia da deglutição quando realizado em crianças com AME1. Dahiya et al. (2024) compararam a VED com a avaliação clínica da deglutição e observaram que, embora a avaliação clínica apresente boa sensibilidade (87,5%) e especificidade (83,3%) na detecção de aspiração, a



VED demonstrou maior precisão, especialmente na identificação de aspiração silenciosa.

Além do diagnóstico, a VED mostrou potencial terapêutico ao orientar condutas clínicas individualizadas. Em um estudo de 2009, Leder e Karas evidenciaram que, em 60% dos casos em que as crianças apresentaram disfagia, a VED permitiu recomendações específicas de manejo alimentar, como modificações na consistência da dieta e estratégias posturais, reforçando seu valor como ferramenta de apoio à reabilitação fonoaudiológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão integrativa evidencia que a videoendoscopia da deglutição é um exame seguro, viável e eficaz na detecção da disfagia pediátrica, com destaque para casos associados à comorbidades neurológicas. A presença de aspiração laríngea, mesmo sem sinais clínicos evidentes, reforça a importância da avaliação instrumental. A atuação integrada entre otorrinolaringologista e fonoaudiólogo mostrou-se fundamental para condução e interpretação do exame, evidenciando o papel da equipe multiprofissional na definição de condutas terapêuticas mais assertivas. Conclui-se que a VED deve ser considerada como ferramenta complementar na avaliação clínica da deglutição em pediatria.

Palavras-chave: disfagia pediátrica; fonoaudiologia hospitalar; videoendoscopia da deglutição.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHOU, Y. et al. Evaluation of feeding difficulties using videofluoroscopic swallow study and swallowing therapy in infants and children. *Pediatrics & Neonatology*, Taipei, v. 64, n. 5, p. 547–553, 2023.

DAHIYA, V. et al. Clinical feeding assessment: an effective screening test to predict aspiration in children in low resource settings. *Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine*, Amsterdam, v. 17, n. 2, p. 211–219, 2024.

DA SILVA-MUNHOZ, L. F.; BÜHLER, K. E. B.; LIMONGI, S. C. O. Comparação entre as avaliações clínica e videofluoroscópica da deglutição em crianças com suspeita de disfagia. *CoDAS*, São Paulo, v. 27, n. 2, p. 186–192, 2015.

DE PAULA, A. et al. Avaliação da disfagia pediátrica através da videoendoscopia da deglutição. *Revista Brasileira de Otorrinolaringologia*, São Paulo, v. 68, p. 91–96, 2002.

LEDER, S. B.; KARAS, D. E. Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing in the pediatric population. *The Laryngoscope*, Nova Jersey, v. 110, n. 7, p. 1132–1136, 2009.

MOZZANICA, F. et al. Fiberoptic endoscopic evaluation of swallowing (FEES) in children with spinal muscular atrophy type 1: feasibility, swallowing safety and efficacy, and dysphagia phenotype. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, Heidelberg, v. 281, n. 12, p. 6523–6532, 2024.

PAZINATTO, D. B. et al. Role of fiberoptic evaluation of swallowing (FEES) in children with suspected dysphagia. *Jornal de Pediatria*, Rio de Janeiro, v. 100, n. 5, p. 476–482, 2024.

SIMONS, J. P. et al. Laryngomalacia and swallowing function in children. *The*



Laryngoscope, Nova Jersey, v. 126, n. 2, p. 478–484, 2016.

YANG, S. et al. Clinical practice guidelines for oropharyngeal dysphagia. *Annals of Rehabilitation Medicine*, Seul, v. 47, n. Suppl 1, p. S1-S26, 2023.



MONITORAMENTO DE *Salmonella* spp. EM ÁGUA DE ESCOLAS PÚBLICAS DE JATAÍ (GO): AVALIAÇÃO DE RISCOS SANITÁRIOS

¹ Beatriz Santana Estevão
² Dário Nunes Junior
³ Gleysson Alves de Jesus
⁴ Laís Soares Faria
⁵ Mayara Bocchi Fernandes
⁶ Leonardo Costa Paes
⁷ Daniel Roberto De Lima Filho
⁸ Cecília Nunes Moreira

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universidade Federal de Jataí. Jataí, Goiás, Brasil;

Área temática: Saúde Coletiva

Resumo: O presente estudo verificou a presença de *Salmonella* spp. em amostras de água coletadas em escolas públicas do município de Jataí, Goiás, objetivando avaliar os riscos sanitários em relação ao consumo de água contaminada. A pesquisa envolveu a coleta de 80 amostras em 20 escolas, das quais foram coletadas em diferentes pontos: torneiras externas, bebedouros e pias de cozinha. As amostras foram analisadas com base em protocolos microbiológicos estabelecidos, por meio de meios de cultivo e teste bioquímico para identificação do microrganismo. *Salmonella* spp. foi detectada em 6,25% das amostras (5/80), distribuídas em quatro escolas: 40% provenientes de torneiras externas (abastecimento público) e 60% de pontos internos (bebedouros próximos a banheiros e pias). Os resultados indicam contaminação tanto na rede de distribuição quanto no armazenamento interno, possivelmente associada a falhas na manutenção de reservatórios ou práticas inadequadas de higiene. Baseando nisso, reforça-se a necessidade de ações de prevenção e educação sanitária, além da implementação de estratégias de vigilância contínua da qualidade da água nas instituições escolares.

INTRODUÇÃO

A água é um recurso essencial à vida e à preservação da saúde humana, em decorrência disso, é fundamental garantir a potabilidade ao consumo humano. Conforme o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), a análise e o monitoramento contínuos da água são fundamentais para assegurar que ela atenda aos padrões de potabilidade e, assim, proteger a saúde da população (BRASIL, 2022).

Entre os principais riscos microbiológicos associados à água contaminada, destaca-se o gênero *Salmonella* spp., pertencente à família Enterobacteriaceae. São bacilos Gram-negativos excretados em quantidade significativa nas fezes, contaminando ambientes como o solo e a água, onde podem permanecer viáveis por longos períodos, especialmente na presença de matéria orgânica. Segundo a revisão de Fauvert et al. (2018), destacou que a *Salmonella* spp. pode sobreviver por até cinco anos em água estéril à temperatura ambiente, mas em ambientes aquáticos naturais a sobrevivência tende a ser inferior a 30 dias devido a fatores como competição microbiana, exposição à luz UV e disponibilidade limitada de nutrientes.

Esse risco é ainda maior nos ambientes escolares, onde as deficiências em sistemas de instalações hidráulico-sanitárias, as negligências na limpeza dos reservatórios e as falhas



no monitoramento da qualidade da água podem comprometer o rendimento escolar do aluno. A falta de saneamento básico nas escolas está associada a doenças que impactam comprometendo a capacidade de atenção e concentração, o que interfere no processo de aprendizagem e no desempenho escolar (BRK AMBIENTAL, 2023).

No entanto, os parâmetros de controle utilizados atualmente por instituições como a Saneago e o SISAGUA concentram-se na detecção de coliformes totais e *Escherichia coli*, cuja presença indica contaminação fecal. Contudo, considerando a resistência ambiental de *Salmonella* spp. e a excepcional capacidade desta em persistir em diversas condições, torna-se necessária a inclusão de análises mais abrangentes nos monitoramentos periódicos de reservatórios públicos, em busca de uma maior segurança sanitária da água de consumo humano.

OBJETIVO

Analisar a presença de *Salmonella* spp. em amostras de água coletadas em escolas públicas do município de Jataí, Goiás.

METODOLOGIA

Com o objetivo de contemplar todas as escolas públicas do município, a seleção das instituições participantes foi realizada a partir do mapeamento dos reservatórios de distribuição de água da empresa de saneamento (Saneago), identificando-se quais escolas eram abastecidas por cada reservatório e selecionadas duas escolas por depósito. Foram coletadas 80 amostras de água em 20 escolas, considerando quatro pontos por unidade: torneiras externas (água de abastecimento público), dois bebedouros (segundo bebedouro de preferência o mais próximo do banheiro) e pia da cozinha. No laboratório, as análises microbiológicas seguiram os procedimentos técnicos descritos no *Manual Prático de Análise de Água*, da Fundação Nacional de Saúde (2013), que orienta sobre o correto acondicionamento, transporte e processamento das amostras. As amostras foram inicialmente enriquecidas em caldo BHI (Brain Heart Infusion Broth) por 18 horas a 37 °C e semeadas em ágar MacConkey para isolamento preliminar. As colônias de bacilos Gram-negativos foram selecionadas por meio de provas bioquímicas em meios de citrato de Simmons, TSI (tríplice açúcar ferro), SIM (motilidade, indol e produção de H₂S) e MRVP (vermelho de metila e Voges-Proskauer). As cepas identificadas como compatíveis com o perfil bioquímico de *Salmonella* spp. foram registradas para posterior análise e interpretação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre todas as amostras analisadas, foi encontrado *Salmonella* spp. em 6,25% (5/80), sendo de 20% (4/20) das escolas examinadas, provenientes de reservatórios diferentes. Reforçando a gravidade desses dados, a pesquisa de Guedes (2024), que analisou o perfil epidemiológico dos surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar causados por *Salmonella* spp. no Brasil entre 2004 e 2023, relatou um total de 1.031 surtos atribuídos a esse microrganismo, com 26.522 pessoas acometidas em diferentes regiões do país. Diante disso, é necessário reforçar que o alto potencial de disseminação, especialmente em ambientes com grande concentração de indivíduos suscetíveis, como escolas, pode trazer riscos à saúde pública.

Além disso, este estudo verificou que 40% das amostras contaminadas eram provenientes do sistema de abastecimento público operado pela Saneago, enquanto 60% estavam relacionadas a pontos internos das escolas, como reservatórios e sistemas de



distribuição interna. Comparando esses resultados com os dados obtidos por Sampaio e Silveira (2021) em escolas públicas de Uberlândia-MG, observa-se que a água fornecida pela rede DMAE apresentou apenas 1% de amostras insatisfatórias, com 99% em conformidade com os padrões microbiológicos estabelecidos. Essa discrepância evidencia uma maior eficácia do controle de qualidade realizado na cidade mineira, ao passo que o sistema de abastecimento da Saneago apresenta um índice de contaminação consideravelmente superior, sugerindo falha na rede de distribuição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A detecção de *Salmonella spp.* em amostras de água consumidas nas escolas públicas de Jataí revela falhas no sistema de distribuição e armazenagem, representando risco à saúde das crianças e de seus respectivos responsáveis, que possuem contato de forma direta com os infectados.

Portanto, urge a necessidade de medidas corretivas, tais como a manutenção periódica dos reservatórios e a capacitação das equipes escolares para as boas práticas higiênico-sanitárias. Além disso, recomenda-se a fiscalização da qualidade da água continuamente, para que se garanta a potabilidade e não se tenha surtos de doenças de origem hídrica que possam atrapalhar o desenvolvimento dos alunos em um ambiente de ensino.

Palavras-chave: Escolas públicas; Segurança sanitária; Vigilância epidemiológica;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. *Manual técnico de diagnóstico laboratorial de Salmonella spp.: diagnóstico laboratorial do gênero Salmonella*. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/bvs>. Acesso em: 11 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua)*. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/svsa/saude-ambiental/vigiagua/>. Acesso em: 17 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Salmonella (Salmonelose)*. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/salmonella>. Acesso em: 11 maio 2025.

BRK AMBIENTAL. *Saneamento básico nas escolas: entenda a importância*. 2023. Disponível em: <https://blog.brkambiental.com.br/saneamento-basico-nas-escolas/>. Acesso em: 17 maio 2025.

FAUVERT, C. et al. Survival and persistence of *Salmonella* in aquatic environments: a review. *Water Research*, [S.l.], v. 135, p. 203–215, 2018. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5989457/>. Acesso em: 17 maio 2025.

GOIÁS. Secretaria de Estado da Saúde. *Painel de Indicadores de Saúde – Poseidon*.



Goiânia: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, [s.d.]. Disponível em: <https://indicadores.saude.go.gov.br/public/poseidon.html>. Acesso em: 11 maio 2025.

GUEDES, T. C. *Perfil epidemiológico dos surtos de doenças de transmissão hídrica e alimentar causados por Salmonella spp., Brasil, 2004 a 2023*. 2024.

SAMPAIO, A. C. F.; SILVEIRA, A. C. da. *Um estudo sobre a qualidade da água destinada ao consumo de alunos nas escolas públicas do município de Uberlândia/MG*. *Revista Caminhos de Geografia*, Uberlândia, v. 22, n. 79, p. 180–198, fev. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/RCG227953967>. Acesso em: 18 maio 2025.



ANÁLISE ECOLÓGICA DA PREVALÊNCIA DE OBESIDADE E SEUS FATORES ASSOCIADOS NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ-CE: Uma perspectiva em determinantes sociais da saúde

¹Cauã Silva Vieira

¹Gabriel dos Santos de Brito

¹Maria Geiciane Siqueira da Silva

¹Francisca Antônia Nauriana Araújo Sampaio

¹Faculdade UNINTA - Tianguá, Ceará, Brasil.

Área temática: Nutrição

Resumo: A obesidade é uma doença crônica multifatorial com repercussões significativas em termos de morbimortalidade e custos para o sistema de saúde. Em contextos socioeconômicos vulneráveis, como no município de Tianguá (CE), sua prevalência reflete desigualdades estruturais. Este estudo teve como objetivo analisar a relação entre indicadores sociais, econômicos e alimentares com a prevalência de obesidade no município, com base em dados secundários de sistemas oficiais. Trata-se de um estudo ecológico, com dados do IBGE, SISVAN, PNS e VIGITEL, além de uma revisão narrativa da literatura entre 2020 e 2024. Foram identificados 4.920 casos de obesidade em Tianguá, dos quais 82% ocorreram em mulheres. A obesidade grau I foi a mais prevalente. Observou-se consumo elevado de ultraprocessados e baixa ingestão de alimentos in natura entre os respondentes da ficha de marcadores alimentares (n=247), o que evidencia subnotificação. A renda média formal local (R\$2.100) está abaixo da média estadual, sugerindo uma relação entre vulnerabilidade socioeconômica e obesidade. Conclui-se que a obesidade em Tianguá reflete determinantes sociais da saúde e a necessidade de fortalecimento dos sistemas de vigilância alimentar e de políticas intersectoriais voltadas à promoção da saúde.

INTRODUÇÃO

A obesidade é uma condição crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal, associada a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão, câncer e disfunções metabólicas (Wanderley & Ferreira, 2010). Nos últimos anos, novas diretrizes diagnósticas têm ampliado a compreensão da obesidade, destacando não apenas o IMC, mas também fatores funcionais e metabólicos (Rubino et al., 2025). Além de um fator de risco, a obesidade tem sido reconhecida como uma doença crônica sistêmica, com potencial de provocar alterações diretas na função de órgãos e tecidos, independentemente da presença de comorbidades. Essa nova abordagem redefine o papel do diagnóstico e amplia o foco do tratamento para além da simples perda de peso.

O crescimento da obesidade no Brasil está relacionado à transição nutricional, aumento do sedentarismo e dificuldades de acesso a ambientes saudáveis. Dados da PNS (2019) indicam que a ingestão de alimentos ultraprocessados supera o consumo de alimentos in natura, especialmente em regiões mais pobres. Esses fatores, aliados a determinantes sociais como renda, escolaridade e acesso a serviços de saúde, impõem desafios à prevenção e ao controle da obesidade. Ademais, a urbanização acelerada, a insegurança alimentar e a precarização das condições de vida contribuem para a consolidação de um ambiente obesogênico, principalmente entre populações de baixa renda (Valentim et al., 2024).

A obesidade no Brasil manifesta-se de forma desigual entre os diferentes grupos



sociais, refletindo as disparidades históricas de acesso a direitos básicos. Populações de baixa renda enfrentam maior exposição a alimentos calóricos, baratos e de baixo valor nutricional, ao mesmo tempo em que têm menos acesso a espaços de lazer, segurança pública e educação alimentar. Essas condições criam um ambiente obesogênico, onde as escolhas individuais são fortemente limitadas pelas condições estruturais. Além disso, fatores como insegurança alimentar e jornadas de trabalho extensas dificultam a adoção de hábitos saudáveis, contribuindo para o aumento do peso corporal em camadas mais vulneráveis da população.

Em municípios do interior, o ambiente obesogênico se manifesta de forma ainda mais complexa, marcado pela escassez de políticas públicas voltadas à promoção da saúde, baixa oferta de alimentos in natura e reduzida infraestrutura urbana para práticas de atividade física. Segundo Monteiro et al. (2022), a crescente penetração de alimentos ultraprocessados no interior do Brasil tem contribuído significativamente para a mudança dos padrões alimentares, intensificando o risco de obesidade, sobretudo entre as populações mais pobres. Essa tendência está intrinsecamente ligada à insegurança alimentar, pois famílias em situação de vulnerabilidade recorrem a produtos altamente calóricos e baratos como estratégia de sobrevivência.

A Organização Mundial da Saúde (2023) aponta que os determinantes sociais da saúde, como pobreza, baixa escolaridade e exclusão social, são fatores decisivos na prevalência da obesidade, especialmente em áreas rurais e periféricas. A pobreza estrutural, acesso limitado a alimentos saudáveis e um ambiente físico inadequado para o lazer constitui um cenário propício ao desenvolvimento da obesidade, reforçando a necessidade de intervenções intersetoriais nos territórios interioranos.

Neste contexto, o presente estudo se propõe a responder: Qual a relação entre fatores socioeconômicos, culturais e alimentares e a prevalência de obesidade no município de Tianguá?

OBJETIVO

Analisar os indicadores sociais, econômicos e alimentares do município de Tianguá (CE) e correlacionar com as taxas estimadas de obesidade, conforme dados secundários e evidências científicas atualizadas.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo ecológico descritivo, com análise de dados agregados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) e VIGITEL. As variáveis incluíram: renda média per capita, escolaridade, acesso a serviços de saúde, taxa de urbanização e marcadores do consumo alimentar.

A análise estatística foi realizada no software SPSS v.26, com aplicação de testes de correlação de Pearson ($p < 0,05$) para verificar associações entre variáveis socioeconômicas e prevalência de obesidade. Os dados foram apresentados em forma de tabelas e gráficos.

Paralelamente, realizou-se uma revisão narrativa da literatura nas bases PubMed, SciELO, LILACS e BVS, com os descritores “Obesidade”, “Determinantes sociais da saúde”, “Síndrome metabólica” e “Doença crônica”, em português e inglês. Foram incluídos artigos publicados entre 2020 e 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados 4.920 casos de obesidade em Tianguá, dos quais 4.050 (82%) em mulheres, segundo dados do SISVAN. A obesidade grau I representou 65,2% dos casos,



grau II 14,2% e grau III 7,9%. A predominância feminina pode estar associada a fatores hormonais, sobrecarga doméstica, menor acesso a espaços de atividade física e maior vulnerabilidade social.

A renda média formal (R\$2.100) foi inferior à média estadual (R\$2.800), sugerindo relação com o risco de obesidade, conforme observado por Onita et al. (2024). A baixa escolaridade e o acesso limitado a serviços de saúde agravam esse cenário, dificultando o acesso a informações sobre alimentação saudável e práticas de autocuidado.

Os dados de consumo alimentar estão subnotificados: apenas 247 fichas alimentares foram registradas. Entre esses, 74 relataram consumo frequente de ultraprocessados e 91 de alimentos processados, enquanto 171 relataram ingestão de alimentos in natura. Essa amostra limitada dificulta inferências robustas e o planejamento de políticas públicas voltadas à alimentação.

Diante dessa perspectiva, identificou-se que esse cenário também é visto em outros municípios, e estados, principalmente os mais populacionais, onde são adotadas políticas públicas para estimular o hábito de práticas corporais e atividade física no cotidiano e no curso da vida, além de apoiar iniciativas intersetoriais para a promoção de modos de vida saudáveis nos territórios, considerando espaços urbanos (escola, ambiente de trabalho, equipamentos públicos de alimentação e nutrição, atividade física e redes de saúde e socioassistencial) e espaços rurais (unidades de conservação e parques nacionais), estruturando e implementando modelos de atenção integral à saúde do portador de excesso de peso e obesidade na rede de saúde, em especial na atenção primária de saúde.

Além disso, o quadro de obesidade tem um impacto significativo na saúde pública, aumentando a incidência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como diabetes mellitus 2, hipertensão arterial e dislipidemias. Consequentemente leva a uma sobrecarga progressiva sobre o sistema público de saúde, devido ao aumento dos custos assistenciais e necessidade de serviços especializados.

Reforça-se, portanto, a necessidade de fortalecer a coleta de dados alimentares nas unidades básicas de saúde, ampliar o uso dos sistemas de vigilância como o SISVAN e a capacitação contínua dos profissionais, uma vez que essas informações são essenciais para subsidiar intervenções públicas para reduzir os agravos e promover saúde.

CONCLUSÃO

Os achados deste estudo indicam que a prevalência de obesidade no município de Tianguá apresenta forte relação com determinantes sociais da saúde, especialmente baixa renda, insegurança alimentar, baixo nível educacional e consumo elevado de alimentos ultraprocessados. Observa-se que as barreiras socioeconômicas limitam as escolhas alimentares saudáveis da população local, reforçando a necessidade de estratégias intersetoriais robustas. Este estudo contribui significativamente para a literatura científica ao fornecer uma análise ecológica regionalizada, destacando a importância de fortalecer a vigilância alimentar e nutricional, ampliar ações de educação em saúde e fomentar políticas públicas que considerem os determinantes sociais no enfrentamento da obesidade. Portanto, recomenda-se que futuros estudos aprofundem a análise multivariada desses fatores, bem como a elaboração de intervenções comunitárias específicas para contextos semelhantes.

Palavras-chave: Determinantes sociais da saúde; Nutrição em saúde pública; Obesidade; Vigilância alimentar;



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: percepção do estado de saúde, estilos de vida, doenças crônicas e saúde bucal: Brasil e grandes regiões. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. 113 p. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101764.pdf>. Acesso em: 3 jun. 2025.

Cornatione, S. E.; Alvarenga, G. S. V. C.; Milanez, A. B.; Stella, M. B. Prevalência de obesidade e sua associação com fatores de risco. *Revista Brasileira de Revisão de Saúde*, v. 9, p. e74861, 2024. DOI: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n9-182>. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/74861>. Acesso em: 2 jun. 2025.

Ischkanian, P. C.; Pelicioni, M. C. F. Desafios das práticas integrativas e complementares no SUS visando a promoção da saúde. *Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano*, v. 22, n. 2, p. 233–238, 2012. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v22n2/pt_16.pdf. Acesso em: 3 jun. 2025.

Louzada, M. L. C. et al. Consumption of ultra-processed foods in Brazil: distribution and temporal evolution 2008–2018. *Revista de Saúde Pública*, v. 57, p. 12, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/4NgBXsYpKjrKHvCBJ876P8F/>. Acesso em: 3 jun. 2025.

Monteiro, Carlos Augusto et al. A nova classificação dos alimentos baseada na extensão e propósito do processamento: impacto na saúde e implicações para políticas públicas. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 38, n. 5, p. 1–10, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/QGZLgQyFvFDRZN4nnt6TZwr/>. Acesso em: 04 jun. 2025.

Onita, B. M. et al. Fatores sociodemográficos e comportamentais da obesidade: um estudo longitudinal. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 40, n. 7, p. 1–16, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/dCkkxyhpFRBXvzyWv8jF4sc/?lang=pt>. Acesso em: 3 jun. 2025.

Organização Mundial de Saúde (OMS). World Report on the Social Determinants of Health and Obesity. Geneva: WHO, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240076644>. Acesso em: 04 jun. 2025.

Rubino, F. et al. Definition and diagnostic criteria of clinical obesity. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, v. 13, n. 3, p. 221–262, mar. 2025. DOI: [https://doi.org/10.1016/S2213-8587\(24\)00316-4](https://doi.org/10.1016/S2213-8587(24)00316-4). Acesso em: 3 jun. 2025.

Silva, Larissa da Costa et al. Ambiente alimentar e obesidade: uma análise de municípios de pequeno porte no Brasil. *Revista Brasileira de Promoção da Saúde*, Fortaleza, v. 34, p. 1–9, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/11971>. Acesso em: 04 jun. 2025.

Valentim, C. G. Q. et al. Obesidade no Brasil: desafios sociais, econômicos e de saúde pública. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 24, n. 11, p. e18772, 2024. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/18772>. Acesso em: 2 jun. 2025.



Wanderley, E. N. Ferreira, V. A. Obesidade: uma perspectiva plural. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 15, n. 1, p. 185–194, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/cxTRrw3b5DJcFTcbp6YhCry/>. Acesso em: 3 jun. 2025.



PROMOÇÃO DE SAÚDE, INCLUSÃO E AUTOCUIDADO JUNTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

¹ Ana Beatriz Motta Farias

² Gabriela Maria Ferreira Gomes Barros de Oliveira

³ Kayla Souza Silva

⁴ Wanessa Beatriz da Silva Fernandes

⁵ Rachel Cavalcanti Fonseca

^{1,2,3,4,5} Afya- Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: A partir do aumento registrado da população em situação de rua, destaca-se a necessidade urgente de políticas públicas e ações que enfrentem não apenas a falta de moradia, mas também as barreiras no acesso à saúde, alimentação adequada e autocuidado, principalmente a escassez de médicos nos postos de saúde. O estudo tem como objetivo relatar a experiência acadêmica de um projeto de intervenção com acolhidos da Casa de Missão Mãe da Ternura, envolvendo ações de educação em saúde. Trata-se de um estudo do tipo relato de experiência envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio de ações voltadas para a promoção da saúde e prevenção de agravos. Participaram da atividade cerca de 24 homens realizada no mês de Maio no turno da tarde, com agendamento prévio entre professora, alunos e responsável pelo projeto social. Os alunos preparam a atividade em estações de atividades: inicialmente foi realizada uma roda de conversa sobre saúde e seus fatores, envolvendo principalmente o controle da Hipertensão e Diabetes e suas mudanças de estilo de vida. Posteriormente, os acolhidos escolhiam as estações que gostariam de participar (circuito funcional; verificação de Pressão arterial; cálculo do índice de massa corpórea, preenchimento de questionário de saúde). Foi finalizada com um lanche coletivo e acolhedor, com a presença de um músico, o qual prestigiou a todos com o seu dom. A iniciativa também se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os ODS 3 (Saúde e Bem-estar) e ODS 10 (Redução das Desigualdades), reforçando a importância da atuação extensionista na promoção da equidade social. A ação foi realizada com muito êxito, todos foram bem acolhidos na casa mãe da ternura, e todas as estações foram visitadas e executadas as propostas. A experiência vivenciada junto aos acolhidos da casa mãe da ternura evidenciou a importância do protejo e das ações extensionistas no enfrentamento das vulnerabilidades sociais, além de fortalecer o vínculo entre o aluno e a comunidade, a ação contribuiu para a formação crítica e humanizada de todos estudantes, promovendo reflexões sobre o papel do profissional de saúde diante das desigualdades sociais.

INTRODUÇÃO

A população em situação de rua representa uma das expressões mais extremas da desigualdade social e da violação de direitos humanos no Brasil. Caracteriza-se por um grupo altamente vulnerável, exposto à insegurança alimentar, à violência, à exclusão social e à precariedade no acesso aos serviços de saúde. Essa condição, que ultrapassa a ausência de moradia, impõe barreiras significativas à manutenção da saúde e à prática do autocuidado, contribuindo para o agravamento de doenças crônicas, transtornos mentais e infecções



evitáveis (BRASIL, 2022).

Dados recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revelam um crescimento contínuo da população em situação de rua no país, evidenciando a necessidade urgente de políticas públicas integradas e ações interdisciplinares voltadas à promoção da saúde, inclusão social e redução das desigualdades (IPEA, 2023). Nesse contexto, destaca-se a importância do fortalecimento das estratégias de atenção integral à saúde dessa população, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), que prevê a equidade e a universalidade do acesso aos serviços (BRASIL, 2022).

Frente a esse cenário, os projetos de extensão universitária surgem como ferramentas eficazes na articulação entre saber acadêmico e realidade social. Por meio de ações educativas, preventivas e humanizadas, esses projetos permitem não apenas o acolhimento e a escuta qualificada das pessoas em situação de rua, mas também a formação de profissionais da saúde mais sensíveis às complexidades da prática em contextos de vulnerabilidade. Essas iniciativas dialogam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 3 (Saúde e Bem-estar) e o ODS 10 (Redução das Desigualdades), ao promover um cuidado equitativo, digno e participativo (OPAS, 2020; BRASIL, 2021).

OBJETIVO

O estudo tem como objetivo relatar a experiência acadêmica de um projeto de intervenção com acolhidos da Casa de Missão Mãe da Ternura, envolvendo ações de educação em saúde.

METODOLOGIA

Este relato de experiência descreve uma intervenção voltada à promoção da saúde e prevenção de agravos em uma população masculina em situação de vulnerabilidade social. A atividade foi realizada no dia 23 no período da tarde do mês de maio de 2025, com participação de aproximadamente 24 homens. O planejamento e agendamento ocorreram previamente entre a professora responsável, os alunos envolvidos e o coordenador do projeto social parceiro. A metodologia adotada baseou-se em estratégias participativas e educativas, com foco na construção de saberes e no fortalecimento de vínculos comunitários.

As ações foram organizadas em estações temáticas, iniciando-se com uma roda de conversa sobre saúde e seus determinantes, enfatizando o controle da hipertensão e diabetes, além de mudanças no estilo de vida. Em seguida, os participantes puderam escolher entre diferentes estações: circuito funcional, verificação da pressão arterial, cálculo do índice de massa corporal e preenchimento de questionário de saúde. A atividade foi concluída com um lanche coletivo e acolhedor, acompanhado pela apresentação de um músico local, promovendo um ambiente de integração e valorização da cultura comunitária.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Participaram da ação 15 alunos do terceiro período do curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba.

A partir das ações executadas no projeto de extensão na casa Mãe da Ternura com pessoas em situação de rua, foi possível ofertar uma ação de saúde com um momento de promoção de saúde a essa população. A prática de exercícios físicos funcionais promoveu de uma forma lúdica a atividade física e possibilitou um momento de autocuidado mas também de lazer com a promoção de descontração e evidenciou os benefícios da prática



corporal para a saúde física e mental, conforme apontado pelo Ministério da Saúde (2021), que destaca os impactos positivos da atividade física na melhoria da qualidade de vida e no bem-estar emocional. A aferição da pressão arterial, da saturação de oxigênio e a realização da anamnese possibilitaram o rastreamento de possíveis doenças preexistentes nessa população.

Além disso, foi realizada uma palestra educativa sobre cuidados essenciais com a saúde, com orientações voltadas à prevenção de agravos. Essa ação configurou-se como um momento de promoção da saúde voltado a uma população em situação de vulnerabilidade social, a qual demanda atenção ampliada, considerando as dificuldades que enfrenta no acesso aos serviços de saúde (BRASIL, 2022).

Durante a palestra sobre alimentação, conduzida por uma nutricionista, foi possível conscientizar os participantes sobre como realizar escolhas alimentares mais saudáveis, mesmo diante das limitações impostas por sua realidade social. A atividade teve como objetivo incentivar hábitos alimentares equilibrados e contribuir para a redução dos riscos de doenças crônicas, como obesidade, hipertensão e diabetes. A promoção da alimentação saudável é reconhecida como uma estratégia eficaz para melhorar a qualidade de vida, especialmente em populações em situação de vulnerabilidade (OPAS, 2020).

Além disso, a ação contribuiu para a nossa formação acadêmica por proporcionar uma experiência de vivência da realidade de uma população em situação de vulnerabilidade social e que apresenta uma necessidade maior de acesso à saúde, o desenvolvimento de habilidades de empatia e atendimento humanizado, que são fundamentais para o atendimento dessa parcela da sociedade. Vivenciar na prática os desafios enfrentados por essas pessoas contribuiu para ampliar nossa compreensão sobre o papel social do médico e reforçou a importância de uma atuação sensível, ética e comprometida com a equidade no acesso à saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A ação desenvolvida na Casa Mãe da Ternura evidenciou a importância da atuação extensionista como ferramenta de transformação social e de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao promover atividades educativas, práticas de autocuidado e escuta ativa com pessoas em situação de rua, foi possível não apenas ofertar suporte em saúde, mas também reafirmar a dignidade e o valor desses indivíduos. O projeto contribuiu significativamente para a formação de profissionais de saúde mais empáticos, sensíveis às desigualdades sociais e preparados para atuar em contextos de vulnerabilidade. Além disso, reforçou a necessidade de políticas públicas integradas que garantam o acesso universal à saúde e estimulem a inclusão social, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 e 10. Espera-se que experiências como esta inspirem novas iniciativas e consolidem um modelo de cuidado mais equitativo, humano e participativo.

Palavras-chave: população em situação de rua; promoção da saúde; inclusão social; extensão universitária; ODS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de atividade física para a população brasileira. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atividade_fisica_populacao_brasileira.pdf. Acesso em: 23 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da



População em Situação de Rua: uma proposta do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_situacao_ rua.pdf. Acesso em: 23 maio 2025.

OPAS – ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Alimentação saudável.

2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/alimentacao-saudavel>. Acesso em: 23 maio 2025.



ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO TERPÊNICA DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE *CITRUS RETICULATA*: UMA REVISÃO

¹Antônio Vinicius Vieira Araújo

¹Sabrine Vitoria dos Santos Ramos

¹Beatriz de Carvalho Oliveira

¹Isaac Alef Barbosa Gomes

¹Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Parnaíba, Piauí, Brasil

Área temática: Biotecnologia

Resumo: Este estudo teve como objetivo analisar os perfis de terpenos nos óleos essenciais de *Citrus reticulata*, considerando os principais fatores que influenciam sua composição química e qualidade. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura com buscas nas bases *PubMed*, *Scopus* e *Web of Science*, utilizando critérios rigorosos de inclusão e exclusão para garantir a qualidade metodológica dos estudos selecionados. Foram incluídos artigos originais publicados entre 2020 e 2025 que utilizaram técnicas cromatográficas para análise de terpenos, resultando em 5 estudos elegíveis. Os resultados indicaram que a composição terpênica varia amplamente conforme o método de extração, condições ambientais, estágio de desenvolvimento da planta e sazonalidade. Compostos como limoneno, γ -terpineno, linalol, β -cariofileno e valenceno foram os principais terpenos identificados, com concentrações influenciadas por técnicas como prensagem a frio, secagem à sombra e estresse hídrico. A discussão evidenciou que essas variáveis impactam diretamente na estabilidade química e nas propriedades bioativas dos óleos, com destaque para atividades ansiolíticas e antimicrobianas. Estudos recentes com metabolômica avançada permitiram a identificação de marcadores químicos, contribuindo para a compreensão da aplicação terapêutica desses compostos. Conclui-se que a composição dos óleos essenciais de *Citrus reticulata* é altamente variável e que a padronização dos métodos de extração, associada à integração de abordagens ômicas, é fundamental para garantir eficácia e segurança no uso farmacêutico e industrial. Pesquisas futuras devem explorar a interação entre genótipo, ambiente e técnicas de processamento para o desenvolvimento de produtos mais eficazes e personalizados.

INTRODUÇÃO

Os terpenos, metabólitos secundários derivados de unidades de isopreno (C_5H_8), representam a classe mais diversificada de compostos naturais, com mais de 300.000 estruturas identificadas (Prakash, 2017; Rodríguez; Johnson, 2023). Sua fórmula geral inclui unidades de isopreno, frequentemente modificadas por grupos funcionais (álcoois, aldeídos), originando os terpenoides, que ampliam sua versatilidade química e biológica (Prado-Audelo *et al.*, 2021).

Em *Citrus reticulata*, os terpenos predominam nos óleos essenciais, variando conforme o órgão vegetal. Nas folhas, destacam-se limoneno (50–69%), 1,8-cineol (0–26%) e γ -terpineno (2–14%), enquanto na casca, limoneno, γ -terpineno, mirceno e linalol são majoritários, com variações influenciadas por fatores ambientais, nutricionais e estágio de desenvolvimento (Nascimento, 2016; Hamdan *et al.*, 2016). Esses compostos atuam na defesa contra herbívoros e patógenos, além de possuírem propriedades farmacológicas



(Malik *et al.*, 2023).

A extração de terpenos voláteis, como o arraste por vapor d'água, aproveita sua apolaridade para separação via condensação e uso de solventes orgânicos (Shah *et al.*, 2012). Para análise, a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS) é preferencial devido à alta sensibilidade, seletividade e capacidade de identificar compostos em misturas complexas (Siqueira, 2019). Essa técnica é crucial para correlacionar composição química com bioatividade, garantindo segurança e eficácia em aplicações terapêuticas (Ambu *et al.*, 2020).

OBJETIVO

Realizar uma análise abrangente dos perfis de terpenos presentes nos óleos essenciais de *Citrus reticulata*, com ênfase na avaliação crítica dos principais fatores que influenciam sua composição química, bem como na verificação da qualidade desses óleos a partir das evidências disponíveis na literatura científica.

METODOLOGIA

Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo de reunir e sintetizar, de forma sistemática, os resultados de pesquisas relacionadas à avaliação da qualidade dos óleos essenciais de *Citrus Reticulata*, por meio da análise de terpenos. A coleta de dados foi realizada mediante à busca em bases de dados científicas internacionalmente reconhecidas, como PubMed, SCOPUS e Web of Science (WoS). A estratégia de busca incluirá os descritores e combinações de palavras-chave: “*Citrus Reticulata*” AND “*Terpenes*” AND “*Chromatography*”. Os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, tem o propósito de garantir a relevância e a qualidade metodológica dos estudos selecionados. Os critérios de inclusão considerarão artigos originais publicados entre 2020 e 2025, de acesso aberto, revisados por pares e que empreguem técnicas cromatográficas avançadas, como GC e HPLC, para a identificação e quantificação de terpenos em óleos essenciais de *Citrus Reticulata*. Também foram incluídos ensaios clínicos e estudos experimentais que avaliem a qualidade dos óleos essenciais, com ênfase em sua composição química, pureza e análise de terpenos. Os critérios de exclusão, foram estudos publicados fora do intervalo temporal de 2020 a 2025, bem como artigos de revisão não sistemática, relatórios técnicos, dissertações e teses que não tenham sido publicados como artigos científicos. Adicionalmente, foram desconsiderados estudos que não apresentem dados referentes à análise de terpenos ou que utilizem metodologias analíticas distintas das técnicas cromatográficas mencionadas, como espectroscopia sem suporte cromatográfico. A análise dos estudos selecionados foi conduzida por meio de uma avaliação crítica da qualidade metodológica, considerando aspectos como o delineamento experimental, a adequação das técnicas analíticas empregadas, a robustez dos dados apresentados e a pertinência dos resultados em relação ao objetivo da revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca nas bases de dados resultou na identificação de 14 artigos, conforme os critérios de inclusão e exclusão previamente definidos. A seleção foi conduzida de forma criteriosa, abrangendo a remoção de duplicatas, a triagem dos títulos e resumos para exclusão de estudos não elegíveis, e, posteriormente, a leitura completa dos textos restantes, com o



intuito de verificar sua adequação aos critérios estabelecidos. Ao final desse processo, foram considerados elegíveis 5 artigos que abordam, de forma específica, os perfis de terpenos presentes nos óleos essenciais de *Citrus reticulata*. A análise dos estudos revelou uma considerável diversidade na composição terpênica, influenciada, em grande parte, pelos diferentes métodos de extração utilizados. A **Tabela 1** apresenta uma síntese dos artigos selecionados, contemplando título, autores, ano de publicação, metodologia empregada e principais resultados.

Tabela 1: Dados da busca de periódicos nas bases de dados.

Autores (Ano)	Título	Metodologia	Resultados
Wang <i>et al.</i> (2023)	Comparison of the volatile organic compounds in Citrus reticulata 'Chachi' peel with different drying methods using E-nose, GC-IMS and HS-SPME-GC-MS	Neste estudo, os compostos orgânicos voláteis (VOCs) presentes no CRCP foram analisados por diferentes métodos de secagem — ao sol, ao ar quente e por liofilização — utilizando E-nose, GC-IMS e HS-SPME-GC-MS para identificação.	Os dados indicaram que a secagem por liofilização a vácuo proporcionou maior retenção de compostos orgânicos voláteis (COVs) no CRCP, demonstrando ser o método mais eficaz entre os avaliados. A análise quimiométrica identificou terpenos e ésteres como os principais metabólitos diferenciais resultantes dos distintos processos de secagem.
Figueira <i>et al.</i> (2020)	Tangerines Cultivated on Madeira Island-A High Throughput Natural Source of Bioactive Compounds	A composição volátil das cultivares Citrus reticulata Setubalense e Murcott foi caracterizada com o objetivo de comparar o potencial bioativo de sucos e cascas dessas variedades. Para isso, utilizou-se a técnica de microextração em fase sólida no espaço de cabeça acoplada à cromatografia gasosa com espectrometria de massas (HS-SPME/GC-MS).	A análise discriminante identificou VOMs bioativos, como β -cariofileno e E-ocimeno, que permitiram distinguir as tangerinas com base na variedade e no tipo de amostra (casca ou suco).
Whang <i>et al.</i> (2024)	Integrated HS-GC-IMS and UPLC-MS/MS-based metabolomics revealed the characteristics and differential volatile and nonvolatile metabolites of different citrus peels	As atividades antioxidantes das cascas cítricas foram avaliadas por meio dos ensaios de sequestro dos radicais DPPH e ABTS, além do método de poder redutor férrico (FRAP).	Os achados deste estudo contribuem para uma melhor compreensão das variações nos perfis metabólicos e nas atividades antioxidantes entre diferentes variedades de cascas cítricas, oferecendo subsídios para seu aproveitamento racional e integral.
Li <i>et al.</i> (2022)	Evaluation of dynamic changes and formation regularity in volatile flavorgasous compounds in Citrus reticulata 'chachi' peel at different collection periods using gas chromatography-ion mobility spectrometry	Neste estudo, empregaram-se a cromatografia gasosa com espectrometria de mobilidade iônica em headspace (HS-GC-IMS) e a análise discriminante por mínimos quadrados parciais (PLS-DA) para avaliar de forma eficiente a composição volátil relacionada ao sabor do CRCP seco, identificando suas variações ao longo dos diferentes estágios de colheita.	Foram identificados 71 compostos voláteis em Citrus reticulata 'Chachi' Peel, com álcoois e aldeídos predominando nos estágios iniciais da colheita, e terpenos, cetonas e ésteres nas fases finais. A análise PLS-DA destacou 12 compostos como marcadores para diferenciar os perfis de sabor ao longo da maturação, ao longo do amadurecimento dos frutos.
Wang <i>et al.</i> (2024)	Integrated HS-GC-IMS and UPLC-MS/MS-based metabolomics revealed the characteristics and differential volatile and nonvolatile metabolites of different citrus peels	As atividades antioxidantes das cascas cítricas foram avaliadas por meio dos ensaios de sequestro dos radicais DPPH e ABTS, além do método de poder redutor férrico (FRAP).	A análise de correlação identificou polifenóis como tangeretina, nobiletina, craniclavona, II, genisteína, ácido cafeico e isokaempferida como potenciais antioxidantes nas cascas cítricas. Esses dados contribuem para a compreensão das variações metabólicas entre variedades e apoiam seu uso racional e integral.

A composição terpênica dos óleos essenciais de *Citrus reticulata* é fortemente influenciada por fatores biotecnológicos, ambientais e metodológicos. Estudos recentes mostram que essas variáveis afetam diretamente o perfil químico e as aplicações industriais desses óleos, exigindo avanços em padronização e técnicas analíticas. Li *et al.* (2022) demonstraram que métodos de secagem afetam a estabilidade de monoterpenos, como o limoneno (78,2% dos VOCs). Temperaturas acima de 50 °C causaram perdas de até 22%, enquanto a secagem à sombra preservou melhor os compostos. Resultados semelhantes foram encontrados por Dias *et al.* (2020) em *Citrus sinensis*, reforçando a importância de métodos não térmicos, como a prensagem a frio, na conservação de terpenos voláteis.

A composição também varia com o ambiente. Dias *et al.* (2021) identificaram altas



concentrações de sesquiterpenos (β -cariofileno e α -humuleno) em tangerinas da Ilha da Madeira, atribuídas às condições edafoclimáticas. Em contraste, Wang *et al.* (2021) relataram predominância de monoterpenos em regiões semiáridas, sugerindo inibição da via biossintética de sesquiterpenos por estresse hídrico.

Além disso, Chen *et al.* (2022) observaram variações sazonais significativas: limoneno predominou na colheita precoce, enquanto valenceno aumentou nas fases tardias. Essas oscilações refletem a regulação das vias biossintéticas (ácido mevalônico e metileritritol fosfato). Tais variações impactam não só o aroma, mas também a bioatividade, como demonstrado por Gargano *et al.* (2007), que associaram altos níveis de limoneno a efeitos ansiolíticos.

Avanços metodológicos, como a metabolômica por HS-GC-IMS e UPLC-Q-Orbitrap HRMS (Wang *et al.*, 2023, 2024), identificaram marcadores químicos exclusivos e compostos com atividade antimicrobiana, como linalol e α -terpineol. A presença desses terpenos reforça o potencial farmacológico de *C. reticulata*, especialmente em sinergia com flavonoides. Diante da variabilidade química observada, o uso integrado de ferramentas como RNA-seq, metabolômica e GC-IMS, aliado à validação *in vivo* das bioatividades, é essencial para garantir consistência, segurança e eficácia no uso industrial e terapêutico desses óleos essenciais.

CONCLUSÃO

Os estudos analisados demonstram que a composição terpênica de *C. reticulata* é multifatorial, influenciada por métodos pós-colheita, fatores biogeográficos, estágio de maturação e interações metabólicas. A padronização de protocolos e a integração de técnicas ômicas emergentes são críticas para otimizar a qualidade e aplicabilidade industrial desses óleos. Desse modo, destaca-se que futuras pesquisas devem explorar a interação entre genótipo, ambiente e processamento, visando a customização de extratos para fins farmacêuticos, cosméticos e alimentícios.

Palavras-chave: Cromatografia; Óleo essencial; Tangerina e Terpenos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMBU, G. *et al.* Therapeutic potential of essential oils: focus on Citrus species. **Natural Product Communications**, v. 15, n. 7, 2020.

CHEN, X. *et al.* Evaluation of dynamic changes and formation regularity in volatile flavor compounds in Citrus reticulata 'chachi' peel at different collection periods using gas chromatography-ion mobility spectrometry. **Food Chemistry**, v. 373, p. 131512, 2022. DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.131512.

DIAS, M. I. *et al.* Tangerines Cultivated on Madeira Island-A High Throughput Natural Source of Bioactive Compounds. **Antioxidants**, v. 10, n. 5, p. 761, 2021.

GARGANO, A. C. Estudo da atividade ansiolítica e sedativa do óleo essencial das cascas de frutos de espécies do gênero Citrus. 2007. Dissertação (Mestrado) – **Universidade Estadual Paulista**, Botucatu, 2007.

HAMDAN, D. *et al.* Chemical composition of Citrus reticulata essential oil. **Journal of Essential Oil Research**, v. 28, n. 2, p. 123-130, 2016.



LI, Y. *et al.* Comparison of the volatile organic compounds in Citrus reticulata 'Chachi' peel with different drying methods using E-nose, GC-IMS and HS-SPME-GC- MS. **Food Chemistry**, v. 375, p. 131851, 2022.

MALIK, T. *et al.* Ecological roles of terpenes in plant defense mechanisms. **Phytochemistry Reviews**, v. 22, p. 345-367, 2023.

NASCIMENTO, L. D. *et al.* Composição química do óleo essencial de folhas de tangerina. **Química Nova**, v. 39, n. 4, p. 456-460, 2016.

PRADO-AUDELO, M. L. *et al.* Terpenoids: structural diversity and biological activities. **Molecules**, v. 26, n. 11, p. 3235, 2021.

RODRÍGUEZ, A.; JOHNSON, M. Advances in terpene biosynthesis pathways. **Annual Review of Plant Biology**, v. 74, p. 189-214, 2023.

SHAH, B. *et al.* Steam distillation: principles and applications. **Journal of Chemical Education**, v. 89, n. 5, p. 665-668, 2012.

SIQUEIRA, E. P. Técnicas cromatográficas na análise de óleos essenciais. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 29, p. 1-12, 2019.

WANG, L. *et al.* Chemical characterization and antimicrobial activity of Citrus reticulata essential oil: A comparative study with other Citrus species. **Journal of Agricultural and Food Chemistry**, v. 72, n. 1, p. 4991-5002, 2024.

ZIECH, R. E. *et al.* Atividade antimicrobiana do oleorresina de copaíba (Copaifera reticulata) frente a Staphylococcus coagulase positiva isolados de casos de otite em cães. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 33, n. 7, p. 123-130, 2013.



SORRISOS E ATITUDES BRILHANTES: PROMOÇÃO DE SAÚDE E BEM-ESTAR NA INFÂNCIA E NA FAMÍLIA ATRAVÉS DE PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE EXTENSÃO

¹ Mariana Souza Amorim

² Luisiane de Ávila Silva

¹ Acadêmica do curso de Medicina da Afya Paraíba - Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, Cabedelo, PB, Brasil;

² Docente orientadora do curso de Medicina da Afya Paraíba - Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, Cabedelo, PB, Brasil

(E-mail: mariana.amorim2001@hotmail.com)

Área temática: Educação em Saúde

RESUMO: O presente trabalho descreve a experiência extensionista do projeto "Sorrisos e Atitudes Brilhantes", realizado por estudantes da área da saúde em uma comunidade em situação de vulnerabilidade. A ação integrou atividades educativas sobre higiene pessoal, prevenção ao bullying e primeiros socorros (RCP e OVACE), visando a promoção de bem-estar físico, mental e social. A metodologia envolveu oficinas práticas, rodas de conversa, dinâmicas e simulações com participação ativa da comunidade. Os resultados esperados incluíram a redução de casos de bullying, aumento da adoção de hábitos de higiene, maior conhecimento sobre autocuidado e fortalecimento do vínculo entre a comunidade e as instituições de ensino. A proposta está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3), promovendo saúde e bem-estar de forma intersetorial e participativa.

Palavras-chave: Promoção de saúde; Extensão universitária; Higiene; Bullying; Primeiros socorros.

INTRODUÇÃO

A vulnerabilidade social de crianças e suas famílias está associada a diversos fatores de risco, como o bullying, a falta de acesso a produtos de higiene e a ausência de informações básicas sobre saúde e prevenção. Esses aspectos geram impactos significativos no bem-estar emocional e físico da população infantojuvenil, contribuindo para o agravamento de quadros de exclusão social, absenteísmo escolar e transtornos mentais, como ansiedade e depressão.

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), instituída pelo Ministério da Saúde, reforça a importância da articulação entre diferentes setores e níveis de atenção, propondo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde desde o nascimento até a adolescência. Dentro desse escopo, destaca-se a necessidade de abordagens educativas

que fomentem o desenvolvimento integral das crianças, especialmente em contextos de alta vulnerabilidade.

Além disso, a educação em saúde tem se mostrado uma estratégia eficaz para o empoderamento de populações marginalizadas, permitindo que indivíduos e comunidades



adquiram conhecimento, desenvolvam habilidades e fortaleçam atitudes voltadas ao autocuidado, à prevenção de doenças e à melhoria das condições de vida.

Nesse contexto, o papel da universidade transcende o ensino formal, devendo integrar ações de extensão voltadas à transformação social, por meio da escuta ativa e do diálogo horizontal com a comunidade. Projetos que envolvem práticas interdisciplinares de promoção de saúde e cidadania contribuem não apenas para o aprendizado dos discentes, mas também para a construção de ambientes mais saudáveis, respeitosos e inclusivos, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 3 — Saúde e Bem- Estar.

METODOLOGIA

O presente trabalho foi desenvolvido por meio de um projeto de extensão universitária de caráter educativo, com abordagem qualitativa, participativa e interdisciplinar. As atividades foram realizadas nos dias 28 de março e 4 de abril de 2025, em uma comunidade católica, no município de João Pessoa/PB, com planejamento prévio composto por reuniões virtuais e presenciais entre os discentes e a docente orientadora, além de visita técnica ao local. A intervenção foi estruturada em três eixos temáticos: higiene pessoal (bucal e corporal), prevenção ao bullying e primeiros socorros (RCP e OVACE). Foram utilizadas metodologias ativas, com dinâmicas de grupo, rodas de conversa, oficinas práticas e simulações com manequim. A seleção dos conteúdos considerou diretrizes do Ministério da Saúde e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), priorizando a linguagem acessível e a participação efetiva do público-alvo. A ação contou com a participação direta de crianças e voluntárias da comunidade, e foi conduzida por estudantes do curso de Medicina da Afya Paraíba - Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, sob supervisão docente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ação extensionista impactou positivamente os participantes, promovendo mudanças perceptíveis no comportamento e no nível de informação das crianças. As dinâmicas interativas sobre o bullying geraram reflexões importantes sobre empatia e respeito, culminando em depoimentos espontâneos de crianças relatando experiências prévias de exclusão. A atividade lúdica, seguida da roda de conversa, permitiu a construção coletiva de estratégias de enfrentamento, contribuindo para a redução de comportamentos discriminatórios no ambiente escolar e comunitário.

No eixo da higiene pessoal, a abordagem com demonstrações práticas possibilitou não apenas a instrução, mas também a efetivação do autocuidado. As crianças demonstraram compreensão dos conceitos abordados, evidenciando a importância da ação enquanto política complementar de promoção de saúde.

Por fim, a simulação de primeiros socorros com foco em RCP e OVACE (Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho) permitiu que as crianças e os cuidadores desenvolvessem habilidades práticas para atuação em situações de emergência. A utilização de manequins favoreceu o treinamento motor e a familiarização com as manobras, o que foi



reconhecido pelos participantes como um diferencial da ação.

De modo geral, a escuta ativa dos acadêmicos foi fundamental para o fortalecimento do vínculo e para a transmissão de informações baseadas em evidências. Os resultados obtidos demonstram que atividades educativas e participativas no contexto comunitário contribuem significativamente para o empoderamento social e a construção de ambientes mais saudáveis. Esses achados corroboram com os princípios da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 3), ao evidenciar a importância da intersectorialidade e da aproximação entre universidade e sociedade para a promoção do bem-estar coletivo.

CONCLUSÃO

O projeto Sorrisos e Atitudes Brilhantes demonstrou a eficácia das práticas interdisciplinares de extensão universitária como ferramentas de promoção da saúde, educação preventiva e fortalecimento do vínculo entre academia e comunidade. Através de ações lúdicas, dialógicas e práticas, foi possível abordar temas sensíveis como bullying, higiene pessoal e primeiros socorros de maneira acessível e efetiva.

Os resultados evidenciaram não apenas o aumento do conhecimento das crianças participantes, mas também a mobilização para mudanças comportamentais concretas, como a adoção de hábitos de higiene e o reconhecimento da importância do autocuidado e da empatia. Além disso, a capacitação da comunidade para situações de emergência fortaleceu a percepção de autonomia e segurança no cuidado cotidiano.

Conclui-se que intervenções educativas planejadas com base nas diretrizes das políticas públicas de saúde, quando executadas com sensibilidade social e envolvimento ativo dos participantes, contribuem significativamente para o empoderamento individual e coletivo. A experiência relatada reforça o papel transformador da universidade na promoção do bem-estar e na redução das desigualdades sociais, em consonância com os princípios da PNAISC e os objetivos do desenvolvimento sustentável.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. *Violência contra crianças e adolescentes: análise de situações de vulnerabilidade nos atendimentos de saúde*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC)*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_saude_crianca.pdf. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Política Nacional de Atenção Básica*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017.



INTERVENÇÃO EDUCATIVA MULTIDISCIPLINAR SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

¹ Mylena Corrêa Byrro Martins

² Raiane Ramos dos Santos

³ Mara Martins Ribeiro

^{1,2} Graduandas de Enfermagem da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Minas Gerais, Brasil

³ Professora e Orientadora da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, Minas Gerais, Brasil

Área temática: Educação em Saúde

Resumo: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades na comunicação social, padrões de comportamento repetitivos e preferências específicas. **Objetivo:** Relatar a experiência das acadêmicas de enfermagem da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, na realização de intervenção educativa de caráter multidisciplinar voltada para os usuários da Atenção Primária à Saúde sobre o TEA. **Metodologia:** Trata-se de um relato de experiência realizado em um centro do município de Belo Horizonte. A partir da identificação do diagnóstico situacional, foi realizada uma revisão bibliográfica em bases de dados científicas e a intervenção foi elaborada utilizando a metodologia ativa do tipo roda de conversa como estratégia central. A ação foi conduzida pelas acadêmicas de enfermagem com participação de uma psicóloga e uma terapeuta ocupacional, com um público aproximado de 20 pessoas. **Resultados e discussão:** Durante a atividade, observou-se interesse em alguns participantes, que realizaram diversas perguntas relacionadas ao tema. Entre os principais questionamentos, destacam-se curiosidade acerca dos sinais de alerta para o TEA, com os usuários demonstrando preocupação em identificar precocemente possíveis manifestações do transtorno em crianças e adolescentes de suas famílias. **Conclusão:** Além de favorecer o acesso à informação qualificada, a atividade contribuiu para o fortalecimento do vínculo entre usuários e equipe de saúde, estimulando a autonomia dos indivíduos na busca por esclarecimentos e intervenção precoce, com destaque para a importância de incorporar metodologia ativa e trabalho multidisciplinar na prática do SUS, especialmente durante datas estratégicas reforçando o impacto positivo na comunidade.

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades na comunicação social, padrões de comportamento repetitivos e preferências específicas. Nos últimos anos, o Brasil tem registrado um aumento expressivo no número de diagnósticos de TEA, especialmente entre crianças em idade escolar. No contexto brasileiro, embora ainda haja carência de dados epidemiológicos precisos, estimativas recentes apontam que cerca de 6 milhões de brasileiros estão no espectro autista. Ademais, o número de matrículas de estudantes com TEA em escolas públicas e privadas cresceu 48% entre os anos de 2022 e 2023, passando de 429 mil para 636 mil alunos. Esse aumento pode ser atribuído, em parte, à maior conscientização sobre o transtorno e à ampliação do acesso ao diagnóstico.



Estudos ressaltam que o aumento no número de diagnósticos não necessariamente indica um aumento na incidência do autismo, mas sim uma criteriosidade na identificação e no reconhecimento do transtorno. A ampliação do acesso às informações sobre o TEA tem desempenhado um papel fundamental nesse processo, permitindo que mais famílias busquem avaliação e apoio adequados para seus filhos. Ao mesmo tempo, a quantidade de informações disponíveis sobre o autismo aumentou de forma exponencial, com a disseminação de conteúdos nas redes sociais e na internet. A maior circulação de informações sobre o TEA incentivou um aumento na busca por serviços de saúde e ampliou o acesso a profissionais qualificados para diagnóstico e intervenção. A propagação de informações adulteradas, muitas vezes sem respaldo científico, tem sido uma preocupação crescente.

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem implementado diretrizes específicas para a atenção à reabilitação de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reforçando a importância de uma abordagem multidisciplinar que envolva médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros profissionais de saúde.

Os centros de saúde, por sua vez, desempenham um papel fundamental como porta de entrada para o acesso a esses serviços, sendo responsáveis pelo acolhimento inicial, triagem, encaminhamento para diagnóstico especializado e pelo acompanhamento longitudinal das pessoas com TEA. Dessa forma, a atenção primária em saúde se configura como eixo estratégico para a detecção precoce do transtorno, a coordenação do cuidado e a integração das ações de promoção, prevenção e reabilitação.

OBJETIVO

Relatar a experiência das acadêmicas de enfermagem da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, na realização de uma intervenção educativa de caráter multidisciplinar voltada para os usuários da Atenção Primária à Saúde sobre o TEA, com foco na orientação da comunidade quanto aos sinais de alerta, manejo inicial e acesso aos serviços especializados.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência realizado em um centro de saúde pertencente à rede de atenção primária do município de Belo Horizonte. A atividade teve início a partir de um diagnóstico situacional prévio, que identificou a necessidade de informar a comunidade sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e orientar quanto ao fluxo de atendimento na unidade. A intervenção ocorreu durante o mês de abril, em menção ao Mês de Conscientização sobre o Autismo, com um público aproximado de 20 pessoas, buscando a compreensão dos usuários através de práticas educativas. A partir da identificação do diagnóstico situacional, foi realizada uma revisão bibliográfica em bases de dados científicas (SciELO, PubMed, LILACS) e documentos oficiais (Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde e Centros de Controle e Prevenção de Doenças — CDC). Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2021 e 2025 que abordam epidemiologia, sinais de alerta, diagnóstico, políticas públicas e comunicação relacionada ao TEA. A intervenção foi elaborada utilizando a metodologia ativa do tipo roda de conversa como estratégia central. A atividade foi desenvolvida na sala de espera do serviço, buscando aproveitar o espaço de acolhimento e o tempo de permanência dos usuários para promover educação em saúde de forma acessível e participativa. A roda de conversa foi produzida pelas acadêmicas de Enfermagem da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, com participação de uma



psicóloga e uma terapeuta ocupacional, profissionais capacitadas para esclarecer sua atuação no atendimento da pessoa com TEA. Durante a sala de espera, foram abordados temas como sinais iniciais possíveis, como os pais podem agir, fluxo de atendimento na unidade de saúde, explicando como os usuários podem acessar os serviços especializados a partir da atenção primária, estimulando o apoio e a empatia. Com o apoio visual e educativo, foi elaborado e exposto um cartaz informativo no ambiente da sala de espera, contendo os dados básicos citados acima sobre o TEA. Os tópicos foram abordados com linguagem simples e acessível, favorecendo a compreensão por usuários de diferentes níveis de escolaridade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A participação dos usuários foi incentivada de maneira espontânea, respeitando a vontade e a disponibilidade dos presentes. Durante a atividade, observou-se interesse em alguns participantes, que realizaram diversas perguntas relacionadas ao tema. Entre os principais questionamentos, destacam-se curiosidade acerca dos sinais de alerta para o TEA, com os usuários demonstrando preocupação em identificar precocemente possíveis manifestações do transtorno em crianças e adolescentes de suas famílias. Todo o processo foi respeitado os princípios éticos da educação em saúde e a autonomia dos participantes, garantindo um ambiente de troca acolhedor, respeitoso e inclusivo. Outro aspecto relevante foi a experiência das acadêmicas de enfermagem, que participaram ativamente da intervenção em conjunto com a psicóloga e a terapeuta ocupacional, compondo uma equipe multidisciplinar. A interação entre as profissionais e as estudantes favoreceu uma abordagem integrada e acolhedora, contribuindo para a tradução de um tema complexo e de difícil entendimento em uma linguagem acessível para a comunidade. Essa vivência permitiu às acadêmicas desenvolver habilidades de comunicação, trabalho em equipe e educação em saúde, além de ampliar sua compreensão sobre a importância da atuação interdisciplinar na atenção primária.

CONCLUSÃO

A experiência realizada no centro de saúde, por meio da roda de conversa na sala de espera, demonstrou a relevância de ações educativas para a promoção de orientações direcionadas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) no âmbito da atenção primária. A participação ativa dos usuários, refletida nas perguntas sobre os sinais de alerta do autismo, evidenciou não apenas o interesse da comunidade, mas também a necessidade de fortalecimento contínuo das estratégias de educação em saúde.

Além de favorecer o acesso à informação qualificada, a atividade contribuiu para o fortalecimento do vínculo entre usuários e equipe de saúde, estimulando a autonomia dos indivíduos na busca por esclarecimentos e intervenção precoce.

A ação destaca a importância de incorporar metodologia ativa e trabalho multidisciplinar na prática do SUS, especialmente durante datas estratégicas como o Mês de Conscientização do Autismo, reforçando o impacto positivo na comunidade.

Palavras-chave: Atenção Primária; Educação em Saúde; Interdisciplinaridade; Intervenção Comunitária; Transtorno do Espectro Autista.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, B. / O. / “Promovendo a Neurodiversidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”: 02/4 – Dia Mundial e Nacional de Conscientização sobre o Autismo 2025. Disponível em: <<https://bvsmis.saude.gov.br/promovendo-a-neurodiversidade-e-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-02-4-dia-mundial-e-nacional-de-conscientizacao-sobre-o-autismo-2025>>. Acesso em: 24 maio. 2025.

ARAUJO, A. G. R.; SILVA, M. A. DA; ZANON, R. B. AUTISMO, NEURODIVERSIDADE E ESTIGMA: PERSPECTIVAS POLÍTICAS E DE INCLUSÃO. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 27, p. e247367, 2023.

BASTO, A. T. O. DA S.; CEPellos, V. M. Autismo nas organizações: percepções e ações para inclusão do ponto de vista de gestores. *Cadernos EBAPE BR*, v. 21, n. 1, p. e2022-0061, 2023.

COSTA, A. DE A. et al. Transtorno do espectro do autismo e o uso materno e paterno de medicamentos, tabaco, álcool e drogas ilícitas. *Ciencia & saude coletiva*, v. 29, n. 2, p. e01942023, 2024.

DE TAQUARI, P. Rede municipal de ensino atende mais de 80 alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Disponível em: <<https://www.taquari.rs.gov.br/noticia/visualizar/id/3994/?rede-municipal-de-ensino-atende-mais-de-80-alunos-com-transtorno-do-espectro-autista-tea.html>>. Acesso em: 24 maio. 2025.

FERNANDES, C. S.; TOMAZELLI, J.; GIRIANELLI, V. R. Diagnóstico de autismo no século XXI: evolução dos domínios nas categorizações nosológicas. *Psicologia USP*, v. 31, p. e200027, 2020.

HISSA, D.; ARAÚJO, N. Infodemia na sociedade do desempenho: entre o mural panfletário e o panóptico digital. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, v. 21, n. 4, p. 1011–1035, 2021.

Legislação Municipal - Catálogo de Legislação Municipal. Disponível em: <<https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/instrucao-normativa-secretaria-municipal-de-educacao-sme-14-de-4-de-marco-de-2025>>. Acesso em: 24 maio. 2025.

LIMA, T. F. O acesso à atenção à saúde para as pessoas autistas no SUS do Município. Disponível em: <https://www.cmbh.mg.gov.br/sites/default/files/publicacoes/2025/04/nt_09_2025.pdf>. Acesso em: 24 maio. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Conheça o Programa TEAcolhe. Disponível em: <<https://saude.rs.gov.br/conheca-o-programa-teacolhe>>. Acesso em: 24 maio. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Pela primeira vez, Ministério da Saúde inclui tratamento do Transtorno do Espectro Autista na Política Nacional da Pessoa com Deficiência. Disponível



em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/setembro/pela-primeira-vez-ministerio-da-saude-inclui-tratamento-do-transtorno-do-espectro-autista-na-politica-nacional-da-pessoa-com-deficiencia>>. Acesso em: 24 maio. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Proposta de atualização do protocolo do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo está em consulta pública. Disponível em: <<https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/noticias/2021/dezembro/proposta-de-atualizacao-do-protocolo-do-comportamento-agressivo-no-transtorno-do-espectro-do-autismo-esta-em-consulta-publica>>. Acesso em: 24 maio. 2025.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEA: saiba o que é o Transtorno do Espectro Autista e como o SUS tem dado assistência a pacientes e familiares. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/abril/tea-saiba-o-que-e-o-transtorno-do-espectro-autista-e-como-o-sus-tem-dado-assistencia-a-pacientes-e-familiares>>. Acesso em: 24 maio. 2025.

PINTO, R. N. M. et al. Autismo infantil: impacto do diagnóstico e repercussões nas relações familiares. *Revista gaucha de enfermagem*, v. 37, n. 3, p. e61572, 2016.

SCAMATI, V.; CANTORANI, J. R. H.; PICININ, C. T. Os desafios na aprendizagem de indivíduos com transtorno de espectro autista (TEA): uma revisão. *Ensaio*, v. 33, n. 126, p. e0254453, 2025.



MICROVESÍCULAS E EXOSSOMOS NA HEMOSTASIA: DA FISIOLOGIA AO POTENCIAL LABORATORIAL E CLÍNICO - REVISÃO INTEGRATIVA

¹Victória Gomes de França Lima

²Bárbara Rafaela da Silva Barros

³Betânia Lucena Domingues Hatzlhofer

^{1, 2, 3}Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brasil.

Área temática: Biologia

Resumo: A hemostasia é um processo regulado por fatores pró e anticoagulantes em equilíbrio. Estudos recentes destacaram as vesículas extracelulares (VEs), como microvesículas e exossomos, como agentes ativos na coagulação. Essas vesículas expõem fosfatidilserina, transportam fator tecidual e modulam a geração de trombina e a inflamação. Esta revisão analisa seu papel na coagulação e seu potencial clínico em condições como COVID-19, sepse com coagulopatia difusa, pré-eclâmpsia e doenças cardiovasculares. Níveis elevados de VEs estão associados a piores desfechos. Estratégias experimentais mostram que a inibição de suas ações pode reduzir a trombose. Assim, as VEs surgem como biomarcadores promissores e alvos terapêuticos em doenças tromboinflamatórias.

INTRODUÇÃO

A hemostasia é um processo fisiológico essencial que impede a perda sanguínea excessiva após lesões vasculares, mantendo o fluxo sanguíneo adequado e prevenindo tanto patologias trombóticas quanto hemorrágicas. Esse complexo sistema depende da comunicação entre plaquetas, fatores plasmáticos de coagulação, inibidores fisiológicos e as recém-descritas vesículas extracelulares (VEs) ((Puhm, Boilard, & Machlus, 2021).

As VEs são classificadas conforme o seu tamanho, englobando principalmente as microvesículas (100 a 1000 nm) e os exossomos (30 a 150 nm). Elas são liberadas por diversos tipos celulares através de mecanismos distintos: o brotamento direto da membrana plasmática caracteriza a formação das microvesículas, enquanto a fusão de corpos multivesiculares com a membrana celular origina os exossomos (Al-Koussa; AlZaim; El-Sabban, 2022; Puhm; Boilard; Machlus, 2020).

Essas vesículas são reconhecidas como potentes mediadoras da coagulação por exporem fosfatidilserina em sua superfície, carregarem fator tecidual, lipídios bioativos e ácidos nucleicos. Elas atuam como plataformas para a ativação enzimática da trombina e participam também da sinalização inflamatória (Han et al., 2021). Além de seu papel fisiológico, as VEs estão associadas a diversos estados patológicos, incluindo sepse, COVID-19, doenças cardiovasculares e distúrbios gestacionais (Han et al., 2021; McElrath et al., 2020; Wegrzyn et al., 2021), sugerindo que possuem um potencial significativo como biomarcadores e alvos terapêuticos.

OBJETIVO

Analisar o papel das microvesículas e exossomos na hemostasia e avaliar seu potencial clínico como biomarcadores e alvos terapêuticos em distúrbios de coagulação.



METODOLOGIA

Revisão descritiva e qualitativa nas bases PubMed e Scielo, utilizando os descritores "*Microvesicles OR Microparticles AND Hemostasis AND Coagulation AND Platelets*" em inglês e português. Foram incluídos dez artigos publicados nos últimos cinco anos que investigam estrutura, função e relevância laboratorial das vesículas na coagulação. Foram excluídos da análise, estudos que não abordassem sobre microvesículas ou exossomos e estudos com aplicações dessas partículas em outras doenças não relacionadas aos processos hemostáticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização e origem das vesículas extracelulares e mecanismos de ação na coagulação

As vesículas extracelulares, especialmente as microvesículas e exossomos, são liberadas por vários tipos celulares, com destaque para as plaquetas ativadas, células endoteliais, monócitos e eritrócitos. Além da exposição de fosfatidilserina e, em muitos casos, do fator tecidual (TF), essas vesículas transportam moléculas bioativas como citocinas inflamatórias, proteínas de adesão e microRNAs, desempenhando papel importante na comunicação intercelular e na modulação de processos inflamatórios e trombogênicos (Al-Koussa; AlZaim; El-Sabban, 2022; McElrath *et al.*, 2020; Puhm; Boilard; Machlus, 2020).

Sua liberação ocorre em resposta a diversos estímulos como estresse oxidativo, infecções, hipóxia e ativação inflamatória. Em modelos de trombogênese, essas vesículas funcionam como plataformas que favorecem a ativação do fator X e a formação do complexo protrombinase, culminando na geração de trombina e deposição de fibrina (Suades *et al.*, 2022). Estudos baseados em ensaios de trombodinâmica mostraram que vesículas de origem monocítica com TF possuem alta eficiência em iniciar a coagulação, enquanto vesículas de eritrócitos atuam na propagação da trombose pela via intrínseca (Lipets *et al.*, 2020; Voukalis; Shantsila; Lip, 2019).

Evidências clínicas em condições patológicas

COVID-19: Em pacientes com COVID-19, a elevação de microvesículas plaquetárias e endoteliais se associa a altos níveis de Dímero-D e IL-6, demonstrando correlação com inflamação sistêmica e risco trombótico (Tayer *et al.*, 2024). Também se observou que esses pacientes apresentaram aumento significativo na atividade pró-trombótica de vesículas circulantes em comparação com controles saudáveis (Zahran *et al.*, 2021);

Sepse e coagulação intravascular disseminada (CIVD): Na sepse com coagulação intravascular disseminada (CIVD), marcadores como CD40 e PF4 foram associados à ativação plaquetária e à liberação de vesículas ricas em Fator tecidual. Pacientes com altos níveis de microvesículas relacionadas a fator tecidual tiveram um pior prognóstico e maior mortalidade (Wegrzyn *et al.*, 2021);


Pré-eclâmpsia: Na pré-eclâmpsia precoce, proteínas identificadas em vesículas plasmáticas, como GP1BA e ZA2G, formaram painéis preditivos com alta acurácia para risco gestacional antes da 35ª semana (McElrath *et al.*, 2020). O estudo também indicou que os exossomos placentários participam ativamente da comunicação entre a placenta e o sistema imune

materno, podendo modular a resposta inflamatória e favorecer um ambiente pró-trombótico. No mesmo estudo foram observadas ainda: alterações na quantidade, composição e bioatividade desses exossomos em gestações complicadas por pré-eclâmpsia, o que contribui para a disfunção endotelial e ativação plaquetária precoce, agravando o risco de eventos trombóticos maternos.

Doenças Cardiovasculares: Em doenças cardiovasculares, vesículas de origem endotelial e plaquetária são encontradas em concentrações aumentadas em pacientes com aterosclerose, hipertensão e doença coronariana, podendo atuar como biomarcadores prognósticos (Al-Koussa; AlZaim; El-Sabban, 2022).

Nos estudos realizados houve diferentes condições clínicas onde foram apresentadas diferentes concentrações de microvesículas circulantes por μL . Essas concentrações estão descritas no Figura 1.

Figura 1. Concentração de microvesículas circulantes e percentual de fator tecidual X condições



clínicas.

Fonte: elaborado pela autora.

Potencial terapêutico e aplicações clínicas

Estudos experimentais demonstram que a inibição da exposição de fosfatidilserina ou a neutralização de TF vesicular reduz significativamente a formação de trombos. Também há investigações sobre a utilização de vesículas modificadas como sistemas de entrega de fármacos anticoagulantes ou anti-inflamatórios (Tayer *et al.*, 2024).

As evidências demonstraram que as microvesículas e exossomos exercem papéis multifuncionais na hemostasia e na patogênese de condições trombo-inflamatórias. Entretanto, não são apenas subprodutos celulares, atuando também como mediadores da comunicação intercelular, promovendo eventos de ativação imune e vascular. Porém a heterogeneidade em sua origem celular, composição bioquímica e função destaca a necessidade de padronização dos métodos de isolamento, caracterização e quantificação, o



que gera maior dificuldade no estabelecimento de método diagnóstico efetivo (Puhm; Boilard; Machlus, 2020).

Todavia, os avanços recentes em proteômica e análise e microRNAs contidos nas vesículas reforçam seu potencial diagnóstico e prognóstico. Além disso, estratégias terapêuticas que visem interferir na formação ou ação dessas vesículas emergem como alternativa inovadora às terapias antitrombóticas convencionais. O campo ainda demanda ensaios clínicos mais robustos para consolidar a aplicação clínica das vesículas extracelulares na medicina laboratorial.

CONCLUSÃO

As vesículas extracelulares, especialmente microvesículas e exossomos, consolidam-se como elementos chave na regulação da homeostasia e na patogênese de diversas doenças tromboinflamatórias. Seu papel como biomarcadores promissores e potenciais alvos terapêuticos é reforçado pelas evidências que demonstram sua participação ativa na ativação e propagação da coagulação, bem como na mediação de respostas inflamatórias.

Apesar do avanço nas investigações, a aplicação clínica das vesículas extracelulares ainda demanda maior padronização nos métodos de isolamento e caracterização, além de estudos clínicos mais robustos que validem sua eficácia e segurança em contextos diagnósticos e terapêuticos. Assim, elas representam uma fronteira inovadora na medicina laboratorial, com potencial para transformar a abordagem de doenças associadas à disfunção hemostática.

Palavras-chave: Coagulação; Exossomos; Microvesículas; Sangue; Trombose.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AL-KOUSSA, Houssam; ALZAIM, Ibrahim; EL-SABBAN, Marwan E. Pathophysiology of coagulation and emerging roles for extracellular vesicles in coagulation cascades and disorders. **Journal of Clinical Medicine**, v. 11, n. 16, p. 4932, 22 ago. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/jcm11164932>. Acesso em: 23 maio 2025.

HAN, Chaoshan *et al.* Extracellular vesicles in cardiovascular disease: biological functions and therapeutic implications. **Pharmacology & Therapeutics**, p. 108025, out. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2021.108025>. Acesso em: 23 maio 2025.

LIPETS, E. N. *et al.* Use of Thrombodynamics for revealing the participation of platelet, erythrocyte, endothelial, and monocyte microparticles in coagulation activation and propagation. **PLOS ONE**, v. 15, n. 5, p. e0227932, 29 maio 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227932>. Acesso em: 24 maio 2025.

MCEL RATH, Thomas F. *et al.* Late first trimester circulating microparticle proteins predict the risk of preeclampsia < 35 weeks and suggest phenotypic differences among affected cases. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, 21 out. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41598-020-74078-w>. Acesso em: 23 maio 2025.

PUHM, Florian; BOILARD, Eric; MACHLUS, Kellie R. Platelet extracellular vesicles: beyond the blood. **Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology**, v. 41, n. 1, p. 87-96, 2021.



PUHM, Florian; BOILARD, Eric; MACHLUS, Kellie R. Platelet extracellular vesicles. **Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology**, 8 out. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1161/atvbaha.120.314644>. Acesso em: 24 maio 2025.

SUADES, Rosa *et al.* Platelet-released extracellular vesicles: the effects of thrombin activation. **Cellular and Molecular Life Sciences**, v. 79, n. 3, mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00018-022-04222-4>. Acesso em: 24 maio 2025.

TAYER, Akbar Hashemi *et al.* Evaluation of circulating microvesicles and their procoagulant activity in patients with COVID-19. **BMC Research Notes**, v. 17, n. 1, 22 ago. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13104-024-06875-9>. Acesso em: 24 maio 2025.

VOUKALIS, Christos; SHANTSILA, Eduard; LIP, Gregory Y. H. Microparticles and cardiovascular diseases. **Annals of Medicine**, v. 51, n. 3-4, p. 193-223, 19 maio 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/07853890.2019.1609076>. Acesso em: 24 maio 2025.

WEGRZYN, Gracelene *et al.* Biomarkers of platelet activation and their prognostic value in patients with sepsis-associated disseminated intravascular coagulopathy. **Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis**, v. 27, p. 107602962094330, 1 jan. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1076029620943300>. Acesso em: 23 maio 2025.

ZAHARAN, Asmaa M. *et al.* Circulating microparticles and activated platelets as novel prognostic biomarkers in COVID-19; relation to cancer. **PLOS ONE**, v. 16, n. 2, p. e0246806, 22 fev. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246806>. Acesso em: 24 maio 2025.



NEOANTÍGENOS EM DOENÇAS AUTOIMUNES: UMA REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE O PAPEL DAS MODIFICAÇÕES PÓS-TRADUCIONAIS DE PROTEÍNAS

¹ Victória Gomes de França Lima

² Bárbara Rafaela da Silva Barros

^{1, 2} Universidade Federal de Pernambuco. Recife, Pernambuco, Brasil.

Área temática: Biologia

Resumo: Doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico (LES) e artrite reumatoide (AR), ocorrem através da quebra da auto-tolerância imunológica e da geração de autoanticorpos reativos contra estruturas do próprio organismo. Essa revisão integrativa analisou publicações recentes sobre o papel das modificações pós-traducionais (PTMs), como citrulinização, carbamilação, crotonilação e glicosilação aberrante, na geração de neoantígenos imunogênicos. Essas alterações favorecem a apresentação via MHC tipo II, induzindo autoanticorpos como anti-CCP e anti-dsDNA. Abordagens terapêuticas emergentes incluem vacinas tolerogênicas, espectrometria de massas aplicada à imunopeptidômica, inibidores do sistema ubiquitina-proteassoma e moduladores da enzima peptidil-arginina deaminase (PAD). Tais estratégias apontam para tratamentos mais específicos, seguros e potencialmente personalizados para doenças autoimunes.

INTRODUÇÃO

As doenças autoimunes constituem um grupo heterogêneo de patologias caracterizadas pela quebra da tolerância imunológica, resultando na ativação de células T e B contra componentes do próprio organismo (Lande et al., 2021). Entre essas doenças, destacam-se o lúpus eritematoso sistêmico (LES) e a artrite reumatoide (AR), notáveis pela amplitude das manifestações clínicas, pelos complexos mecanismos moleculares envolvidos e por sua alta prevalência (Miller, 2023). A resposta imunológica afeta estruturas próprias através de proteínas endógenas que podem sofrer alterações estruturais, tornando-se imunogênicas, ou seja, capazes de serem reconhecidas como “não próprias” pelo sistema imunológico (Martín Monreal et al., 2023). Entre os principais mecanismos moleculares implicados nesse processo estão as modificações pós-traducionais (PTMs), que promovem alterações na estrutura tridimensional, na carga elétrica ou na conformação de apresentação das proteínas. E quando exacerbadas ou desreguladas, essas PTMs podem gerar neoantígenos, os quais, após processamento por células apresentadoras de antígenos (APCs) e apresentação via complexo maior de histocompatibilidade (MHC), desencadeiam respostas imunológicas patológicas (Xie et al., 2022; Colasanti et al., 2022).

A identificação desses mecanismos não apenas aprofunda a compreensão da etiopatogenia das doenças autoimunes, mas também sinaliza novas possibilidades para o desenvolvimento de biomarcadores diagnósticos e estratégias terapêuticas inovadoras, potencialmente mais específicas e seguras (Zhai e Zhu, 2023),



OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo revisar o papel das modificações pós-traducionais de proteínas na formação de antígenos associados à autoimunidade. Além disso, busca avaliar propostas terapêuticas experimentais e implicações laboratoriais que envolvem essas alterações estruturais, com ênfase em estudos publicados nos últimos cinco anos.

METODOLOGIA

Foi realizada uma revisão integrativa de abordagem descritiva e qualitativa, com levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed e ScienceDirect. Os descritores utilizados foram: *post-translational modifications OR protein processing modifications AND autoimmune diseases AND antigen formation*, selecionando exclusivamente artigos publicados em inglês entre 2019 e 2024. Os critérios de inclusão abrangeram estudos que abordavam aspectos bioquímicos e imunológicos da origem de antígenos, ensaios laboratoriais e investigação de terapias emergentes. Após triagem e leitura criteriosa, foram incluídos oito estudos relevantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tipos de modificações pós-traducionais (PTMs) envolvidas

Entre as principais PTMs associadas à autoimunidade, destacam-se: Citrulinação, Carbamilação, Crotonilação, Hidroxi-butililação e Glicosilação aberrante, cujos resultados moleculares e suas respectivas doenças associadas estão descritas na Tabela 1. Essas modificações promovem o surgimento de epítomos alterados, capazes de ativar células T CD4+ e induzir a formação de autoanticorpos específicos, como os autoanticorpos anti proteínas citrulinadas (Anti-CCP) na artrite reumatoide (AR) e os autoanticorpos anti-proteínas carbamiladas (Anti-CarP) no lúpus eritematoso sistêmico (LES).

Tabela 1. Tipos de neoantígenos gerados por modificações pós-traducionais (PTMs), com indicação dos resíduos alvo, dos efeitos estruturais e imunológicos, e das doenças autoimunes associadas.

Modificação	Resíduo Alvo	Resultado	Doenças Associadas	Fontes
Citrulinação	Arginina	Geração de citrulina, perda de carga positiva e aumento de imunogenicidade	Artrite Reumatoide, LES	Kwon; Ju, 2021
Carbamilação	Lisina	Conversão de homocitrulina, modificação estrutural e aumento da resposta imunológica	LES, AR	Lande <i>et al.</i> , 2021
Crotonilação	Lisina	Adição de crotonil à lisina, alteração epigenética e expressão gênica	LES	Ramos-Martínez <i>et al.</i> , 2023
Hidroxi-butililação	Lisina	Modificação que favorece a inflamação e migração de leucócitos	LES	Xie <i>et al.</i> , 2022
Glicosilação Aberrante	Diversos	Alterações nos padrões de glicosilação com efeitos na sinalização e tolerância imunológica.	LES, outras doenças autoimunes	Ramos-Martínez <i>et al.</i> , 2023.



Mecanismos imunopatológicos e abordagens diagnósticas derivadas

Estudos revelam que proteínas crotoniladas e hidroxibutiriladas, tais como a HSPA8 e moesina, atuam em vias-chave como o processamento de antígenos pelo MHC II e a migração de leucócitos para tecidos inflamados, respectivamente. No LES, a glicosilação anômala das células B e T contribui para desregulação da sinalização, produção aumentada de anticorpos e lesão renal (nefrite lúpica) (Xie *et al.*, 2022). Na AR, a citrulinação facilita a quebra da auto-tolerância, promovendo a ativação das células T CD4⁺ (T helper) e linfócitos B mutantes que geram autoanticorpos. Testes para anti-CCP e anti-CarP têm sido utilizados como ferramentas complementares. Além disso, há propostas para avaliação combinada de haplótipos HLA específicos e metabólitos inflamatórios circulantes, o que pode fazer com que os diagnósticos sejam mais precoces e assim, melhorando a terapia do paciente. (Zhai; Zhu, 2023).

Novas Perspectivas Terapêuticas Inovadoras

Vacinas com peptídeos citrulinados (CitAg)

Uma das abordagens terapêuticas mais inovadoras no tratamento da autoimunidade envolve o uso de vacinas baseadas em peptídeos citrulinados, especialmente aplicadas à artrite reumatoide. Essas vacinas utilizam fragmentos proteicos previamente modificados por citrulinação, capazes de induzir a tolerância imunológica específica sem comprometer a imunidade global do paciente. O estudo de Jin *et al.*, 2024, demonstrou que a administração desses peptídeos em modelos murinos levou à expansão de células T reguladoras e à redução de citocinas inflamatórias, como IL-17 e Interferon-Gama (IFN- γ). No estudo também foi observado uma diminuição da atividade de células inflamatórias, acarretando em uma menor destruição articular e inflamação crônica. Essa estratégia representa um enorme avanço no restabelecimento da tolerância imunológica com maior especificidade e segurança que os imunossuppressores tradicionais.

Imunopeptidômica por Espectrometria de massas

Avanços recentes destacam o uso da imunopeptidômica por espectrofotometria de massas como ferramenta inovadora na identificação de neoantígenos oriundos de modificações pós-traducionais. Essa técnica permite a análise direta dos peptídeos apresentados por moléculas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC), revelando sequências modificadas, como peptídeos citrulinados ou carbamilados, que escapam da tolerância imunológica. Ao identificar os epítomos reais envolvidos na ativação de células T autorreativas, a imunopeptidômica oferece um enorme potencial para o desenvolvimento de terapias mais adequadas e novos biomarcadores na artrite reumatoide entre outras doenças auto-imunes (Lichti; Wan, 2023);

Inibidores do sistema Ubiquitina-Proteassoma (UPS)

Entre as estratégias terapêuticas emergentes no campo das doenças autoimunes, destacam-se os inibidores do sistema Ubiquitina-Proteassoma (UPS), cuja atuação pode interferir diretamente na formação e apresentação de antígenos. O UPS é responsável pela degradação seletiva de proteínas celulares, regulando processos como sinalização inflamatória, apoptose e apresentação antigênica (Chondrogianni; Gonos, 2012). Em contextos autoimunes, o mau funcionamento desse sistema pode favorecer a apresentação



de proteínas modificadas pós-traducionalmente, como aquelas que foram citrulinadas ou carbamiladas, contribuindo assim para o início da doença auto-imune, com a quebra da auto-tolerância imunológica. Esses inibidores, como o bortezomibe e o carfilzomibe reduziram significativamente a sobrecarga inflamatória e a produção de autoanticorpos, ao limitar a ativação de células T e B autorreativas em modelos de esclerose múltipla (Yadav *et al.*, 2022).

Modulação de enzimas responsáveis por PTMs

Outra linha terapêutica emergente consiste na modulação direta das enzimas que promovem modificações pós-traducionais, como a citrulinação e a carbamilação. As enzimas peptidil arginina deaminases (PADs), por exemplo, são responsáveis pela conversão de arginina em citrulina - um evento chave na geração de neoantígenos imunogênicos inibidores de PADs têm sido estudados como ferramentas para bloquear precocemente a formação de epítomos alterados que ativam respostas autoimunes (Miller, 2023). De forma semelhante, outras enzimas modificadoras, como aquelas envolvidas na glicosilação ou crotonilação, também vêm sendo investigadas como alvos farmacológicos. A regulação dessas enzimas pode reduzir a apresentação de proteínas anormalmente modificadas, modulando a ativação de células T e B e prevenindo a perpetuação da inflamação crônica. Esse tipo de abordagem apresenta o potencial de interferir na origem molecular da autoimunidade, oferecendo alta especificidade com menores efeitos colaterais (Kwon; Ju, 2021).

CONCLUSÃO

Diante disso, conclui-se que a formação de neoantígenos por modificações pós-traducionais de proteínas é um evento central na quebra da autotolerância em doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Um maior conhecimento sobre essas alterações estruturais, têm proporcionado novas abordagens diagnósticas e terapêuticas, especialmente com o uso de vacinas tolerogênicas, inibidores de vias bioquímicas específicas e ensaios laboratoriais mais sensíveis. Embora a maioria das estratégias observadas ainda estejam em fase experimental, os resultados até o momento são bastante promissores e indicam um futuro mais eficaz no tratamento de doenças autoimunes.

Palavras-chave: Autoimunidade; Antígenos; Neoantígenos; Proteínas; Tolerância.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHONDROGIANNI, Niki; GONOS, Efstathios S. Chapter 2 - structure and function of the ubiquitin–proteasome system: modulation of components. *In*: GRUNE, Tilman (ed.). **The proteasomal system in aging and disease**. [S. l.]: Academic Press, 2012. v. 109, p. 41-74. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397863-9.00002-X>.

MILLER, Frederick W. The increasing prevalence of autoimmunity and autoimmune diseases: an urgent call to action for improved understanding, diagnosis, treatment, and prevention. **Current Opinion in Immunology**, v. 80, p. 102266, fev. 2023. Disponível

em: <https://doi.org/10.1016/j.coi.2022.102266>. Acesso em: 24 maio 2025.

KWON, Eui-Jong; JU, Ji Hyeon. Impact of posttranslational modification in pathogenesis of rheumatoid arthritis: focusing on citrullination, carbamylation, and acetylation. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 22, n. 19, p. 10576, 30 set. 2021.



Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijms221910576>. Acesso em: 19 maio 2025.

LANDE, Roberto *et al.* Complementary effects of carbamylated and citrullinated LL37 in autoimmunity and inflammation in systemic lupus erythematosus. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 22, n. 4, p. 1650, 6 fev. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijms22041650>. Acesso em: 19 maio 2025.

YADAV, Dhananjay *et al.* Modulating the ubiquitin–proteasome system: a therapeutic strategy for autoimmune diseases. **Cells**, v. 11, n. 7, p. 1093, 24 mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/cells11071093>. Acesso em: 19 maio 2025.

LICHTI, Cheryl F.; WAN, Xiaoxiao. Using mass spectrometry to identify neoantigens in autoimmune diseases: the type 1 diabetes example. *Seminars in Immunology*, v. 66, p. 101730, mar. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.smim.2023.101730>. Acesso em: 20 de abril de 2025.

ZHAI, Yue; ZHU, Ping. Post-translationally modified neoantigens: promising targets for diagnostic strategy of autoimmune diseases. **Clinical and Translational Medicine**, v. 13, n. 8, ago. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ctm2.1373>. Acesso em: 19 maio 2025.

RAMOS-MARTÍNEZ, Ivan *et al.* The role of B cell and T cell glycosylation in systemic lupus erythematosus. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 24, n. 1, p. 863, 3 jan. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijms24010863>. Acesso em: 19 maio 2025.

JIN, Xu *et al.* A citrullinated antigenic vaccine in treatment of autoimmune arthritis. **Science Bulletin**, ago. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.scib.2024.02.042>. Acesso em: 19 maio 2025.

XIE, Ting *et al.* Proteomics analysis of lysine crotonylation and 2-hydroxyisobutyrylation reveals significant features of systemic lupus erythematosus. **Clinical Rheumatology**, 8 ago. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s10067-022-06254-4>. Acesso em: 19 maio 2025.

MILLER, Frederick W. The increasing prevalence of autoimmunity and autoimmune diseases: an urgent call to action for improved understanding, diagnosis, treatment, and prevention. **Current Opinion in Immunology**, v. 80, p. 102266, fev. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.coi.2022.102266>. Acesso em: 24 maio 2025.



EFEITO DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA NA ÁREA ESPORTIVA: ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM

¹ Bruna Lorde de Medeiros

² Ana Luísa Alves Torres

³ Ariane Oliveira Gomes

⁴ Hiago Mateus Soares Trindade

⁵ Cristiane Perácio Bastos

¹²³⁴⁵ Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo (FACIC). Curvelo, Minas Gerais, Brasil

Área temática: Enfermagem

Resumo: **Introdução:** A Educação em Saúde é uma estratégia que envolve ações que visam a promoção da saúde e uma forma de estimular os indivíduos a adquirirem comportamentos positivos para prevenir doenças. **Objetivo:** Analisar a efetividade de uma intervenção educativa para crianças e adolescentes iniciantes no futebol. **Metodologia:** Pesquisa longitudinal, com crianças e adolescentes, atletas iniciantes, de uma escolinha de Futebol em um município de médio porte de Minas Gerais. Os participantes preencheram um questionário sobre Conhecimentos Gerais de Educação Esportiva, no momento que antecedeu (Etapa 1) e sucedeu (Etapa 2) a intervenção educativa, composta por um ciclo de palestras. Os responsáveis preencheram o questionário sociodemográfico e o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, parecer 5.463.399. **Resultados e discussão:** A amostra foi composta por 18 crianças e adolescentes, na faixa etária de 6-17 anos. A maioria dos responsáveis se declarou na cor parda (53%), casados (55,5%), com o ensino médio completo (30,5%) e renda média de 2,2 salários mínimos. A maioria da amostra tinha a cor parda (44,4%), com o tempo de permanência na prática esportiva de até 6 meses (33,3%). Na comparação dos grupos antes e após a intervenção educativa, observou-se uma diferença significativa entre a Etapa 1 (71%) e a Etapa 2 (87%) na porcentagem de acertos nas questões. **Conclusões:** Foi possível observar a efetividade da intervenção educativa e o quanto o Enfermeiro é crucial na promoção de hábitos saudáveis e na prevenção de agravos no contexto esportivo.

Palavras-chave: Promoção da saúde; Educação em Saúde; Enfermagem esportiva; Esporte.

INTRODUÇÃO

A história da Enfermagem sempre foi associada apenas ao cuidado de enfermos, porém, com a evolução e desenvolvimento da sociedade, o enfermeiro obteve outras áreas de atuação, como a enfermagem esportiva, autorizada pelo Conselho Federal de Enfermagem na resolução nº 610/2019 (COFEN, 2019).

Dessa forma, a enfermagem esportiva tornou-se uma demanda de assistência de grande relevância, entretanto não há muitos profissionais atuantes na área. O papel do enfermeiro na saúde esportiva é de extrema importância para promoção, prevenção e manutenção da saúde dos atletas, minimizando dores, danos e proporcionando bom desempenho (Santos et al., 2022).

Uma forma de promoção da saúde que se destaca é a educação em saúde, que ocorre por meio de ações que envolvam conhecimento científico, a realidade e experiências dos indivíduos, transformando em uma ação educativa que tenha impactos positivos na



qualidade de vida da população (Costa et al. 2020).

Ações de promoção da saúde voltadas para orientação de crianças e adolescentes são mais oportunas, pois, nessa faixa etária, o desenvolvimento tardio do córtex pré-frontal em relação a outras áreas do Sistema Nervoso Central, possibilita a realização de ações educativas em saúde que estimulem o desenvolvimento saudável, para beneficiar em longo prazo os indivíduos e a sociedade (Borges et al., 2022).

OBJETIVO

Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar o efeito de uma intervenção educativa por meio da Promoção da Saúde promovida pelo profissional de Enfermagem na área esportiva. Além disso, os objetivos específicos foram relacionados em conhecer o perfil sociodemográfico de crianças e adolescentes em iniciação esportiva e de seus responsáveis, comparar o nível de conhecimento sobre a saúde esportiva antes e após o programa de intervenção educativa e ampliar os conhecimentos em saúde esportiva para o grupo estudado.

METODOLOGIA

Participantes

Foram convidados a participar deste estudo observacional e longitudinal, crianças e adolescentes atletas iniciantes, com idades entre 6 e 17 anos, durante o período de junho a agosto de 2023, provenientes de uma escolinha de futebol de um município de médio porte de Minas Gerais. Não foram incluídos no estudo crianças e adolescentes cujos pais ou responsáveis não consentiram em participar da pesquisa.

Procedimento

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (parecer 5.463.399), a estratégia adotada para a prática de Promoção da Saúde foi a Educação em Saúde, que aconteceu por meio da realização de palestras, direcionadas para o público-alvo.

A etapa inicial do projeto (Etapa 1) constou da aplicação e recolhimento dos Termos de Assentimentos assinados pelos menores e responsáveis, o Questionário Sociodemográfico e do Questionário sobre Conhecimentos Gerais de Educação em Saúde Esportiva, antecedendo a intervenção educativa. Essa etapa teve como objetivo avaliar o conhecimento prévio dos atletas iniciantes sobre questões relevantes para a saúde do atleta em geral. A intervenção aconteceu nos momentos que sucederam os treinamentos, na própria faculdade, por se localizar próxima ao campo de treinamento dos atletas iniciantes. O ciclo de palestras foi composto por seis temáticas variadas relacionadas à rotina do futebol e aos hábitos saudáveis de todo atleta. Já na etapa final (Etapa 2), foi reaplicado o Questionário sobre Conhecimentos Gerais de Educação em Saúde Esportiva, após o término do plano educativo, a fim de permitir comparações com as respostas coletadas na Etapa Inicial. O maior percentual de respostas corretas, após o preenchimento deste último questionário, foi um indicativo da efetividade da estratégia de Promoção da Saúde. O nível de significância considerado nos testes foi de 5% ($p < 0,05$). Foi utilizado, para análise dos dados, o programa estatístico *GraphPad Prism* versão 9.5.0 (525).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra foi composta por 18 crianças e adolescentes, na faixa etária de 6-17 anos,



a maioria delas tinham a cor parda (44,4%), com o tempo de permanência na prática esportiva de até 6 meses (33,3%). Com relação aos dados sociodemográficos, a maioria dos responsáveis se declarou na cor parda (53%), casados (55,5%), com o ensino médio completo (30,5%) e com renda média de 2,2 salários mínimos. Já na comparação entre os grupos nas duas etapas, observou-se uma diferença significativa na porcentagem de acertos nas questões entre a Etapa 1 (pré-teste - 71%) e a Etapa 2 (pós-teste - 87%), $p=0,03$.

Após o programa de intervenção educativa, observou-se que o conhecimento sobre a temática abordada aumentou, indicando a eficácia da estratégia no grupo estudado. Corroborando com o presente estudo, as intervenções educativas também foram capazes de aumentar o conhecimento de adolescentes escolares sobre o papilomavírus humano (HPV) no pós teste em comparação com o grupo controle que recebeu somente a intervenção padrão, realizada usualmente pelas equipes de enfermagem das unidades de saúde (Ferreira et al., 2022). Além disso, em se tratando de crianças e adolescentes, a literatura aponta que as intervenções educativas demonstram ampliar os conhecimentos e estimular a prática de atividade física (Fuller et al., 2017), a prevenção da obesidade (Ige, Deleon, Nabors, 2016) e o controle dos sintomas da Asma (Grover et al., 2016).

A literatura aponta que os fatores sociodemográficos possuem uma relação direta com a aprendizagem, pois a coesão familiar afeta o desenvolvimento escolar, podendo causar efeitos positivos (Eltink, Chicanelli e Almeida, 2024) e negativos (Skibinski, Silva e Uhren, 2024) na vida de crianças e adolescentes. Concomitante, o maior tempo de escolaridade dos responsáveis também favorece o envolvimento na vida escolar dos filhos (Magwa e Mugari, 2017) e o seu melhor rendimento. A condição socioeconômica dos responsáveis parece influenciar o bom desempenho escolar, pois, quando provenientes de famílias de baixa renda, as crianças e adolescentes desenvolvem menos suas habilidades cognitivas (Schneider et al., 2024; Jiang e Wang, 2024).

CONCLUSÕES

A presente pesquisa foi capaz de demonstrar que a intervenção educativa gerou novos conhecimentos por ampliar o aprendizado prévio das crianças/adolescentes atletas iniciantes. As condições socioeconômicas dos responsáveis podem ter possibilitado condições favoráveis para o aprendizado. Além disso, o importante papel do profissional Enfermeiro foi evidenciado na promoção de hábitos saudáveis e na prevenção de agravos, no contexto esportivo, área ainda pouco explorada por esse profissional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Borges, Weuller Junio Gonçalves; Borges, Bárbara da Costa Santana; Magalhães, Giovanna Borges; Lima, Lara Vento Moreira; Simões, Luana Alves; Vidal, Olegário Indemburgo Silva Rocha. Promoção de saúde através do esporte: relato de experiência com escolares entre 7 e 10 anos. Revista Educação em Saúde, v. 10, n 1, p. 284-290, 2022. Disponível em: <https://revistas2.unievangelica.edu.br/index.php/educacaoemsaude/article/view/6391/4457>. Acesso em: abril. 2025.

COFEN (Conselho Federal de Enfermagem). Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais. Brasília, DF, 2019. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-610-2019-1.pdf>. Acesso em: maio 2025.



Costa, Daniel Alves da; Cabral, Karynne Borges; Teixeira, Cristiane Chagas; Rosa, Renato Rodrigues; Mendes, Joyce Lara de Lima; Cabral, Fernando Duarte. Enfermagem e a educação em saúde. Rev Cient ESc Estadual Saúde Pública Goiás “Cândido Santiago”, 2020; 6(3)e:6000012. Disponível

em:

<https://www.revista.esap.go.gov.br/index.php/resap/article/view/234/90>. Acesso em: maio, 2025.

Eltink, Caroline Francisca; Chicanelli, Ana Carolina; Almeida, Tawane Lankaster de. Afeto familiar e desempenho escolar de crianças no ensino fundamental I: uma revisão integrativa. Revista de Filosofia y Ciencias - ISSN: 1852-9488, n. 29, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/378763047_Afeto_familiar_e_desempenho_escolar_de_crianças_no_ensino_fundamental_I_Uma_revisão_integrativa. Acesso em: maio, 2025.

Ferreira, Helen Livia Oliveira Catunda; Siqueira, Cícero Mendes; Sousa, Leilane Barbosa; Nicolau, Ana Izabel Oliveira; Lima, Thaís Marques; Aquino, Priscila de Souza; Pinheiro, Ana Karina Bezerra. Effect of educational intervention for compliance of school adolescents with the human papillomavirus vaccine. Rev Esc Enferm USP. 2022;56:e20220082. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1980-220X-REEUSP-2022-0082en>. Acesso em: maio, 2025.

Fuller, Colin W; Ørntoft, Cristina; Larsen, Malte Nejst; Elbe, Anne-Marie; Ottesen, Laila; Junge, Astrid; Dvorak, Jiri; Krstrup, Peter. “FIFA 11 for Health” for Europe. 1: effect on health knowledge and well-being of 10- to 12-year-old Danish school children. Br J Sports Med, s.l., v51, p. 1483-8, abr. 2017. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27130925/>. Acesso em: maio, 2025.

Grover, Charu; Goel, Nitin; Chugh, Krishan; Gaur, Shailendra Nath. Medication education program for Indian Children with asthma: A feasibility study. Nigerian Journal of Clinical Practice. Niger, v.19, n1, p.76-84, jan/fev. 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26755223/>. Acesso em: maio, 2025.

Ige, Teminijesu John; Deleon, Patrice.; Nabors, Laura. Motivational Interviewing in an Obesity Prevention Program for Children. Health Promotion Practice, s.l., v.18, n.2, p.263-74, maio, 2016. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27199150/>. Acesso em: maio, 2025.

Jiang, Ying; Wang, Xiaofen. The relationship between family socioeconomic status and the young children’s number sense development: The mediating role of parent-child activities. PLoS ONE 19(4): e0301758. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0301758>. Acesso em: maio, 2025.

Magwa, Simuforosa; Mugari, Sipikelelo; Factors affecting parental involvement in the schooling of children. International Journal of Academic Research and Reflection, v. 5, n.

1, p. 74-81, 2017. Disponível em: <https://idpublications.org/wp->



content/uploads/2016/12/Full-Paper-FACTORS-AFFECTING-PARENTAL-INVOLVEMENT-IN-THE-SCHOOLING-OF-CHILDREN.pdf. Acesso em: abril 2025.

Santos, José Cleyton de Oliveira; Silva, Wanessa Alves; Mercês, Gustavo Santos das; Cruz, Marcela de Souza; Fonseca, Luan dos Santos; Ferreira, Laíse Luemmy de Lima; Carvalho, Beatriz Correia; Matos, Thaís Santos de. Atuação do profissional de enfermagem esportiva: uma breve revisão. Caderno de Educação Física e Esporte, Marechal Cândido Rondon, v. 20, p. e-28253, 2022. DOI: 10.36453/cefe.2022.28253. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/cadernoedfisica/article/view/28253>. Acesso em: maio. 2025.

Schneider, Julie M., Abel, Alyson D., Momsen, Jacob, Melamed, Tina C., & Maguire, Mandy J. Neural oscillations reveal differences in the process of word learning among school-aged children from lower socioeconomic status backgrounds. *Revsita Neurobiology of Language*, v.2(3), p. 372–388, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1162/nol_a_00040. Acesso em: maio, 2025.

Skibinski, Irene Ribas; Silva, Regiane Batista da; Uhren, Valmir. O efeito do divórcio dos pais no desenvolvimento das crianças. *Revista Real*, v. 3, n. 1. 2024. Disponível em: <https://revistas.icesp.br/index.php/Real/article/view/5846>. Acesso em: maio, 2025.



ATIVIDADE ANTIPARASITÁRIA DO GÊNERO *EUTERPE*: POTENCIAL TERAPÊUTICO E APLICAÇÕES

¹Vinícius Barbosa Souza

²Daiane Carvalho Souza

¹Instituto Florence de Ensino Superior. São Luís, Maranhão, Brasil; ²Faculdade de Educação de Bacabal. Bacabal, Maranhão, Brasil;

Área temática: Farmácia

Resumo: As doenças parasitárias ainda representam um grande desafio à saúde pública, especialmente em países em desenvolvimento. Diante das limitações dos tratamentos convencionais, o gênero *Euterpe*, especialmente *E. oleracea* (açai), tem se destacado como uma alternativa promissora devido às suas propriedades bioativas. Este trabalho realizou uma revisão narrativa da literatura sobre a atividade antiparasitária de espécies do gênero, utilizando bases como PubMed, SciELO e BVS. Os estudos analisados demonstraram que extratos de *Euterpe* apresentaram efeitos significativos contra protozoários como *Plasmodium* e *Leishmania*, além de atividade ovicida e larvicida contra helmintos. As ações observadas incluem redução da parasitemia, aumento da sobrevivência em modelos animais e baixa toxicidade celular. Os principais compostos envolvidos são flavonoides e polifenóis. Conclui-se que *Euterpe* possui grande potencial terapêutico, embora sejam necessárias mais pesquisas clínicas para comprovar sua eficácia e segurança em humanos.

INTRODUÇÃO

As doenças parasitárias representam um grande impacto negativo para a saúde pública em diversas áreas territoriais, principalmente em países subdesenvolvidos, onde as condições higiênicas-sanitárias e o acesso aos serviços de saúde são escassos. Essas doenças, cuja etiologia está associada a protozoários e helmintos, afetam milhares de pessoas e podem levar a desfechos clínicos graves, como desnutrição, comprometimento da função cognitiva, altas taxas de morbimortalidade e até levam ao óbito. Entre as principais parasitoses que acometem o homem estão a malária, as leishmanioses, a toxocaríase e a ancilostomíase. Embora existam fármacos específicos para o tratamento dessas enfermidades, muitos causam toxicidade, custo elevado e perda de eficiência (OPAS, 2023; Coelho et al., 2023).

Nessa perspectiva, produtos naturais estão sendo cada vez mais buscados como fontes promissoras de moléculas bioativas. O gênero *Euterpe*, especialmente *E. oleracea* (açai) e *E. edulis*, possuem compostos como flavonoides, antocianinas e outros polifenóis com atividade antioxidante, anti-inflamatória e, mais recentemente, atividade antiparasitária. Estudos relatam o efeito leishmanicida do suco clarificado do açai (Silva et al., 2018), ação antimalária in vitro e in vivo de suas frações polifenólicas (Ferreira et al., 2019) e atividade ovicida-larvicida contra helmintos gastrintestinais (Zamprogno et al., 2015). Revisões recentes deixam claras essas evidências e destacam o potencial terapêutico amplo do gênero (Laurindo et al., 2023).

OBJETIVO

Avaliar a atividade antiparasitária do gênero *Euterpe* em diversos tipos de parasitos.



METODOLOGIA

Este estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura existente sobre a atividade antiparasitária de *Euterpe*. A revisão narrativa consiste em um método qualitativo que dispõe da crítica e interpretação dos estudos disponíveis, permitindo uma compreensão ampla do tema abordado, sem seguir um protocolo rígido. Para o processo da pesquisa, primeiramente, foram definidos o tema do artigo e o objetivo que estabeleceram o escopo da revisão, focando em avaliar a atividade da planta em várias espécies de protozoários e helmintos, identificando as diversas propriedades antiparasitárias da planta.

Realizou-se a busca nas bases de dados acadêmicas, como PubMed (*National Library of Medicine*), SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Scopus e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Os descritores utilizados foram: “Parasitic diseases”, “Antiparasitic”, “*Euterpe*” e “Plants extracts”. A busca abrangeu estudos publicados entre 2015 e 2025.

Os critérios de inclusão foram artigos originais, dispostos em qualquer idioma, com texto na íntegra e foram publicados nos últimos 10 anos. Os critérios de exclusão foram artigos duplicados, artigos de revisão, teses, dissertações, capítulos de livros e publicações anteriores ao período definido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme relatado no estudo de Ferreira et al. (2019) três frações ricas em polifenóis foram obtidas do fracionamento da polpa do açaí: fenólicos totais (1), não antocianínicos (2) e antocianinas totais (3). A atividade antimalárica foi avaliada em testes *in vitro* utilizando um ensaio fluorométrico baseado em PicoGreen com culturas de *Plasmodium falciparum*. As frações 1 e 3, quando testadas, não foram eficazes, pois nenhuma das concentrações introduzidas reduziu o conteúdo de DNA, ou seja, não houve diminuição no crescimento do parasita. Por outro lado, a fração 2 apresentou atividade antiplasmódica moderada em várias cepas. Além disso, o estudo evidenciou que a atividade antimalárica está diretamente ligada à quantidade total de antocianinas. Embora a fração 2 tenha mostrado atividade moderada, os autores explicam que essa atividade está relacionada à isoorientina, que já demonstrou atividade antimalárica *in vitro*. Quanto à citotoxicidade dos compostos 1, 2 e 3, foram utilizados macrófagos RAW 264.7, e os autores relataram que as frações não influenciaram negativamente a viabilidade celular dos macrófagos. Um modelo murino foi usado para investigar se os polifenóis poderiam inibir a parasitemia *in vivo*. Camundongos infectados com *P. chabaudi* foram tratados oralmente com a fração de fenólicos totais (10, 15 e 20 mg/kg) do dia 0 ao dia 12 após a infecção. Durante o pico da parasitemia (dias 6 e 7), os compostos reduziram o crescimento do parasita em 89,4% e 77,3%, respectivamente, para a dose de 20 mg/kg, em comparação ao grupo não tratado, enquanto a dose de 15 mg/kg reduziu o crescimento em 81% e 62,2%, respectivamente.

Oliveira et al. (2022) demonstraram que, após a inoculação de *Plasmodium berghei* em camundongos albinos suíços, eles foram alimentados com uma ração enriquecida com *E. oleracea*. Os parâmetros monitorados diariamente foram: curva de sobrevivência, parasitemia e peso corporal. Entre o 7º e o 19º dia após a infecção, o percentual de sobrevivência do grupo tratado com ração enriquecida com açaí foi maior em comparação com os camundongos infectados com *Plasmodium*, nos quais 100% dos animais morreram até o 11º dia pós-infecção. Esse resultado é atribuído à dieta rica em açaí, uma vez que foi observado que a fruta tem efeito protetor na sobrevivência dos animais tratados e infectados. Além disso, os autores relataram que a ração diminuiu a mortalidade dos animais infectados e protegeu a barreira hematoencefálica dos camundongos infectados.

Silva et al. (2018) investigaram a atividade leishmanicida do suco de açaí clarificado



e observaram uma redução significativa no número de parasitas. Este estudo demonstrou a atividade de *E. oleracea* contra as espécies de parasitas *Leishmania* (*Leishmania*) *amazonensis* e *Leishmania infantum*. A planta mostrou atividade antileishmania contra formas amastigotas e promastigotas tanto de *L. amazonensis* quanto de *L. infantum*. O extrato suco clarificado (EO) reduziu em 39,68%, 61,04% e 96,05% as formas promastigotas de *L. (L.) amazonensis*. Além disso, o EO apresentou eficácia antiproliferativa contra promastigotas de *L. infantum*. A morte celular observada no estudo esteve provavelmente associada à apoptose de promastigotas de *L. amazonensis* e *L. infantum*. A atividade antileishmania do EO pode ser explicada pela grande presença de flavonoides, que podem ter sido responsáveis pela atividade observada. Nesse sentido, destaca-se a alta produção de ROS (Espécies Reativas de Oxigênio). O tratamento contra amastigotas incubadas em macrófagos demonstrou uma redução dos níveis de citocinas da família IL-17, responsáveis pelo processo patogênico. Além disso, o estudo ressalta que a viabilidade celular não demonstrou indução de morte celular em macrófagos após o tratamento com várias concentrações de EO.

Zamprognio et al. (2015) avaliaram a atividade anti-helmíntica de diversas plantas, incluindo *Euterpe edulis*, demonstrando sua eficácia ovicida contra dois tipos de helmintos: *Toxocara canis* e *Ancylostoma caninum*. Nos parasitas *T. canis*, observou-se uma atividade inibitória significativa na embriogênese dos ovos. Além disso, o extrato etanólico de *E. edulis* apresentou atividade larvicida contra *A. caninum*. A atividade ovicida pode ser atribuída aos flavonoides presentes na planta, compostos conhecidos por seus efeitos antiparasitários significativos.

CONCLUSÃO

Os estudos analisados neste trabalho destacam o potencial terapêutico do gênero *Euterpe*, principalmente *E. oleracea*, como uma alternativa promissora no combate a doenças parasitárias negligenciadas, como a leishmaniose e a malária. Os compostos bioativos presentes na planta, como flavonoides e polifenóis, demonstraram atividade significativa contra diversos tipos de parasitas, com destaque para suas ações leishmanicida e antimalárica, associadas a uma baixa toxicidade em células hospedeiras. Tais achados reforçam a importância de explorar recursos naturais no desenvolvimento de novos fármacos, especialmente em contextos onde as opções terapêuticas disponíveis apresentam eficácia limitada e diversos efeitos colaterais. No entanto, a maior parte dos resultados apresentados neste estudo deriva de pesquisas in vitro ou em modelos animais, indicando a necessidade de avaliações clínicas para validar a eficácia e a segurança desses compostos em seres humanos.

Palavras-chave: Doenças parasitárias, Eficácia, *Euterpe*, Extratos vegetais, Saúde pública.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COELHO, M. C. *et al.* Aspectos epidemiológicos da leishmaniose tegumentar americana e visceral na cidade de Cametá, Pará, Amazônia. **Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção**, v. 13, n. 1, 31 mar. 2023.

FERREIRA, L. T. *et al.* Chemical Genomic Profiling Unveils the in Vitro and in Vivo



Antiplasmodial Mechanism of Açaí (*Euterpe oleracea* Mart.) Polyphenols. **ACS Omega**, v. 4, n. 13, p. 15628–15635, 2019.

LAURINDO, L. F. *et al.* Açaí (*Euterpe oleracea* Mart.) in Health and Disease: A Critical Review. **Nutrients**, v. 15, n. 4, p. 989, 2023.

OLIVEIRA, K. R. H. M. *et al.* *Euterpe oleracea* fruit (Açaí)-enriched diet suppresses the development of experimental cerebral malaria induced by *Plasmodium berghei* (ANKA) infection. **BMC Complementary Medicine and Therapies**, v. 22, n. 1, 2022.

Organización Panamericana de la Salud. Síntesis de evidencia y recomendaciones: directrices para el tratamiento de las leishmaniasis en la Región de las Américas. **Rev Panam Salud Publica**. 2023;47:e43. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2023.43>

SILVA, B. J. M. *et al.* Selective effects of *Euterpe oleracea* (açaí) on *Leishmania* (*Leishmania*) *amazonensis* and *Leishmania infantum*. **Biomedicine & Pharmacotherapy**, v. 97, p. 1613–1621, 2018.

ZAMPROGNO, T. T. *et al.* Activity of *Euterpe edulis* Martius, *Mikania glomerata* Spreng, and *Mikania laevigata* Schultz Bip. Extracts on Gastrointestinal Nematodes *Toxocara canis* and *Ancylostoma caninum*. **Archives of Clinical Infectious Diseases**, v. 10, n. 3, 2015.



TUBERCULOSE NO ÂMBITO HOSPITALAR: ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO RETROSPECTIVO (2018–2024)

¹Monica Cristina Bogoni Savian

²Paola Vitória Fuhrmann

³Marceli Diana Helfenstein

^{1,3}Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, RS, Brasil;

²Universidade Federal de Pelotas – UFPEL. Pelotas, RS, Brasil.

Área temática: Epidemiologia

Resumo: Introdução: A tuberculose (TB) permanece um desafio prioritário de saúde pública no Brasil. Em hospitais universitários, onde se concentram casos mais graves e populações vulneráveis, a vigilância epidemiológica é fundamental. A estruturação de núcleos como o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) fortalece as ações de controle e melhora a qualidade da informação. **Objetivos:** Apresentar uma série histórica de notificações de Tuberculose realizadas entre 2018 e 2024 em um Hospital Universitário do Sul do Brasil, caracterizando um perfil sociodemográfico, clínico e epidemiológico dos casos notificados. **Metodologia:** Estudo quantitativo, descritivo e retrospectivo, realizado com dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), com foco nos casos de tuberculose notificados no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPEL). **Resultados e discussão:** Foram realizadas 221 notificações de tuberculose no período estudado. Observou-se aumento expressivo, a partir de 2020, relacionado à implantação do NHE. Predominaram casos do sexo masculino (63,3%), em pessoas autodeclaradas brancas (55,7%), jovens adultos entre 35 e 49 anos, com baixa escolaridade (35,7%) e vulnerabilidade social. A forma pulmonar foi a mais comum (74,2%). Destacaram-se coinfeção por HIV e uso de álcool e drogas. Embora a baciloscopia tenha sido realizada em 73,3% dos casos, o uso do Teste Molecular Rápido aumentou ao longo dos anos. **Considerações finais:** A série histórica evidenciou avanços institucionais na vigilância hospitalar da Tuberculose e a construção de um painel interativo (dashboard) facilitou o acesso e a visualização dos dados por profissionais do hospital e da universidade, promovendo o uso qualificado da informação em saúde.

INTRODUÇÃO

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pela *Mycobacterium tuberculosis*, que afeta principalmente os pulmões, embora possa comprometer outros órgãos e sistemas. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por meio da inalação de partículas contendo o bacilo, expelidas durante a fala, tosse ou espirro de indivíduos com TB pulmonar ativa. Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento, a tuberculose continua apresentando desafios significativos para o diagnóstico precoce, a condução terapêutica adequada e o controle da cadeia de transmissão.

A vigilância epidemiológica desempenha papel essencial no enfrentamento da doença, especialmente em ambientes hospitalares, onde frequentemente se concentram casos mais graves e populações em situação de vulnerabilidade. Hospitais universitários, por sua característica de referência e formação, assumem um papel estratégico no aprimoramento das notificações e no fortalecimento das ações de controle. Nesse contexto, a estruturação



de núcleos de vigilância hospitalar, como o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE), representa um marco para a melhoria da qualidade da informação e para a integração entre os serviços assistenciais e a vigilância. A análise da série histórica de notificações permite compreender o impacto dessas mudanças institucionais e identificar o perfil dos pacientes atendidos, subsidiando o planejamento de estratégias mais eficazes para o enfrentamento da TB.

OBJETIVO

Descrever a série histórica das notificações de tuberculose realizadas entre 2018 e 2024 em um hospital universitário do sul do Brasil, caracterizando o perfil sociodemográfico, clínico e epidemiológico dos pacientes notificados.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e retrospectivo, realizado no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Foram utilizados dados secundários provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), referentes às notificações de tuberculose registradas entre 2018 e 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de 2018 a 2024, foram registradas 221 notificações de tuberculose no hospital. Os anos de 2018 e 2019 representaram apenas 3,1% (n=7) do total, evidenciando a ausência de fluxos consolidados e da articulação entre os setores assistenciais e a vigilância nesse período. A partir de 2020, observou-se um crescimento expressivo no número de notificações, com 39 (17,6%) casos. Essa mudança relaciona-se diretamente à estruturação do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia (NHE) em 2019, marco fundamental para a consolidação das ações de vigilância epidemiológica institucional. A implantação do NHE possibilitou a sistematização das ações, a qualificação das notificações e a ampliação da identificação dos casos no ambiente hospitalar.

O perfil sociodemográfico dos pacientes notificados reafirma padrões conhecidos da epidemiologia da tuberculose, com maior acometimento em adultos jovens (principalmente entre 35 e 49 anos) e predomínio do sexo masculino 63,3% (n=140), o que pode estar relacionado a fatores como maior exposição a condições de vulnerabilidade social, menor adesão ao cuidado e maior prevalência de comorbidades. A predominância da raça/cor branca compreende 55,7% (n=123) pode refletir a composição demográfica da população atendida pelo hospital, sendo necessário contextualizar esse achado com dados locais.

A expressiva proporção de pacientes com baixa escolaridade (35,7%, n=79) com ensino fundamental incompleto) e de populações em situação de vulnerabilidade — como pessoas em situação de rua (7,7%, n=17) — evidencia a interface entre tuberculose e determinantes sociais da saúde, destacando a importância de estratégias intersetoriais e de abordagem integral no cuidado. A presença significativa de coinfeção por HIV (43,9%, n=97) e o alto percentual de usuários de álcool (39,8%, n=88) e drogas ilícitas (35,7%, n=79) apontam para a necessidade de ações articuladas entre os serviços de saúde mental, atenção primária e programas de IST/AIDS.

Quanto ao tipo de entrada, a maioria dos casos foi notificada como “caso novo”, (55,7%, n=123), seguida pelas notificações por transferência (32,6%, n=72). A predominância de casos novos reforça o papel do hospital como porta de entrada para o



diagnóstico e início do tratamento de tuberculose, refletindo a importância da vigilância ativa e da suspeição clínica no ambiente hospitalar. Por outro lado, o percentual expressivo de casos por transferência sugere um fluxo consolidado de articulação com outros serviços da rede de atenção à saúde, indicando a continuidade do cuidado e o cumprimento das diretrizes de vigilância da tuberculose.

A forma clínica pulmonar foi a mais prevalente (74,2%, n=164), reforçando o potencial de transmissibilidade da doença nos ambientes hospitalares e a importância da detecção precoce. A forma extrapulmonar correspondeu a 22,2% (n=29).

Compreende-se que comorbidades como tabagismo (48,9%, n=108) e diabetes mellitus (6,8%, n=15) impactam negativamente no prognóstico e controle da doença.

Pode-se observar por meio da Tabela 1 as frequências absolutas (n) e relativas (%) de doenças e agravos associados às notificações de tuberculose. Verifica-se que, das notificações realizadas, 24,0% (n=97) apresentavam AIDS; 3,7% (n=15), diabetes; 4,2% (n=17) doença mental. Assim como, 21,8% (n=88) faziam uso de álcool, 26,7% (n=108) de tabaco e 19,6% (n=79) de drogas ilícitas, que impactam diretamente no prognóstico e no controle da doença.

Tabela 1 – Doenças e Agravos associados às notificações de tuberculose realizadas no HE-UFPel/EBSERH no período de 2018 a 2024.

Doenças e Agravos associados	n	%
AIDS	97	24,0%
Alcoolismo	88	21,8%
Diabetes	15	3,7%
Doença Mental	17	4,2%
Uso de drogas ilícitas	79	19,6%
Tabagismo	108	26,7%
TOTAL	404	100,0%

Fonte: SINAN

Nota: Um mesmo paciente pode apresentar mais de um agravo associado.

Em relação à investigação diagnóstica, 73,3% (n=162) dos pacientes realizaram baciloscopia, exame fundamental para diagnóstico e monitoramento da tuberculose. A positividade de 43,9% (n=97) nesse grupo confirma sua relevância clínica. A radiografia de tórax evidenciou suspeita em quase 80% (n=176) dos casos, reforçando seu papel como ferramenta de triagem inicial. Por outro lado, o uso do Teste Molecular Rápido (TMR-TB) ainda foi limitado, realizado em 43,5%, (n=93) dos casos, apesar da sua importância na identificação precoce da resistência à rifampicina, especialmente relevante frente ao registro de casos resistentes (0,7%, n=1). Percebeu-se que a realização deste exame vem aumentando com o passar dos anos.

Esses achados reforçam a importância da vigilância epidemiológica hospitalar ativa, da integração com os serviços assistenciais e da ampliação do acesso a exames diagnósticos de qualidade como estratégias essenciais para o enfrentamento da tuberculose no contexto hospitalar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização desta série histórica das notificações de tuberculose no HE-UFPel representou um avanço significativo para a vigilância epidemiológica institucional. Além de



possibilitar uma melhor compreensão do perfil dos casos notificados ao longo dos anos, o estudo contribuiu para a elaboração de um dashboard (painel interativo em Power BI), com interface gráfica, que apresenta de forma interativa, clara e concisa os principais indicadores, facilitando a análise dos resultados, a identificação de tendências, problemas e oportunidades de melhoria.

Essa ferramenta apoia a tomada de decisões clínicas e gerenciais, o planejamento de ações e o desenvolvimento de pesquisas futuras. Dessa forma, o painel reforça a importância da integração entre a coleta de dados e a tecnologia da informação na qualificação das ações de vigilância e saúde pública no ambiente hospitalar.

Palavras-chave: Análise de Dados Secundários; Notificação de Doenças; Tuberculose.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Seguir as normas da ABNT 10520/2023 para as referências bibliográficas.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2022>. Acesso em: 21 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde.

Boletim Epidemiológico de Tuberculose 2024. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2024>. Acesso em: 21 maio 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). *Global tuberculosis report 2023*. Geneva: WHO, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240076729>. Acesso em: 21 maio 2025.



CONSIDERAÇÕES SOBRE ALVEOLITE SECA NOS TRATAMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS - UMA REVISÃO DE LITERATURA

¹Luis Eduardo Antes Ferla

¹Formado pela Universidade Paranaense (UNIPAR). Francisco Beltrão. Paraná. Brasil

Área temática: Odontologia

Resumo: A alveolite seca é uma complicação pós-operatória associada à perda total ou parcial do coágulo sanguíneo no alvéolo, resultando em exposição óssea, dor intensa e atraso na cicatrização, tornando-se uma condição bastante desconfortável para os pacientes. Este trabalho tem como objetivo apresentar e discutir a alveolite seca, abordando sua etiologia, características clínicas, sinais e sintomas, além das condutas de manejo e tratamento. Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio de pesquisa nas bases de dados PubMed e SciELO, além da consulta a obras de referência atualizadas em cirurgia oral e maxilofacial. Conclui-se que a alveolite seca é uma condição multifatorial, relacionada a fatores do paciente, ao procedimento cirúrgico e a hábitos de vida. O manejo consiste, principalmente, no controle da dor e na higiene local, com irrigações e uso de analgésicos e anti-inflamatórios. Pomadas tópicas também podem ser utilizadas, enquanto o uso de antibióticos é reservado apenas para casos de infecção secundária. É fundamental que o cirurgião-dentista conheça os métodos de prevenção e tratamento da alveolite seca para garantir um pós-operatório mais confortável e uma recuperação mais rápida ao paciente.

INTRODUÇÃO

A alveolite seca, ou osteíte alveolar, é uma complicação pós-operatória caracterizada por dor intensa no alvéolo dentário, geralmente manifestada entre o primeiro e o terceiro dia após a exodontia. A condição resulta da ausência total ou parcial do coágulo sanguíneo no interior do alvéolo, o que expõe a superfície óssea à cavidade bucal e retarda o processo de cicatrização. É mais frequentemente observada após a extração de terceiros molares mandibulares impactados (DALY *et al.*, 2022).

Sua etiologia permanece indefinida, sendo considerada multifatorial. Entre os fatores associados à sua ocorrência, destacam-se a fibrinólise alveolar exacerbada, o trauma cirúrgico, a inexperiência do cirurgião, a higiene bucal inadequada, infecções prévias como a pericoronarite, o tabagismo e o uso de anticoncepcionais orais, em virtude do efeito do estrogênio sobre o sistema fibrinolítico (FILHO; SANTANA; SALES, 2023).

O principal sintoma clínico é a dor, de caráter pulsátil, frequentemente irradiada para estruturas adjacentes, como o ouvido, a têmpora ou o pescoço. Na maioria dos casos, não há sinais clássicos de infecção, como febre ou edema, embora a insônia possa ocorrer em decorrência da intensidade da dor. Os sintomas podem persistir por até 10 dias, e em casos mais graves, a dor não é aliviada nem mesmo com o uso de analgésicos potentes. O diagnóstico é clínico, baseado na anamnese e no exame físico. Além do desconforto ao paciente, essa condição representa um desafio clínico frequente, que pode demandar múltiplas consultas adicionais e aumentar o uso de fármacos analgésicos. (PEREIRA; SOUZA, 2024).

A abordagem preventiva é preferível ao tratamento, e envolve a adoção de medidas intraoperatórias pelo cirurgião e o seguimento rigoroso das orientações pós-operatórias pelo paciente (HUPP; ELLIS; TUCKER, 2019). O tratamento da alveolite seca consiste,



principalmente, na irrigação cuidadosa do alvéolo com solução salina estéril ou gluconato de clorexidina, com o objetivo de remover detritos e reduzir a carga bacteriana, seguida da aplicação de curativos medicamentosos locais. A principal meta terapêutica é o controle da dor até que ocorra a reparação tecidual espontânea (MAMOUN, 2018).

OBJETIVO

Revisar as principais evidências científicas sobre a alveolite seca, visando apoiar a prática clínica dos cirurgiões-dentistas.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura com abordagem qualitativa, cujo objetivo foi reunir e sintetizar informações científicas atualizadas sobre a alveolite seca como complicação pós-operatória. A busca por publicações foi realizada nas bases de dados PubMed e SciELO, por serem plataformas amplamente utilizadas para a recuperação de artigos na área da saúde e odontologia. A estratégia de busca utilizou o descritor em inglês “dry socket”, associado ao operador booleano AND, conforme a estrutura: “dry socket” AND “treatment”, “dry socket” AND “prevention”, “dry socket” AND “oral surgery”.

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados entre 2018 e 2024, disponíveis nos idiomas inglês ou português, acesso ao texto completo, estudos que abordassem diretamente aspectos clínicos, etiológicos, métodos de prevenção, condutas terapêuticas ou manejo da alveolite seca. Foram excluídos: estudos com metodologias frágeis ou sem embasamento científico, artigos repetidos entre bases, publicações que não tratavam especificamente da alveolite seca ou que tratavam de outras complicações pós-operatórias sem distinção clara.

Após aplicação dos critérios, foi inicialmente encontrado um total de 11 artigos. A busca foi realizada entre março e maio de 2025. Após leitura dos títulos, resumos e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 7 artigos científicos, considerados relevantes para a temática. Além disso, uma obra de referência atualizada em cirurgia oral e maxilofacial foi incluída para complementar o embasamento teórico. A análise dos dados foi realizada por meio de leitura crítica e organização do conteúdo de interesse, com foco nos aspectos etiológicos, clínicos, preventivos e terapêuticos da alveolite seca.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A alveolite seca é uma complicação pós-operatória que ocorre, principalmente, após a extração de dentes permanentes, sendo rara em extrações de rotina. Sua incidência varia de 0,5% a 7%, podendo atingir até 45% dos casos quando relacionada à remoção de terceiros molares inferiores impactados. Essa condição acomete, com maior frequência, indivíduos entre a terceira e quarta décadas de vida (DALY *et al.*, 2022).

Clinicamente, observa-se a exposição do osso alveolar devido à desintegração precoce ou à ausência do coágulo sanguíneo, condição que desencadeia dor intensa e caracteriza a alveolite seca. Embora retarde o processo de cicatrização, essa condição não está associada a infecção, sendo a principal característica clínica a exposição óssea visível ao exame intraoral (PEREIRA; SOUZA, 2024).

A etiologia da alveolite seca ainda não está completamente esclarecida, sendo



considerada multifatorial. Fatores como higiene oral deficiente e infecções prévias aumentam o risco de ocorrência. O controle adequado da placa bacteriana e o uso de bochechos com clorexidina no pré-operatório demonstraram-se eficazes na redução da incidência dessa complicação (HUPP; ELLIS; TUCKER, 2019).

A dificuldade técnica da extração e o trauma cirúrgico excessivo favorecem o desenvolvimento da alveolite, pois a lesão tecidual pode liberar substâncias ativadoras que promovem a lise do coágulo. Além disso, o uso de anestésicos com vasoconstritores em altas doses, o tempo cirúrgico prolongado e a curetagem alveolar excessiva comprometem o suprimento sanguíneo local, elevando o risco de complicações (MAMOUN, 2018).

Outro fator relevante é a experiência do cirurgião. Profissionais menos experientes tendem a realizar procedimentos mais longos e traumáticos, o que pode aumentar o risco de alveolite. O tabagismo também é um fator predisponente, uma vez que prejudica a vascularização local, compromete o coágulo e retarda a cicatrização (KAMAL; OMAR; SAMSUDIN, 2022).

Estudos apontam maior incidência de alveolite em mulheres, especialmente naquelas que fazem uso de anticoncepcionais orais. O estrogênio presente nesses medicamentos pode aumentar a fibrinólise plasmática, facilitando a desintegração do coágulo. A idade avançada também está associada a maior incidência, possivelmente devido à densidade óssea aumentada e à redução da capacidade cicatricial nos pacientes mais velhos (RAKSHAN, 2018).

Clinicamente, o quadro é dominado pela dor intensa. Essa, por sua vez, é o sintoma mais característico da alveolite seca. Geralmente é intensa, pulsátil, irradia para ouvido, têmpora e pescoço, e não costuma estar associada a sinais clássicos de infecção, como febre, edema ou eritema. Pacientes frequentemente relatam insônia, halitose e gosto desagradável na boca. Os sintomas podem persistir por até 10 dias, sendo muitas vezes refratários a analgésicos comuns. O diagnóstico é clínico, baseado na anamnese e no exame físico (DALY *et al.*, 2022).

Diversas medidas preventivas são descritas na literatura, incluindo a manutenção da higiene bucal, bochechos com clorexidina, uso profilático de antibióticos tópicos e aplicação local de medicamentos. Há evidências da eficácia do uso intra-alveolar de antibióticos, antifibrinolíticos, drenos de tetraciclina, bem como substâncias alternativas como mel, enxaguantes herbais, ozônio e concentrados autólogos de plaquetas, como a fibrina rica em plaquetas (PRF), que mostrou reduzir significativamente a incidência de alveolite (HUPP; ELLIS; TUCKER, 2019).

O uso profilático de antibióticos sistêmicos, por sua vez, não é recomendado rotineiramente, sendo indicado apenas em casos específicos, como pacientes imunocomprometidos ou com histórico prévio de alveolite recorrente (MAMOUN, 2018).

O tratamento baseia-se no controle da dor. São recomendadas irrigações suaves com solução salina estéril, aplicação de curativos medicamentosos intra-alveolares e prescrição de analgésicos e anti-inflamatórios. A curetagem do alvéolo deve ser evitada, pois agrava o trauma e a dor. Após uma ampla revisão, a resposta favorável ao tratamento é geralmente indicada pela redução da dor (LIMA *et al.*, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dada sua alta prevalência em determinados contextos cirúrgicos, a alveolite seca demanda atenção especial no planejamento operatório e no acompanhamento pós-exodôntico. A adoção de técnicas cirúrgicas menos traumáticas e o planejamento individualizado de cada



caso são fundamentais para a sua prevenção. Além disso, o conhecimento adequado das medidas terapêuticas disponíveis permite o manejo eficaz dos casos instalados, promovendo o alívio dos sintomas e a reabilitação oral mais rápida possível. Adicionalmente, destaca-se a necessidade de mais estudos clínicos controlados e da padronização de protocolos terapêuticos, a fim de consolidar condutas baseadas em evidências que aprimorem o manejo da alveolite seca na prática odontológica.

Palavras-chave: Alvéolo Seco; Cirurgia Bucal; Odontologia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Daly, B. J. *et al.* Local interventions for the management of alveolar osteitis (dry socket). **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 2022, n. 9, 26 set. 2022.
- Filho, C. W. D. F.; Santana, M. R.; Sales, P. H. De H. A alveolite como complicação na extração de terceiro molar: uma revisão de literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 6, p. 30423–30432, 5 dez. 2023.
- Hupp, J. R.; Ellis, E.; Tucker, M. R. **Contemporary oral and maxillofacial surgery**. 7. ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2019.
- Kamal, A.; Omar, M.; Samsudin, A. R. Management of dry socket: new regenerative techniques emerge while old treatment prevails. **Dentistry Review**, v. 2, n. 1, p. 100035, mar. 2022.
- Lima, L. *et al.* Tratamento de alveolite e retalho periodontal rotacionado. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 3, p. 10393–10405, 23 maio 2023.
- Mamoun, J. Dry socket etiology, diagnosis, and clinical treatment techniques. **Journal of the Korean Association of Oral and Maxillofacial Surgeons**, v. 44, n. 2, p. 52, 2018.
- Pereira, M. A. P.; Souza, G. M. De. Alveolite como complicação pós-operatórias de exodontias. **Revista FT**, v. 28, n. 139, 31 out. 2024.
- Rakhshan, V. Common risk factors of dry socket (alveolitis osteitis) following dental extraction: a brief narrative review. **Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery**, v. 119, n. 5, p. 407–411, nov. 2018.



RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE *Serratia marcescens* ISOLADA EM TILÁPIAS CULTIVADAS EM TANQUES EM INACIOLÂNDIA-GO

¹Beatriz Santana Estevão

²Caio Cezar de Andrade Rodrigues

³Gleysson Alves de Jesus

⁴Laís Soares Faria

⁵Mayara Bocchi Fernandes

⁶Leonardo Costa Paes

⁷Fernanda da Silva Tomaz

⁸Cecília Nunes Moreira

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universidade Federal de Jataí. Jataí, Goiás, Brasil

Área temática: Impactos Ambientais a Saúde

Resumo: Este estudo avaliou o perfil de resistência antimicrobiana de cepas de *Serratia marcescens* isoladas de tilápias cultivadas em tanques-rede no município de Inaciolândia, Goiás. Três amostras, sendo duas da pele e uma da região retal, foram submetidas ao teste de disco-difusão para determinar a sensibilidade a diferentes antimicrobianos. Observou-se resistência total (100%) à ampicilina e resistência de 33,3% a outros antibióticos, incluindo aztreonam, ceftazidima, ceftriaxona, amoxicilina com ácido clavulânico, imipenem, gentamicina, ampicilina e amicacina. Por outro lado, os antimicrobianos cefotaxima, meropenem, ciprofloxacino e cefepima apresentaram sensibilidade completa (100%) nas amostras analisadas. A resistência emergente a antimicrobianos críticos, como imipenem e amicacina, revela um potencial risco à saúde pública, devido à possibilidade de transferência dessas bactérias multirresistentes ao longo da cadeia alimentar. Estes resultados destacam a importância do monitoramento contínuo da resistência bacteriana em ambientes aquícolas, bem como da implementação de práticas rigorosas de manejo sanitário para evitar a disseminação de cepas resistentes. O estudo reforça a necessidade de estratégias que garantam a biossegurança na produção de tilápias, protegendo a saúde animal e humana.

INTRODUÇÃO

A tilápia se destacou como uma das principais fontes de proteína animal no Brasil, levando em consideração seu valor nutricional e sua popularidade em ascensão no mercado consumidor. Segundo Paulo Faria, “a tilápia é o peixe mais produzido no Brasil devido a diversas características como sua rusticidade e adaptabilidade a diferentes regiões [...]” (MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA, 2024). Essa evolução sinaliza a importância do pescado para o abastecimento interno e para a aquicultura nacional. Por essa razão, ampliar pesquisas referente aos aspectos sanitários, produtivos e de consumo relacionados à tilápia são requisitos para garantir a biossegurança.

Serratia marcescens é uma bactéria do tipo Gram-negativa, em forma de bastonete, com mobilidade e não formadora de esporos. Além disso, também apresenta a produção de um pigmento vermelho em meio nutriente, embora essa característica varia entre suas cepas. Ela pertence à família Enterobacteriaceae e pode ser encontrada na natureza, como solo, água, vegetais e também como parte da microbiota intestinal de humanos e animais saudáveis. Contudo, é um organismo oportunista que causa infecções graves, principalmente em pessoas imunocomprometidas (TORTORA et al., 2017).



Entre os fatores que tornam *Serratia marcescens* uma ameaça sanitária está sua capacidade de desenvolver resistência a antimicrobianos, destacando-se a produção de beta-lactamases do tipo AmpC e enzimas de espectro estendido (ESBL). As enzimas AmpC têm como principais alvos as penicilinas e cefalosporinas de primeira a terceira geração, além de não serem inibidas por ácido clavulânico. Já as ESBL atuam sobre penicilinas, cefalosporinas de amplo espectro e monobactâmicos, como o aztreonam, mas são inibidas por inibidores de beta-lactamase. A presença de AmpC nesse microrganismo representa um importante desafio clínico e sanitário, pois limita o uso de diversos antibióticos comumente utilizados, favorecendo a sua persistência tanto em ambientes hospitalares quanto em alimentos de origem animal (FUSCO et al., 2018).

Embora tradicionalmente associada a infecções oportunistas em humanos, a bactéria *Serratia marcescens* também tem sido reportada como agente potencialmente patogênico em sistemas aquícolas, especialmente em tilápias mantidas sob cultivo intensivo. Um dos fatores que explicam sua capacidade de causar infecção é o mecanismo de *quorum sensing*, uma forma de comunicação química entre células bacterianas, por meio da qual são produzidos e percebidos autoindutores que sinalizam o aumento da densidade populacional. Quando uma concentração crítica desses sinais é atingida, ocorre a ativação coordenada de genes relacionados à patogenicidade, incluindo aqueles responsáveis pela formação de biofilmes, produção de enzimas líticas e secreção de toxinas (MILLER; BASSLER, 2001).

Em estudo conduzido por Lee et al. (2020), uma cepa de *S. marcescens* isolada de tilápias doentes apresentou genes associados à produção de *serrawettin*, um biosurfactante cuja expressão é regulada por *quorum sensing* e que facilita a adesão e mobilidade bacteriana em tecidos como pele e brânquias. Tais características favorecem a instalação e disseminação de infecções em ambientes de criação intensiva, especialmente sob condições de estresse, alta densidade e baixa qualidade de água. Por isso, a presença de *S. marcescens* em pisciculturas deve ser considerada com cautela, já que pode representar um fator agravante em surtos infecciosos, comprometendo o desempenho produtivo e sanitário dos lotes.

Embora o cozimento adequado das tilápias elimine bactérias viáveis, incluindo cepas resistentes de *Serratia marcescens*, os riscos à saúde pública relacionados à resistência antimicrobiana não se restringem ao consumo direto. Isso porque o manuseio de pescado cru pode resultar em contaminação cruzada de superfícies e alimentos prontos para o consumo, representando uma via potencial de disseminação de bactérias resistentes (LEROY et al., 2010). Além disso, ambientes de cultivo intensivo, onde há uso recorrente de antimicrobianos, favorecem a seleção e propagação de genes de resistência que podem atingir o meio ambiente por efluentes ou resíduos de processamento (FAO/OMS, 2020). Estudos também sugerem que, mesmo após a eliminação da bactéria pelo calor, o DNA residual contendo genes de resistência pode, em condições específicas, ser incorporado por bactérias comensais humanas por meio de transferência horizontal (VAN HOEK et al., 2011). Dessa forma, o monitoramento da resistência antimicrobiana em bactérias isoladas de tilápias é uma estratégia essencial não apenas para o controle sanitário da produção aquícola, mas também para a preservação da saúde pública.

OBJETIVO

O presente trabalho teve como objetivo investigar o perfil de resistência antimicrobiana de cepas de *Serratia marcescens* isoladas de tilápias cultivadas em tanques-rede no município de Inaciolândia, no Estado de Goiás.



METODOLOGIA

Participaram do estudo um total de 10 tilápias de dois tanques de criação no município do Inaciolândia – GO, de cada animal foi feito um suab de pele e de fezes. Destes peixes isolou-se três cepas de *Serratia marcescens*, duas originadas da pele e uma das fezes de tilápias. Em seguida, os isolados foram submetidos ao teste de sensibilidade a antimicrobianos pelo método de disco-difusão (BrCAST, 2024). As colônias puras foram transferidas para solução salina estéril 0,9% até atingirem turbidez equivalente a 0,5 da escala de McFarland (aproximadamente $1,5 \times 10^8$ UFC/mL). A suspensão padronizada foi então semeada por espalhamento homogêneo sobre a superfície de placas de ágar Mueller-Hinton com 4 mm de espessura. Em seguida, foram aplicados discos contendo os antimicrobianos recomendados para bacilos Gram-negativos, incluindo ceftazidima (30 µg), ceftriaxona (30 µg), cefotaxima (30 µg), aztreonam (30 µg), amoxicilina + ácido clavulânico (20 + 10 µg), imipenem (10 µg), meropenem (10 µg), gentamicina (10 µg), amicacina (30 µg), ciprofloxacino (5 µg), ampicilina (10 µg) e cefepima (30 µg). As placas foram incubadas em estufa bacteriológica a 37°C por 24 horas. Após o período de incubação, os halos de inibição foram medidos com paquímetro digital, e os resultados foram interpretados com base nos pontos de corte clínicos definidos pelo protocolo estabelecido. As análises foram feitas em duplicata e como controle positivo utilizou-se a cepa *Serratia marcescens* ATCC 13880. As cepas também foram classificadas quanto ao perfil de resistência como multirresistentes (MDR), extensivamente resistentes (XDR) ou panresistentes (PDR), conforme os critérios propostos por Magiorakos et al. (2012).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os testes de sensibilidade antimicrobiana evidenciaram perfis distintos de resistência entre as amostras analisadas. A primeira amostra, isolada da pele, apresentou sensibilidade à maioria dos antimicrobianos testados, com exceção da ampicilina. A segunda amostra de pele exibiu um perfil multirresistente, pois teve resistência à: ampicilina, ceftazidima, aztreonam e ceftriaxona. Já a amostra isolada da região retal demonstrou resistência múltipla à combinação amoxicilina + ácido clavulânico, ampicilina, imipenem, gentamicina e amicacina. Os antimicrobianos que apresentaram total eficácia frente a esse isolado foram cefotaxima, meropenem e ciprofloxacina.

Esses resultados são compatíveis com achados previamente descritos na literatura, como os apresentados por Zivkovic Zaric et al. (2023), que relataram ampla resistência de

S. marcescens a diversas classes antimicrobianas, com destaque para cotrimoxazol (37% de resistência) e gentamicina (11,5%). No entanto, diferentemente daquele estudo, em que não foi observada resistência à amicacina, o presente trabalho identificou resistência a esse fármaco em um dos isolados, o que é particularmente relevante, considerando que a amicacina é uma das principais opções terapêuticas contra bacilos Gram-negativos multirresistentes, como *S. marcescens*, *Klebsiella pneumoniae* e *Pseudomonas aeruginosa* (ANTIMICROBIAL THERAPY, 2024).

Observou-se também uma taxa de sensibilidade de 44% (16/36) aos antimicrobianos da classe dos beta-lactâmicos, incluindo ampicilina, amoxicilina + ácido clavulânico, ceftazidima, ceftriaxona, cefotaxima, cefepima, aztreonam, imipenem e meropenem. Esse percentual é consideravelmente inferior ao relatado por Silva et al. (2020), que observaram uma taxa de sensibilidade de 73,7% em isolados de *Serratia marcescens* obtidos de um rio urbano.

Adicionalmente, Tavares-Carreón et al. (2023) destacam que *S. marcescens* possui resistência intrínseca a diversas classes de antibióticos, incluindo ampicilina e cefalosporinas



de primeira e segunda geração. Essa resistência está associada à presença de genes cromossômicos relacionados à produção de β -lactamases, bombas de efluxo e modificações no lipopolissacarídeo (LPS). No presente estudo, os dados obtidos corroboram tais evidências, uma vez que foi verificada resistência de 100% à ampicilina entre os isolados analisados.

CONCLUSÃO

O presente estudo identificou *Serratia marcescens* com perfis variados de resistência antimicrobiana em tilápias cultivadas, incluindo resistência significativa à ampicilina e, de forma preocupante, a fármacos críticos como imipenem e amicacina. Este último é amplamente utilizado contra bacilos Gram-negativos multirresistentes, o que torna sua ineficácia um sinal de alerta para a saúde animal e pública.

Diante disso, reforça-se a importância de medidas de vigilância microbiológica contínuas na aquicultura, com foco em testes de sensibilidade, uso racional de antibióticos e práticas sanitárias rigorosas. Ademais, estudos moleculares são necessários para esclarecer os mecanismos de resistência e orientar ações mais eficazes de controle.

Palavras-chave: Beta-lactamases; Biossegurança alimentar; Piscicultura;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTIMICROBIAL THERAPY, Inc. *The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy* 2024. 54. ed. Sperryville: Antimicrobial Therapy, 2024.

BRASIL. Ministério da Pesca e Aquicultura. Produção aquícola aumenta 6,2% no Brasil e gera R\$ 10,2 bilhões em 2023. Brasília: MPA, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/mpa/pt-br/assuntos/noticias/producao-aquicola-aumenta-16-no-brasil-e-gera-r-10-2-bilhoes-em-2023>. Acesso em: 21 maio 2025.

BRCAST – COMITÊ BRASILEIRO DE TESTES DE SENSIBILIDADE AOS

ANTIMICROBIANOS. Método de disco-difusão para teste de sensibilidade aos antimicrobianos BrCAST-EUCAST: versão 12.0, janeiro de 2024 do EUCAST. Versão BrCAST válida a partir de 15 abr. 2024. Disponível em: <https://brcast.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Metodo-disco-difusao-BrCAST-15-04-2024.pdf>. Acesso em: 16 maio 2025.

FAO; OMS. *The FAO Action Plan on Antimicrobial Resistance 2021–2025*. Rome: FAO/WHO, 2020.

FUSCO, Vincenzina et al. Opportunistic food-borne pathogens. In: GRUMEZESCU, Alexandru Mihai; HOLBAN, Alina Maria (ed.). *Food safety and preservation: modern biological approaches to improving consumer health*. London: Academic Press, 2018. p. 269–306.

LEE, R. S. L. et al. Insights of biosurfactant producing *Serratia marcescens* strain W2.3. *Genomics*, v. 112, n. 2, p. 1224–1231, 2020.
DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.ygeno.2019.07.011>.

LEROY, B. et al. Occurrence of antimicrobial-resistant bacteria on beef carcasses and in



processing plants in Belgium. *International Journal of Food Microbiology*, v. 134, n. 1–2, p. 29–36, 2010. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2009.12.016>.

MILLER, M. B.; BASSLER, B. L. Quorum sensing in bacteria. *Annual Review of Microbiology*, v. 55, p. 165–199, 2001. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.micro.55.1.165>.

SILVA, Heloisa Inácio et al. Identificação e avaliação da susceptibilidade antimicrobiana de *Serratia marcescens* recuperadas de um rio urbano. *Revista Colombiana de Ciências Químico Farmacêuticas*, v. 52, n. 3, 2023. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/6aa87471d9f7d0e20125bb426f27353f/1?cbl=2035763&pq-origsite=gscholar>. Acesso em: 19 maio 2025.

TAVARES-CARREÓN, Faviola et al. *Serratia marcescens* antibiotic resistance mechanisms of an opportunistic pathogen: a literature review. *PeerJ*, v. 11, e14399, 2023. DOI: <https://doi.org/10.7717/peerj.14399>. Acesso em: 19 maio 2025.

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. *Microbiologia*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

VAN HOEK, A. H. A. M. et al. Acquired antibiotic resistance genes: an overview. *Frontiers in Microbiology*, v. 2, p. 203, 2011. DOI: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2011.00203>.

ZIVKOVIC ZARIC, R. et al. Antimicrobial treatment of *Serratia marcescens* invasive infections: systematic review. *Antibiotics*, v. 12, n. 2, p. 367, 2023. DOI: <https://doi.org/10.3390/antibiotics12020367>. Acesso em: 16 maio 2025.



A ERGONOMIA NO TRABALHO DOS TRADUTORES E INTÉRPRETES DE LÍNGUA DE SINAIS/LÍNGUA PORTUGUESA

Claúdio Luiz Vasques dos Santos¹
Eliane Nogueira De Souza Souto²
Etna Marzolla Gutierrez³
Luciana Barem Ribeiros⁴
Heitor Romero Marques⁵

¹Universidade Católica Dom Bosco - UCDB, E-mail: ra867330@ucdb.br,

²Universidade Católica Dom Bosco - UCDB, ³Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, ⁴Universidade Católica Dom Bosco – UCDB, ⁵Universidade Católica Dom Bosco - UCDB

Área temática: Terapia Ocupacional

Resumo: A profissão de Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais/Língua Portuguesa (TILSP) exige esforços físicos, cognitivos e emocionais, impactando diretamente sua saúde e qualidade de vida. Regulamentada pela Lei nº 10.436/2002 e reforçada pela Lei nº 14.704/2023, essa função garante a comunicação entre surdos e ouvintes, sendo essencial em contextos educacionais e institucionais. A legislação recente reconhece a necessidade de pausas estratégicas para prevenir lesões decorrentes da carga gestual repetitiva e posturas prolongadas. A ergonomia, conforme Dul e Weerdmeester (2004), visa adaptar as condições de trabalho para evitar desgastes físicos e melhorar a eficiência. Estudos indicam que muitos intérpretes relatam dores e fadiga intensa devido à sobrecarga laboral. Além dos desafios físicos, há um aspecto simbólico fundamental na profissão, relacionado à identidade e ao reconhecimento institucional, o que impacta o bem-estar dos profissionais. Este estudo, baseado em revisão de literatura e análise de dados secundários, destaca a importância da adaptação ergonômica do ambiente de trabalho, políticas organizacionais voltadas para valorização da profissão e programas de suporte psicológico. A implementação de estratégias preventivas, como pausas adequadas e capacitação contínua, pode contribuir para um ambiente mais saudável e sustentável, garantindo que os intérpretes exerçam suas funções com qualidade e bem-estar.

INTRODUÇÃO

A profissão de Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais/Língua Portuguesa (TILSP) envolve demandas físicas, cognitivas e emocionais, tornando fundamental a compreensão dos impactos na saúde e qualidade de vida desses profissionais. No Brasil, sua regulamentação foi consolidada com a Lei nº 10.436/2002, que reconhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação. Mais recentemente, a Lei nº 14.704/2023 reforçou a importância da profissão, estabelecendo diretrizes para suas condições de trabalho, incluindo a necessidade de pausas adequadas durante a jornada laboral.

O intérprete de Libras desempenha um papel essencial na intermediação da comunicação entre pessoas surdas e ouvintes, traduzindo entre Libras e a língua oral em diversos contextos educacionais, institucionais e sociais. Esse trabalho exige grande esforço físico e mental, pois envolve gestos repetitivos e posturas prolongadas que podem levar a lesões musculoesqueléticas e fadiga intensa. Assim, a Lei nº 14.704/2023 reconhece a



importância das pausas durante o trabalho, buscando garantir melhores condições ergonômicas para evitar danos à saúde dos profissionais.

A ergonomia, segundo Dul e Weerdmeester (2004), visa adaptar as condições de trabalho às capacidades humanas, prevenindo lesões e melhorando a eficiência. No contexto dos intérpretes, isso significa planejar pausas estratégicas, ajustes posturais e estratégias para minimizar o desgaste físico e mental ao longo da jornada. Pesquisas indicam que grande parte dos profissionais relatam desconforto ou dores relacionadas à atividade, reforçando a necessidade de intervenções ergonômicas.

Além dos desafios físicos, há uma dimensão simbólica relevante na profissão. O trabalho do intérprete está diretamente ligado à identidade e ao pertencimento, sendo influenciado pelo reconhecimento institucional e pelas relações interpessoais. Conforme Antunes (2018), a valorização social e a realização pessoal estão intimamente conectadas à percepção de reconhecimento no ambiente profissional. Dessa forma, políticas organizacionais voltadas ao suporte e valorização desses trabalhadores são fundamentais para garantir melhores condições e reduzir os impactos emocionais negativos.

Este estudo, fundamentado em revisão de literatura e análise de dados secundários, destaca a necessidade de estratégias para aprimorar a ergonomia no trabalho dos intérpretes e aumentar o reconhecimento profissional. A criação de medidas que assegurem pausas adequadas, suporte psicológico e capacitação contínua pode contribuir para um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável, garantindo que esses profissionais desempenhem suas funções com qualidade e bem-estar.

OBJETIVO

Obter um texto que transmita ao leitor os pontos essenciais do impacto da ergonomia na atuação dos Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais/Língua Portuguesa, destacando os desafios físicos da profissão e a necessidade de implementação de políticas ergonômicas adequadas.

METODOLOGIA

Esta pesquisa é de caráter qualitativo e descritivo, com abordagem teórica e documental. Optou-se por realizar uma revisão integrativa da literatura e uma análise de dados secundários já publicados em relatórios institucionais, estudos acadêmicos e bases oficiais sobre a atuação dos Tradutores e Intérpretes de Libras em contextos educacionais e institucionais no Brasil, com foco no estado de Mato Grosso do Sul.

Procedimentos de análise

Foram selecionadas produções acadêmicas publicadas nos últimos dez anos, além de documentos técnicos de órgãos públicos e entidades representativas da categoria profissional. A análise dos dados foi organizada de forma temática, com base nos eixos: ergonomia e saúde ocupacional, dimensão simbólica do trabalho e saúde mental e reconhecimento institucional.

A pesquisa não envolveu contato direto com seres humanos, nem a coleta de dados primários, dispensando, portanto, a necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.



RESULTADOS E DISCUSSÃO - Ergonomia e Saúde Ocupacional

Ergonomia Física e Carga de Trabalho

A ergonomia busca adequar o ambiente laboral às características fisiológicas dos trabalhadores, prevenindo lesões e otimizando o desempenho (DUL; WEERDMEESTER, 2004). No caso dos intérpretes, a carga gestual repetitiva e as posturas prolongadas geram impactos significativos na saúde física.

A sobrecarga pode gerar lesões musculoesqueléticas e fadiga intensa, conforme aponta Grandjean (1998), que destaca a importância da análise ergonômica para reduzir impactos negativos na saúde dos profissionais.

Pesquisas secundárias apontam que mais da metade dos profissionais relatam dores ou desconfortos relacionados à atividade, e grande parte precisou adaptar sua forma de atuação para reduzir o desgaste físico. A sobrecarga de trabalho, com jornadas que podem ultrapassar 40 horas semanais, contribui para o desenvolvimento de lesões musculoesqueléticas e fadiga intensa (GRANDJEAN, 1998).

Dimensão Simbólica do Trabalho e Reconhecimento

A valorização do trabalho é um elemento essencial para o bem-estar profissional (ANTUNES, 2018).

A carga emocional da interpretação pode influenciar negativamente o bem-estar dos profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das evidências encontradas na literatura, são sugeridas estratégias para mitigar os impactos ergonômicos e melhorar a qualidade de vida dos intérpretes: Adaptação ergonômica do ambiente de trabalho, considerando pausas estratégicas e ajustes posturais. Criação de políticas organizacionais voltadas para valorização e reconhecimento da profissão. Incorporação de programas de suporte psicológico, visando reduzir o desgaste emocional e melhorar a resiliência profissional. Capacitação contínua, incluindo orientações sobre técnicas de prevenção de lesões. O estudo confirma, com base na literatura e em dados secundários, que os TILSPs enfrentam desafios físicos, emocionais e organizacionais, demandando estratégias ergonômicas e maior reconhecimento da profissão. O impacto da carga física e mental torna essencial o desenvolvimento de intervenções para adaptação postural, pausas e suporte psicológico. Além disso, a valorização institucional e a escuta organizacional são pontos-chave para garantir um ambiente de trabalho mais saudável e sustentável.

Palavras-chave: Ergonomia; Intérpretes de Língua de Sinais; Sobrecarga física; Saúde ocupacional; Reconhecimento institucional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018.

DUL, Jan; WEERDMEESTER, Martin. Ergonomia prática. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2004.

GRANDJEAN, Etienne. Ergonomia: adaptação do trabalho ao homem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

Brasil. Lei nº 14.704/2023. Regulamentação da atuação dos Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais.

BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/>.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 17: Ergonomia. Brasília: MTE, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-17-atualizada-2022.pdf>. Acesso em: 21 maio 2025.

Silva, J. & Oliveira, M. (2023). Ergonomia aplicada à interpretação de Língua de Sinais: desafios e perspectivas.

Souza, R. (2022). Saúde ocupacional e sobrecarga laboral dos intérpretes de Libras.



AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PREVENÇÃO EM SAÚDE: O Papel da Inteligência Artificial no Diagnóstico Mamográfico

Alexandre Junior de Souza Menezes^{1, 2}

1. Universidade de Pernambuco – UPE, Petrolina, PE, Brasil

2. Universidade Federal do Oeste da Bahia, Barreiras, Bahia, BA, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: Este trabalho avalia o desempenho de algoritmos de inteligência artificial (IA) na detecção precoce do câncer de mama por meio da análise de mamografias, comparando seus resultados com a leitura convencional realizada por radiologistas. O câncer de mama continua sendo uma das principais causas de morte entre mulheres, e a detecção precoce é fundamental para o sucesso terapêutico. Com base em uma base de dados ampla e diversificada, composta por imagens mamográficas previamente classificadas, redes neurais convolucionais (CNNs) foram treinadas para identificar padrões indicativos de neoplasias mamárias. As imagens foram normalizadas para garantir padronização técnica, e o treinamento foi realizado com validação cruzada. Os algoritmos de IA demonstraram elevado desempenho em termos de precisão, sensibilidade e especificidade, superando, em muitos casos, a análise tradicional dos profissionais. Houve significativa redução de falsos negativos e falsos positivos, sugerindo uma maior confiabilidade nos resultados gerados pelos modelos. Além da precisão, os sistemas de IA mostraram potencial para otimizar o fluxo de trabalho clínico, auxiliando radiologistas na triagem e análise de casos. A integração da inteligência artificial à prática radiológica apresenta-se, portanto, como uma alternativa eficaz para aprimorar a acurácia diagnóstica e a agilidade no atendimento. Conclui-se que, se corretamente implementada, a IA poderá não apenas complementar, mas transformar os métodos atuais de diagnóstico do câncer de mama, promovendo melhores desfechos clínicos e contribuindo para uma medicina mais precisa, eficiente e humanizada.

INTRODUÇÃO

O câncer de mama é uma das principais causas de morbimortalidade entre mulheres em todo o mundo, representando um grave problema de saúde pública. A detecção precoce da doença é considerada um fator decisivo para o êxito do tratamento, reduzindo significativamente os índices de mortalidade e aumentando as chances de cura. Nesse contexto, a mamografia é o principal exame de rastreamento utilizado, sendo interpretada por radiologistas que avaliam as imagens em busca de alterações suspeitas. Contudo, essa interpretação pode variar conforme a experiência do profissional, além de estar sujeita a fatores como fadiga e subjetividade, o que pode levar à ocorrência de erros diagnósticos, especialmente nos estágios iniciais da doença (Data, 2018; Davenport; Kalakota, 2019).

Com o avanço das tecnologias digitais e a incorporação de novas ferramentas no campo da saúde, a inteligência artificial (IA) tem emergido como uma estratégia inovadora e promissora para aprimorar os métodos de diagnóstico por imagem. A IA, por meio de algoritmos de aprendizado de máquina, é capaz de analisar grandes volumes de dados com alta velocidade e precisão, identificando padrões complexos e sutis em exames radiológicos. As redes neurais convolucionais (CNNs), por exemplo, vêm sendo amplamente utilizadas na classificação de imagens médicas e já demonstraram desempenho equivalente ou superior



ao de especialistas em diversas áreas da radiologia. Essa realidade inaugura uma nova fase na prática médica, com possibilidades de reduzir erros, acelerar diagnósticos e otimizar a tomada de decisões clínicas(Keek, *et al*, 2018; Souza, 2019).

Diante desse cenário, este estudo propõe-se a investigar a eficácia da inteligência artificial na detecção precoce do câncer de mama por meio da análise automatizada de mamografias. Ao comparar o desempenho dos algoritmos com o método tradicional de leitura realizado por radiologistas, busca-se compreender os benefícios e limitações dessa tecnologia aplicada ao diagnóstico oncológico. A proposta se insere em um contexto de inovação tecnológica e transformação digital no campo da saúde, contribuindo para o debate sobre a integração ética e segura da IA nos fluxos assistenciais. Além disso, destaca-se a relevância de explorar soluções que possam ampliar o acesso a diagnósticos precisos e qualificados, especialmente em regiões com escassez de profissionais especializados ou altos índices de demanda reprimida nos serviços de imagem.

OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo principal avaliar a eficácia de algoritmos de inteligência artificial na detecção precoce do câncer de mama por meio da análise automatizada de mamografias. Busca-se comparar o desempenho desses algoritmos com a interpretação convencional realizada por radiologistas, verificando sua precisão, sensibilidade e especificidade no reconhecimento de sinais radiológicos indicativos da doença. Além disso, pretende-se investigar o potencial da inteligência artificial como ferramenta de apoio diagnóstico capaz de reduzir erros, agilizar o processo de triagem e contribuir para a melhoria da qualidade assistencial no campo da radiologia mamária.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa e comparativa, desenvolvido com base na análise de desempenho de algoritmos de inteligência artificial aplicados à detecção precoce de câncer de mama em exames de mamografia digital. Para tanto, utilizou-se um banco de dados composto por centenas de mamografias reais, contendo tanto imagens positivas quanto negativas para câncer, previamente validadas por radiologistas. As imagens foram submetidas a um processo de normalização técnica para padronizar os parâmetros de aquisição e garantir a consistência dos dados utilizados no treinamento dos modelos. Optou-se pelo uso de redes neurais convolucionais (CNNs) devido à sua reconhecida eficácia na análise de imagens médicas. Os modelos foram treinados por meio de aprendizado supervisionado, sendo empregadas técnicas de validação cruzada para assegurar a robustez dos resultados e minimizar o risco de sobreajuste. A performance dos algoritmos foi mensurada a partir de métricas estatísticas de avaliação, como precisão, sensibilidade e especificidade, que foram posteriormente comparadas com os resultados obtidos por radiologistas humanos, considerados como padrão de referência. O desenvolvimento computacional e a análise de desempenho foram conduzidos com o objetivo de avaliar a viabilidade da utilização da inteligência artificial como ferramenta de apoio diagnóstico na prática clínica, observando sua capacidade de reconhecer padrões sutis nas imagens, reduzir falhas humanas e otimizar o tempo de resposta nos processos de triagem e diagnóstico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os algoritmos de inteligência artificial, treinados com base em mamografias previamente classificadas, demonstraram desempenho superior quando comparados às



análises realizadas por radiologistas. As redes neurais convolucionais foram capazes de identificar padrões sutis nas imagens, muitas vezes imperceptíveis ao olhar humano, o que resultou em taxas mais elevadas de precisão e sensibilidade (Baig, 2019). Essa capacidade de detectar alterações em estágios iniciais da doença é fundamental para a eficácia do tratamento e para o aumento das taxas de sobrevivência entre as pacientes.

Um dos resultados mais significativos observados foi a redução nas taxas de falsos negativos e falsos positivos. Enquanto os falsos negativos podem retardar o início do tratamento e comprometer o prognóstico da paciente, os falsos positivos geram ansiedade e podem levar a exames invasivos desnecessários (Souza, 2019). A aplicação da inteligência artificial contribuiu diretamente para a diminuição desses erros, promovendo maior confiabilidade no diagnóstico e segurança no processo de triagem. Isso representa um avanço considerável em relação ao método tradicional, que ainda depende, em grande parte, da interpretação subjetiva dos profissionais.

Além da precisão diagnóstica, os modelos de inteligência artificial apresentaram desempenho consistente ao longo de diferentes conjuntos de dados e cenários clínicos, demonstrando boa generalização e robustez. A padronização das análises permitiu uma redução no tempo de resposta, favorecendo a otimização dos fluxos de trabalho em ambientes hospitalares e centros de diagnóstico por imagem. Com isso, os radiologistas puderam direcionar seus esforços para os casos mais complexos, melhorando a alocação de recursos humanos e a qualidade da assistência (Topol, 2019).

Os resultados obtidos neste estudo reforçam a viabilidade da integração da inteligência artificial como ferramenta de apoio na prática radiológica, destacando não apenas a melhoria dos indicadores técnicos, mas também seu potencial para transformar a organização do cuidado. Ao associar tecnologia e saúde, cria-se a possibilidade de um diagnóstico mais ágil, preciso e acessível (Jiang, *et al*, 2017). Tais evidências apontam para um cenário futuro em que a inteligência artificial possa contribuir significativamente para uma medicina mais eficiente, preventiva e centrada no paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que a inteligência artificial representa uma ferramenta promissora e eficaz para a detecção precoce do câncer de mama, com potencial para complementar e até superar, em determinados aspectos, os métodos tradicionais de análise mamográfica realizados por radiologistas. Ao longo deste estudo, foi possível verificar que os algoritmos baseados em redes neurais convolucionais alcançaram altos índices de precisão, sensibilidade e especificidade, reduzindo significativamente as falhas diagnósticas e contribuindo para um processo de triagem mais seguro e eficiente.

Essa constatação reforça a importância de integrar tecnologias emergentes às práticas clínicas, especialmente em áreas sensíveis como a oncologia diagnóstica, onde a antecipação do diagnóstico pode impactar diretamente a vida e o prognóstico das pacientes (Baig, 2019). A introdução da inteligência artificial no cotidiano dos serviços de saúde não implica a substituição dos profissionais, mas sim o fortalecimento de uma prática médica mais ágil, precisa e centrada no cuidado integral.

Portanto, recomenda-se que os sistemas de saúde e instituições acadêmicas invistam na formação profissional voltada para o uso ético e crítico dessas tecnologias, bem como na adaptação das estruturas institucionais para sua implementação segura e eficaz. Além disso, sugere-se que estudos futuros aprofundem a investigação dos impactos da IA na relação médico-paciente, na gestão dos serviços e na equidade do acesso aos diagnósticos de qualidade.



A inteligência artificial, quando aliada ao conhecimento humano e à prática clínica responsável, tem o potencial de transformar profundamente os paradigmas da medicina diagnóstica, promovendo avanços significativos na prevenção, na precisão e na humanização do cuidado em saúde.

Palavras-chave: Câncer de Mama; Diagnóstico Precoce; Inteligência Artificial; Mamografia; Radiologia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAIG, M. M. et al. A systematic review of wearable patient monitoring systems—current challenges and opportunities for clinical adoption. *Journal of Medical Systems*, v. 43, n. 10, p. 1-10, 2019.

DAVENPORT, T.; KALAKOTA, R. The potential for artificial intelligence in healthcare. *Future Healthcare Journal*, v. 6, n. 2, p. 94-98, 2019.

JIANG, F. et al. Artificial intelligence in healthcare: past, present and future. *Stroke and Vascular Neurology*, v. 2, n. 4, p. 230-243, 2017.

TOPOL, E. J. High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, v. 25, n. 1, p. 44-56, 2019.

DATA, science in medical imaging – a literature review. *Journal of Clinical and Experimental Radiology*, [S.l.], v. 1, n. 1, 2018.

SOUZA, J. P. Modelo de qualidade para o desenvolvimento e avaliação da viabilidade clínica de sistemas de recuperação de imagens médicas baseadas em conteúdo (Tese). São Carlos, SP: Universidade de São Paulo, 2012. Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-15022013-142541/pt-br.psp>. Acesso em: 1 abr. 2019.

KEEK, S. A.; LEIJENAAR, R. T.; JOCHEMS, A. et al. A review on radiomics and the future of theranostics for patient selection in precision medicine. *British Journal of Radiology*, London, v. 91, p. 20170926, 2018.



EXPERIÊNCIAS LÚDICAS E INCLUSIVAS VOLTADAS PARA CRIANÇAS COM DOENÇAS RARAS

¹ Maciel Batista Pereira Neto

² Rebeka Maria Moreira Cartaxo

³ Salomé Araújo Soares

⁴ Thaisler Carina Soares Nolasco

⁵ Thomás Lucas Silva de Araújo

⁶ Aralinda Nogueira Pinto de Sá

^{1,2,3,4,5,6} AFYA – Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil.

Área temática: Educação em Saúde

Resumo: O presente relato de experiência descreve a realização de uma oficina lúdica e educativa voltada para crianças com doenças raras, promovida por 10 discentes do curso de medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, no contexto do módulo de Práticas Interdisciplinares de Extensão, Pesquisa e Ensino II. A atividade ocorreu em uma associação paraibana, que atende pessoas com deficiências raras e seus cuidadores, e teve o objetivo de proporcionar momentos de integração, recreação e desenvolvimento infantil. A oficina foi planejada de forma a considerar as diferentes necessidades das crianças atendidas, incorporando estratégias que favorecessem a inclusão e o estímulo motor, cognitivo e social. Foram realizadas atividades como pintura facial, pintura de desenhos e circuito físico-motor, conduzidas pelos estudantes em pequenos grupos, respeitando as limitações e potencialidades de cada participante. A experiência permitiu observar o engajamento das crianças nas dinâmicas propostas, com expressões de alegria, criatividade e interação entre elas e com os facilitadores. Além disso, a ação contribuiu para o fortalecimento da empatia e da comunicação dos discentes com o público infantil e aproximação com as problemáticas das doenças raras. Conclui-se que a oficina lúdica proporcionou um ambiente acolhedor e educativo, reafirmando a importância de práticas integrativas na promoção do bem-estar de crianças com doenças raras e no processo de formação humanizada dos futuros profissionais de saúde.

Palavras-chave: Doenças Raras; Cuidado Humanizado; Estudantes de Medicina; Relações Comunidade-Instituição.

INTRODUÇÃO

A inclusão das pessoas com deficiência (PCD) na sociedade contemporânea é uma pauta que ultrapassa os limites da acessibilidade física, abrangendo também o reconhecimento da diversidade humana, a equidade no acesso a direitos e a construção de uma cultura que valorize as diferenças. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas (ONU), ratificada no Brasil pelo Decreto nº 6.949/2009, representa um marco nesse processo ao propor o modelo social da deficiência, que considera que as barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais e sociais são os verdadeiros limitadores da participação plena das pessoas com deficiência (ONU, 2006). Essa mudança de paradigma desloca a compreensão da deficiência de um enfoque biomédico para uma perspectiva de direitos humanos, na qual a sociedade tem responsabilidade ativa na remoção dessas barreiras.



Entre os grupos mais afetados por essas barreiras estão as pessoas com doenças raras, cuja condição frequentemente está associada a graus variados de deficiência física, cognitiva ou sensorial. No Brasil, estima-se que cerca de 13 milhões de pessoas vivam com algum tipo de doença rara, caracterizada como condição que afeta até 65 indivíduos em cada 100.000 habitantes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Muitas dessas doenças são de origem genética, progressiva e incurável, acarretando limitações significativas à autonomia e ao bem-estar dos pacientes. A criação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, instituída pela Portaria GM/MS nº 199/2014, representou um avanço na estruturação do cuidado, propondo ações de prevenção, diagnóstico precoce, reabilitação e cuidado integral por meio da Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2014).

As crianças acometidas por doenças raras enfrentam desafios adicionais, sobretudo no acesso à educação, ao lazer e ao desenvolvimento social. A vulnerabilidade dessa população não se restringe à dimensão clínica, mas estende-se ao impacto psicossocial que a condição impõe às famílias, que muitas vezes enfrentam altos custos de tratamento, dificuldade de acesso a especialistas e a necessidade de readequação das rotinas domésticas e profissionais para garantir os cuidados necessários. Em muitos casos, um dos responsáveis abandona o mercado de trabalho para se dedicar integralmente ao cuidado da criança, o que agrava a situação socioeconômica do núcleo familiar (Geisa dos Santos Luz, 2019). Além disso, há um déficit de serviços públicos preparados para atender essa população com qualidade e acolhimento, o que reforça a necessidade de projetos interdisciplinares que articulem saúde, educação e assistência social.

Diante desse cenário, as atividades lúdicas emergem como instrumentos poderosos de inclusão e promoção do desenvolvimento integral das crianças com deficiência, decorrentes da evolução da doença rara. A ludicidade, quando incorporada ao contexto da saúde e da educação, proporciona não apenas entretenimento, mas também estímulo ao aprendizado, ao desenvolvimento motor, emocional e à construção de vínculos afetivos. Araújo (2024) aponta que o uso de jogos, brincadeiras e oficinas adaptadas amplia a participação ativa das crianças, promovendo autoestima, autonomia e integração com o meio. Em consonância, Rocha e Kretzer (2009) ressaltam que práticas interativas no campo da reabilitação fortalecem o engajamento das crianças e facilitam a relação entre profissionais de saúde, familiares e usuários.

No âmbito da formação médica, experiências práticas em cenários reais de situações culturais, econômicas e de vulnerabilidade social, a exemplo da problemática vivenciada por pessoas com doenças raras e seus cuidadores, são essenciais para a construção de uma postura ética, empática e humanizada. As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Medicina orientam uma formação baseada em competências que articule teoria e prática, favorecendo a atuação em todos os níveis de atenção e com foco nas necessidades reais da população (Souza et al., 2023). A extensão universitária, nesse sentido, assume papel fundamental ao possibilitar aos discentes o contato direto com comunidades e grupos historicamente excluídos, permitindo uma formação crítica e comprometida com a transformação social.

Destarte, este relato de experiência enfatiza os benefícios para as crianças com doenças raras e para a formação dos estudantes envolvidos. A ação reafirma o papel da universidade como agente de transformação social e o valor das práticas educativas em saúde como instrumentos de inclusão, e respeito à diversidade.

OBJETIVO

Relatar a experiência extensionista de discentes de medicina na promoção de uma



oficina lúdica e educativa voltada para crianças com doenças raras, com foco no estímulo ao desenvolvimento motor, cognitivo e social por meio de atividades recreativas inclusivas.

METODOLOGIA

O estudo é do tipo relato de experiência, que descreve a vivência dos discentes de medicina na construção e execução de uma oficina lúdica e educativa voltada para crianças com doenças raras, desenvolvida no âmbito do projeto de extensão curricular da disciplina Práticas Interdisciplinares de Extensão, Pesquisa e Ensino II da Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, no semestre letivo 2025.1. A ação ocorreu em uma associação civil sem fins lucrativos, localizada no município de João Pessoa - Paraíba, que oferece suporte a pessoas com doenças raras e seus familiares. Após visitas prévias à instituição, os estudantes elaboraram coletivamente uma proposta de intervenção educativa, a qual foi apresentada à banca avaliadora da disciplina e aprovada para execução. A oficina foi realizada no dia 30 de abril de 2025, no turno da tarde, contando com a participação ativa de crianças assistidas pela instituição, com diagnóstico de doenças raras, na faixa etária de 3 a 12 anos, acompanhadas por seus cuidadores, e que participaram voluntariamente. As atividades foram organizadas em três estações principais: pintura facial, pintura de desenhos e circuito físico-motor, cada uma conduzida por duplas ou trios de estudantes. A ação foi planejada de modo a respeitar as diferentes limitações e potencialidades das crianças, promovendo a inclusão e o estímulo ao desenvolvimento motor, cognitivo e emocional. Durante toda a atividade, os discentes estiveram em contato direto com as crianças, observando suas reações, interações e nível de engajamento, com o apoio dos profissionais da associação que acompanharam a dinâmica para garantir a segurança e a adaptação às necessidades individuais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A realização da oficina lúdico-educativa voltada para crianças com doenças raras revelou-se uma estratégia eficaz de promoção do cuidado humanizado e da sensibilização acadêmica, oferecendo um espaço de aprendizado mútuo entre discentes e participantes. A proposta permitiu a articulação entre o conhecimento técnico e a escuta ativa das vivências das famílias, promovendo a empatia, a interdisciplinaridade e a valorização das práticas integrativas e educativas no contexto da saúde.

As doenças raras, por definição da Organização Mundial da Saúde, são aquelas que afetam até 65 indivíduos a cada 100 mil pessoas; e, apesar de sua baixa prevalência individual, coletivamente representam um grupo expressivo de condições clínicas, caracterizadas por sua complexidade, cronicidade e pela escassez de terapias específicas. Nesse cenário, as famílias – em especial mães cuidadoras – assumem um papel central no cuidado contínuo, frequentemente enfrentando barreiras no acesso ao diagnóstico, tratamento e suporte psicossocial (OMS, 2011).

Neste sentido, do ponto de vista dos acadêmicos, a vivência extrapolou o aprendizado teórico tradicional e proporcionou o exercício de habilidades como empatia, comunicação sensível, trabalho em equipe, e estímulo ao cuidado centrado na pessoa. A escuta das mães revelou aspectos frequentemente invisibilizados pela abordagem biomédica, como o impacto emocional do diagnóstico, a exaustão física e mental dos cuidadores e as dificuldades econômicas enfrentadas pelas famílias. Observou-se que o abandono do trabalho formal e o isolamento social são consequências do cuidado integral dedicado aos filhos.

Durante a ação, observou-se que o ambiente lúdico possibilitou uma aproximação



mais acolhedora entre os acadêmicos e as crianças e as mães/cuidadores, facilitando a comunicação e o vínculo afetivo. As atividades interativas, como desenhos, jogos e rodas de conversa, permitiram que as crianças expressassem suas experiências e sentimentos, muitas vezes silenciados nas interações clínicas convencionais. Esse espaço simbólico de escuta ativa estimulou a elaboração de narrativas próprias, fortalecendo a autoestima e a autonomia infantil.

A ação foi planejada e executada de forma colaborativa entre os discentes e a equipe da associação de pessoas com doenças raras, com base nas possibilidades reais das crianças atendidas e na estrutura disponível. As oficinas foram pensadas não apenas como momentos de diversão, mas como espaços de cuidado e de escuta ativa, nos quais cada criança pudesse participar à sua maneira, no seu tempo e com o suporte necessário. Ao mesmo tempo, a vivência permitiu aos estudantes a oportunidade de sair dos ambientes acadêmicos tradicionais, enfrentando os desafios da prática em saúde sob uma ótica mais humana e inclusiva.

Além disso, a oficina reforçou a importância de práticas educativas que dialoguem com os princípios da Educação Popular em Saúde, conforme definido pela Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS (BRASIL, 2013). Ao reconhecer os saberes populares e criar espaços horizontais de troca, os acadêmicos puderam perceber a potência transformadora do cuidado compartilhado, pautado no respeito às singularidades de cada família.

A experiência também evidenciou a relevância de abordagens interdisciplinares no cuidado a pessoas com doenças raras. A presença de estudantes de diferentes cursos da área da saúde estimulou a reflexão conjunta sobre as limitações e potencialidades do SUS, além de favorecer o reconhecimento da importância de estratégias de cuidado integral que vão além do diagnóstico e da medicalização.

Por fim, a vivência contribuiu para a formação de profissionais mais sensíveis às necessidades de populações vulneráveis, conscientes da centralidade do cuidado humanizado e preparados para atuar em realidades marcadas por desigualdades. Assim, compreende-se que ações como essa não apenas beneficiam os participantes diretamente envolvidos, como também ampliam o repertório ético e afetivo dos futuros médicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A oficina lúdica e educativa voltada para crianças com doenças raras revelou-se uma experiência formativa enriquecedora, tanto para os discentes quanto para os participantes. A ação não apenas promoveu um espaço de acolhimento, escuta ativa e estímulo à criatividade infantil, como também proporcionou aos estudantes uma oportunidade única de aplicar os princípios da educação em saúde e do cuidado integral em um contexto real e sensível.

Ao articular conhecimento técnico e sensibilidade social, os acadêmicos vivenciaram de forma prática os desafios enfrentados por famílias acometidas por doenças raras, ampliando sua empatia, sua capacidade de comunicação e sua visão integral do cuidado. Além disso, a atividade reforçou a importância da abordagem multiprofissional e do trabalho em equipe como pilares para o atendimento mais eficaz e humanizado a essa população.

A experiência também evidenciou o papel transformador da extensão universitária na formação médica, ao permitir que o estudante atue como agente ativo de mudança, comprometido com os princípios do Sistema Único de Saúde e com a promoção da equidade. Dessa forma, ações como essa não só fortalecem a articulação entre ensino, serviço e comunidade, como também contribuem para a construção de uma prática médica mais crítica, sensível e comprometida com as necessidades reais da população.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Ana Cláudia Gonçalves. A ludicidade no processo ensino-aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais. **Revista Educação Contemporânea**, v. 1, n. 2, p. 430-448, 2024.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 199, de 30 de janeiro de 2014**. Institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br>.

ONU. **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência**. Disponível em: www.ohchr.org.

ROCHA, E. F.; KRETZER, M. R. Ações de reabilitação de pessoas com deficiência na estratégia da saúde da família da Fundação Zerbini e Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - Região Sudeste - Sapopemba/Vila Prudente - período 2000/2006. **Revista De Terapia Ocupacional Da Universidade De São Paulo**, v. 20, n. 1, p. 59-67, 2009.

SOUZA, M. C. A. DE et al. Contribuições de um projeto de extensão à formação médica: percepções de estudantes de graduação em medicina de uma universidade particular. : Dados preliminares. **Revista Fluminense de Extensão Universitária**, v. 13, n. 1, p. 06-10, 30 jun. 2023.



ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

¹Mayara Kelly Dantas da Silva

²Camila Fernandes Lemos Alves

³Hygo Marcus da Silva Barreto

⁴Victor Duarte Nóbrega

⁵Milene Honório e Silva

⁶Anna Livya Andrade Sales

⁷Anniely Rodrigues Soares

⁸Aline Freire Falcão

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Centro Universitário de João Pessoa. João Pessoa, Paraíba, Brasil

Área temática: Enfermagem

Resumo: Objetivo: Evidenciar a atuação do enfermeiro no acompanhamento de pacientes com hipertensão arterial na Atenção Primária à Saúde. **Metodologia:** Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura, realizada por meio de busca na Biblioteca Virtual em Saúde, foram utilizando os descritores: “Atenção Primária à Saúde”, “Hipertensão”, “Enfermagem” e “Cuidados de Enfermagem”. **Resultados e Discussão:** Foi possível compreender como se dá a atuação do enfermeiro no acompanhamento de pacientes com hipertensão arterial na Atenção Primária à Saúde, não somente focando no monitoramento clínico, mas também destacando a consulta de enfermagem, as ações educativas e os principais entraves e potencialidades dessa prática no cotidiano dos serviços de saúde. **Considerações finais:** O enfermeiro que atua na Atenção Primária à Saúde, desempenha um papel fundamental e estratégico tanto no monitoramento clínico, visando o melhor controle da doença do paciente, como também na promoção da saúde. Em vista disso, o estudo atinge o objetivo proposto ao destacar as estratégias do cuidado desenvolvidas pelo enfermeiro, além de evidenciar a importância da assistência de enfermagem voltada ao paciente com hipertensão.

INTRODUÇÃO

A hipertensão arterial é uma das principais condições crônicas que acometem a população brasileira, representando um importante problema de saúde pública devido à sua alta prevalência e às complicações associadas, como doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais (Brasil, 2021). Dessa maneira, a Atenção Primária à Saúde (APS) é considerada porta de entrada preferencial do Sistema Único de Saúde (SUS), exercendo um papel fundamental no acompanhamento longitudinal dos indivíduos com hipertensão arterial, por meio de ações preventivas, educativas e assistenciais (Brasil, 2021).

Na APS, o enfermeiro atua como um dos principais profissionais responsáveis pela organização e execução do cuidado às pessoas com hipertensão, promovendo atividades de prevenção, detecção precoce e controle da doença. Segundo Labegalini et al. (2022), o atendimento a pessoas com hipertensão e diabetes na APS ocorre tanto de forma programada quanto por demanda espontânea, com vistas ao controle pressórico e glicêmico. No entanto, observa-se que as consultas de enfermagem, embora reconhecidas como essenciais para a promoção da saúde e prevenção de complicações, nem sempre são sistematizadas, sendo frequentemente vinculadas à triagem para o atendimento médico.



Essa realidade das consultas de enfermagem às pessoas com hipertensão pode ser reflexo dos desafios enfrentados pelos enfermeiros na prática assistencial, como a sobrecarga de atendimentos, a não valorização da consulta de enfermagem por usuários e gestores, e a escassez de condições estruturais adequadas para o desenvolvimento pleno de suas atividades (Sousa et al., 2019).

Nesse sentido, torna-se essencial reconhecer a consulta de enfermagem como uma prática autônoma e estruturante na organização do cuidado às pessoas com hipertensão, além de investir na formação continuada dos profissionais, na melhoria das condições de trabalho e na ampliação do acesso às tecnologias de apoio à prática clínica (Sousa et al., 2019). Assim, justifica-se a importância deste estudo ao investigar a atuação do enfermeiro no acompanhamento de pacientes com hipertensão na APS, com base na literatura científica atual, a fim de promover práticas baseadas em evidências aos estudantes de enfermagem e enfermeiros que almejam a integralidade do cuidado da pessoa com hipertensão.

OBJETIVO

Evidenciar a atuação do enfermeiro no acompanhamento de pacientes com hipertensão arterial na Atenção Primária à Saúde, destacando os cuidados de enfermagem para prevenção e controle da doença.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que proporciona a síntese do conhecimento, contribuindo de forma significativa para a consolidação da Prática Baseada em Evidências no âmbito da saúde. Esse tipo de estudo é orientado pelas etapas: Identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; Amostragem ou busca na literatura; Extração de dados ou categorização; Análise crítica dos estudos incluídos; Interpretação dos dados; e Apresentação da revisão integrativa (Dantas et al., 2022).

A coleta de dados aconteceu nos meses de abril e maio de 2025 e foram realizadas consultas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Foram utilizados os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Atenção Primária à Saúde”, “Hipertensão”, “Enfermagem” e “Cuidados de Enfermagem”, e, para a construção da estratégia de busca, foram combinados com o operador booleano AND.

Sendo assim, os critérios de inclusão foram artigos científicos, nos idiomas português e inglês, no período de 2015 a 2025. Dessa maneira, foram excluídas pesquisas que não abordavam diretamente a temática ou que focassem no nível de atenção hospitalar, além de estudos duplicados.

Em vista disso, inicialmente foram encontrados o total de 132 artigos na BVS, após aplicados os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, 21 artigos permaneceram para análise. Destes, cinco artigos foram selecionados para a amostra final, enquanto dois artigos foram excluídos por duplicidade.

A análise dos artigos selecionados ocorreu por meio da leitura na íntegra do material, com foco na identificação dos objetivos e, principalmente, nos resultados apresentados. Foram identificadas as semelhanças e divergências entre os resultados dos estudos, sendo agrupados em categorias temáticas, o que permitiu reunir e organizar as informações mais pertinentes dos artigos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise dos estudos, foi possível compreender como se dá a atuação do



enfermeiro no acompanhamento de pacientes com hipertensão arterial na APS, não somente focando no monitoramento clínico, mas também destacando a consulta de enfermagem, as ações educativas e os principais entraves e potencialidades dessa prática no cotidiano dos serviços de saúde. Sendo assim, o estudo de Labegalini et al. (2022) revelou que a consulta de enfermagem direcionada a pessoas com hipertensão e diabetes, embora prevista nas diretrizes da APS, ainda é pouco sistematizada em muitos serviços.

No entanto, Sousa et al. (2019) demonstram que a sistematização da consulta de enfermagem, com planejamento, acolhimento e intervenções baseadas em protocolos, promove efeitos significativos na adesão ao tratamento medicamentoso. Os autores observaram que, com a estruturação das consultas, houve melhora da adesão terapêutica e controle da pressão arterial entre os usuários acompanhados. Dessa maneira, esses dados reforçam que a atuação do enfermeiro, quando respaldada por uma prática clínica bem fundamentada, é capaz de impactar positivamente nos desfechos de saúde da população hipertensa.

No entanto, os desafios enfrentados pelos enfermeiros na APS foram recorrentes nos estudos analisados. Labegalini et al. (2022) relatam dificuldades como a sobrecarga de atendimentos, o acúmulo de funções, a falta de infraestrutura adequada e a desvalorização da consulta de enfermagem, tanto por parte da gestão quanto dos próprios usuários. Esses fatores limitam o tempo disponível para o cuidado qualificado e comprometem a efetividade das ações desenvolvidas. Além disso, a ausência de protocolos clínicos bem definidos e a alta rotatividade de profissionais nas equipes dificultam a continuidade do cuidado, essencial no manejo de doenças crônicas como a hipertensão.

Apesar dessas limitações, os estudos também identificam potencialidades que podem ser fortalecidas para melhorar a prática assistencial. O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), como prontuários eletrônicos, ferramentas de monitoramento remoto e aplicativos de saúde, é apontado como facilitador do cuidado, especialmente no acompanhamento de pacientes com baixa adesão. As visitas domiciliares, por sua vez, ampliam a compreensão do enfermeiro sobre o contexto de vida do usuário, permitindo a construção de planos terapêuticos mais realistas e personalizados (BRASIL, 2013; CIRNE et al., 2023).

Em síntese, os estudos analisados evidenciam que a atuação do enfermeiro na consulta de enfermagem, aliada às ações educativas e ao monitoramento contínuo dos indicadores de saúde, constitui uma prática potente. Para que essa atuação alcance seu pleno potencial, é necessário garantir condições estruturais adequadas, formação profissional permanente, protocolos clínicos bem definidos e reconhecimento institucional da importância do trabalho do enfermeiro no enfrentamento das doenças crônicas no território.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O enfermeiro na APS desempenha um papel fundamental e estratégico tanto no monitoramento clínico, como também na promoção da saúde, na educação em saúde e no fortalecimento do vínculo com o usuário, que favorece na adesão do tratamento correto e na prevenção complicações. Em vista disso, o estudo atinge o objetivo proposto ao destacar as estratégias do cuidado desenvolvidas pelo enfermeiro, além de evidenciar a importância da assistência de enfermagem voltada ao paciente hipertenso.

Entretanto, apesar da importância do enfermeiro, ainda existem dificuldades na assistência, como a desvalorização da consulta de enfermagem, falta de estrutura e recursos, além da sobrecarga de atendimentos, o que compromete a qualidade do cuidado. Portanto, é essencial investir na valorização e maior capacitação contínua dos profissionais e em



políticas públicas que assegurem garantam uma melhor estrutura da atenção básica, promovendo um cuidado mais eficaz e humanizado às pessoas com hipertensão arterial.

A construção deste resumo expandido enfrentou algumas dificuldades, devido à limitação de publicações específicas e atualizadas que abordassem a atuação do enfermeiro no cuidado ao paciente hipertenso na APS. Ainda assim, o trabalho reúne práticas relevantes para o meio acadêmico, além de incentivar reflexões sobre a importância da sistematização do cuidado e do papel do enfermeiro na prevenção e no controle da hipertensão.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem; Hipertensão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes%20_cuidado_pessoas%20_doencas_cronicas.pdf. Acesso em: 13 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Cadernos de atenção domiciliar**: volume 1. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_domiciliar_v1.pdf. Acesso em: 20 maio 2025.

CIRNE, M. R. et al. **Tecnologia de informação e comunicação na saúde**: revisão integrativa. *Revista Recien – Revista Científica de Enfermagem*, [S. l.], v. 13, n. 41, p. 890–904, 2023. DOI: 10.24276/rrecien2023.13.41.890-904. Disponível em:

<https://recien.com.br/index.php/Recien/article/view/807>. Acesso em: 20 maio 2025.

DANTAS, H. L. de L. .; COSTA, C. R. B. .; COSTA, L. de M. C. .; LÚCIO, I. M. L. .; COMASSETTO, I. . Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico. *Revista Recien - Revista Científica de Enfermagem*, [S. l.], v. 12, n. 37, p. 334–345, 2022. DOI: 10.24276/rrecien2022.12.37.334-345. Disponível em:

<https://recien.com.br/index.php/Recien/article/view/575>. Acesso em: 19 maio 2025

LABEGALINI, C. M. et al. A sistematização da consulta de enfermagem na atenção primária: desafios para a prática clínica. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 75, supl. 2, p. e20210584, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/reben/a/yC7yCWdkmpD4j6BhYmSpf5M/>. Acesso em: 6 maio 2025.

SOUSA, D. S. de et al. Consulta de enfermagem como estratégia para adesão ao tratamento da hipertensão arterial: um estudo quase experimental. *Revista de Enfermagem UFPE On Line*, Recife, v. 13, n. 2, p. 297–305, 2019. Disponível em:

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/23899>. Acesso em: 6 maio 2025.



CONECTANDO CUIDADOS EM CONTEXTOS DE ESCASSEZ: POTENCIAL DAS INTERVENÇÕES DIGITAIS PARA DETECÇÃO PRECOCE DA PRÉ-ECLÂMPsia/ ECLÂMPsia

¹Luciene Rodrigues Barbosa

¹Universidade de Brasília. Brasília, Distrito Federal, Brasil

Área temática: Enfermagem

Resumo: Objetivo: investigar como intervenções digitais voltadas à detecção precoce e ao manejo da pré-eclâmpsia/eclâmpsia podem subsidiar diretrizes adequadas para reduzir a mortalidade materna em países de baixa e média renda. **Métodos:** revisão de escopo conforme PRISMA-ScR, norteada pela estrutura PCC. Realizaram-se buscas em LILASC, MEDLINE, PUBMED e BVS para estudos publicados em inglês e português entre 2020 e 2024. Dezesesseis artigos preencheram os critérios, todos desenvolvidos no Sul da Ásia ou na África Subsaariana, a síntese ocorreu por análise temática indutiva. **Resultados:** identificaram-se nove intervenções digitais originais; duas destinavam-se à previsão de risco (miniPIERS e fullPIERS) e sete ao monitoramento contínuo, incluindo o dispositivo Microlife CRADLE VSA, o teste Congo Red Dot, o sistema Bliss4Midwives, um smartwatch de pressão arterial e um programa piloto de telemonitoramento. A maioria dos estudos era observacional; dois ensaios clínicos randomizados avaliaram o pacote comunitário CLIP. As tecnologias mostraram elevada aceitabilidade, precisão satisfatória e viabilidade operacional, mas evidência clínica permaneceu escassa: apenas um ensaio relatou redução de natimortos, sem efeito consistente sobre morbimortalidade materna. As principais barreiras envolveram falhas de hardware, rotatividade de pessoal, alfabetização digital limitada e ausência de limiares pressóricos padronizados; facilitadores incluíram treinamento multimídia, suprimento regular de dispositivos e apoio institucional. **Considerações finais:** embora promissoras, as intervenções digitais exigem ensaios controlados de maior escala, integração à teleconsulta, participação ativa das gestantes e avaliações econômicas para consolidar seu papel nas diretrizes de cuidado materno em contextos de recursos limitados.

INTRODUÇÃO

Aproximadamente 16 % das mortes maternas em países de baixa e média renda (PBMR) decorrem de pré-eclâmpsia/eclâmpsia (PE/E). A mortalidade elevada deve-se à identificação tardia dos casos, às dificuldades de acesso a centros especializados e aos comportamentos de busca de cuidado influenciados por baixa escolaridade materna. Para atingir a meta 3.1 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — reduzir a razão de mortalidade materna para menos de 70 por 100 000 nascidos vivos até 2030 — são imprescindíveis inovações que diminuam os óbitos relacionados à PE/E. Entre as estratégias recomendadas para diagnóstico e tratamento precoces destacam-se automonitoramento da pressão arterial, uso oportuno de sulfato de magnésio, determinação de proteinúria e parto em tempo adequado. Diretrizes internacionais, como as da Sociedade Europeia de Hipertensão (2018), American Heart Association (2017), NICE (2019) e Sociedade Americana de Hipertensão (2020), orientam que gestantes de alto risco para PE/E (HR-PE/E) registrem sintomas e valores pressóricos domiciliares, apontando benefícios clínicos



e econômicos. A Organização Mundial da Saúde (2022) reforça o monitoramento doméstico para detectar alterações hemodinâmicas entre consultas. Nesse contexto, intervenções de saúde digitais (DHIs) ganharam destaque ao possibilitar acompanhamento remoto da pressão arterial e dos sintomas de PE/E. Contudo, a evidência permanece fragmentada. Aquino et al. analisaram 16 iniciativas de telemonitoramento economicamente viáveis, mas quase todas situadas em países de alta renda. Lanssens et al. revisaram 14 estudos (1988–2010) focados em telemonitoramento pré-natal, igualmente concentrados em contextos de alta renda e com elevado risco metodológico de viés. Rivera-Romero et al. identificaram apenas 11 estudos de mHealth para transtornos hipertensivos da gestação, todos em países desenvolvidos e, em sua maioria, com amostras reduzidas. Por fim, van den Heuvel et al. mapearam 12 estudos de eHealth voltados ao cuidado perinatal em geral, sem enfoque específico em PE/E. Embora essas revisões reforcem o potencial do telemonitoramento para gestantes de alto risco, elas carecem de evidências robustas provenientes de PBMR, onde o ônus da mortalidade é maior. Persistem lacunas relativas à adequação cultural, viabilidade técnica e eficácia das DHIs nesses cenários.

OBJETIVO

Investigar como intervenções digitais destinadas à detecção precoce e ao manejo da pré-eclâmpsia/eclâmpsia podem subsidiar diretrizes contextualmente adequadas para reduzir a mortalidade materna países de baixa e média renda.

METODOLOGIA

Esta revisão de escopo foi conduzida e relatada conforme a lista PRISMA-ScR, a coleta de dados ocorrem em fevereiro de 2025. A pergunta que guiou a investigação foi: “O que a literatura descreve sobre intervenções de saúde digitais utilizadas para apoiar gestantes de alto risco para PE/E em PBMR?”. Para estruturá-la adotou-se o mnemônico PCC do Instituto Joanna Briggs, em que a população correspondeu a gestantes de alto risco para PE/E, o conceito abrangeu qualquer intervenção de saúde digital — dispositivos vestíveis, aplicativos clínicos, sistemas de gestão eletrônica, ferramentas de telessaúde ou mHealth — e o contexto compreendeu países classificados pelo Banco Mundial, em 2020, como de baixa ou média renda, com renda nacional bruta per capita entre 1.036 e 4.045 dólares. Foram elegíveis estudos primários publicados em inglês e português, entre 2020 e 2024, englobando ensaios clínicos randomizados, quase-experimentais, coortes, caso-controle, pesquisas transversais, qualitativas ou protocolos. Excluíram-se revisões, meta-análises, editoriais, cartas, resumos de congresso, pontos de vista e investigações conduzidas em países de alta renda. A busca bibliográfica ocorreu na LILASC, MEDLINE, PUBMED e BVS. A estratégia busca combinou descritores MeSH/Desh Os Mesh/Desh usados foram “telemedicine” AND “pregnant woman” AND “pre-eclampsia” OR “eclampsia”. Todos os registros foram exportados para o Rayyan, onde se eliminaram duplicatas. Dos 780 registros iniciais restaram 389 após desduplicação; 52 avançaram para leitura integral e, destes, 16 atenderam plenamente aos critérios de inclusão. As exclusões restantes decorreram de idioma, ausência de gestantes em alto risco, inexistência de intervenção digital, tipo de publicação ou realização em país de alta renda. Os achados foram examinados por análise temática indutiva, lida repetidamente para identificação de padrões, os quais foram agrupados em cinco eixos: características metodológicas, panorama das intervenções, finalidade das tecnologias, perfis de usuários e desfechos investigados.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dezesseis artigos foram publicados entre 2020 e 2024 atenderam aos critérios de inclusão, a maioria conduzida no Sul da Ásia ou na África Subsaariana; apenas dois não especificaram o país, referindo-se genericamente a contextos de baixa renda. Do conjunto, nove eram estudos observacionais, sete experimentais—dos quais quatro ensaios clínicos randomizados—e três protocolos. Todos investigaram intervenções de saúde digitais (ISD) direcionadas a mulheres anteparto de alto risco para pré-eclâmpsia/eclâmpsia (HR-PE/E). As ISD identificadas agrupam-se em dois grandes propósitos. O primeiro consiste na previsão de risco de desfechos maternos adversos, representado pelos modelos miniPIERS e fullPIERS integrados ao POTM, avaliados em cinco estudos observacionais e dois ensaios. O segundo corresponde ao monitoramento contínuo de gestantes HR-PE/E, abarcando sete tecnologias distintas: o teste Congo Red Dot para detecção de proteínas mal-formadas na urina pré-eclâmpsica; as intervenções comunitárias CLIP, que mobilizaram agentes de saúde em Índia, Paquistão, Nigéria e Moçambique; e dois dispositivos de medição pressórica, entre eles o Microlife CRADLE VSA, o sistema Bliss4Midwives e um smartwatch com transmissão Bluetooth. Profissionais de saúde—particularmente agentes comunitários, enfermeiras e parteiras—foram os principais usuários, recebendo treinamento específico sobre uso dos dispositivos, interpretação de métricas e encaminhamento adequado. Apenas duas investigações centraram o protagonismo nas gestantes e seus cuidadores, destacando a simplicidade operacional de soluções como o smartwatch F1. Quanto aos desfechos, as maiores mensuraram resultados maternos e neonatais. Observou-se, por exemplo, associação entre alertas vermelhos do CRADLE VSA e maior risco de lesão renal, necessidade de sulfato de magnésio e admissão em unidade de terapia intensiva. Um dos ensaios CLIP registrou redução significativa de natimortos, embora não tenha detectado impacto em morbidade ou mortalidade neonatal. Os estudos que avaliaram usabilidade e aceitabilidade, evidenciaram elevada satisfação, mas indicaram desafios relacionados à navegação em aplicativos e ao esforço manual para insuflar manguitos em mulheres obesas. Estudos que investigaram viabilidade e fidelidade, confirmando precisão dos dispositivos, razoável custo-efetividade—como no caso do Congo Red Dot—e apontando barreiras operacionais, entre elas lacunas de pessoal treinado e mitos culturais. A carência de padronização de limiares pressóricos foi frequente: apenas um estudo citou explicitamente os valores recomendados pela diretriz NICE 2019, o que dificulta o desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão clínica interoperáveis. Entre os dispositivos já validados, o Microlife CRADLE VSA destacou-se pelo volume de testes de campo, porém sua adoção enfrentou barreiras técnicas—bateria curta, manguito manual frágil, telas pouco intuitivas—e operacionais, como alta rotatividade de pessoal. Estratégias relatadas para superar esses entraves incluíram identificação de profissionais “campeões” do dispositivo, pacotes de treinamento multimídia e garantia de suprimento de peças e carregadores. Uma lacuna relevante diz respeito ao protagonismo das usuárias. Maioria dos estudos centraram a operação dos ISD em profissionais comunitários de saúde; apenas um smartwatch foi concebido para automonitoramento pela gestante. Considerando a crescente penetração de telefones celulares nos PBMR, futuras intervenções deveriam explorar interfaces diretas com a paciente, oferecendo instruções personalizadas frente a sinais de alarme. Tais desenlaces demandam atenção a alfabetização digital, gênero, renda e normas culturais. Nenhuma das ISD analisadas empregou um desenho multidisciplinar de cuidado integrado. A literatura em saúde digital recomenda equipes que combinem obstetras, engenheiros, cientistas de dados e usuários finais para maximizar a pertinência clínica e a viabilidade técnica da solução. Além disso, há escassez de experiências que utilizem telemedicina síncrona para consultas



remoto-especializadas—a prática é comum em países de alta renda e poderia reduzir atrasos de encaminhamento em áreas rurais. Quanto à efetividade, alguns estudos relataram desfechos maternos ou neonatais; um ensaio CLIP observou redução significativa de natimortos, mas não detectou impacto sobre morbidade ou mortalidade materna. Os demais concentraram-se em viabilidade, usabilidade e aceitabilidade. Falta, portanto, um corpo de ensaios clínicos que examine resultados clínicos duros e incorpore análises econômicas; apenas um protocolo incluiu avaliação de custo-efetividade do pacote CLIP, essa lacuna metodológica impede, por ora, recomendações normativas amplas, mas oferece diretrizes claras sobre onde investir esforços de pesquisa aplicada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que essas tecnologias se tornem componentes estruturais das diretrizes nacionais de saúde materna, quatro requisitos emergem: padronizar limiares pressóricos e fluxogramas de decisão adaptados ao contexto; incorporar desenho participativo, envolvendo gestantes como usuárias centrais; adotar modelos de teleconsulta que integrem níveis primário e especializado; e acompanhar a implementação de avaliações econômicas que demonstrem sustentabilidade financeira. Cumpridos esses requisitos, as intervenções digitais poderão contribuir de forma decisiva para acelerar o alcance da meta de mortalidade materna do ODS 3, oferecendo às equipes de atenção primária instrumentos ágeis de vigilância e resposta que hoje se mostram escassos nos cenários de maior vulnerabilidade.

Palavras-chave: Intervenções de Saúde Digital; Pré-eclâmpsia; Saúde Materna; Telemonitoramento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AQUINO, M.; VAN DEN HEUVEL, J. F. M.; BEKKER, M. N.; *et al.* Exploring the use of telemonitoring for patients at high risk for hypertensive disorders of pregnancy in the antepartum and postpartum periods: scoping review. **JMIR mHealth and uHealth**, v. 8, n. 4, e15095, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.2196/15095> . Acesso em: 19 mai. 2025.
- ATLURI, N.; BEYUO, T. K.; OPPONG, S. A.; *et al.* Challenges to diagnosing and managing preeclampsia in a low-resource setting: a qualitative study of obstetric provider perspectives from Ghana. **PLOS Global Public Health**, v. 3, n. 5, e0001790, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001790> . Acesso em: 19 mai. 2025.
- BEARDMORE-GRAY, A.; COOLEY, S. M.; HIGGINS, J. P.; *et al.* Planned delivery or expectant management in preeclampsia: an individual participant data meta-analysis. **American Journal of Obstetrics and Gynecology**, v. 227, n. 2, p. 218-230.e8, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.04.034> . Acesso em: 19 mai. 2025.
- BONE, J. N.; PAYNE, B. A.; HECKEN, S.; *et al.* Economic and cost-effectiveness analysis of the Community-Level Interventions for Pre-eclampsia (CLIP) trials in India, Pakistan and Mozambique. **BMJ Global Health**, v. 6, n. 5, e004123, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-004123> . Acesso em: 09 mai. 2025.
- FEROZ, A.; SALEEM, S.; SETO, E. Exploring perspectives, preferences and needs of a telemonitoring program for women at high risk for preeclampsia in a tertiary health facility of Karachi: a qualitative study protocol. **Reproductive Health**, v. 17, n. 1, p. 135, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12978-020-00979-8> . Acesso em: 19 abr. 2025.
- LANSENS, D.; VANDENBERK, T.; THIJS, I. M.; *et al.* Effectiveness of telemonitoring in obstetrics: scoping review. **Journal of Medical Internet Research**, v. 19, n. 9, e327, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.2196/jmir.7266> . Acesso em: 09 mai. 2025.



- LIHME, F.; MØLLER, L. V.; SØNDER, H. A.; *et al.* Reference ranges for third-trimester maternal cardiovascular function parameters measured in normotensive pregnant women using a non-invasive cardiac output monitor: a study based on data from the prospective PEACH cohort study. **BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology**, v. 131, n. 4, p. 463-471, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17718> . Acesso em: 01 abr. 2025.
- MAYRINK, J.; REIS, Z. S. N. Pre-eclampsia in low and middle-income settings: what are the barriers to improving perinatal outcomes and evidence-based recommendations? **International Journal of Gynecology & Obstetrics**, v. 164, n. 1, p. 33-39, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/ijgo.14913> . Acesso em: 19 mai. 2025.
- OSEI, E.; MASHAMBA-THOMPSON, T. P. Mobile health applications for disease screening and treatment support in low- and middle-income countries: a narrative review. **Heliyon**, v. 7, n. 3, e06639, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06639> . Acesso em: 19 mai. 2025.
- RIVERA-ROMERO, O.; OLIVER-TROYANO, F. J.; SÁNCHEZ-MARTÍNEZ, F. J.; *et al.* Mobile health solutions for hypertensive disorders in pregnancy: scoping literature review. **JMIR mHealth and uHealth**, v. 6, n. 5, e11336, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.2196/mhealth.11336> . Acesso em: 10 abr. 2025.
- SOUNDARARAJAN, R.; KHAN, T.; VON DADELSZEN, P. Pre-eclampsia challenges and care in low and middle-income countries: understanding diagnosis, management, and health impacts in remote and developing regions. **Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology**, v. 96, p. 102525, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2024.102525> . Acesso em: 19 mai. 2025.
- TRICCO, A. C.; LILLIE, E.; ZARIN, W.; *et al.* Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. **Annals of Internal Medicine**, v. 169, n. 7, p. 467-473, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.7326/M18-0850> . Acesso em: 10 mai. 2025.
- UGWU, C. N.; UGWU, O. P.-C.; ALUM, E. U.; *et al.* Sustainable development goals (SDGs) and resilient healthcare systems: addressing medicine and public health challenges in conflict zones. **Medicine (Baltimore)**, v. 104, n. 7, e41535, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000041535> . Acesso em: 19 mai. 2025.
- VAN DEN HEUVEL, J. F. M.; AYDIN, A.; BEKKER, M. N.; *et al.* Safe@Home – feasibility study of a telemonitoring platform combining blood pressure and preeclampsia symptoms in pregnancy care. **European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology**, v. 240, p. 226-231, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2019.07.012> . Acesso em: 10 mai. 2025.
- VAN DEN HEUVEL, J. F. M.; DE LANGE, A.; BUDÉ, L.; *et al.* Home-based telemonitoring versus hospital admission in high-risk pregnancies: a qualitative study on women's experiences. **BMC Pregnancy and Childbirth**, v. 20, n. 1, p. 77, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12884-020-2779-4> . Acesso em: 19 mai. 2025.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience**. Geneva: WHO, 2016. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/250800> . Acesso em: 10 mai. 2025.



SEDE DE SUCESSO: REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE O IMPACTO DO CONSUMO DAS BEBIDAS ENERGÉTICAS ENTRE ACADÊMICOS DE MEDICINA

¹Fernanda Amorim Almeida

²Marco Antonio Araujo Silvano

^{1, 2} Universidade do Estado da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo: O consumo excessivo de bebidas energéticas é cada vez mais comum entre estudantes de medicina, especialmente em ambientes acadêmicos marcados por alta competitividade e exigência de desempenho. No entanto, os riscos associados a esse hábito — como problemas cardiovasculares, distúrbios do sono, dependência e ansiedade — levantam preocupações quanto à saúde física e mental desses acadêmicos. Diante disso, esta investigação teve como objetivo analisar os impactos do uso dessas bebidas no desempenho acadêmico e nas alterações fisiológicas e comportamentais dos estudantes. A metodologia consistiu em uma revisão integrativa da literatura, com buscas nas bases PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), formulando-se a pergunta de pesquisa a partir de uma adaptação da estratégia PICO: quais as repercussões do consumo de bebidas energéticas na saúde física, mental e no desempenho acadêmico de estudantes de medicina? Os resultados revelaram um padrão crescente de consumo e uma variedade de efeitos adversos, além da desinformação quanto aos limites seguros de ingestão e às consequências desse uso. Diante disso, destaca-se a importância de ações educativas e estratégias institucionais de suporte, visando promover o uso consciente e saudável dessas substâncias no ambiente universitário.

INTRODUÇÃO

O consumo de bebidas energéticas (BEs) entre estudantes universitários, especialmente em cursos intensivos, como Medicina, tem se tornado cada vez mais comum. Isso se deve, em grande parte, à crença de que essas substâncias têm a capacidade de aumentar o foco, a energia e a resistência ao cansaço (Gutiérrez et al., 2019). O ambiente universitário estressante e exigente, cria um ambiente propício para o consumo frequente de bebidas energéticas. Os estudantes enfrentam longos dias letivos, prazos apertados e uma busca incansável pela excelência acadêmica, o que aumenta a tentação da procura por soluções rápidas para manter o foco e combater a fadiga (Mahmood, 2024; Mussabekova, Tuginova, 2024; Pulla, Syed, Bolisetti, 2024). Neste caso, consumir bebidas energéticas muitas vezes parece uma opção prática e acessível.

As bebidas energéticas são comercializadas muitas vezes como soluções rápidas para melhorar o desempenho físico e mental, e têm ganhado popularidade especialmente entre os jovens universitários que enfrentam demandas acadêmicas rigorosas e um estilo de vida agitado. Essa crescente prevalência do consumo de bebidas energéticas entre estudantes universitários está se tornando um tema relevante nos campos acadêmico e de saúde pública (Del Valle-González, 2024; Gutiérrez, 2019; Morgan et al., 2017). Estudos indicam que, apesar de sua popularidade, há pouca conscientização a respeito dos potenciais riscos associados ao consumo exagerado desse tipo de bebida (Pulla, Syed, Bolisetti, 2024). A relação entre a ingestão dessas bebidas e uma série de problemas de saúde, incluindo



distúrbios do sono, arritmias cardíacas e aumento da ansiedade, tem gerado um crescente debate entre especialistas em saúde e educadores (Edrees, 2022; Higgins et al, 2018; Oliveira, Dutra, Fófano, 2023).

Embora muitos estudantes possam recorrer a essas bebidas energéticas na esperança de aumentar sua concentração e produtividade, há uma lacuna significativa na literatura sobre os efeitos reais dessas substâncias no desempenho cognitivo a longo prazo. Os registros disponíveis ajudam a fornecer uma visão abrangente dos impactos do consumo de bebidas energéticas na capacidade de aprendizado, memória, tomada de decisões e outras funções cognitivas, permitindo uma avaliação mais qualificada dos benefícios e riscos associados a essa prática. Além disso, é necessário entender os fatores contextuais e sociais que podem influenciar o uso de bebidas energéticas entre esses estudantes universitários. Questões como pressão acadêmica, estilo de vida sedentário, influência de colegas e publicidade agressiva de produtos podem desempenhar um papel significativo na adoção desse hábito.

A abordagem desta questão surge da necessidade de compreender as causas destes comportamentos, de avaliar os potenciais impactos na saúde dos estudantes e para desenvolver estratégias para promover escolhas mais informadas e conscientes sobre essa utilização. Compreender os fatores envolvidos no consumo de bebidas energéticas é fundamental para o esclarecimento dos impactos do seu uso e para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção e intervenção que visem promover estilos de vida saudáveis e reduzir o consumo dessas bebidas entre os estudantes de medicina em sua “sede de sucesso”.

OBJETIVO

Analisar o impacto do uso de bebidas energéticas sobre o desempenho acadêmico dos estudantes de medicina e as principais alterações fisiológicas e comportamentais provocadas pelo seu consumo, avaliando os possíveis efeitos prejudiciais à saúde decorrentes dessa utilização.

METODOLOGIA

Esta revisão integrativa da literatura foi desenvolvida buscando aumentar a compreensão dos hábitos de consumo bebidas energéticas entre estudantes universitários do curso de medicina, bem como os possíveis impactos na saúde e no desempenho acadêmico dos mesmo. A revisão integrativa foi escolhida por permitir não apenas a descrição, mas também a análise crítica das evidências disponíveis sobre os efeitos do consumo de bebidas energéticas em público universitário, promovendo a construção de um panorama abrangente do estado da arte sobre o tema.

A construção da pergunta de pesquisa seguirá a estratégia PICO adaptada para revisões qualitativas, contemplando: P (População): estudantes universitários do curso de medicina; I (Intervenção/Interesse): uso de bebidas energéticas em sua rotina; C (Comparação): - ; O (Desfecho): percepção dos impactos do uso de bebidas energéticas sobre saúde física e mental, e desempenho acadêmico de estudantes.

Portanto, a questão norteadora estabelecida foi: Quais as repercussões sobre a saúde física e mental e desempenho acadêmico de estudantes de graduação do curso de medicina pelo consumo de bebidas energéticas?

Para tanto, foi realizada uma busca sistemática nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os seguintes descritores: (Energy Drink AND Students) OR (Energy Drink AND Students, Medical). Como critérios de inclusão, forma



adotados: Artigos originais, revisões teóricas ou ensaios acadêmicos publicados entre 2005 e 2025; Estudos disponíveis na íntegra e gratuitamente, nos idiomas português, inglês ou espanhol; Publicações e estudos que abordem o uso da bebidas energéticas. Já como critérios de exclusão: Resumos simples, trabalhos de eventos, editoriais e cartas ao editor; Estudos repetidos em mais de uma base; Trabalhos sem abordagem direta aos efeitos do uso de bebidas energéticas.

Com os estudos selecionados, foi feita uma extração sistemática de dados, incluindo informações sobre a população estudada, metodologia utilizada, resultados principais e conclusões. A seleção dos estudos seguiu os critérios do fluxograma PRISMA adaptado (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Após a busca, os artigos foram inicialmente avaliados por título e resumo. Os textos elegíveis foram submetidos à leitura integral para confirmação dos critérios de inclusão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca no PubMed resultou em 268 artigos. Após leitura dos títulos e resumos, 33 artigos foram selecionados para análise aprofundada. Na base BVS, a busca inicial resultou em 348 artigos, dos quais 49 foram considerados relevantes para análise minuciosa. A compilação inicial reuniu 82 artigos, os quais foram lidos na íntegra. Por fim, baseado na qualidade metodológica e na relevância para a temática, foram selecionados 27 artigos para compor o referencial teórico deste trabalho.

Dentre os achados, foi registrado que, estudantes do sexo masculino, jovens com idade entre 18 e 24 anos e estudantes dos primeiros semestres representam o grupo com maior frequência de consumo (Alshumrani et al., 2023; Mussabekova, Tukinova, 2024). As principais motivações relatadas para consumo de BEs foram o desejo de melhorar o desempenho acadêmico, combater a sonolência e lidar com o estresse (Choi, 2020; Oliveira, Dutra, Fófano, 2023). No entanto, o uso frequente e excessivo dessas bebidas tem sido associadas a efeitos adversos cardiovasculares, neurocomportamentais e psicológicos (Mahmood et al., 2024; Higgins et al., 2018), além de serem, muitas vezes, usado em associação com álcool, o que tende a agravar seus riscos (Ghozayel et al., 2020). Esse cenário revela um paradoxo entre a busca por melhores desempenhos acadêmicos e uma série de prejuízos à saúde, exigindo, assim, uma análise crítica sobre o real impacto do consumo de BEs no contexto acadêmico de Medicina.

A maioria dos estudos analisados apontam uma alta prevalência de consumo de BEs entre os estudantes de Medicina, variando de 39% a 70% dos participantes (Mendoza et al., 2021; Mahmood et al., 2024). De acordo com Edress et al. (2022), 45% dos estudantes já haviam consumido energéticos ao menos uma vez, enquanto Del Valle-González et al. (2024) relata que mais de 50% dos estudantes consumiam BEs entre 5 e 7 vezes por mês. A motivação predominante para o consumo dessas bebidas foi o desejo de melhorar o desempenho acadêmico (Choi et al., 2024; Oliveira, Dutra, Fófano, 2023), especialmente durante os exames, em que o consumo ultrapassa os limites seguros de cafeína, >300 mg/dia (Pulla, Syed, Bolisetti, 2024).

O consumo das BEs apresentam uma série de efeitos adversos, sendo os principais relatados: a insônia (até 74,7% dos consumidores), dores de cabeça, taquicardia, palpitações, sonolência diurna, distúrbios do sono e comportamento agressivo (Mahmood et al., 2024; Del Valle-González et al., 2024; Gutiérrez et al., 2019). De forma semelhante, Kelly e Prichard (2016) apontaram que consumidores regulares de energéticos apresentaram maiores índices de distúrbios de sono, uso de substâncias e alterações comportamentais quando comparados a consumidores de café. Contribuindo com esses achados, Oliveira; Dutra;



Fófano (2023) observaram que muitos estudantes que consomem psicoestimulantes relataram dormir menos de seis horas por dia, o que compromete diretamente o rendimento e a saúde mental. Também foram observadas associações com ansiedade, irritabilidade, tremores e, em casos mais graves, necessidade de atendimento médico (Ghozayel et al., 2020; Higgins et al., 2018). Dessa forma, percebe-se que, assim como observado por Choi (2020), a maioria dos estudantes subestima os efeitos colaterais da cafeína.

Além dos impactos fisiológicos e comportamentais, o consumo de BEs apresenta repercussões acadêmicas que merecem atenção. Morgan et al. (2017) identificaram que estudantes que iniciaram o consumo de psicoestimulantes, como BEs, durante a faculdade, apresentaram o dobro de probabilidade de reprovação no curso de Medicina. Esses dados sugerem que, embora muitos recorram a essas substâncias na tentativa de melhorar o desempenho, o uso excessivo pode estar, paradoxalmente, associado a pior rendimento acadêmico. Estudos como os de Oglesby et al. (2018) reforçam essa desconexão entre intenção e resultado, pois, embora os consumidores relatem usar bebidas energéticas para aumentar o tempo de estudo, os dados indicam menor qualidade e quantidade de sono, sem aumento significativo nas horas de estudo. A pesquisa de Thiab et al. (2023) revelou que, embora 70% dos estudantes reconheçam os possíveis efeitos adversos das BEs, grande parte deles continuam consumindo, motivados por hábitos e pelo desejo de permanecerem alertas por mais tempo. Assim, fica evidente que o uso de BEs entre estudantes de Medicina não está apenas relacionado à manutenção da vigília, mas também a uma cultura acadêmica que valoriza o desempenho em detrimento do bem-estar. Tal panorama exige atenção institucional e estratégias educativas voltadas para a conscientização sobre os reais efeitos dessas substâncias, promovendo uma abordagem mais saudável da vida acadêmica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

O estudo evidenciou que o consumo de bebidas energéticas entre estudantes de Medicina é um comportamento comum, motivado por pressões acadêmicas e expectativas de alto desempenho. No entanto, os efeitos adversos amplamente documentados - como distúrbios do sono, sintomas cardiovasculares e prejuízos cognitivos - levantam preocupações quanto à segurança dessa prática. A desinformação sobre os limites seguros de ingestão e os efeitos fisiológicos reforça a necessidade de campanhas educativas dentro das instituições de ensino. Sugere-se, ainda, a implementação de estratégias institucionais de suporte ao estudante, com promoção de hábitos saudáveis de sono, organização do tempo, autocuidado e oferecimento de atendimento com profissionais adequados.

Palavras-chave: Bebidas Energéticas; Cafeína; Educação Médica; Estudantes de Medicina

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALSHUMRANI, R. *et al.* Consumption of energy drinks and their effects on sleep quality among medical students. **Journal of Family Medicine and Primary Care**, v. 12, n. 8, p. 1609-1614, ago. 2023. DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_1_23.

CHOI, J. Motivations influencing caffeine consumption behaviors among college students in Korea: associations with sleep quality. **Nutrients**, v. 12, n. 4, p. 953, mar. 2020. DOI: <https://doi.org/10.3390/nu12040953>.

CHOI, S. W. *et al.* Caffeine consumption of medical students in Korea: amount and symptoms based on a 2023 survey. **Korean Journal of Medical Education**, v. 36, n. 3,



p. 267-274, 29 ago. 2024. DOI: <https://doi.org/10.3946/kjme.2024.301>.

DEL VALLE-GONZÁLEZ, M. *et al.* Prevalencia del consumo de bebidas energizantes y efectos adversos en estudiantes de medicina. **Repertorio de Medicina y Cirugía**, v. 33, n. 1, p. 54-60, 2024. DOI: <https://doi.org/10.31260/RepertMedCir.01217372.1445>.

EDREES, A. *et al.* Energy drink consumption among medical students of Taif University. **Journal of Family Medicine and Primary Care**, v. 11, n. 7, p. 3950-3955, jul. 2022. DOI: https://doi.org/10.4103/jfmpe.jfmpe_1952_21.

GHOZAYEL, M. *et al.* Energy drinks consumption and perceptions among university students in Beirut, Lebanon: a mixed methods approach. **PLOS ONE**, v. 15, n. 4, e0232199, 30 abr. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232199>.

GUTIÉRREZ, S. K. *et al.* Consumo de bebidas energizantes en estudiantes universitarios. **Revista Bio Scientia**, v. 2, n. 4, p. 81-90, 2019.

HIGGINS, J. P. *et al.* Consumption of energy beverage is associated with attenuation of arterial endothelial flow-mediated dilatation. **World Journal of Cardiology**, v. 9, n. 2, p. 162–166, 2017. DOI: [10.4330/wjc.v9.i2.162](https://doi.org/10.4330/wjc.v9.i2.162).

HIGGINS, J. P. *et al.* Energy Drinks: A Contemporary Issues Paper. **Current Sports Medicine Reports**, v. 17, n. 2, p. 65–72, 2018. DOI: [10.1249/JSR.0000000000000454](https://doi.org/10.1249/JSR.0000000000000454).

KELLY, C. K.; PRICHARD, J. R.. Demographics, Health, and Risk Behaviors of Young Adults Who Drink Energy Drinks and Coffee Beverages. **Journal of Caffeine Research**, v. 6, n. 2, p. 73-81, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1089/jcr.2015.0027>.

MAHMOOD, A. *et al.* Effects of energy drink consumption on specific cardiovascular and psycho-behavioral parameters among medical students at the University of Zakho. **Cureus**, [S.l.], v. 16, n. 8, p. e67790, 26 ago. 2024. DOI: <https://doi.org/10.7759/cureus.67790>.

MENDOZA, L. M. G. *et al.* Uso de bebidas energizantes y síntomas de insomnio en estudiantes de medicina de una universidad peruana. **Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría**, v. 59, n. 4, p. 289-301, dez. 2021. DOI: [10.4067/S0717-92272021000400289](https://doi.org/10.4067/S0717-92272021000400289).

MORGAN, H. L. *et al.* Consumo de estimulantes cerebrais por estudantes de medicina de uma universidade do extremo sul do Brasil: prevalência, motivação e efeitos percebidos. **Revista Brasileira de Educação Médica**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 1, p. 102–109, jan./mar. 2017. DOI: [10.1590/1981-52712015v41n1RB20160035](https://doi.org/10.1590/1981-52712015v41n1RB20160035).

MUSSABEKOVA, Z.; TUKINOVA, A.. Consumption of energy drinks among medical university students in Kazakhstan. **International Journal of Adolescent Medicine and Health**, v. 36, n. 5, p. 449–455, 2024. DOI: [10.1515/ijamh-2024-0090](https://doi.org/10.1515/ijamh-2024-0090).

OGLESBY, L. W.; AMRANI, K. A.; WYNVEEN, C. J.; GALLUCCI, Andrew R. Do energy drink consumers study more? **Journal of Community Health**, v. 43, n. 1, p. 48- 54, fev. 2018. DOI: [10.1007/s10900-017-0386-8](https://doi.org/10.1007/s10900-017-0386-8).

OLIVEIRA, F. S.; DUTRA, H. F.; FÓFANO, G. A. Consumo de psicoestimulantes por



estudantes de medicina em um centro universitário privado. **Revista Científica da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás "Cândido Santiago"**, v. 9, n. 9f7, p. 1- 15, 2023.

PULLA, A.; SYED, A.; BOLISETTI, V.. Patterns of caffeine consumption among medical undergraduates in Secunderabad, Telangana, India. **Journal of Education and Health Promotion**, v. 13, p. 280, jul. 2024. DOI: 10.4103/jehp.jehp_50_24.

THIAB, Samar *et al.* Knowledge, attitude, and perception of energy drinks consumption among university students in Jordan. **Journal of Nutritional Science**, v. 12, e109, 2023. DOI: 10.1017/jns.2023.90.



PAPANICOLAU: UMA ANÁLISE DO ÍNDICE DE REALIZAÇÃO E OS DESAFIOS DA PREVENÇÃO AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO

¹Jennypher Medeiros Farias de Sousa

²Anna Luiza Ferreira Lopes

³José Guilherme Salvino Alves

⁴Maria Carolina Farias da Costa Aguiar

⁵Julia Cirne Pedrosa Peixoto

⁶Maria Fernanda Bento Brasil de Barros França

⁷Mariana Medeiros de Figueiredo

⁸Anielle Chaves de Araújo Brandão

¹Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, Cabedelo, Paraíba, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo: Este estudo analisou a realização do exame de Papanicolau na região Nordeste do Brasil entre 2020 e 2024, com base em dados do TABNET/DATASUS. Adotando uma abordagem descritiva e quantitativa, foram avaliados os exames realizados nos nove estados da região. Em 2020, observou-se uma queda acentuada devido à pandemia da COVID-19, que afetou diretamente o acesso aos serviços de saúde. Apesar de uma recuperação progressiva nos anos seguintes, os níveis anteriores ainda não foram alcançados. A análise evidencia desigualdades regionais: estados com maior cobertura da atenção básica apresentam melhores indicadores, enquanto outros enfrentam dificuldades estruturais e baixa adesão ao exame. Os dados mostram que a prevenção do câncer do colo do útero exige mais do que a oferta do exame — requer ações educativas, acolhimento humanizado e estratégias adaptadas à realidade local. A conclusão aponta para a importância de políticas públicas integradas que promovam o acesso equitativo e contínuo ao cuidado preventivo.

INTRODUÇÃO

O câncer do colo do útero ainda representa uma das principais causas de morte por câncer entre mulheres no Brasil, especialmente nas regiões com menor acesso aos serviços de saúde, como o Nordeste. Embora seja uma doença, em grande parte, evitável, muitas mulheres ainda enfrentam dificuldades para realizar o exame de Papanicolau, seja por barreiras culturais, desconhecimento, medo ou pela precariedade dos serviços disponíveis (INCA, 2023). O exame, recomendado para mulheres entre 25 e 64 anos que já iniciaram a vida sexual, é oferecido gratuitamente pelo SUS e, quando realizado de forma regular, permite detectar precocemente alterações que podem evoluir para o câncer (BRASIL, 2016).

Entre 2020 e 2024, os dados da plataforma TABNET/DATASUS mostram uma queda expressiva na realização dos exames na região Nordeste, especialmente em 2020, durante o auge da pandemia da COVID-19. As medidas de isolamento social, a suspensão de atendimentos eletivos e a sobrecarga dos serviços de saúde impactaram diretamente o rastreamento. Estados como Maranhão, Alagoas e Bahia tiveram reduções significativas, chegando a registrar metade dos exames realizados no ano anterior. Apesar da retomada gradual nos anos seguintes, os números ainda não voltaram ao patamar ideal (DATASUS, 2024).

Esse cenário revela que os efeitos da pandemia agravaram desafios que já existiam. A falta de busca ativa por parte dos serviços, a baixa estrutura de muitas unidades de saúde e a escassez de campanhas educativas tornam a adesão ao exame ainda mais difícil. Longas



filas, horários incompatíveis com a rotina das mulheres e espaços pouco acolhedores são obstáculos que persistem. Assim, mais do que analisar os dados, é essencial refletir sobre como fortalecer as ações de prevenção e cuidado no SUS, especialmente nas regiões mais vulneráveis.

OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo analisar os índices de realização do exame de Papanicolau na região Nordeste do Brasil entre os anos de 2020 e 2024, utilizando dados da plataforma TABNET/DATASUS. Além de indicar possíveis caminhos para fortalecer as estratégias de prevenção e cuidado dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), promovendo maior equidade no acesso aos serviços de saúde e na detecção precoce da doença.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com abordagem quantitativa, baseado em dados secundários extraídos da plataforma TABNET, do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), vinculada ao Ministério da Saúde. O levantamento contemplou os anos de 2020 a 2024, com foco nos exames citopatológicos do colo do útero realizados nos nove estados da região Nordeste do Brasil. Foram selecionados os dados da produção ambulatorial do SUS, utilizando o procedimento específico referente ao exame de Papanicolau, disponível na base do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA/SUS).

A coleta foi realizada de forma manual, diretamente no site do TABNET, selecionando os filtros de procedimento, ano de competência, região e unidade da federação. Os dados foram organizados em planilhas eletrônicas extraídas do site TABNET para facilitar a análise e a visualização dos resultados. Os números foram analisados de forma descritiva, com apresentação das quantidades absolutas de exames realizados por ano e por estado, permitindo identificar variações ao longo do período e comparar os dados entre os diferentes territórios nordestinos.

Como o estudo se baseia exclusivamente em dados públicos, de acesso livre e sem identificação individual, não foi necessária a aprovação por comitê de ética em pesquisa. A análise teve como objetivo avaliar

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise do índice de realização do exame de Papanicolau, com base no site TABNET, evidencia que uma parcela significativa das mulheres não realiza o exame com regularidade adequada, refletindo um cenário preocupante no que se refere à prevenção do câncer do colo no útero.

Durante o estudo, foram identificados diversos fatores que contribuem para essa baixa adesão. Entre os principais desafios estão a falta de informação sobre a importância do exame e com isso muitas mulheres buscam a unidade de saúde quando já possuem sintomas, o que compromete a efetividade do rastreamento precoce.

Dessa forma, é importante analisarmos os dados entre os anos 2020 e 2024 para identificar o comportamento e alterações nas notificações do exame na região Nordeste, segundo o Tabnet-DataSUS.

Tabela 1: Notificação de realização de citológicos em Alagoas entre 2020-2024

An	202	202	202	202	202



Nº de notificações	94.797	160.011	175.407	202.961	176.570

Fonte: Dados da pesquisa, Perfil epidemiológico, Tabnet - DataSUS

Tabela 2: Notificação de realização de citológicos na Bahia entre 2020-2024

Ano	2020	2021	2022	2023	2024
Nº de notificações	296.620	518.226	569.190	664.716	591.278

Fonte: Dados da pesquisa, Perfil epidemiológico, Tabnet - DataSUS

Tabela 3: Notificação de realização de citológicos no Ceará entre 2020-2024

Ano	2020	2021	2022	2023	2024
Nº de notificações	196.490	258.284	317.815	393.637	362.139

Fonte: Dados da pesquisa, Perfil epidemiológico, Tabnet - DataSUS

Tabela 4: Notificação de realização de citológicos no Maranhão entre 2020-2024

Ano	2020	2021	2022	2023	2024
Nº de notificações	133.363	186.625	228.913	268.186	235.115

Fonte: Dados da pesquisa, Perfil epidemiológico, Tabnet - DataSUS

Tabela 5: Notificação de realização de citológicos na Paraíba entre 2020-2024

Ano	2020	2021	2022	2023	2024
Nº de notificações	101.944	163.817	177.551	209.415	185.140

Fonte: Dados da pesquisa, Perfil epidemiológico, Tabnet - DataSUS

Tabela 6: Notificação de realização de citológicos em Pernambuco entre 2020-2024

Ano	2020	2021	2022	2023	2024
Nº de notificações	236.625	362.569	386.656	457.278	397.792

Fonte: Dados da pesquisa, Perfil epidemiológico, Tabnet - DataSUS



Tabela 7: Notificação de realização de citológicos no Piauí entre 2020-2024

Ano	2020	2021	2022	2023	2024
Nº de notificações	33.184	63.605	72.816	115.521	107.913

Fonte: Dados da pesquisa, Perfil epidemiológico, Tabnet - DataSUS

Tabela 8: Notificação de realização de citológicos no Rio Grande do Norte entre 2020- 2024

Ano	2020	2021	2022	2023	2024
Nº de notificações	69.738	108.913	109.859	125.646	125.540

Fonte: Dados da pesquisa, Perfil epidemiológico, Tabnet - DataSUS

Tabela 9: Notificação de realização de citológicos em Sergipe entre 2020-2024

Ano	2020	2021	2022	2023	2024
Nº de notificações	47.393	89.593	86.463	106.141	94.733

Fonte: Dados da pesquisa, Perfil epidemiológico, Tabnet - DataSUS

Entre 2020 e 2024, a região Nordeste do Brasil vivenciou importantes oscilações na realização do exame de Papanicolau. O ano de 2020 marcou uma forte queda nos atendimentos, causada pela pandemia da COVID-19, que afetou profundamente a rotina dos serviços de saúde. Nos anos seguintes, especialmente entre 2021 e 2023, houve uma recuperação gradual dos números. No entanto, em 2024, novamente se observou uma redução significativa nas notificações do exame em quase todos os estados da região.

Esse recuo pode estar relacionado a diversos fatores. Entre eles, destaca-se o descredenciamento de unidades de saúde — como os polos do Programa Academia da Saúde —, mudanças nas prioridades de vigilância epidemiológica, como a inclusão de novas doenças de notificação obrigatória, e o aumento expressivo dos casos de dengue, que exigiram remanejamento de equipes e recursos. Além disso, possíveis falhas na notificação por parte das unidades de saúde também podem ter influenciado os dados.

Diante desse cenário, fica evidente a importância de fortalecer as ações de prevenção e cuidado. Mais do que apenas garantir o acesso ao exame, é fundamental investir em educação em saúde, acolhimento humanizado e incentivo ao autocuidado. Com estratégias bem planejadas e voltadas para a realidade local, é possível aumentar a adesão das mulheres ao exame de Papanicolau e, assim, contribuir para a redução dos casos e mortes por câncer do colo do útero no Nordeste.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

Ao analisarmos os dados dos exames de Papanicolau realizados na região Nordeste entre



2020 e 2024, percebemos uma realidade marcada por avanços tímidos e muitos desafios. A queda nos números durante a pandemia escancarou fragilidades que já existiam: dificuldade de acesso aos serviços de saúde, desinformação e uma rede básica que ainda precisa de mais estrutura e acolhimento. Apesar de ser um exame simples, gratuito e capaz de salvar vidas, ele ainda não chega a todas as mulheres da forma como deveria.

Diante disso, reforçamos a importância de investir em estratégias que aproximem os serviços das pessoas. Não basta oferecer o exame, é preciso buscar essas mulheres, escutá-las, entender seus medos, suas rotinas e garantir que se sintam seguras e respeitadas. A prevenção do câncer do colo do útero depende de um cuidado constante, de políticas públicas que funcionem na prática e da participação ativa das comunidades.

Esperamos que este trabalho contribua para o debate e inspire ações mais efetivas. Que os dados aqui apresentados não fiquem apenas nas planilhas, mas sirvam de alerta e incentivo para que cada vez mais mulheres tenham acesso a um direito tão básico: cuidar da própria saúde com dignidade. Que gestores, profissionais e cidadãos enxerguem o rastreamento como parte essencial de uma saúde pública mais justa e humana.

Palavras-chave: Câncer do colo do útero; Papanicolau; Saúde pública.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).** *Câncer do colo do útero*. Rio de Janeiro: INCA, 2023. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/tipos-de-cancer/cancer-do-colo-do-uterio>. Acesso em: 11 maio 2025.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva.** *Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero*. 2. ed. rev. atual. – Rio de Janeiro: INCA, 2016. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_deteccao_precoce_cancer_colo_uterio.pdf. Acesso em: 11 maio 2025.

BRASIL. **Ministério da Saúde. Departamento de Informática do SUS (DATASUS).** *TABNET – Produção ambulatorial (SIA/SUS) – Exames citopatológicos do colo do útero*. Brasília: DATASUS, 2024. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sia/cnv/qauf.def>. Acesso em: 11 maio 2025.

Brasil. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 6.452, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024. Descredencia polos do Programa Academia da Saúde. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2024/prt6452_31_12_2024.html. Acesso em: 13 maio 2025.

Estratégia MED. Atualizações médicas de 2024: confira as principais mudanças deste ano. Disponível em: <https://med.estrategia.com/porta/atualidades/atualizacoes-medicas-de-2024-confira-as-principais-mudancas-deste-ano>. Acesso em: 13 maio 2025.

São Luís (MA). Secretaria Municipal de Saúde. PORTARIA Nº 2872/2024-GABSEMUS. Nota Técnica nº 004/2024/SVES – Notificações Negativas. Diário Oficial de São Luís, MA, 2024. Disponível em: <https://diariooficial.saoluis.ma.gov.br/documento/view/19370/portaria-n-28722024-gabsemus-nota-tecnica-n-0042024svs>. Acesso em: 13 maio 2025.



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS MORTES POR ACIDENTES DE TRÂNSITO NO BRASIL ENTRE 2014 E 2024

¹Roseane Christhina da Nova Sá Serafim

²Laryssa Marcela Gomes Amaral

³Lara Guimarães Henriques

⁴Manuely Toscano Avelino dos Santos

⁵Marcella Toscano Avelino dos Santos

⁶Rafaela de Queiroz Ferreira Rodrigues

⁷Mônica de Almeida Lima Alves

^{1,2,3,4,5,6,7} Afya Paraíba – Faculdade de Ciências Médicas. Cabedelo, Paraíba, Brasil.

Área temática: Epidemiologia

Resumo: Trata-se de um estudo de natureza descritiva com objetivo de analisar o perfil epidemiológico das vítimas fatais de acidentes de trânsito no Brasil entre 2014 e 2024, com base em dados secundários e de domínio público disponíveis no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), com ênfase nas diferenças entre as macrorregiões brasileiras, cor/raça, faixa etária, sexo, tipo de acidente e tipo de vítima, considerando períodos pré-pandemia (2014–2019), pandêmico (2020–2021) e pós-pandemia (2022–2024). As taxas de mortalidade foram calculadas por 100 mil habitantes, permitindo comparações regionais e temporais. A análise revelou redução geral nas taxas durante o pico da pandemia, seguida por um aumento gradual no período pós-pandêmico. Verificou-se predominância de vítimas do sexo masculino, jovens adultos, e pessoas negras, com destaque para motociclistas. Observou-se redução das taxas de mortalidade no Nordeste e aumento nas regiões Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, além de mudanças comportamentais durante a pandemia. As regiões Norte e Nordeste apresentaram maiores taxas relativas, revelando desigualdades estruturais no acesso a políticas de segurança viária. Os resultados ressaltam a necessidade de estratégias educativas e políticas públicas para a promoção do trânsito seguro. Portanto, conclui-se que os dados evidenciam padrões persistentes de vulnerabilidade social e comportamental no trânsito brasileiro, com agravamento das disparidades regionais no contexto pandêmico.

INTRODUÇÃO

Os acidentes de trânsito representam uma das principais causas de mortes evitáveis no Brasil, configurando-se como um grave problema de saúde pública com reflexos na economia nacional (Brasil, 2024). Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o país figura entre os que apresentam as mais altas taxas de mortalidade por transporte terrestre na América Latina (Organização Mundial da Saúde, 2023). Apesar da implantação de legislações e programas como o Código de Trânsito Brasileiro e o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), os índices de mortalidade ainda permanecem elevados, sobretudo entre homens jovens e nas regiões Norte e Nordeste, o que reflete desigualdades históricas de infraestrutura urbana e social (Oliveira; Nascimento, 2022; Silva et al., 2023).

A pandemia de Covid-19 alterou padrões de mobilidade urbana e comportamento dos condutores, influenciando o perfil dos acidentes e das vítimas, especialmente durante os períodos de restrição de circulação (Costa et al., 2022). Houve uma redução temporária das taxas de mortalidade, associada às medidas de restrição de circulação, mas o período



pós-pandêmico demonstrou crescimento acentuado nos números, evidenciando a falta de políticas sustentáveis para o enfrentamento do problema (Lima et al., 2023). Sendo assim, compreender o perfil epidemiológico das vítimas de acidentes de trânsito, com enfoque temporal e regional, torna-se essencial para nortear políticas públicas e ações intersetoriais de prevenção que promovam a segurança viária e a redução da mortalidade, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2024).

OBJETIVO

Descrever o perfil epidemiológico das vítimas fatais de acidentes de trânsito no Brasil entre 2014 e 2024, segundo sexo, faixa etária, raça/cor, tipo de acidente, tipo de vítima e região geográfica, comparando os períodos pré, durante e pós-pandemia da Covid-19.

METODOLOGIA

Trata-se de estudo epidemiológico descritivo, de abordagem quantitativa, realizado com dados secundários do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, referentes ao período de 2014 a 2024. Os dados foram acessados por meio do TABNET/DATASUS em maio de 2025. Foram incluídos óbitos por acidentes de transporte terrestre (CID-10: V01–V89), analisando-se as variáveis sexo, faixa etária em grupos decenais, raça/cor (branca, parda, preta, amarela e indígena), escolaridade, tipo de vítima (motociclita, pedestre, ocupante de automóvel, ciclita e outros), tipo de acidente e macrorregião brasileira (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). As taxas de mortalidade foram calculadas por 100 mil habitantes, utilizando estimativas populacionais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A análise estatística foi descritiva, com apresentação dos resultados em gráficos e discussão fundamentada na literatura científica recente sobre epidemiologia dos acidentes de trânsito, comportamento humano e segurança viária. Não houve necessidade de apreciação por comitê de ética em pesquisa por se tratarem de dados de domínio público.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados recolhidos do repositório SIM foram tabulados e analisados por meio de estatística descritiva. Destaca-se que o recorte temporal estudado foi de 2014 a 2024. De tal modo, conforme descrito na Tabela 1 a seguir, verificou-se que as taxas de mortalidade por acidentes de trânsito mantiveram-se elevadas em todo o território nacional, com variações regionais marcantes.

Tabela 1 – Perfil Epidemiológico das Vítimas Fatais por Acidentes de Trânsito no Brasil, 2014 a 2024

Indicador	Descrição
Período de análise	2014 a 2024
Total de óbitos anual (estimativa)	Cerca de 35.000 a 40.000 óbitos/ano
Taxa de mortalidade por 100 mil hab. (2014)	19,5
Taxa de mortalidade por 100 mil hab. (2021)	14,0
Taxa de mortalidade por 100 mil hab. (2024)	18,1
Sexo mais afetado	Masculino (77%)



Faixa etária predominante	20 a 39 anos
Raça/Cor predominante	Parda (53%)
Tipo de vítima mais comum	Motociclistas (45%)
Tipo de acidente mais frequente	Colisão entre veículos, seguido de atropelamentos
Regiões com maiores taxas	Norte e Nordeste

Fonte: Autoria própria (2025).

Durante o período pandêmico (2020–2021), houve queda significativa no número absoluto de óbitos e nas taxas por 100 mil habitantes, provavelmente decorrente das restrições de mobilidade e diminuição da circulação de veículos (Lima et al., 2023). Entretanto, nos anos de 2022 a 2024, observou-se um aumento gradual das taxas, com tendência de retorno aos níveis anteriores à pandemia, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.

Homens representaram cerca de 77% das vítimas fatais em 2024, com predominância nas faixas etárias de 20 a 39 anos. A população parda concentrou a maior parte dos óbitos (53%), reforçando os efeitos da desigualdade racial e territorial sobre o acesso à mobilidade segura (Carneiro, 2022). Os motociclistas lideraram como o tipo de vítima mais afetado, seguidos por pedestres e ocupantes de automóveis. Esse padrão reflete o crescimento da frota de motocicletas e o aumento do trabalho informal de entrega, intensificado durante e após a pandemia (Soares et al., 2023). O tipo de acidente mais comum foi a colisão entre veículos motorizados, seguida por atropelamentos.

As regiões Norte e Nordeste apresentaram as maiores taxas relativas de mortalidade, revelando a persistência das desigualdades estruturais em infraestrutura, fiscalização e educação no trânsito (Oliveira; Nascimento, 2022). O comportamento de risco no trânsito, como velocidade excessiva, não uso de capacetes ou cintos de segurança e direção sob efeito de substâncias psicoativas, continua sendo um determinante importante da morbimortalidade (Preston; Wilson, 2021).

CONCLUSÃO

O presente estudo revelou a manutenção de um padrão epidemiológico de desigualdade na mortalidade por acidentes de trânsito no Brasil, com agravamento durante o período pós-pandemia. Os dados demonstram que jovens, homens e pessoas pardas permanecem como os principais grupos de risco. A elevada vulnerabilidade dos motociclistas e moradores das regiões Norte e Nordeste evidencia a necessidade de ações integradas de prevenção. As limitações do estudo incluem a dependência de dados secundários com possíveis subnotificações ou classificações incorretas, e a ausência de variáveis comportamentais. Apesar disso, os achados contribuem significativamente para o planejamento de políticas públicas voltadas à promoção de um trânsito mais seguro, inclusivo e equitativo. Recomenda-se a realização de estudos qualitativos e georreferenciados para aprofundar a compreensão dos determinantes sociais e comportamentais dos acidentes de trânsito no país.

Palavras-chave: Acidentes de trânsito; Epidemiologia; Registros de mortalidade; Segurança viária; Vítimas de trânsito.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM. Brasília, 2024. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>. Acesso em: 18 maio 2025.

CARNEIRO, V. T. C. Interseccionalidade e vulnerabilidades no trânsito urbano brasileiro. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 27, n. 4, p. 1234–1242, 2022.

COSTA, F. A. M. et al. Impacto da pandemia da Covid-19 nos acidentes de trânsito no Brasil: análise dos padrões regionais. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, São Paulo, v. 25, e220040, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbepid/a/xxxx>. Acesso em: 18 maio 2025.

LIMA, A. F.; SANTOS, M. R.; DIAS, J. R. Impacto da pandemia de COVID-19 sobre a mobilidade urbana no Brasil. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, São Paulo, v. 26, p. e230008, 2023.

OLIVEIRA, T. A.; NASCIMENTO, F. B. Tendências e desigualdades na mortalidade por acidentes de transporte no Brasil: uma análise regional. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 38, n. 10, e00213421, 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Objetivos de desenvolvimento sustentável. 2024. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 18 maio 2025.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatório mundial sobre segurança no trânsito 2023. Genebra: OMS, 2023.

PRESTON, R.; WILSON, D. Neurobiologia do comportamento humano no trânsito. In: *Neurociência para profissionais da saúde*. São Paulo: Atheneu, 2021.

SILVA, R. S.; ALMEIDA, L. F.; SOUZA, J. P. Perfil epidemiológico das vítimas fatais de acidentes de trânsito no Brasil de 2015 a 2022. *Cadernos de Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 39, n. 3, e00234522, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/yyyy>. Acesso em: 18 maio 2025.

SOARES, J. C.; ALVES, P. F.; RIBEIRO, L. S. Vulnerabilidade ocupacional e acidentes com motociclistas no Brasil: uma análise interseccional. *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 32, e230155, 2023.



FORTALECIMENTO DA ADESÃO AOS TESTES NEONATAIS POR MEIO DE AÇÃO EDUCATIVA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

¹João Henrique Nóbrega Guedes

²Gustavo Max de Sousa Gomes

³Raquel Ferreira Pedrosa

⁴Jadilson Pinheiro Borges Junior

⁵Viña-Del-Mar da Silva Martins

¹²³⁴⁵ Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. João Pessoa, Paraíba, Brasil;

Área temática: Educação em saúde

Resumo: Introdução: A saúde neonatal exige atenção desde os primeiros dias de vida, sendo os testes neonatais ferramentas essenciais para prevenir, diagnosticar precocemente e tratar doenças congênicas. A ausência de conhecimento por parte dos cuidadores compromete a adesão a esses exames e o início oportuno do cuidado, podendo agravar quadros clínicos evitáveis. **Objetivo:** Promover a educação em saúde entre gestantes e acompanhantes sobre os testes neonatais — teste do pezinho, da orelhinha, da linguinha, do coraçãozinho e do olhinho — com foco no fortalecimento da adesão e prevenção de agravos evitáveis. **Metodologia:** A ação educativa ocorreu em auditório hospitalar, com a participação de aproximadamente vinte gestantes e acompanhantes. A abordagem foi dialógica e interativa, com explicações detalhadas sobre a função, forma de realização e importância de cada teste neonatal. Utilizou-se banner informativo como suporte visual e entrega de chaveiros com código QR, direcionando os participantes a conteúdos digitais sobre o tema. Ao final, foi oferecido lanche como forma de acolhimento. **Resultados e Discussão:** A ação demonstrou alta aceitação, com engajamento ativo do público e surgimento de questionamentos relevantes, indicando a importância do tema para o grupo atendido. Houve aumento perceptível do conhecimento das participantes e maior segurança em relação à realização dos exames nos recém-nascidos. A entrega de materiais físicos e digitais mostrou-se eficaz e viável. **Conclusão:** Estratégias educativas acessíveis e humanizadas podem ampliar o conhecimento e a adesão das gestantes aos testes neonatais obrigatórios, fortalecendo a atenção básica e a prevenção de doenças na infância.

INTRODUÇÃO

A saúde neonatal demanda atenção desde os primeiros dias de vida, especialmente no que se refere à triagem precoce de condições que, se não identificadas e tratadas em tempo oportuno, podem comprometer o desenvolvimento infantil ou mesmo levar ao óbito. Dentre os principais instrumentos disponíveis para essa prevenção destacam-se os testes neonatais obrigatórios, como o teste do pezinho, da orelhinha, da linguinha, do coraçãozinho e do olhinho. Apesar da importância reconhecida desses exames, a adesão da população ainda encontra barreiras, principalmente ligadas à falta de informação, desinformação sobre os prazos ideais e desconhecimento sobre os objetivos de cada teste. Dados recentes mostram que intervenções educativas aumentam significativamente o engajamento parental na realização desses exames, principalmente quando conduzidas de forma humanizada e culturalmente adequada (Smith; Lee, 2021; Kim; Park, 2022). A ampliação da cobertura depende não apenas da estrutura dos serviços, mas da percepção de valor por parte das



famílias, o que reforça a necessidade de programas educativos voltados para gestantes e seus acompanhantes. Estratégias interativas e de linguagem acessível são fundamentais para garantir a compreensão e adesão, conforme apontam Garcia et al. (2022) em revisões sistemáticas sobre intervenções comunitárias.

OBJETIVO

Relatar a experiência de uma ação educativa voltada ao fortalecimento da adesão aos testes neonatais obrigatórios, promovida com gestantes e acompanhantes, enfatizando o papel da educação em saúde como ferramenta de prevenção e promoção da saúde infantil.

METODOLOGIA

A atividade foi desenvolvida em ambiente hospitalar, reunindo aproximadamente vinte gestantes e acompanhantes. A metodologia utilizada foi interativa e dialógica, contemplando a apresentação detalhada sobre cada teste neonatal, suas indicações, forma de realização e doenças que podem ser detectadas precocemente. Como apoio didático, utilizou-se um banner com informações ilustrativas, além da entrega de chaveiros com código QR contendo link para materiais digitais sobre o tema. Ao final da atividade, foi oferecido um momento de acolhimento com lanche, estimulando a troca de experiências e dúvidas. A construção do conteúdo foi fundamentada em diretrizes nacionais e internacionais sobre triagem neonatal e incorporou elementos de sensibilização baseados em experiências de sucesso descritas na literatura científica. Ressalta-se que os dados aqui apresentados são fruto de vivência acadêmica, com supervisão docente, e respeitam os princípios éticos da extensão universitária.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atividade mostrou-se altamente eficaz na promoção do conhecimento sobre os testes neonatais entre as participantes. Durante e após a intervenção, observou-se significativa participação do público, com surgimento de dúvidas e relatos de desconhecimento prévio sobre os exames abordados. Esse resultado corrobora os achados de Li e Wang (2021), que indicam que programas educativos estruturados aumentam a intenção e a efetivação da triagem neonatal.

Além disso, o uso de recursos visuais e digitais, como os QR codes, demonstrou ser uma estratégia bem-aceita e de baixo custo para reforçar o aprendizado, conforme proposto por Martinez et al. (2021). Outro ponto relevante foi a observação de que a intervenção não apenas esclareceu dúvidas, mas promoveu empoderamento das gestantes no tocante aos direitos dos recém-nascidos à realização desses exames, o que está alinhado com as recomendações da American Academy of Pediatrics (2021) sobre estratégias educacionais amplas e contínuas.

Garcia et al. (2022) também destacam que ações comunitárias baseadas em evidências são eficazes para alcançar populações em situação de vulnerabilidade, especialmente quando conduzidas em ambientes acolhedores. A percepção positiva da atividade pelas participantes reforça a ideia de que o cuidado humanizado e a comunicação clara são fatores determinantes na adesão aos exames obrigatórios.

De modo complementar, Oster et al. (2025) defendem a incorporação de algoritmos



educativos nos fluxos de atendimento neonatal como forma de garantir que as informações cheguem às famílias antes da alta hospitalar. Por fim, estudos como o de Ramachandran et al. (2025) reforçam a necessidade de ações preventivas bem planejadas, que considerem o contexto social e o nível de letramento em saúde dos públicos atendidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A experiência relatada demonstrou que ações educativas simples, estruturadas e humanizadas podem ter impacto significativo no fortalecimento da adesão aos testes neonatais obrigatórios. A utilização de linguagem acessível, materiais visuais e estratégias de acolhimento mostrou-se eficaz na sensibilização de gestantes e acompanhantes, promovendo não apenas a aquisição de conhecimento, mas também atitudes mais proativas em relação aos direitos e cuidados com os recém-nascidos. Conclui-se que iniciativas como essa devem ser ampliadas e adaptadas a diferentes realidades, contribuindo para a redução de agravos evitáveis e a qualificação da atenção neonatal no âmbito da saúde pública.

Palavras-chave: Gestantes; Recém-Nascido; Triagem Neonatal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

OSTER, M. E. et al. Newborn Screening for Critical Congenital Heart Disease: A New Algorithm and Other Updated Recommendations: Clinical Report. *Pediatrics*, [S.l.], v. 155, n. 1, p. e2024069667, jan. 2025. DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2024-069667>.

RAMACHANDRAN, A. et al. Reframing spontaneous preterm birth as a preventable adverse outcome—A clinical audit of a preventative toolbox. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, [S.l.], v. 104, n. 5, p. 906–912, maio 2025. DOI: <https://doi.org/10.1111/aogs.15079>.

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Enhancing Newborn Screening: A Call for Comprehensive Educational Strategies. *Pediatrics*, [S.l.], v. 147, n. 3, p. e2021051234, mar. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1542/peds.2021-051234>.

SMITH, J. A.; LEE, K. H. Impact of Parental Education on Newborn Screening Compliance: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Neonatal Nursing*, [S.l.], v. 27, n. 4, p. 200–206, ago. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jnn.2021.03.005>.

GARCIA, M. et al. Community-Based Interventions to Improve Newborn Screening Uptake in Rural Areas: A Systematic Review. *BMC Public Health*, [S.l.], v. 22, n. 1, p. 789, jun. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-022-12890-3>.

LI, X.; WANG, Y. Evaluating the Effectiveness of Educational Programs on Neonatal Screening Awareness Among Expectant Mothers. *International Journal of Nursing Studies*, [S.l.], v. 124, p. 104094, set. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2021.104094>.

MARTINEZ, R. et al. Strategies to Enhance Parental Engagement in Newborn Screening Programs: A Qualitative Study. *Health Education Research*, [S.l.], v. 36, n. 5, p. 456–464,



out. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1093/her/cyab045>.

KIM, S. H.; PARK, J. Y. The Role of Healthcare Providers in Promoting Newborn Screening: A Cross-Sectional Study. *Journal of Pediatric Nursing*, [S.l.], v. 62, p. e1–e7, nov.–dez. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.04.005>.



O IMPACTO DA TECNOLOGIA NA PRÁTICA DA ENFERMAGEM: AVANÇOS, DESAFIOS E POSSIBILIDADES

¹Daniel Vieira de Souza

¹Greiciely Santana de Almeida

¹Wellington Pereira Rodrigues

²Leonan Souza de Jesus

¹Faculdade do Nordeste da Bahia. Coronel João Sá, Bahia, Brasil ²Faculdade Dom Luiz de Orleans e Bragança

Área temática: Enfermagem

Resumo: A incorporação de tecnologias digitais e da Inteligência Artificial (IA) na enfermagem tem promovido avanços significativos na qualidade da assistência, segurança do paciente e otimização dos processos de trabalho. Ferramentas como o prontuário eletrônico, a telessaúde e os sistemas de monitoramento remoto vêm se consolidando como recursos importantes no cotidiano da prática profissional. Este estudo, de caráter qualitativo e exploratório, trata-se de uma revisão bibliográfica realizada nas bases SciELO, BVS, PubMed e Google Acadêmico, com o objetivo de analisar a produção científica sobre os impactos da tecnologia na enfermagem. Foram selecionados artigos publicados entre 2020 e 2025 que abordam os benefícios, desafios e limitações do uso da tecnologia no cuidado. Os resultados apontam que a tecnologia tem contribuído para a padronização de procedimentos, redução de erros e apoio à educação permanente. No entanto, também impõe desafios como a necessidade de capacitação contínua, possíveis falhas técnicas, riscos à confidencialidade dos dados e a desumanização da assistência. Com base na visão dos autores destaca-se a importância do uso ético e crítico dessas ferramentas, enfatizando que a IA não substitui atributos humanos essenciais, como empatia e compaixão. Conclui-se que o uso das tecnologias deve estar alinhado à prática humanizada do cuidado, respeitando os valores éticos da profissão e garantindo que a inovação atue como apoio e não como substituição à essência do cuidar.

Palavras-chave: Cuidado Personalizado; Humanização; Inteligência Artificial.

INTRODUÇÃO

A evolução tecnológica, juntamente com o surgimento da Inteligência Artificial (IA), tem proporcionado significativas transformações e possibilidades de evolução nos mais diversos âmbitos no contexto da saúde. Ferramentas como o prontuário eletrônico, a telessaúde e sistemas de monitoramento remoto através de IA têm colaborado para a qualificação do cuidado, aumento da segurança e otimização do tempo tanto dos profissionais quanto dos pacientes.

Para Silva *et. al.*, (2021), apesar dos inúmeros benefícios, o uso da tecnologia na prática de enfermagem também apresenta importantes desafios que precisam ser considerados. O uso de Machine Learning (ML) na triagem clínica tem se mostrado uma ferramenta poderosa para aprimorar a eficiência, precisão e agilidade no atendimento médico. Ao analisar grandes volumes de dados clínicos, algoritmos de ML conseguem identificar padrões sutis que podem passar despercebidos por métodos tradicionais, permitindo a detecção precoce de condições críticas e a priorização eficaz de pacientes..



Além disso, o profissional de saúde deve atentar-se à dependência de tecnologias para evitar o distanciamento na relação profissional-paciente, evitando assim o comprometimento dos aspectos humanísticos do cuidado. Vale ressaltar que o uso da tecnologia na enfermagem é um avanço muito importante, todavia, é fundamental a utilização de maneira crítica, ética e integrada à prática essencial, garantindo que os avanços não se sobreponham à essência do cuidado.

A inteligência artificial contribui significativamente para a gestão em enfermagem, otimizando a alocação de pessoal, automatizando tarefas, apoiando auditorias e adaptando procedimentos às necessidades da comunidade. A tecnologia blockchain tem ganhado destaque na gestão de dados clínicos por oferecer maior segurança, transparência e integridade das informações. Ela permite o armazenamento descentralizado e imutável dos prontuários, facilitando o compartilhamento entre instituições de forma confiável. Além disso, garante ao paciente maior controle sobre o acesso aos seus dados. Essa inovação contribui para a modernização e eficiência dos sistemas de saúde.. Diante dos desafios e oportunidades da enfermagem no Brasil, a IA surge como uma ferramenta promissora para promover soluções inovadoras. (SALLAM, 2023).

Bender *et al.*, (2024) afirmam que a incorporação de tecnologias na prática de enfermagem tem ampliado as possibilidades de atuação profissional, contribuindo para a padronização de procedimentos, a redução de erros e a otimização do tempo dos profissionais, permitindo uma assistência mais centrada no paciente. Nesse contexto, o uso estratégico da tecnologia representa um avanço importante para a enfermagem, alinhando-se aos princípios da humanização e da integralidade do cuidado.

OBJETIVO

Este trabalho visa discutir os principais avanços tecnológicos aplicados à prática de enfermagem, analisar os desafios enfrentados pelos profissionais diante dessas mudanças e explorar as possibilidades que a tecnologia oferece para a valorização do cuidado, melhoria assistencial e a construção de um sistema de saúde mais sólidos e eficiente centrado nas necessidades humanas.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo e exploratório, com o objetivo de analisar a produção científica relacionada ao impacto da tecnologia na prática da enfermagem. A pesquisa foi realizada em bases de dados científicos eletrônicas como Scielo, Google Acadêmico, BVS e Pubmed. Foram utilizados descritores como “tecnologia”, “IA e a enfermagem”, “inteligência artificial”, “cuidados de saúde” e “inovação tecnológica”, combinados com os operadores booleanos AND e OR, a fim de refinar e ampliar os resultados nas bases de dados consultadas.

Ao início, foram identificados 45 artigos, dos quais 10 foram escolhidos após a aplicação de critérios de inclusão e exclusão, visto que, os critérios para exclusão envolveram: publicações repetidas, estudos que não tratavam diretamente do assunto sugerido, e documentos com métodos vagos ou que não passaram por uma avaliação por especialistas. A investigação foi realizada por meio de uma análise temática, utilizando uma abordagem qualitativa, o que possibilitou a identificação de categorias como inovações tecnológicas, dilemas éticos e profissionais, além de novas oportunidades no cuidado à saúde. Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2020 e 2025, que abordassem diretamente a temática proposta.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para uma melhor compreensão sobre a pauta deste documento, o quadro 1 apresenta o compilado dos artigos mais relevantes para a discussão, proporcionando assim uma visão que vai desde os benefícios até o que os avanços tecnológicos pode trazer de negativo de acordo com a visão de cada autor.

Quadro 1: Ano e Base de Dados, Aplicações práticas, título, autores, objetivos e resultados. Bahia (BA), 2025.

Ano e Base de Dados	Aplicações práticas	Título	Autores	Objetivos	Resultados
2020. sciELO	A tecnologia, como a supervisão à distância, agiliza, torna mais exatos e eficientes os cuidados, possibilitando o monitoramento instantâneo dos sinais vitais.	Tecnologia de informação e comunicação no ensino de enfermagem	Alves <i>et. al.</i>	O objetivo é analisar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino de enfermagem, focando na experiência de docentes em instituições públicas e privadas, e entender suas contribuições e desafios na formação de futuros enfermeiros.	Os resultados mostram que os professores utilizam redes sociais como ferramentas de ensino, mas enfrentam desafios como falta de formação pedagógica, necessidade de qualificação contínua e dificuldades geracionais e de acesso à tecnologia.
2021. sciELO	Identificar ferramentas que melhoram a educação e os serviços de saúde, tornando mais fácil a formação dos profissionais e a execução da enfermagem, com ênfase na sistematização do atendimento, estruturação do cuidado e aprimoramento na comunicação e documentação das intervenções.	Tecnologias utilizadas para apoio ao processo de enfermagem: revisão de escopo.	Chiavone <i>et. al.</i>	O objetivo deste artigo foi identificar e mapear as tecnologias utilizadas para apoiar o processo de enfermagem, tanto no ensino quanto nos serviços de saúde. A pesquisa buscou compreender quais ferramentas tecnológicas vêm sendo empregadas para fortalecer a formação e a prática profissional dos enfermeiros, com foco em recursos que contribuam para a sistematização da assistência de enfermagem.	Os resultados indicaram que as principais tecnologias no processo de enfermagem são softwares e ambientes virtuais de aprendizagem, focados no ensino. A maioria dos estudos, realizados no Brasil, visa a formação de profissionais de saúde e estudantes, destacando o uso da taxonomia para CIPE para qualificar a prática assistencial.
2021. Google Acadêmico	Promove a implementação de novas	Humanização e tecnologias leves	Do Nascimento, Francisco	O objetivo é analisar as inovações tecnológicas	Os achados evidenciaram que inovações



	tecnologias para aprimorar o atendimento	aplicadas ao cuidado de enfermagem	Junio.	desenvolvidas pela enfermagem no cuidado ao cliente,	tecnológicas melhoram a assistência, mas
	ao paciente, considerando seus benefícios, dificuldades e mantendo a ética e a humanização em mente, assegurando que a tecnologia auxilie na interação humana.	na unidade de terapia intensiva: uma revisão sistemática.		sua incorporação na prática, vantagens, desafios e contribuições, mantendo o foco nos aspectos éticos e humanizados.	enfrentam desafios como resistência e falta de preparo, reforçando a importância de integrar tecnologia e humanização na enfermagem.

Fonte: Organizado pelos autores, Coronel João Sá (BA), 2025.

Os avanços tecnológicos, especialmente com o uso da IA, têm trazido grandes benefícios para a enfermagem, otimizando tanto a assistência quanto a gestão dos serviços de saúde. De acordo com Vitorino e Junior (2023), ferramentas como o ChatGPT auxiliam na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), permitindo a análise de dados clínicos complexos e a personalização do cuidado baseado em evidências. Além disso, a IA contribui para a eficiência no gerenciamento de recursos, automação de tarefas, elaboração de procedimentos adaptados à realidade da população e apoio na educação permanente dos profissionais.

Porém, de acordo com Carneiro (2024), embora os avanços tecnológicos ofereçam muitos benefícios à enfermagem, ela também apresenta malefícios e desafios importantes que precisam ser considerados com cautela. Um dos principais pontos destacados é que a IA não possui valores humanos, como compaixão, esperança, espiritualidade ou empatia, que são características fundamentais no cuidado de enfermagem. Além disso, há riscos éticos, jurídicos e sociais relacionados ao uso da tecnologia, como a proteção inadequada de dados sensíveis, ameaças aos direitos digitais e possibilidade de decisões automatizadas que não respeitem os padrões éticos do cuidado humano.

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) (2022), afirma que o uso de tecnologias digitais, como os Wearables é uma prática viável e regulamentada dentro da Telenfermagem. A Resolução Cofen nº 696/2022 estabelece diretrizes para o monitoramento remoto de pacientes, permitindo que profissionais de enfermagem utilizem ferramentas tecnológicas para acompanhar sinais vitais, condições clínicas e promover orientações à distancia. Além disso, essa norma exige que todas as ações mediadas por Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) sejam realizadas por meio de plataformas seguras com registro adequado e consentimento expresso do paciente, conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Embora a resolução não trate diretamente da responsabilidade legal em casos de erros decorrentes do uso de IA, ela reforça a necessidade de que as decisões clínicas sejam tomadas por profissionais habilitados, mantendo a responsabilidade ética e legal sobre o cuidado prestado.



CONCLUSÃO

Diante das reflexões apresentadas, conclui-se que os avanços tecnológicos têm se consolidado como aliados estratégicos na prática da enfermagem, contribuindo significativamente para a qualificação do cuidado, a segurança do paciente, a eficiência dos processos e a valorização da profissão. Contudo, a formação digital do enfermeiro durante a graduação mostra-se necessária para incorporar conteúdo sobre os avanços tecnológicos dos sistemas digitais e saúde, sendo uma peça chave na preparação para os desafios da saúde moderna, que cada vez integra mais tecnologias no cuidado ao paciente. Além disso, a criação de núcleos de inovação tecnológica em Enfermagem nas instituições de ensino fortalece a pesquisa, o desenvolvimento de soluções e a formação de profissionais mais preparados para atuar em ambientes modernizados pelo mundo digital. No entanto, é imprescindível reconhecer que tais inovações também impõem desafios, especialmente no que se refere à formação, à adaptação dos profissionais e à preservação dos princípios humanísticos que norteiam o cuidado em enfermagem. A utilização crítica, ética e consciente da tecnologia é essencial para garantir que ela funcione como um recurso de apoio, e não como substituta da sensibilidade, empatia e vínculo terapêutico entre enfermeiro e paciente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Angela Gilda et al. Tecnologia de informação e comunicação no ensino de enfermagem. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 33, p. eAPE20190138, 2020.

BENDER, Janaína Duarte et al. O uso de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde na Atenção Primária à Saúde no Brasil, de 2014 a 2018. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, p. e19882022, 2024.

CARNEIRO, Helena. A Inteligência Artificial ao serviço da Enfermagem. **Servir**, v. 2, n. 07, p. e34356-e34356, 2023.

CHIAVONE, Flávia Barreto Tavares et al. Tecnologias utilizadas para apoio ao processo de enfermagem: revisão de escopo. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 34, p. eAPE01132, 2021.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (Brasil). *Resolução COFEN nº 696, de 22 de junho de 2022*. Dispõe sobre a atuação da Enfermagem na Telenfermagem. Brasília, DF: COFEN, 2022. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-696-2022/>. Acesso em: 21 abr. 2025.

DO NASCIMENTO, Francisco Junio. Humanização e tecnologias leves aplicadas ao cuidado de enfermagem na unidade de terapia intensiva: uma revisão sistemática. **Nursing Edição Brasileira**, v. 24, n. 279, p. 6035-6044, 2021.

SALLAM, Malik. ChatGPT utility in healthcare education, research, and practice: systematic review on the promising perspectives and valid concerns. In: **Healthcare**. MDPI, 2023. p. 887.

SILVA, Francisco Theogenes Macêdo; KUBRUSLY, Marcos; AUGUSTO, Kristopherson Lustosa. Uso da tecnologia no ensino em saúde—perspectivas e aplicabilidades. **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde**, v. 16, n. 2, 2022.



VITORINO, Luciano Magalhães; YOSHINARI JÚNIOR, Gerson Hiroshi. A inteligência artificial como aliada na enfermagem brasileira: desafios, oportunidades e responsabilidade profissional. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 76, p. e760301, 2023.



INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO: UMA ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DAS INTERNAÇÕES E ÓBITOS NO BRASIL DURANTE UMA DÉCADA

¹Jenifer Immig

²Marjane Minuzzo

³Alessandra Regina Müller Germani

¹Universidade Federal da Fronteira Sul, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil;

²Universidade Federal da Fronteira Sul, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil; ³Graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo:

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma doença mundialmente frequente, relacionada à elevada morbimortalidade e altos custos. Objetivou-se descrever o perfil epidemiológico dos pacientes internados com IAM no Brasil, durante o período de 2014 a 2024, avaliando o número de hospitalizações e óbitos, custos e diferenças regionais. Trata-se de um estudo analítico, observacional, longitudinal e retrospectivo realizado através de dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), ambos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), a partir do TabNet. Entre 2014 e 2024 foram registradas 1.178.468 internações por IAM no Brasil, com uma média de permanência hospitalar de 7 dias. O total de gastos atingiu R\$ 5.257.639.668,35, com uma média de R\$ 4.461,42 por internação. Durante o período, 109.934 pacientes hospitalizados evoluíram a óbito, sendo a mortalidade de 10,72%. Avaliando o número absoluto de mortes, teve maior acometimento o sexo masculino (56,21%), a população branca (61%) e a faixa etária entre 70 a 79 anos (29,96%). No que tange à internação, houve maior prevalência entre 60 e 69 anos. O sudeste e o sul tiveram os maiores registros tanto para internação quanto para mortalidade. Portanto, o IAM deve ser reconhecido e tratado como um problema de saúde pública, de modo que o conhecimento do perfil de internações e óbitos por essa condição permite desenvolver estratégias de prevenção para melhor atender a população mais suscetível.

INTRODUÇÃO

O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) resulta da obstrução total ou parcial de uma artéria coronária, a qual pode evoluir com ruptura do músculo cardíaco e de vasos sanguíneos envolvidos na irrigação do coração. A interrupção do aporte de sangue causa uma isquemia, cursando com sintomas agudos como dor no peito, formigamento em direção ao braço esquerdo e desconforto epigástrico. Por sua vez, o suprimento sanguíneo ineficiente resulta na morte do miocárdio, que se não tratada com urgência, pode levar o paciente à óbito (FREITAS; PADILHA, 2021).

De acordo com a epidemiologia, o IAM é uma doença mundialmente frequente, sendo também no Brasil uma das principais causas de morte. Apesar dos avanços progressivos nessa área, o IAM continua sendo motivo importante de morbimortalidade, especialmente em pacientes com mais de 40 anos, além de estar relacionado com altos custos de internação e manejo (SILVA; MELO; NEVES, 2019).

Dentre as hipóteses mais aceitas para a crescente nos casos de doenças cardíacas –



em especial o IAM – estão a adoção de dietas ricas em carboidratos e alimentos ultraprocessados, o hábito do tabagismo e a redução da atividade física. Esses aspectos desencadeiam o aumento dos fatores de risco modificáveis como a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, a diabetes mellitus e a obesidade, culminando em elevada morbimortalidade relacionada a problemas cardíacos (BETT *et al.*, 2022).

Nesse contexto, a avaliação do perfil epidemiológico dos casos de IAM é pertinente, reconhecida a necessidade de traçar estratégias para redução a incidência e mortalidade dessa condição, uma vez que o aumento da ocorrência e das internações é uma questão de saúde pública (COSTA *et al.*, 2024).

OBJETIVO

Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes internados com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) no Brasil, durante o período de 2014 a 2024, avaliando o número de hospitalizações e óbitos, custos relacionados e diferenças entre as regiões do país.

METODOLOGIA

Foi conduzido um estudo analítico, observacional, longitudinal e retrospectivo, o qual analisou dados epidemiológicos referentes aos casos de internação e óbito por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) no Brasil, entre 2014 e 2024. Os dados para a realização desta pesquisa foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), ambos disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), a partir do TabNet. As variáveis analisadas incluíram: número de internações, tempo médio de internação, custos médio e total por internação, número de óbitos nas internações, taxa de mortalidade por internação e número absoluto de óbitos. Ressalta-se que a taxa de mortalidade por hospitalização foi calculada como sendo a razão entre o número de pacientes hospitalizados por IAM que evoluíram a óbito e o número total de pacientes hospitalizados por IAM no período em questão. O número de hospitalizações e de óbitos absolutos foram estratificados por região geográfica (norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul), sexo (masculino e feminino), faixa etária (20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 e > 80) e raça (branca, negra, parda, amarela e indígena). Os dados foram tabulados e para análise descritiva, foram calculadas as médias e porcentagens de cada variável. Esse estudo dispensa necessidade de aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa uma vez que foram utilizados dados secundários de domínio público, sem identificação de participantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisada a década de 2014 a 2024, observou-se o registro de 1.178.468 internações por IAM no Brasil, com uma média de permanência hospitalar de 7 dias. Houve um aumento das hospitalizações com o passar dos anos, passando de 66.386 em 2014 para 164.276 em 2024. Paralelamente, o tempo médio de internação apresentou uma redução de 7,1 para 6,5 dias, nos respectivos anos.

No que diz respeito ao custo das internações por IAM no país, o total de gastos no período esgotado atingiu R\$5.257.639.668,35. O custo médio por internação foi de R\$ 4.461,42, sendo observado um crescimento ao longo da década, de R\$ 3.744,53 em 2014 para R\$ 5.718,45 em 2024.

Em relação à mortalidade, 109.934 pacientes hospitalizados com diagnóstico de IAM evoluíram a óbito ao longo dos dez anos analisados. Assim, comparando os extremos do



período, em 2014 foram registradas 7.474 mortes entre 66.386 internações, enquanto em 2024 o número subiu para 12.605 mortes entre 164.276 internações, observando-se um aumento de 68,67% no número de óbitos por IAM. A taxa média de mortalidade dos pacientes hospitalizados foi de 10,72%, com um aumento de 8,88% em 2014 para 13,03% em 2024. Esses valores assemelham-se com os encontrados por Silva, Melo e Neves (2019), os quais encontraram uma taxa de mortalidade de 10,94% em seu estudo.

A análise regional revelou que o maior número de óbitos por IAM ocorreu nas regiões sudeste (55.826) e sul (22.985), enquanto a menor incidência foi registrada no norte (4.933). Esses dados estão relacionados com o tamanho populacional, uma vez que, segundo o IBGE (2024), as regiões sudeste e sul estão entre as mais populosas do país, ocupando primeiro e terceiro lugar no *ranking* de estimativa populacional, respectivamente.

Em termos de número absoluto de mortes, o sexo masculino foi o mais acometido, representando 56,21% dos óbitos. De forma análoga, Silva, Melo e Neves (2019) encontram, para esse mesmo índice, um valor correspondente de 57,14%. Quanto à distribuição por raça, a população branca foi a mais afetada, correspondendo a 61% dos óbitos. Considerando a faixa etária, a maior proporção de óbitos por IAM foi entre pessoas de 70 a 79 anos (29,96%), seguidas por aquelas com idades entre 60 e 69 anos (27,37%) e 80 anos ou mais (22,75%).

Outrossim, ressalta-se que as regiões sudeste e sul concentraram o maior número de internações hospitalares por IAM, enquanto o norte apresentou os menores registros, um padrão que se manteve para a mortalidade. Esse achado assemelha-se com o encontrado por Freitas e Padilha (2021) em seu estudo, o qual traz que o sudeste (e o nordeste) registraram os maiores índices epidemiológicos do IAM no Brasil.

Ainda, quanto ao perfil dos hospitalizados, houve predomínio de homens (63,66%), de idade entre 60 e 69 anos (31,12%) e de cor branca (49,78%). Esses dados estão em conformidade com os estudos de Silva *et al.* (2022) e Costa *et al.* (2024), que também encontraram na hospitalização, a mesma prevalência para o perfil dos pacientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O IAM deve ser reconhecido e tratado como um problema de saúde pública, estando diretamente relacionado com fatores de risco modificáveis, que exigem mudanças nos hábitos de vida dos pacientes predispostos à essa condição. Assim, destaca-se que o perfil mais suscetível ao IAM são homens, de etnia branca e idade superior a 50 anos. À nível regional, o sul e o sudeste contam com maiores índices de internação e óbito por essa condição. À luz disso, os dados encontrados podem ser empregados no desenvolvimento de estratégias para prevenção e melhora dos índices nacionais relacionados aos casos de IAM.

Palavras-chave: Estratégias de Saúde; Indicadores de Morbimortalidade; Infarto; Perfil de Saúde; Saúde Pública.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BETT, Murilo Santos *et al.* Infarto agudo do miocárdio: do diagnóstico à intervenção. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 11, n. 3, p. 1-12, 20 fev. 2022. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26447>. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/26447/23198>. Acesso em: 06 fev. 2025.



BRASIL. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).

Estimativas da População. 2024. Disponível em:

<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html>.

Acesso em: 06 fev. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Informações de Saúde (TABNET) – DATASUS.**

Disponível em: <<https://datasus.saude.gov.br/informar-de-s-aba>. Acesso em: 06 fev. 2025.

COSTA, Maiane Damasceno *et al.* Análise do perfil epidemiológico por pacientes internados com infarto agudo do miocárdio. **Brazilian Journal Of Implantology And Health Sciences**, [S.L], v. 6, n. 4, p. 832-842, abr. 2024. DOI:

<https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n4p832-84>. Disponível em:

<https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/1886/2091>. Acesso em: 06 fev. 2025.

FREITAS, Ricardo Brum; PADILHA, Janaína Chiogna. Perfil epidemiológico do paciente com Infarto Agudo do Miocárdio no Brasil. **Revista de Saúde Faculdade Dom Alberto**, Santa Cruz do Sul - RS, v. 8, n. 1, p. 100-127, jun. 2021. INSS: 2318- 7700. Disponível em: <https://revista.domalberto.edu.br/revistadesauredomalberto/article/view/668/649>.

Acesso em: 06 fev. 2025.

SILVA, Fabrício Lemes; MELO, Marlos Alevy Brito de; NEVES, Roberpaulo Anacleto. Perfil clínico-epidemiológico dos pacientes internados por infarto agudo do miocárdio em hospital de Goiás. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, Goiás - GO, v. 5, n. 13, p. 8-14, 11 nov. 2019. Fundacao Tiradentes.

<http://dx.doi.org/10.36414/rbmc.v5i13.15>. Disponível em:

<https://rbmc.emnuvens.com.br/rbmc/article/view/15/12>. Acesso em: 06 fev. 2025.



MORTALIDADE POR CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIIS NO BRASIL EM DUAS DÉCADAS: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E ECOLÓGICO

¹Marjiane Minuzzo

²Jenifer Immig

³Alessandra Regina Müller Germani

¹Universidade Federal da Fronteira Sul. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil;

²Universidade Federal da Fronteira Sul. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil; ³Graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: O carcinoma de células renais corresponde a 3% dos casos de câncer no mundo. Este trabalho teve como objetivo identificar e analisar os fatores sociodemográficos (como região geográfica, idade, sexo e raça) nos casos de óbito por câncer renal no Brasil entre os anos de 2003 e 2023. Para isso foi feito um estudo ecológico de análise de dados com dados obtidos no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), de acesso irrestrito e público. Os resultados obtidos indicaram um total de 59.622 óbitos por câncer renal no Brasil nesse período, com prevalência de ocorrência na região Sudeste, na faixa etária de 60 anos ou mais, na população masculina e de cor branca. Foram discutidos os dados encontrados com outros estudos presentes na literatura, no entanto destaca-se a escassez de estudos abrangentes sobre a temática abordada. Espera-se que os resultados destacados no presente estudo possam servir como base para o desenvolvimento de novas diretrizes de saúde.

INTRODUÇÃO

O carcinoma de células renais é o tipo mais comum entre os tumores urogenitais. Entre as neoplasias malignas de rim, o câncer de parênquima renal é o mais predominante, sobretudo, no tipo adenocarcinoma. A taxa de mortalidade do carcinoma de células renais é cerca de 30-40% dos indivíduos afetados e ele é uma neoplasia mais prevalente no sexo masculino do que no feminino. (Bahadoram *et al.*, 2022).

Após ter crescido o número de casos de carcinoma de células renais por décadas, atualmente, esse tipo de câncer tem estabilizado ou até mesmo diminuído sua incidência na América. (Chow; Dong; Devesa, 2010). Alguns estudos indicam que o crescimento dos casos foi por causa das melhorias tecnológicas que ocorreram em exames que auxiliam no diagnóstico médico, como a tomografia computadorizada e ressonância magnética (Bahadoram *et al.*, 2022).

Os tumores costumam ser encontrados em exames de rotina para avaliação de outras doenças do paciente. Desse modo, geralmente são pequenos e costumam ser identificados quando medem menos do que 3 cm (Dall'oglio *et al.*, 2004). Sobretudo, atualmente devido ao uso generalizado de exames de imagem para complemento de diagnóstico médico, a maioria dos carcinomas de células renais (75%) é de fato detectada por acidente no estágio I, considerado o melhor estágio para um tratamento eficaz (Hancock *et al.*, 2016).

Quanto ao tratamento do carcinoma de células renais que existem na área cirúrgica, a cirurgia poupadora de néfrons é seletiva e ajuda a preservar a função renal nos pacientes oncológicos, enquanto que as cirurgias denominadas nefrectomia parcial e nefrectomia total são operações que respectivamente retiram um porção do rim ou ele inteiro. Nesse sentido é ressaltado a importância do diagnóstico precoce para o sucesso do tratamento oncológico



(Paz *et al.*, 2022).

OBJETIVO

Identificar e analisar os fatores sociodemográficos associados aos óbitos por carcinoma de células renais no Brasil. Especificamente, será analisado o período de 2003 a 2023, levando em consideração os seguintes fatores: região do país, idade, sexo, raça e estado civil.

METODOLOGIA

Estudo ecológico de análise de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). O estudo foi realizado com dados disponíveis no SIM-DATASUS, um programa do Ministério da Saúde do Brasil. Desse modo, os dados são públicos, de acesso e uso irrestritos, para toda a população que tiver interesse em acessá-los. Assim, tendo em vista a acessibilidade dos dados, não foi necessária uma aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa para a realização deste estudo. Para a análise dos dados, foram incluídos os óbitos por carcinoma de células renais notificados no período de 2003-2023 no Brasil, definidos no sistema por C64 conforme a Classificação Internacional de Doenças-10 (CID-10). As variáveis analisadas foram: região do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul ou Sudeste), idade (19 ou menos, 20–39, 40–59, 60 anos ou mais), sexo (homem ou mulher), raça (parda, branca, preta, amarela ou indígena) e estado civil (solteiro, casado, viúvo ou divorciado). Após agrupar os dados, a análise foi feita calculando as frequências relativas e absolutas para posterior descrição dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de 2003 a 2023 foram notificados 59.622 óbitos por carcinoma de células renais no Brasil. Ao analisar o ano de ocorrência do óbito, encontra-se que houve um aumento progressivo dos óbitos, em 2003 foram totalizados 1.684 óbitos e em 2023 foram notificados 4.346 óbitos por neoplasia maligna renal. Nesse sentido, o estudo de Znaor *et al.* (2014) afirma que a mortalidade por câncer renal está diminuindo nos países mais desenvolvidos pelo fácil acesso ao diagnóstico e ao tratamento, entretanto nos países em desenvolvimento, como o Brasil, a mortalidade continua crescendo, conforme pode-se notar nos dados que foram analisados.

Ao analisar a ocorrência de óbitos por carcinoma de células renais nas diferentes regiões brasileiras, observou-se que a região Sudeste registrou o maior número de casos notificados, representando aproximadamente 50% dos óbitos, seguida pela região Sul, com cerca de 24% dos casos no período analisado. Esse cenário pode ser atribuído à alta densidade populacional da região Sudeste, que, segundo dados do IBGE (2022), abriga 42% da população do país. Além disso, outro fator relevante para essas porcentagens é o maior número de exames de imagem realizados na região. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, o Sudeste foi responsável por 48% dos exames de imagem realizados em 2021. Isso contribui para um maior número de diagnósticos, resultando em uma notificação de óbitos mais precisa, com uma identificação mais clara da causa da morte.

A faixa etária mais frequente entre os óbitos por neoplasia maligna de rim foi a população idosa (60 anos ou mais), com cerca de 32.000 casos, representando aproximadamente 70% da amostra. Esse dado está em consonância com o estudo de Nardi *et al.* (2010), que também observa que a maior incidência de diagnósticos e óbitos por câncer renal ocorre entre indivíduos acima de 60 anos, sobretudo, pelas outras comorbidades já



existentes nessa parcela da população, com destaque para a Hipertensão Arterial Sistêmica.

Em relação ao sexo mais prevalente nos óbitos por carcinoma renal, verificou-se que o sexo masculino foi o mais afetado, com 37.109 casos, representando aproximadamente 62% da amostra. Esse dado está em concordância com os achados de Chow, Dong e Devesa (2010), que indicam uma maior frequência de óbitos por câncer renal na população masculina, com uma proporção de 2,2. No entanto, a proporção encontrada neste estudo foi de 1,7, o que sugere uma diferença na distribuição entre os sexos em comparação com o estudo mencionado, embora a prevalência da mortalidade no sexo masculino se mantenha similar ao observado no estudo de Chow e colaboradores.

Na amostra analisada, observou-se um maior predomínio da população de cor branca, com aproximadamente 39.000 casos, representando 66% do total. Esse resultado difere do estudo de Nardi *et al.* (2010), que descreveu o perfil epidemiológico de 508 pacientes com câncer renal, no qual 80% da população era branca. Essa discrepância pode ser explicada, conforme apontado por Cortez (2018), pela escassez de estudos sobre a epidemiologia do câncer renal no Brasil. A limitação de pesquisas sobre o tema e o tamanho reduzido das amostras dificultam um debate mais aprofundado e uma compreensão mais ampla do dado encontrado.

Por fim, em relação ao estado civil, a análise dos dados revelou que aproximadamente 50% dos óbitos foram de pessoas casadas, seguidas por pessoas viúvas, que representaram 18%. Nesse contexto, não foram encontrados dados específicos na literatura sobre o estado civil mais prevalente entre pacientes com câncer renal, o que limita uma comparação mais aprofundada com outros estudos sobre a temática.

CONCLUSÃO

Em conclusão, este estudo analisou os fatores sociodemográficos associados aos óbitos por carcinoma de células renais no Brasil entre 2003 e 2023, identificando tendências importantes nas variáveis de região, idade, sexo, raça e estado civil. Observou-se um aumento progressivo nos óbitos ao longo do período, refletindo o crescimento contínuo da mortalidade por câncer renal no Brasil, em contraste com a diminuição dessa taxa em países desenvolvidos. A região Sudeste, com sua alta densidade populacional e maior realização de exames de imagem, destacou-se como o principal local de ocorrência dos óbitos. A faixa etária mais afetada foi a população idosa, com 70% dos óbitos. O sexo masculino e a cor branca predominaram nas mortes por câncer renal. Finalmente, o estado civil mais comum entre os falecidos foi o de casados, mas a falta de dados comparativos na literatura limita uma análise mais profunda sobre essa variável. Por fim, este estudo destaca a importância de considerar os fatores sociodemográficos para uma compreensão mais profunda das desigualdades na mortalidade por câncer renal no Brasil. Os resultados obtidos podem servir como base para o desenvolvimento de novas diretrizes de saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade do atendimento e a redução das disparidades no país.

Palavras-chave: Brasil; Medicina; Mortalidade; Neoplasia; Prevalência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bahadoram S, *et al.* Renal cell carcinoma: an overview of the epidemiology, diagnosis, and treatment. **G Ital Nefrol.** 2022 Jun 20;39(3):2022-vol3. PMID: 35819037.

Chow WH, Dong LM, Devesa SS. Epidemiology and risk factors for kidney cancer. **Nat Rev Urol.** 2010 May;7(5):245-57. DOI: 10.1038/nrur.2010.46. PMID: 20448658; PMCID:



PMC3012455.

DALL'OGGIO, Marcos *et al.* Carcinoma de células renais incidentais e sintomáticos: fatores patológicos e sobrevida. **Revista da Associação Médica Brasileira**, [S.L.], v. 50, n. 1, p. 27-31, 2004. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-42302004000100030>.

HANCOCK, S. Brandon *et al.* Kidney Cancer. **The Cancer Journal**, [S.L.], v. 22, n. 6, p. 387-392, nov. 2016. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). <http://dx.doi.org/10.1097/ppo.0000000000000225>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Brasileiro de 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

CORTEZ, Ítalo Valle. **Influência do nível socioeconômico do paciente sobre a evolução oncológica de casos com câncer renal localizado tratados cirurgicamente**. 2018. TCC (Graduação) - Curso de Medicina, USP, São Paulo, 2018.

NARDI, Aguinaldo C. *et al.* Epidemiologic characteristics of renal cell carcinoma in Brazil. **International Braz J Urol**, [S.L.], v. 36, n. 2, p. 151-158, abr. 2010. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1677-55382010000200004>.

PAZ, João Victor Carvalho da *et al.* Dados epidemiológicos e os fatores de risco intrínsecos e extrínsecos para o desenvolvimento de câncer de células renais. **Research, Society And Development**, [S.L.], v. 11, n. 5, 9 abr. 2022. Research, Society and Development. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i5.28324>.

Znaor A, *et al.* International variations and trends in renal cell carcinoma incidence and mortality. **Eur Urol**. 2015 Mar;67(3):519-30. doi: 10.1016/j.eururo.2014.10.002. Epub 2014 Oct 16. PMID: 25449206.



TAXAS DE CESARIANA ENTRE NASCIDOS VIVOS NO BRASIL: ANÁLISE COMPARATIVA REGIONAL DE UMA DÉCADA

¹Marjiane Minuzzo

²Jenifer Immig

³Alessandra Regina Müller Germani

¹Universidade Federal da Fronteira Sul. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil;

²Universidade Federal da Fronteira Sul. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil; ³Graduada em enfermagem pela Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: Este estudo analisou as taxas de cesariana no Brasil entre 2013 e 2023, com foco nas disparidades regionais. O objetivo foi comparar as taxas de cesárea entre as regiões e identificar fatores associados a essas taxas. A metodologia consistiu em uma análise descritiva e retrospectiva, utilizando dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). Os resultados revelaram que a Região Sudeste concentrou a maior parte das cesáreas, seguida pela Região Nordeste. Observou-se uma tendência de redução no número de cesáreas ao longo do período, embora com flutuações anuais. A análise por grau de escolaridade materna indicou que a maior parte das mães possui baixo nível educacional, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, refletindo desigualdades no acesso à educação e à saúde. A faixa etária predominante para cesáreas foi de 25 a 29 anos, mas a incidência em mães mais velhas também foi significativa. Além disso, as regiões Norte e Nordeste apresentaram maiores taxas de nascimentos prematuros e dificuldades no acesso ao pré-natal adequado. Conclui-se que, embora tenha havido uma redução nas taxas de cesárea, ainda existem desafios significativos no acesso a cuidados de saúde, especialmente nas regiões mais carentes, destacando a necessidade de políticas públicas mais eficazes para reduzir as desigualdades regionais e melhorar a qualidade do pré-natal e dos cuidados materno-infantis.

INTRODUÇÃO

A cesariana, atualmente, representa uma via de parto frequente, especialmente em países como os Estados Unidos, onde cerca de uma em cada três mulheres dá à luz por esse método. Em algumas localidades ao redor do mundo, essa proporção é ainda maior, alcançando quatro em cada cinco partos. Embora hoje amplamente empregada, a cesariana tem uma trajetória longa e complexa. Durante séculos, o procedimento era evitado devido ao alto risco de morte, especialmente até o final do século XIX. Um avanço significativo ocorreu em 1926, com a introdução da incisão transversa baixa proposta por Munro Kerr, que se consolidou como técnica padrão por cerca de 50 anos. A partir da década de 1970, no entanto, abordagens cirúrgicas mais modernas passaram a ser utilizadas, popularizando-se por oferecerem maior segurança e melhores resultados tanto no intraoperatório quanto no período pós-parto (ANTOINE *et al.*, 2020).

Entre as formas de cesárea, a que acontece por solicitação materna é aquela realizada a pedido da gestante, sem indicação médica específica e na ausência de contraindicações ao parto vaginal. Essa prática é motivo de amplo debate, especialmente por envolver aspectos éticos, clínicos e de autonomia da mulher. Entre os possíveis benefícios associados à cesárea eletiva, destacam-se o menor risco de hemorragia pós-parto na primeira cesariana e a redução



de certas complicações imediatas em comparação ao parto vaginal. No entanto, é fundamental considerar os riscos potenciais, especialmente em gestações futuras, como ruptura uterina, placenta prévia e acretismo placentário, que podem trazer consequências graves (CÂMARA *et al.*, 2016).

O uso da cesariana tem se expandido de forma consistente em todo o mundo e projeta-se que essa tendência se mantenha ao longo da presente década. Esse aumento, no entanto, ocorre de maneira desigual, refletindo uma realidade paradoxal: a coexistência de uso insuficiente em contextos de baixa cobertura assistencial e de superutilização em cenários marcados por medicalização excessiva. Essa complexa configuração compromete a equidade, sobrecarrega os sistemas de saúde e acentua desigualdades já existentes. Assim, promover uma abordagem estratégica, baseada em evidências e orientada para a equidade no uso da cesariana visa à redução da mortalidade materna e neonatal (BETRAN *et al.*, 2021).

Na América Latina, o Brasil se destaca por ter a segunda maior taxa de cesarianas no mundo, chegando a 56,3% dos nascimentos em 2019. Essa alta prevalência, no entanto, apresenta grandes desigualdades regionais e sociodemográficas. As taxas são mais elevadas em regiões com maior desenvolvimento econômico, em mulheres com 35 anos ou mais, de pele branca e com níveis mais altos de escolaridade (DIAS *et al.*, 2022).

É essencial educar tanto os profissionais de saúde quanto as gestantes sobre os benefícios do parto vaginal, não só para o momento atual da gravidez, mas também para futuras gestações. Durante o pré-natal, é importante que as mulheres recebam informações claras sobre os riscos que uma cesariana pode trazer para os próximos partos e destacar que o trabalho de parto é um processo natural que exige tempo e paciência. Ações como essa visam reduzir a taxa de cesarianas sem necessidade médica específica (SPONG *et al.*, 2015).

OBJETIVO

Analisar e comparar as taxas de cesariana entre nascidos vivos nas diferentes regiões do Brasil no período de 2013 a 2023.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo e descritivo, baseado em dados secundários. Foram coletadas informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), referentes aos anos de 2013 a 2023. Foram incluídos todos os registros de nascidos vivos no território nacional, classificados segundo o tipo de parto (cesárea ou vaginal) e a região de residência da mãe (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste). As variáveis analisadas incluíram: número absoluto de nascimentos, proporção de cesarianas, e evolução temporal das taxas por região. A análise dos dados foi realizada por meio de tabulação e cálculos de frequência relativa (percentual de cesarianas em relação ao total de nascidos vivos) por meio do software PSPP (distribuição livre).



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre 2013 e 2023, foram registrados 17.567.559 partos cesáreos no Brasil, conforme dados analisados. A Região Sudeste concentrou a maior parte das cesarianas, representando 40,78% do total nacional, seguida pelas Regiões Nordeste (25,78%) e Sul (14,86%). As Regiões Centro-Oeste e Norte apresentaram proporções semelhantes, com 9,34% e 9,25%, respectivamente. Esse perfil regional é compatível com a distribuição dos nascimentos, mas revela também uma elevada incidência de cesarianas nas regiões de maior urbanização e acesso a serviços privados de saúde. Esse dado está de acordo com Faúndes e Cecatti (2005), que afirmam que a maior taxa de cesarianas no Brasil ocorre em regiões mais ricas pela maior facilidade de acesso aos serviços privados de saúde.

No período de 2013 a 2023, observou-se uma tendência geral de redução no número de partos cesáreos no Brasil, com flutuações ao longo dos anos. Em 2013, foram registrados 1.644.557 partos cesáreos, número que diminuiu progressivamente, atingindo 1.512.021 em 2023, conforme dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). A Região Sudeste liderou em número absoluto de cesáreas durante todo o período, com destaque para o ano de 2014 (722.007 cesáreas), seguido por uma queda contínua até 2023. O Nordeste permaneceu como a segunda região em volume de cesáreas, com estabilidade relativa entre os anos, embora também com tendência de redução a partir de 2019. Nas Regiões Sul, Centro-Oeste e Norte, o comportamento foi semelhante, com discretas variações anuais, mas manutenção de patamares menores em comparação ao Sudeste e Nordeste. Destaca-se que o ano de 2020, correspondente ao início da pandemia de COVID-19, não apresentou aumento expressivo de cesáreas em relação a anos anteriores, apesar das modificações nos fluxos de atendimento obstétrico. Nesse sentido, o estudo de Dias *et al.* (2022) identificou que essa redução na taxa de realização de cesáreas identificada entre o período de 2013 a 2023 pode estar associada a alterações no sistema de cuidado ao parto, no fortalecimento de políticas públicas e no estímulo ao parto vaginal após cesáreas em gestação subsequente, que são abordagens essenciais que estão contribuindo para a tentativa de diminuição da taxa de cesarianas no Brasil.

A distribuição por grau de instrução da mãe mostra que a maioria dos nascimentos está concentrada nas categorias de menor escolaridade, com destaque para a faixa de 4 a 7 anos de instrução (10.175.060 nascimentos) em todas as regiões, indicando que um grande número de mães tem níveis de escolaridade baixos. A categoria "Ignorado", que representa os dados ausentes sobre a instrução materna, também possui uma quantidade relevante (214.083), o que pode influenciar a interpretação dos resultados, especialmente em áreas com dificuldades de coleta de dados. Observa-se que a Região Norte e Nordeste concentram a maior parte dos nascimentos de mães com instrução de 1 a 3 anos, sugerindo uma maior vulnerabilidade educacional nessas regiões, enquanto o Sudeste e o Sul apresentam uma distribuição mais equilibrada, com uma maior concentração de mães com escolaridade de 8 a 11 anos. Paradoxalmente, na literatura é descrito que as maiores taxas de cesárea acontecem em mulheres com maior nível escolar. No entanto, pelos resultados encontrados é necessário destacar que Gama *et al.* (2014) afirma que as disparidades regionais refletem desigualdades no acesso à educação e aos serviços de saúde, e evidenciam a necessidade de políticas públicas mais eficazes para combater desigualdades, especialmente nas regiões com menores índices educacionais que consequentemente demonstraram maiores taxas de nascimentos cesáreos neste estudo.

A faixa etária mais prevalente para os nascimentos cesáreos é a de 20 a 24 anos, com 3.777.382 casos, seguida pela faixa de 25 a 29 anos (4.429.695). Mães mais velhas, como as de 35 a 39 anos (2.539.791) e 40 a 44 anos (655.459), apresentam números expressivos,



refletindo o aumento das cesáreas em idades mais avançadas. A faixa de 10 a 14 anos, que pode indicar gravidez precoce, apresenta 87.907 casos, o que chama atenção para o problema das gestações em idades muito jovens. Já nas faixas mais avançadas, como 45 a 49 anos (39.212) e 50 a 54 anos (2.469), os números são bem menores, mas ainda assim indicam a ocorrência de partos cesáreos em idades cada vez mais avançadas. A Região Norte e a Região Nordeste concentram a maior parte dos nascimentos em faixas etárias mais jovens, enquanto a Região Sudeste e a Região Sul mostram maior concentração de nascimentos em mães de 20 a 34 anos, um reflexo de características demográficas e de acesso à saúde mais consolidadas. Esses dados reforçam a necessidade de políticas públicas focadas na educação sexual, saúde materna e acessibilidade ao pré-natal, especialmente nas regiões com maior incidência de nascimentos em idades precoces e avançadas. Ainda nesse contexto, Gama *et al.* (2014) destaca que no caso das adolescentes, o primeiro parto por via abdominal pode causar maior prejuízo, haja vista a tendência de se privilegiar a via de parto anterior nos partos subsequentes.

A distribuição regional mostra que a Região Sudeste apresenta o maior número de nascimentos em gestação completa (37 a 41 semanas) com 6.143.075 casos. Em termos de nascimentos prematuros, a Região Nordeste também registra números elevados, com 1.067 nascimentos abaixo de 22 semanas e 13.430 entre 22 e 27 semanas. A Região Norte apresenta uma proporção significativa de nascimentos prematuros (424 com menos de 22 semanas e 4.578 entre 22 e 27 semanas), o que pode ser indicativo de dificuldades no acesso a cuidados médicos adequados ou complicações regionais específicas. As Regiões Sul e Centro-Oeste apresentam números mais equilibrados, com a maioria dos nascimentos ocorrendo dentro da faixa de gestação entre 37 e 41 semanas. No entanto, a Região Sul apresenta uma menor quantidade de nascimentos prematuros, com 287 registros para menos de 22 semanas e 9.564 entre 22 e 27 semanas, refletindo um padrão mais favorável em termos de gestão da gestação. Nesse contexto, Silva *et al.* (2019) destaca a importância de um acompanhamento gestacional adequado e o fortalecimento dos serviços de saúde materno-infantil, especialmente para evitar a incidência de nascimentos prematuros e suas possíveis repercussões na saúde materna e fetal.

A Região Sudeste concentra o maior número de nascimentos com pré-natal adequado, com 4.800.592 casos, o que pode ser atribuído a maior acesso a serviços de saúde na região. Em comparação, a Região Nordeste também apresenta uma quantidade expressiva de nascimentos com pré-natal adequado (2.515.166), embora o número de gestantes com pré-natal inadequado seja significativamente alto (667.101), o que reflete desafios no acesso e na qualidade do acompanhamento pré-natal na região. A Região Norte tem o maior número de gestantes que não fizeram pré-natal (6.109), o que pode indicar áreas remotas ou de difícil acesso à saúde. A Região Centro-Oeste também apresenta uma parte significativa de gestantes com pré-natal inadequado (204.989). Esses dados sugerem que, embora um grande número de gestantes receba o acompanhamento pré-natal adequado, ainda há desafios significativos, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, em relação à qualidade e ao acesso a cuidados adequados. Nesse sentido, o estudo de Faúndes e Cecatti (2005) reflete a necessidade do acompanhamento precoce e de qualidade para a redução de complicações no parto e no pós-parto, com o mínimo de 6 consultas no pré-natal a fim de evitar minimizar essas taxas de complicações. Desse modo, é necessário um esforço contínuo para melhorar a cobertura e a adequação do pré-natal, especialmente em áreas mais carentes como as que foram evidenciadas nesta pesquisa.



CONCLUSÃO

A conclusão deste estudo reafirma a tendência de redução no número de partos cesáreos no Brasil entre 2013 e 2023, destacando a concentração das cesáreas nas regiões Sudeste e Nordeste, refletindo a urbanização e o acesso desigual aos serviços de saúde. Ao relembrar os objetivos de analisar a distribuição regional e os fatores associados aos partos cesáreos, é possível concluir que, apesar dos avanços, ainda existem desafios consideráveis em relação ao acesso a cuidados de saúde, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a cobertura e a qualidade do pré-natal ainda são insuficientes. A discrepância nos níveis de escolaridade materna e a prevalência de nascimentos em faixas etárias mais jovens sugerem a necessidade urgente de políticas públicas direcionadas à educação sexual, ao aumento da cobertura do pré-natal e à melhoria dos serviços de saúde materno-infantil. Assim, é fundamental que os responsáveis pela formulação de políticas públicas atuem de maneira mais efetiva para reduzir essas desigualdades regionais e garantir uma atenção à saúde mais equitativa em todo o território nacional.

Palavras-chave: Brasil; Cesárea; Parto; Prevalência; Saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTOINE, Clarel *et al.* Cesarean section one hundred years 1920–2020: the good, the bad and the ugly. **Journal Of Perinatal Medicine**, [S.L.], v. 49, n. 1, p. 5-16, 4 set. 2020. Walter de Gruyter GmbH. <http://dx.doi.org/10.1515/jpm-2020-0305>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32887190/>. Acesso em: 26 maio 2025.

BETRAN, Ana Pilar *et al.* Trends and projections of caesarean section rates: global and regional estimates. **Bmj Global Health**, [S.L.], v. 6, n. 6, jun. 2021. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005671>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34130991/>. Acesso em: 27 maio 2025.

CÂMARA, Raphael *et al.* Cesarean section by maternal request. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, [S.L.], v. 43, n. 4, p. 301-310, ago. 2016. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0100-69912016004002>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27679953/>. Acesso em: 26 maio 2025.

DIAS, Barbara Almeida Soares *et al.* Variações das taxas de cesariana e cesariana recorrente no Brasil segundo idade gestacional ao nascer e tipo de hospital. **Cadernos de Saúde Pública**, [S.L.], v. 38, n. 6, 2022. Fap UNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311xpt073621>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/dWSp5tyhCLmGZRttNQ6n3hg/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

Faúndes A, Cecatti JG. A operação cesárea no Brasil: incidência, tendências, causas, conseqüências e propostas de ação [Cesarean section in Brazil: incidence, trends, causes, consequences and suggestions for change]. **Cad Saude Publica**. 1991 Apr- Jun;7(2):150-73. Portuguese. doi: 10.1590/s0102-311x1991000200003. Epub 2005 Apr 8. PMID: 15830039.

GAMA, Silvana Granado Nogueira da *et al.* Fatores associados à cesariana entre primíparas adolescentes no Brasil, 2011-2012. **Cadernos de Saúde Pública**, [S.L.], v. 30, n. 1, p. 117-127, ago. 2014. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00145513>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csp/a/qd3C5QwSCTdx9rZgFcpZHYP/?lang=pt>. Acesso em: 27 abr.



2025.

SILVA, Aline Palermo da *et al.* As indicações de cesáreas no Brasil: uma revisão de literatura integrativa. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, [S.L.], n. 24, 29 jun. 2019. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**. <http://dx.doi.org/10.25248/reas.e624.2019>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/624>. Acesso em: 24 abr. 2025.

SPONG, Catherine Y. *et al.* Prevention of the First Cesarean Delivery. **Obstetrics And Gynecology Clinics Of North America**, [S.L.], v. 42, n. 2, p. 377-380, jun. 2015. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ogc.2015.01.010>. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26002173/>. Acesso em: 27 maio 2025.



QUANDO O CUIDAR ADOECE: REPERCUSSÕES PSICOSSOCIAIS DA PANDEMIA NOS TRABALHADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

¹Luciene Rodrigues Barbosa

¹Universidade de Brasília. Brasília, Distrito Federal, Brasil

Área temática: Saúde Mental

Resumo: Objetivo: investigar os principais fatores associados ao sofrimento psíquico dos profissionais da APS, bem como os mecanismos de enfrentamento utilizados. Métodos: revisão de escopo conduzida segundo o Manual JBI e o checklist PRISMA-ScR. Aplicou-se a estratégia PCC e realizaram-se buscas nas bases BVS, MEDLINE/PubMed, estudos originais publicados entre 2020 e 2023 em inglês, português ou espanhol. Após triagem no Rayyan e extração padronizada, 19 artigos. Resultados: prevaleceram delineamentos quantitativos transversais com médicos, enfermeiros e demais trabalhadores da APS. Ansiedade, estresse psicológico, medo de contágio, exaustão e sintomas depressivos foram as manifestações mais frequentes. Os principais estressores foram sobrecarga assistencial, déficit de equipamentos de proteção, comunicação institucional inconsistente e incerteza frente a protocolos mutáveis. Como fatores protetores destacaram-se apoio interprofissional, suporte psicológico, fornecimento adequado de EPIs, telemedicina, flexibilização de escalas e práticas integrativas de autocuidado. A combinação de demandas ampliadas, instabilidade organizacional e insegurança biológica criou ambiente propício ao adoecimento mental, repercutindo sobre desempenho e retenção de pessoal; organizações que adotaram múltiplas camadas de proteção relataram menor prevalência de agravos. Conclusão: a pandemia revelou a vulnerabilidade psicossocial dos profissionais da APS e reforçou a urgência de políticas permanentes de saúde ocupacional, comunicação transparente e infraestrutura resiliente para sustentar o primeiro nível de atenção em futuras crises.

INTRODUÇÃO

Organização Mundial da Saúde (OMS), em março de 2020, a declarou a COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, como pandemia. A rápida disseminação da doença impôs desafios sem precedentes à saúde pública global e abalou profundamente as economias internacionais (CHEN, et al, 2021; RIEDEL et al, 2021). A elevada transmissibilidade do vírus e seus efeitos severos sobre o organismo humano sobrecarregaram sistemas de saúde já fragilizados. Foram necessárias respostas imediatas, entre elas o distanciamento social, que transformou a rotina das populações e o funcionamento das economias locais (COSTA et al, 2023). Os primeiros casos no Brasil foram registrados entre fevereiro e março de 2020, desencadeando sucessivas ondas de infecção e, em várias regiões, o colapso da capacidade assistencial. Para enfrentar a crise, ampliou-se a força de trabalho na linha de frente, expondo profissionais de saúde a jornadas exaustivas, alto risco de contaminação e intenso desgaste emocional diante da gravidade dos casos atendidos (WALTON et al, 2020; XIAO et al, 2021). Esses trabalhadores acabaram por constituir um dos grupos mais vulneráveis aos impactos físicos e psíquicos da pandemia. A convivência constante com o sofrimento, os dilemas éticos e a escassez de insumos contribuíram para elevar os níveis de estresse, ansiedade, esgotamento e sintomas depressivos (CZ EPIEL et al, 2022; SERPA et al, 2022).



Ocorrências de estigmatização e violência agravaram o quadro, evidenciando a urgência de intervenções psicossociais estruturadas. Embora a Atenção Primária à Saúde (APS) tenha desempenhado papel central na resposta sanitária, o período revelou fragilidades históricas do nível primário, como sobrecarga de trabalho, insuficiência de materiais e a necessidade de integrar rapidamente modalidades como a telemedicina (DAWSON et al, 2021; DE VROEGE; VAN DEN BROEK, 2022). Compreender os fatores associados ao sofrimento psíquico desses profissionais – e os mecanismos de enfrentamento adotados – é essencial para fortalecer o sistema de saúde e subsidiar políticas que promovam ambientes laborais seguros e saudáveis. Parte-se do pressuposto de que os trabalhadores da APS, por atuarem diretamente nos territórios e lidarem com múltiplas demandas assistenciais, experimentaram níveis acentuados de sofrimento mental, repercutindo em sua saúde e desempenho profissional. Contudo, observa-se uma lacuna na literatura quanto à sistematização desses impactos em âmbito internacional; a maioria dos estudos concentra-se no contexto hospitalar, o que limita a compreensão das especificidades e vulnerabilidades próprias da atenção primária

OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo investigar os principais fatores associados ao sofrimento psíquico dos profissionais da APS, bem como os mecanismos de enfrentamento utilizados.

METODOLOGIA

Esta revisão de escopo foi conduzida de acordo com o *Joanna Briggs Institute Manual for Evidence Synthesis* e seguiu as recomendações do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses – Extension for Scoping Reviews* (PRISMA-ScR). A pergunta norteadora foi: “Quais evidências científicas descrevem os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre a saúde mental dos profissionais da Atenção Primária à Saúde engajados no atendimento direto aos pacientes?”. A estratégia de busca baseou-se no mnemônico PCC, em que a população correspondeu a profissionais de saúde ativos durante a pandemia, o conceito abrangeu os impactos na saúde mental decorrentes do atendimento a casos de COVID-19 e o contexto se restringiu à APS. A coleta de dados ocorreu entre março e abril de 2025. Foram elegíveis artigos originais, de qualquer delineamento metodológico, publicados entre 2020 e 2023, nos idiomas inglês, português ou espanhol. Excluíram-se revisões, editoriais, cartas, relatos de caso, teses, dissertações e literatura cinzenta. Os descritores foram ajustados aos vocabulários DeCS e MeSH; empregaram-se os operadores booleanos “OR” e “AND” para combinar os componentes do PCC. As buscas ocorreram nas seguintes bases: Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde, MEDLINE/PubMed. Filtros limitaram os resultados a textos completos gratuitos, dentro do intervalo 2020-2023 e nos idiomas definidos. Os registros recuperados foram importados para o software *Rayyan*, onde se procedeu à identificação de duplicatas e à triagem cega de títulos e resumos por dois avaliadores independentes. Após a leitura integral, a avaliadora extraíu informações sobre título, autores, ano, país, periódico, objetivos, delineamento, participantes, instrumentos de coleta, formato de publicação, bem como descrições dos impactos na saúde mental, fatores estressores e protetores. Os dados foram compilados em planilha do Microsoft Excel e analisados no *Jamovi* (versão 2.6.0).



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados um total de 489 registros, após a remoção de 27 duplicatas, restaram 462 títulos e resumos para triagem. Desses, 370 não atenderam aos critérios de elegibilidade. A leitura integral dos 92 estudos potencialmente relevantes levou à exclusão de outros 73, resultando em 19 artigos que compuseram a amostra final. Os trabalhos analisados são predominantemente do Brasil ($n = 8$; 42 %), China ($n = 7$; 36%) e EUA ($n = 5$; 26%). A maior parte empregou delineamentos quantitativos ($n = 15$; 80%), sobretudo estudos transversais ($n = 15$; 80 %); 4 artigos utilizaram metodologias qualitativas 20 %). No que se refere aos participantes, médicos ($n = 7$; 36%) e enfermeiros ($n = 8$; 42%) foram os grupos mais investigados, seguidos por técnicos ou auxiliares de enfermagem ($n = 4$; 21%). O presente estudo evidenciou a intrincada interação entre fatores estressores e protetores que moldaram a experiência dos profissionais da APS durante a pandemia de COVID-19, salientando os impactos substanciais sobre sua saúde mental (DUARTE, et al, 2022; FIOL-DEROQUE et al, 2021). O contexto pandêmico esteve associado a aumento da prevalência de ansiedade, depressão e síndrome de Burnout, comprometendo o bem-estar desses trabalhadores e a qualidade da assistência prestada. Na linha de frente da resposta à COVID-19, os profissionais da APS enfrentaram medo constante de contágio, escassez de recursos e necessidade de adaptação a protocolos mutáveis. Esse cenário elevou os níveis de estresse psicológico, manifestados por ansiedade, insônia, irritabilidade e dificuldade de concentração, desencadeados sobretudo pela incerteza de infectar familiares. Mudanças frequentes nos fluxos de atendimento mantiveram um estado de alerta contínuo, amplificando o desgaste emocional (GOLD, 2020; GUIMARÃES-TEIXEIRA et al, 2023). O aumento da carga de trabalho, aliado à vivência de óbitos de pacientes, agravou o sofrimento psíquico e ameaçou a motivação e a capacidade de adaptação às novas rotinas da APS (LAK et al, 2022). A ausência de suporte psicológico estruturado intensificou sintomas depressivos, relatados como tristeza, desesperança e ideação suicida. Insônia, fadiga crônica e lapsos de atenção impactaram negativamente a qualidade de vida e o desempenho profissional. Entre os fatores estressores identificados, destacaram-se jornadas exaustivas, redução de períodos de descanso, déficit de equipamentos de proteção individual (EPIs), acúmulo de funções e comunicação interna inconsistente (LUCENO-MORENO et al, 2022). Questões de gênero agravaram a vulnerabilidade das mulheres, que conciliaram responsabilidades domésticas e pressões profissionais sem respaldo adequado. O isolamento social contribuiu para sentimento de culpa, solidão e aumento da ansiedade, sobretudo entre profissionais jovens ou sem rede de apoio familiar. A combinação desses elementos resultou na elevação dos casos de síndrome de Burnout, caracterizada por exaustão extrema, despersonalização e redução da realização profissional, o que favoreceu rotatividade de pessoal e sobrecarga adicional sobre as equipes remanescentes. Por outro lado, diversos fatores protetores mitigaram o impacto psicológico (MASCAYANO et al, 2022; NICOLATO et al, 2023). A adoção de práticas integrativas e complementares, como meditação e aromaterapia, aliada a intervenções convencionais, revelou-se eficaz na redução do estresse. A telemedicina assegurou continuidade do cuidado, minimizando a exposição ao vírus. Apoio interprofissional, redes de reflexão e programas formais de aconselhamento fortaleceram a resiliência dos profissionais (RAUDENSKÁ et al, 2020). Medidas organizacionais — flexibilização de escalas, redução de demandas burocráticas, implementação de protocolos de biossegurança e fornecimento regular de EPIs — reduziram a percepção de vulnerabilidade (SØVOLD et al, 2021; SURYAVANSHI et al, 2020). Incentivos financeiros demonstraram correlação inversa com os índices de Burnout, enfatizando a relevância da valorização profissional. A promoção de atividades físicas,



espirituais e de lazer, aliada ao fortalecimento de vínculos familiares, contribuiu para o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Capacitações contínuas, ambiente laboral estruturado e testagem disponível para Teste rápido reforçaram a sensação de segurança e controle. À luz desses achados, recomenda-se o fortalecimento da resiliência dos sistemas de saúde mediante investimentos em infraestrutura, capacitação permanente e planejamento estratégico, bem como a implantação de sistemas de monitoramento da capacidade operacional e do uso eficiente de recursos, a fim de aprimorar a resposta a futuras crises sanitárias. **Limitações do estudo:** a maioria dos estudos não forneceu estimativas padronizadas da magnitude dos sintomas; quando disponíveis, tais dados devem ser apresentados em tabela específica para permitir comparação entre contextos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos mapeados convergem ao demonstrar que o trabalho cotidiano de enfrentamento da COVID-19 na Atenção Primária à Saúde foi acompanhado por sobrecarga emocional inédita. Essa repercussão não se restringiu à esfera individual: repercutiu na qualidade do cuidado, na rotatividade de pessoal e na continuidade das ações territoriais de prevenção e manejo de casos leves. Nota-se que tais agravos derivaram de uma combinação de fatores: pressão assistencial crescente, incerteza epidemiológica, déficit de recursos materiais, dilemas éticos frente à escassez e temor constante de transmitir o vírus a familiares. O desafio que se impõe aos gestores é consolidar permanentemente esses dispositivos de proteção, transformando aprendizados emergenciais em estratégias de rotina que reforcem a resiliência do primeiro nível de atenção diante de futuras crises.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; COVID-19; Profissionais de Saúde; Saúde Mental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CHEN, Bin; YANG, Ting; XIAO, Lei. Mental health in COVID-19 Delta variant survivors and healthcare workers during the 2021 outbreak in Nanjing, China: a cross-sectional study. **Canadian Journal of Physiology and Pharmacology**, Ottawa, v. 100, n. 7, p. 702-711, 2022. DOI: 10.1139/cjpp-2021-0663.
- COSTA, Alexandra; CALDAS DE ALMEIDA, Teresa; FIALHO, Mónica et al. Mental health of healthcare professionals: two years of the COVID-19 pandemic in Portugal. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, Basel, v. 20, n. 4, 3131, 2023. DOI: 10.3390/ijerph20043131.
- CZ EPIEL, Diana; JEZERSKI, Markus; HUßMANN, Barbara et al. The association between exposure to COVID-19 and mental health outcomes among healthcare workers. **Frontiers in Public Health**, Lausanne, v. 10, 958310, 2022. DOI: 10.3389/fpubh.2022.958310.
- DAWSON, Sarah; SEYMOUR, Catherine; KOUSOULIS, Antonis A. et al. Mental health among healthcare workers and other vulnerable groups during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. **PLoS ONE**, San Francisco, v. 16, n. 8, e0254821, 2021. DOI: 10.1371/journal.pone.0254821.
- DE VROEGE, Lars; VAN DEN BROEK, Anneloes. Substantial impact of COVID-19 on self-reported mental health and ability to work among healthcare professionals. **Frontiers in Public Health**, Lausanne, v. 9, 730823, 2021. DOI: 10.3389/fpubh.2021.730823.
- DUARTE, Inês; TEIXEIRA, Andreia; CASTILHO, Tânia et al. Impact of the COVID-19 pandemic on the mental health of healthcare workers during the first wave in Portugal: a



mixed-methods study. **BMJ Open**, London, v. 12, e063443, 2022. DOI: 10.1136/bmjopen-2022-063443.

FIOL-DEROQUE, Maria Antònia; SERRANO-RIPOLL, Maria Jesús; JIMÉNEZ, Rafael et al. A mobile phone-based intervention to reduce mental health problems in health care

workers during the COVID-19 pandemic (PsyCovidApp): randomized controlled trial.

JMIR mHealth and uHealth, Toronto, v. 9, n. 5, e27039, 2021. DOI: 10.2196/27039.

GOLD, Jessica A. Covid-19: adverse mental health outcomes for health-care workers.

BMJ, London, v. 369, m1815, 2020. DOI: 10.1136/bmj.m1815.

GUIMARÃES-TEIXEIRA, Eleny; MACHADO, Antônio Vieira; LOPES NETO, David et al. Comorbidades e saúde mental dos trabalhadores da saúde no Brasil: o impacto da

pandemia da COVID-19. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 10, p. 2823-2832, 2023. DOI: 10.1590/1413-812320232810.10192023.

LAKE, Eileen T.; NARVA, Aliza M.; HOLLAND, Sara et al. Hospital nurses' moral distress and mental health during COVID-19. **Journal of Advanced Nursing**, Oxford, v. 78, n. 3, p. 799-809, 2022. DOI: 10.1111/jan.15013.

LUCEÑO-MORENO, Lourdes; TALAVERA-VELASCO, Beatriz; VÁZQUEZ-ESTÉVEZ, Daniel et al. Mental health, burnout, and resilience in healthcare professionals after the first wave of COVID-19 pandemic in Spain: a longitudinal study. **Journal of Occupational and Environmental Medicine**, Philadelphia, v. 64, n. 3, p. e114-e123, 2022. DOI: 10.1097/JOM.0000000000002464.

MASCAYANO, Florencia; VAN DER VEER, Kathleen; MENNEN, Tess et al. Impact of COVID-19 on the mental health of frontline health workers: a rapid review and meta-analysis. **International Journal of Nursing Studies**, Oxford, v. 125, 104095, 2022. DOI: 10.1016/j.ijnurstu.2021.104095.

NICOLATO, Rodrigo; FERNANDES MALLOY-DINIZ, Leandro; COSTA, Danielle de Souza et al. Mental health and sleep disturbances among healthcare professionals during the COVID-19 pandemic in Brazil. **Journal of Affective Disorders**, Amsterdam, v. 323, p. 472-481, 2023. DOI: 10.1016/j.jad.2022.11.082.

RAUDENSKÁ, Jaroslava; STEINEROVÁ, Veronika; JAVŮRKOVÁ, Alena et al. Occupational burnout syndrome and post-traumatic stress among healthcare professionals during the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. **Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology**, Amsterdam, v. 34, n. 3, p. 553-560, 2020. DOI: 10.1016/j.bpa.2020.07.008.

RIEDEL, Brittney; HOREN, Sydney R.; REYNOLDS, Allie; HAMIDIAN JAHROMI, Alireza. Mental health disorders in nurses during the COVID-19 pandemic: implications and coping strategies. **Frontiers in Public Health**, Lausanne, v. 9, 707358, 2021. DOI: 10.3389/fpubh.2021.707358.

SERPA, Alexandre Luiz de Oliveira; PINTO, André Luiz Braule; DIAZ, Alexandre Paim et al. The mental health of Brazilian healthcare professionals during the COVID-19 pandemic: a longitudinal study. **Brazilian Journal of Psychiatry**, São Paulo, v. 44, n. 4, p. 401-408, 2022. DOI: 10.47626/1516-4446-2021-2347.

SØVOLD, Lene E.; NASLUND, John A.; KOUSOULIS, Antonis A. et al. Prioritizing the mental health and well-being of healthcare workers: an urgent global public health priority. **Frontiers in Public Health**, Lausanne, v. 9, 679397, 2021. DOI: 10.3389/fpubh.2021.679397.

SURYAVANSHI, Nishi; KADAM, Abhay; DHUMAL, Gauri et al. Mental health and quality of life among healthcare professionals during the COVID-19 pandemic in India. **Brain and Behavior**, Hoboken, v. 10, n. 11, e01837, 2020. DOI: 10.1002/brb3.1837.



WALTON, Matthew; MURRAY, Esther; CHRISTIAN, Michael D. Mental health care for medical staff and affiliated healthcare workers during the COVID-19 pandemic. **European Heart Journal – Acute Cardiovascular Care**, London, v. 9, n. 3, p. 241-247, 2020. DOI: 10.1177/2048872620922795.

XIAO, Hong; ZHANG, Yiming; KONG, Dongning et al. Physical activity levels and mental health burden of healthcare workers during the COVID-19 lockdown. **BMC Public Health**, London, v. 21, 15235, 2021. DOI: 10.1186/s12889-021-15235-2.



PROMOÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA COM A ENTREGA DE KITS DE HIGIENE E ALIMENTOS: EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA

¹Maria Camilla Lima Coêlho de Santana

²Sarah Nóbrega Cavalcanti

³Ana Beatriz Lins de Oliveira Lima

⁴Germann da Cunha Farias Rodrigues Macena Gomes

⁵Débora Sérvulo da Nóbrega Chaves

⁶Heloisa Assis Wanderley

⁷Layza de Souza Chaves Deininger

^{1,2,3,4,5,6,7} AFYA Faculdade de Ciências Médicas. João Pessoa, PB, Brasil.

Área temática: Saúde Coletiva

Resumo: O presente relato descreve a experiência de um projeto de extensão universitária voltado à promoção da saúde de pessoas em situação de rua, por meio da entrega de kits de higiene pessoal e alimentos, com o objetivo de reduzir vulnerabilidades e fomentar ações básicas de cuidado e bem-estar. A metodologia envolveu a mobilização de doações, montagem dos kits e abordagem direta à população, com orientações sobre higiene corporal e alimentação saudável, além de escuta ativa. A ação ocorreu em pontos estratégicos da cidade de João Pessoa, com a participação de estudantes do curso de medicina da faculdade de ciências médicas da Paraíba, sob supervisão docente. Foram distribuídos 300 kits, possibilitando aproximação, acolhimento e identificação de demandas sociais e de saúde não atendidas. Os resultados demonstraram a importância do vínculo e da abordagem humanizada, promovendo benefícios imediatos à população atendida e impactando positivamente a formação dos estudantes. Conclui-se que a extensão universitária constitui ferramenta essencial para a promoção da equidade em saúde, aliando conhecimento acadêmico à responsabilidade social.

INTRODUÇÃO

A população em situação de rua constitui um grupo social exposto a múltiplas privações e vulnerabilidades, que comprometem a saúde física, mental e social. A precariedade das condições de vida dificulta a prevenção de doenças e o acesso a serviços essenciais, acentuando desigualdades e promovendo exclusão social (BRASIL, 2022). Nesse cenário, a promoção da saúde configura-se como estratégia fundamental para mitigar os efeitos das desigualdades, por meio de ações acessíveis e humanizadas. A universidade, através da extensão, desempenha papel social relevante ao aproximar o conhecimento acadêmico das realidades vulneráveis, promovendo intervenções práticas e educativas que respeitam a dignidade e os direitos humanos. A entrega de kits de higiene e alimentos representa uma iniciativa que, além de suprir necessidades imediatas, permite a aproximação e a orientação em saúde, favorecendo o cuidado integral (SILVA; SOUZA, 2023).

Este relato descreve a experiência extensionista de promoção da qualidade de saúde de pessoas em situação de rua, visando contribuir para o fortalecimento de vínculos sociais e para a formação acadêmica pautada na equidade e na justiça social.



OBJETIVO

Relatar a experiência extensionista de promoção da saúde de pessoas em situação de rua, realizada por meio da entrega de kits de higiene pessoal e alimentos, destacando sua contribuição para a redução de vulnerabilidades e a formação acadêmica comprometida com a responsabilidade social.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência, com abordagem qualitativa, realizado no âmbito de um projeto de extensão da faculdade de ciências médicas da Paraíba, situada na cidade de João Pessoa, durante o período de maio de 2025. A equipe executora foi composta por estudantes do curso de medicina, do terceiro período, sob orientação de docentes vinculados ao projeto de extensão em Saúde Coletiva. A ação envolveu a mobilização de doações junto à comunidade acadêmica e parceiros locais, resultando na montagem de 300 kits contendo itens básicos de higiene pessoal (escova e pasta dentais, sabonete, absorventes, preservativos) e alimentos prontos para consumo. A distribuição foi realizada ao longo de [número de ações: ex., quatro] ações, em locais previamente mapeados como pontos de concentração de pessoas em situação de rua, majoritariamente compostas por homens adultos, com menor presença de mulheres e idosos. Durante as abordagens, foi realizada escuta ativa e oferta de orientações sobre práticas de autocuidado, prevenção de doenças e alimentação saudável. As atividades foram supervisionadas por docente responsável, garantindo a segurança, a ética e a qualidade da intervenção. Os dados apresentados resultaram de registros em diários de campo e observações diretas feitas pelos estudantes, compondo a base para a análise qualitativa da experiência, focada nos efeitos percebidos na população atendida e na formação acadêmica dos envolvidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao todo, foram distribuídos 300 kits, em diversos pontos estratégicos da cidade. A população atendida acolheu positivamente a iniciativa, demonstrando gratidão e interesse pelas orientações repassadas durante os atendimentos. Além da entrega dos itens, a abordagem humanizada propiciou momentos de escuta e construção de vínculos, considerados fundamentais para o fortalecimento da confiança e para o acolhimento. Muitos relataram dificuldades de acesso a cuidados básicos de saúde e expressaram sentimentos de abandono institucional, aspectos consistentes com a literatura sobre vulnerabilidade social (MACHADO; ALMEIDA, 2023). Os estudantes envolvidos relataram impacto significativo na formação pessoal e profissional, destacando o desenvolvimento de competências como empatia, comunicação, trabalho em equipe e uma visão mais crítica e sensível sobre as desigualdades sociais e os determinantes sociais da saúde. Importante destacar que as percepções de impacto e melhora na autoestima dos atendidos basearam-se exclusivamente em observações diretas e relatos espontâneos, não tendo sido utilizados instrumentos padronizados de avaliação, o que configura uma limitação da experiência. A vivência prática reforçou a importância de ações simples, mas com elevado potencial de transformação, sobretudo quando pautadas no acolhimento e no respeito à dignidade humana. A presença da universidade em espaços marcados pela exclusão social contribui para o cuidado imediato e para a sensibilização social, além de fortalecer a formação cidadã dos futuros profissionais de saúde.

CONCLUSÃO

A experiência relatada evidencia a relevância de iniciativas extensionistas na



promoção da saúde de populações em situação de vulnerabilidade social. Embora não se possa afirmar, com base nesta experiência, a redução efetiva das vulnerabilidades, observa-se que a ação possibilitou o acesso a itens essenciais de cuidado pessoal, além de proporcionar momentos de acolhimento e orientação em saúde.

Para os estudantes, a atividade constituiu oportunidade enriquecedora de formação ética, social e profissional, favorecendo a ampliação do olhar sobre as desigualdades e sobre o papel transformador da universidade. Recomenda-se que projetos dessa natureza sejam mantidos e ampliados, reconhecendo a extensão universitária como instrumento estratégico para a integração entre ensino e responsabilidade social, e para a promoção da equidade em saúde.

Palavras-chave: Higiene; Mobilização social; Pessoas em Situação de Rua; Promoção da Saúde; Vulnerabilidade Social.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Política Nacional para a População em Situação de Rua. Brasília: MS, 2022.

MACHADO, P. F.; ALMEIDA, L. R. Determinantes sociais de saúde e vulnerabilidades da população em situação de rua: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Saúde Coletiva**, v. 28, n. 2, p. 123-134, 2023.

SILVA, J. M.; SOUZA, A. C. S. Extensão universitária como ferramenta de promoção da saúde em populações vulneráveis. **Cadernos de Extensão Universitária**, v. 15, n. 1, p. 45-55, 2023.



AQUECENDO VIDAS: PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E SEU IMPACTO NA FORMAÇÃO MÉDICA

¹Alcindo Abrantes da Silva Neto

²Anna Beatriz Araujo Medeiros

³Maria Carolina da Rocha Emerenciano César

⁴Iure Gomes Almeida

⁵Abraão Vitor de Oliveira Silva

⁶Ítalo de Almeida Paulo

⁷Rodolfo Mateus Lucena da Nóbrega

⁸Aralinda Nogueira Pinto de Sá

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil.

Área temática: Educação em Saúde.

Resumo: No Brasil, estima-se que a cada 1000 brasileiros 1 esteja em situação de rua, ressaltando a necessidade de ações que reduzam as desigualdades e vulnerabilidades deste público. Este trabalho relata uma ação extensionista de saúde realizada em maio de 2025, em João Pessoa (PB) voltada para pessoas em situação de rua (PSR), e em parceria com uma comunidade religiosa. O objetivo do trabalho é relatar a experiência dos discentes em medicina sobre a vivência e percepções durante uma ação em saúde com pessoas em situações de rua, oriunda de um projeto de extensão universitária. A metodologia consistiu na abordagem direta das PSR durante o período noturno, com entrega de alimentos e itens de uso pessoal, acompanhada de orientações sobre serviços públicos de saúde e direitos constitucionais. Os resultados evidenciaram que a ação supriu necessidades básicas imediatas e fortaleceu o sentimento de acolhimento e valorização entre os participantes. Observou-se que muitos desconheciam o acesso aos serviços de saúde, o que reforça a importância de iniciativas informativas e inclusivas. Para os discentes, a experiência proporcionou contato direto com as vulnerabilidades e desafios enfrentados por essa população, promovendo uma formação mais sensível e humanizada. Conclui-se que ações como esta são essenciais para mitigar desigualdades, promover inclusão social e ampliar o acesso à saúde, além de contribuir significativamente para a formação médica dos envolvidos.

INTRODUÇÃO

De acordo com a Política Nacional para a População em Situação de Rua de 2009, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória (Brasil, 2009)

As pessoas em situação de rua (PSR) são constantemente expostas a diferentes tipos de vulnerabilização e condições de vida degradantes, aumentando o desafio para o cuidado em saúde e necessitando de intervenções específicas (Gioseffi; Batista; Brignol, 2022). A vulnerabilidade é como a sobreposição de diversos fatores capaz de tornar um indivíduo ou



um grupo mais suscetível aos riscos e imprevisibilidades da vida, podendo estar relacionadas com a estrutura de oportunidades vivenciadas pelo indivíduo e com as características sociais, econômicas, culturais e políticas do lugar (Valle; Farah; Carneiro, 2020).

Nos últimos anos, foi observado um aumento significativo da população em situação de rua em todo o Brasil, refletindo também na cidade de João Pessoa. Em 2008, estimava-se que cerca de 50 mil pessoas viviam nessa condição no país, número que cresceu para mais de 236 mil em 2022, segundo dados do Cadastro Único (Brasil, 2023). Esse aumento expressivo reforça a necessidade de intervenções estratégicas que garantam o acesso aos serviços essenciais, promovendo a reinserção social e a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas (Brasil, 2023).

Nesse contexto, as pessoas em vulnerabilidade social, como as que estão em situação de rua, têm diversas dificuldades relacionadas a condições de sobrevivência mínima, por exemplo, alimentação, higiene, vestimenta e saúde. Desse modo, ações voltadas ao bem-estar dessa população são de extrema importância, não apenas para atender às necessidades básicas, mas também para promover a inclusão e a dignidade dessas pessoas (Pimenta, 2019). À luz disso, vivências de discentes com diferentes tipos de público de forma precoce durante a graduação, sendo um destes públicos as pessoas em situação de rua, são de fundamental importância para uma formação robusta e humanística, conforme corrobora o estudo de Basso *et al* (2023). Portanto, a junção da necessidade social com o benéfico acadêmico é o cerne deste trabalho.

A partir do contato direto com essa população em vulnerabilidade, buscou-se refletir sobre os impactos da escuta ativa, da empatia e da formação humanística no processo de construção do cuidado integral. Relatar essa vivência permite evidenciar a importância de experiências práticas no desenvolvimento profissional e pessoal, especialmente no que se refere ao enfrentamento das desigualdades sociais em saúde.

OBJETIVO

Relatar a experiência dos discentes em medicina sobre a vivência e percepções durante uma ação em saúde com pessoas em situações de rua, oriunda de um projeto de extensão universitária.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência sobre uma ação em saúde realizada por 14 (quatorze alunos) do segundo ano da graduação em Medicina, oriunda do módulo de Projeto de Extensão Curricular obrigatório da Faculdade de Ciências Médicas – AFYA Paraíba, durante as aulas práticas do módulo de Práticas Interdisciplinares de Extensão, Pesquisa e Ensino- PIEPE. O público-alvo impactado foi de, aproximadamente, 80 pessoas em situação de rua (PSR) localizadas nas ruas do centro da cidade. A ação aconteceu com a parceria de uma comunidade religiosa do município de João Pessoa (PB). Essa ação foi realizada em maio de 2025, no período noturno. Durante a ação, foi realizada a distribuição de alimentos: marmitas, além de sopa, pães, café e sucos; doação de 80 mantas cobertores/mantas e roupas. Além disso, também houve uma conversa, com esses indivíduos, acerca dos seus direitos de acesso à saúde e as diversas redes de apoio às quais estes têm direito constitucional, buscando promover um cuidado mais inclusivo e humanizado, essencial para atender às necessidades específicas dessa população.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto de extensão visou realizar uma ação para proporcionar as pessoas em situações de rua um momento no qual alimentos e itens de uso pessoal fossem doados, assim como, conversas breves sobre suas problemáticas de saúde e direito de acesso a rede de atenção a qual estes detêm como qualquer outro cidadão. A ação foi realizada nas ruas do município de João Pessoa (PB) e contou com o apoio da pastoral de rua de uma comunidade católica do mesmo município, esta que já tem ação contínua com o público-alvo em todos os dias da semana. A ação teve como números a distribuição de 50 marmitas, 70 porções de sopa, 80 mantas, suco e água a várias pessoas em situação de rua de sexo e idade variados.

Alguns estudos indicam que ações com pessoas em situação de rua (PSR) desempenham um papel importante no bem-estar emocional e físico, em virtude de atenuar as desigualdades e vulnerabilidades a qual este público está constantemente exposto (Gioseffi; Batista; Brignol, 2022). Na ação realizada, as PSR's relataram que momentos como aquele são o único no dia a qual se sentem valorizados, acolhidos e entendidos, além de ter a certeza de que terão a alimentação diária necessária ao seu manutenção nutricional mínimo, corroborando a observação de Pimenta (2019), onde essas atividades promovem a expressão de sentimentos e socialização.

Além disso, algumas características geralmente presentes entre as PSR é o não entendimento que estes detêm os mesmos direitos de acesso a rede de atenção à saúde como qualquer cidadão, levando a agravos nas situações patológicas (Junior *et al*, 2010), demonstrando que momentos como este esclarecem os meios de auxílio que as pessoas em situação de rua detêm. Diante disso, foi possível observar esses sentimentos na ação realizada, onde algumas pessoas em situação de rua relataram gratidão pela conversa e por despertar interesse sobre a problemática que estes enfrentavam e não sabiam como lidar, no âmbito da saúde. Ademais, a interação dos discentes com a PSR's foi de grande importância para compreensão da dinâmica de vida deste público e redes de suporte.

Nesse contexto, a ação realizada reforçou a importância das vivências com pessoas em situação de rua, levando a um suporte nutricional mínimo, informação de direitos, direcionamentos para resolução de problemas a saúde, assim como, proporcionando uma formação mais robusta e humanizada para e para os discentes do curso de medicina a qual puderam vivenciar as dificuldades que este público enfrenta.

O valor das experiências de aprendizado baseado na comunidade foi evidente ao longo da ação. De acordo com Barreto *et al*. (2024), trabalhar com populações vulneráveis é um fator altamente propício no ensino de médicos para serem socialmente responsáveis, empáticos e comprometidos eticamente, possibilitando, assim, uma visão mais abrangente e intersetorial sobre a saúde. Essa experiência ofereceu aos estudantes a oportunidade de contemplar sua própria prática profissional futura e entender que não existe apenas o aspecto clínico da saúde, mas também a solicitude, a escuta ativa e a dedicação social como aspectos centrais da prática médica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência prática dos discentes de medicina na atividade extensionista demonstrou sua importância para uma formação médica sólida e humanizada, visto que, é necessário tratar as pessoas que procuram aos serviços de saúde e aquelas a qual não procuram por diversos motivos, sendo este cuidado tanto de possíveis patologias biológicas, mas primordialmente abrangendo a saúde em seu conceito ampliado: física, mental e social.

Além disso, foi possível observar como a atenção a pessoas em situações de rua é de extrema importância, pois este público está exposto a vulnerabilidades e desigualdades



grandes, e os mecanismos para atenuar esta problemática são limitados, gerando assim uma necessidade de atenção ampla. Fato que ficou ainda mais explícito a todos os participantes do projeto.

A experiência de extensão foi significativa e ajudou na formação dos discentes envolvidos, visto que, experiências como está aqui relatada forma profissionais socialmente sensíveis e conscientes. Este envolvimento com as PSR no mostra a importância de ver além das necessidades clínicas e adotar uma visão mais holística da saúde.

Palavras-chave: Extensão Comunitária; Formação Médica; População em situação de rua.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARRETO, C. H. W.; PINTO, C. F. C.; BARBOSA, E. W. M.; PAULA, G. S.; PASCOAL, P. C.; SILVA FILHO, R. C.; SÁ, A. N. P. Da invisibilidade à intervenção: atividade de extensão curricular com pessoas em situação de rua. *In: Anais do IV CICISU (Org.). Uma visão Interdisciplinar da saúde única: interconexões entre a saúde humana, animal e ambiental.* Porto Alegre: Tesais, 2024. P 545-555.

BASSO, L. D. P.; LEMOS, A. S. R.; PIMENTA, P. H.; BEZERRA, E. S.; AZEVEDO, M. A. R.; GALIZIA, F. S. Curricularização da extensão: Propostas de universidades Federais Paulistas. **Revista Brasileira de Extensão Universitária.** v. 14, n. 2, p: 189–199, 2023.

BRASIL, Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009. **Política Nacional para a População em Situação de Rua.** Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 2009.

BRASIL, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. **Cadastro Único.** Brasília, 2023.

CARNEIRO JUNIOR, N.; JESUS, C. H.; CREVELIM, M. A. A Estratégia Saúde da Família para a equidade de acesso dirigida à população em situação de rua em grandes centros urbanos. **Saúde e Sociedade.** v. 19, n. 3, p. 709-716, 2010.

GIOSEFFI, J. R.; BATISTA, R.; BRIGNOL, S. M. Tuberculose, vulnerabilidades e HIV em pessoas em situação de rua: revisão sistemática. **Revista de Saúde Pública,** v. 56, p. 43, 2022.

PIMENTA, M. M. Pessoas em situação de rua em Porto Alegre: processos de estigmatização e invisibilidade social. **Civitas.** v. 19, n. 1, p. 82-104, 2019.

VALLE, F. A. A. L.; FARAH, B. F.; CARNEIRO, N. As vivências na rua que interferem na saúde: perspectiva da população em situação de rua. **Saúde em Debate,** v. 44, n. 124, p. 182-192, 2020.



CUIDADOS DE ENFERMAGEM QUE TRASCENDEM CONHECIMENTOS TÉCNICOS: ESPIRITUALIDADE, FÉ, CARIDADE, HUMANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL E LOCAL

¹Eliane Nogueira De Souza Souto

²Etna Marzolla Gutierrez

³Claúdio Luiz Vasques dos Santos

⁴Luciana Barem Ribeiro

⁵Heitor Romero Marques

^{1,2,3,4,5} Universidade Católica Dom Bosco. Campo Grande, Mato Grosso Do Sul, Brasil.

Área temática: Enfermagem

Resumo: O estudo propõe uma ampliação da prática de enfermagem ao integrar valores como espiritualidade, fé, solidariedade e responsabilidade social, visando à promoção do cuidado integral. O objetivo é refletir sobre como a incorporação da dimensão espiritual e de valores humanos contribui para qualificar a atuação profissional da enfermagem. Trata-se de uma pesquisa teórica, com análise crítico-reflexiva fundamentada em revisão de literatura científica dos últimos cinco anos, nas áreas de enfermagem e saúde pública, com foco no cuidado humanizado e espiritual. Os resultados indicam que a inclusão desses valores fortalece o vínculo entre profissionais e pacientes, melhora a adesão aos tratamentos, promove conforto emocional e amplia a compreensão do cuidado para além do aspecto biológico. Além disso, reforça a atuação da enfermagem como promotora de dignidade, pertencimento e transformação social nos territórios em que atua. Conclui-se que a enfermagem contemporânea deve integrar competências técnicas e humanísticas, reconhecendo a espiritualidade como dimensão essencial da saúde. O cuidado integral exige sensibilidade, ética e compromisso com a humanização, reafirmando a enfermagem como prática científica, social e espiritual.

Palavras-chave: Cuidado integral; Enfermagem; Espiritualidade , Humanização no território da saúde; Impacto emocional.

Financiamento: Agência de fomento Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

INTRODUÇÃO

A enfermagem é uma profissão essencial para a garantia da qualidade dos serviços de saúde, desempenhando funções que vão além das habilidades técnicas, incorporando aspectos éticos, educacionais e de acolhimento humano (Rolim *et al.*, 2020). Com as mudanças nas demandas sociais e os avanços tecnológicos, a prática da enfermagem foi gradualmente ressignificada, exigindo uma abordagem reflexiva e crítica, fundamentada na integralidade do cuidado (Neves, 2024). A evolução do perfil epidemiológico, com o aumento da expectativa de vida e a complexidade das doenças crônicas, trouxe novos contextos, é fundamental discutir a importância da formação contínua, da valorização profissional e da humanização no atendimento de enfermagem, garantindo um cuidado ético, seguro e eficaz (Amaral *et al.*, 2024).



Os profissionais de saúde, especialmente da enfermagem, lidam constantemente com sofrimento, angústia e morte, exigindo competências emocionais e humanas para enfrentar a complexidade do cuidado (Lima *et al.*, 2020, Teixeira *et al.*, 2022). A exposição contínua a perdas e estados terminais impacta o bem-estar psicológico desses trabalhadores, gerando frustração e impotência, o que torna essencial o suporte emocional e suporte emocional e espiritual (Lima, 2022).

O cuidado em saúde transcendente do ato técnico, configura-se como uma atitude de atenção integral às dimensões físicas, mentais, sociais e espirituais do paciente (Rosa *et al.*, 2023). A relação de confiança entre enfermagem e paciente é crucial para a eficácia terapêutica, especialmente em casos de doenças crônicas ou terminais (Barbosa; *et al.*, 2023). Também o acompanhante do enfermo, envolvido em processos de perda e negação, necessita de acolhimento emocional e espiritual.

A introdução dos cuidados paliativos reforça a necessidade de assistência integral, que valorize a dignidade e o alívio da dor até o final da vida, incluindo suporte emocional, social e espiritual (Barbosa; *et al.*, 2024).

Durante a pandemia de *Coronavírus Disease2* - (COVID-19), os profissionais de enfermagem enfrentaram dificuldades extremas, como sobrecarga, medo, perda e esgotamento emocional, preocupação com os familiares geraram grande ansiedade, intensificada pela incerteza sobre a nova doença (Rodrigues; *et al.*, 2021, Jesus, 2024.). A espiritualidade tornou-se um importante recurso para manter o vínculo humano com os pacientes em meio à crise sanitária (Ferreira, 2024). Jornadas exaustivas e a escassez de Equipamento de Proteção Individual (EPIs). O cansaço e esgotamento emocional e a morte em massa tornou-se uma realidade de martírio, impotência e tristeza, agravados pela impossibilidade de oferecer um cuidado mais humanizado devido à superlotação dos hospitais.

Diante da diversidade de adoecimento da sociedade e do absenteísmo dos profissionais por doenças mentais e musculoesquelético, vale refletir a necessidade de implementação de políticas públicas que visa o apoio psicológico para os profissionais e de valorização da enfermagem, a fim de garantir a sustentabilidade da força de trabalho em saúde (Rolim *et al.*, 2020). Embora esses problemas sejam recorrentes, o distanciamento da família durante a pandemia foi um elemento adicional que exacerbava as dificuldades. Pois, esses profissionais, muitas vezes, exercem carga horária dupla para compensar a baixa remuneração, especialmente em instituições privadas, permanecendo fora de seus lares por longos períodos.

A enfermagem sempre esteve presente em todos os territórios de atenção à saúde, seja ela pequena, média e alta complexidade. O protagonismo da enfermagem reafirma sua importância na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação em saúde, reafirmando seu compromisso com o cuidado integral e humanizado, respeitando as crenças e valores de cada indivíduo e contribuindo para uma sociedade mais saudável.

A sociedade brasileira, apesar do reconhecimento ampliado da enfermagem durante a pandemia, esses profissionais ainda enfrentam questões de desrespeito e violência. Além disso, há desigualdades estruturais relacionadas à classe, gênero e raça. A maior parte da profissão é composta por mulheres (85%) e pessoas negras (53%), sendo que 77% dos profissionais em funções técnicas e auxiliares pertencem a essas categorias, refletindo desigualdades sociais históricas (Carmo, *et al.*, 2024). Esse cenário é agravado pela violência verbal, assédio moral e discriminação sofrida pelos profissionais.

Em resposta a esses desafios, o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) implementou, em novembro de 2024, a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, com o objetivo de promover ambientes de



trabalho dignos e seguros (Cofen, 2024). Além disso, a sobrecarga de trabalho e as condições precárias impactam negativamente a percepção pública da profissão, com apenas 25% dos 2,8 milhões de profissionais registrados sendo enfermeiros(as) (Brasil, 2024). É essencial que a sociedade reconheça e valorize a enfermagem não apenas em momentos de crise, mas de forma contínua, garantindo respeito, condições de trabalho adequadas e o devido reconhecimento profissional.

OBJETIVO

Refletir sobre a integração da dimensão espiritual e dos valores humanos que contribui para a promoção do cuidado integral no exercício da enfermagem, os valores que transcendem os conhecimentos técnicos assistenciais, como a fé, caridade, humanização e a responsabilidade social e local, em uma sociedade que busca a promoção da saúde em diversos territórios de atuação, com ênfase no impacto emocional dos profissionais e na valorização da profissão.

METODOLOGIA

Estudo teórico, de análise crítico-reflexiva, baseada em estudos publicados nos últimos cinco anos nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *Google Scholar*, Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), e a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Selecionados artigos que abordassem práticas de cuidado em enfermagem, humanização da assistência, espiritualidade no cuidado e saúde baseada na fé. O estudo considerou a relevância temática, a atualidade dos textos e a contribuição para o aprimoramento da prática assistencial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A prática da enfermagem transcende a execução técnica, exigindo competências éticas, emocionais e sociais para garantir o cuidado integral. A análise evidenciou que a incorporação da espiritualidade e dos valores humanos é crucial para um cuidado empático e centrado no paciente, sobretudo em contextos de vulnerabilidade, como doenças crônicas e emergências sanitárias.

A análise mostrou que a incorporação da espiritualidade no cuidado fortalece a relação enfermeiro-paciente e promove uma abordagem mais empática, essencial em doenças crônicas. Durante adoecimento em massa da população e os cuidados paliativos mostrou a importância da fé e solidariedade para os profissionais, ajudando-os a lidar com o sofrimento constante. O reconhecimento da enfermagem é um fator colaborativo, pois a profissão se desvalia de estruturas relacionados à desigualdade de gênero e raça (Carmo, *et al.*, 2024). Constatou-se necessidade de políticas institucionais de valorização, como a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação (Cofen, 2024).

A abordagem holística, que integra dimensões emocionais e espirituais, mostrou-se essencial para fortalecer o vínculo terapêutico e promover qualidade de vida, especialmente nos cuidados paliativos. Pequenos gestos de acolhimento demonstraram impacto significativo no alívio do sofrimento.

A abrangência territorial da enfermagem reforça a necessidade de formação contínua e valorização profissional. Durante período pandêmico evidenciaram a urgência de estratégias de proteção à saúde mental dos profissionais, reafirmando que o cuidado integral deve considerar todas as dimensões do ser humano: física, emocional, social e espiritual.



CONCLUSÃO

O estudo reconhece que a dimensão espiritual transcendente do ser humano, é fundamental para a prática da enfermagem e para a construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária. Valorizar a espiritualidade no ambiente acadêmico e profissional fortalece a atuação da enfermagem diante dos desafios emocionais e existenciais do cuidado, especialmente em contextos de sofrimento, terminalidade e crises sanitárias. A integração entre suporte emocional, técnico e espiritual potencializa não apenas a qualidade da assistência prestada, mas também o desenvolvimento social e local, consolidando práticas de saúde mais humanas, éticas e transformadoras.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, P. B.; *et al.* Ações de enfermagem nos cuidados paliativos ao paciente em tratamento oncológico. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 1, n. 01, p. 269-294, 2024. DOI: 10.51891/rease.v1i01.17359. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17359>. Acesso em: 24 abr. 2025.

BARBOSA, T. M. S.; MIRANDA, M. E. G. de; FATURI, C. L. N.; *et al.* A prática da enfermagem em cuidados paliativos: atenção e conforto aos pacientes em estado terminal. *Revista Família, Ciclos de Vida e Saúde no Contexto Social*, v. 27, n. 130, 2023. Disponível em: <https://revistaft.com.br/a-pratica-da-enfermagem-em-cuidados-paliativos-atencao-e-conforto-aos-pacientes-em-estado-terminal>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BRASIL. Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Déficit de enfermeiros preocupa o mundo: no Brasil, o gargalo é a formação qualificada. 2024. Disponível em: <https://anadem.org.br/2024/05/15/deficit-de-enfermeiros-preocupa-o-mundo-no-brasil-o-gargalo-e-a-formacao-qualificada/>. Acesso em: 26 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para a organização dos cuidados paliativos no âmbito do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. *Manual de Cuidados Paliativos – 2. ed. revisada e ampliada*. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/2023/manual-de-cuidados-paliativos-2a-edicao/view>. Acesso em: 27 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Perfil da Enfermagem no Brasil: análise dos profissionais registrados*. Brasília, 2024. Disponível em: <https://biblioteca.cofen.gov.br/perfil-da-enfermagem-no-brasil/>. Acesso em: 28 abr. 2025.

CARMO, K. M. do; *et al.* Perfil da enfermagem brasileira sob a perspectiva de classe, gênero e raça/cor da pele. *Cadernos de Educação e Desenvolvimento*, v. 16, n. 3, p. e3549-e3549, 2024. DOI: 10.55905/cuadv16n3-015. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/view/3549>. Acesso em: 27 abr. 2025.

COFEN – CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Resolução Cofen nº 768, de 12 de novembro de 2024. Institui a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 2024. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-768-de-12-de-novembro-de-2024/>. Acesso em: 26 abr. 2025.

NEVES, Tarcísio Tércio das; *et al.* Teoria de Betty Neuman no cuidado de enfermagem



holístico ao paciente oncológico: ensaio reflexivo. **Escola Anna Nery**, v. 28, p. e20240014, 2024. Acesso em: 28 abr. 2025.

JESUS, S. E. de; FREITAS, M. S.; SILVA, L. S. da; LIMA, J. M. de; ROCHA, E. M. da; NASCIMENTO, V. F. do; LEMES, A. G.; ROBAZZI, M. L. do C. C. Saúde mental dos profissionais de enfermagem dos serviços hospitalares: uma revisão integrativa. *Contribuições para a Ciência Social*, v. 17, n. 1, p. 7671–7689, 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.1-463. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/4752>. Acesso em: 28 abr. 2025.

LIMA, M. C. de. Implicações da religiosidade e espiritualidade no cuidado integral à saúde e o papel do enfermeiro nesse contexto: revisão integrativa. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/5218>. Acesso em: 23 abr. 2025.

MOTA, D. D. C. F.; SILVA, T. P.; NOGUEIRA, J. A. Enfermagem na pandemia de COVID-19: impactos e desafios para a saúde mental. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 36, eAPE03862, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/XnFgSwFSSdT79M8Dvmd4ThB/>. Acesso em: 26 abr. 2025.

TEIXEIRA, Ana Isabel; *et al.* Competências emocionais nos enfermeiros de saúde mental: contributos da implementação de um modelo de supervisão clínica. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental*, jul. 2022. DOI: 10.19131/rpesm.347. Disponível em: <https://doi.org/10.19131/rpesm.347>. Acesso em: 16 maio 2025.

LIMA, Thainá Oliveira; TAVARES, Cláudia Mara. Competências emocionais na prática de enfermagem: desafios no cuidado em saúde. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental*, n. spe7, Porto, out. 2020. ISSN 1647-2160. DOI: 10.19131/rpesm.0250. Disponível em: <https://doi.org/10.19131/rpesm.0250>. Acesso em: 23 abr. 2025.

RIBEIRO, M. A.; *et al.* A relevância da formação contínua e especializações para profissionais de saúde: garantindo excelência e atualização. *Periódicos Brasil: Pesquisa Científica*, Macapá, v. 3, n. 2, p. 816–826, 2024. DOI: 10.36557/pbpc.v3i2.120. Disponível em: <https://periodicosbrasil.emnuvens.com.br/revista/article/view/120>. Acesso em: 28 abr. 2025.

RODRIGUES, L. C.; *et al.* Impactos da pandemia da Covid-19 na saúde mental dos enfermeiros. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, v. 24, n. 1, p. e14482, 2024. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e14482.2024>. Acesso em: 23 abr. 2025.



EVIDÊNCIAS DA ATIVIDADE FÍSICA NOS SINTOMAS PSICOLÓGICOS DE SOBREVIVENTES DO CÂNCER DE MAMA: UMA UMBRELLA REVIEW

¹Juliana da Silveira

¹Alicia Garcia Lima

¹Priscila Rodrigues Gil

¹Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães

¹Universidade do Estado de Santa Catarina. Florianópolis, Santa Catarina, Brasil.

Área temática: Educação Física

Resumo: O estudo aborda sobre as diferentes modalidades de atividade física como forma de tratamento não farmacológico para sobreviventes do câncer de mama. **Objetivo:** Analisar a eficácia da atividade física nos sintomas psicológicos de mulheres sobreviventes do câncer de mama, bem como a qualidade metodológica e o nível de evidência das revisões incluídas. **Métodos:** Foram pesquisadas nas bases de dados Apa PsycNet, Embase Elsevier; PubMed Central®; Scopus Elsevier; SPORTDiscus e Web of science revisões metanálises que deveriam investigar o efeito da atividade física na autoestima, estresse, imagem corporal, otimismo e sintomas depressivos em sobreviventes do câncer de mama. A qualidade metodológica foi avaliada pelo AMSTAR 2 e foi realizada a análise de sobreposição. **Resultados:** Dezoito metanálises preencheram os critérios; a maioria dos estudos foi classificada como de alta qualidade. Fortes evidências mostram que diferentes modalidades de atividade física promovem resultados positivos nos sintomas psicológicos de sobreviventes do câncer de mama. A maioria das intervenções investigou os efeitos da Yoga, com grande ênfase nos sintomas depressivos. **Conclusão:** De forma geral, esta revisão sugere que a atividade física pode ser utilizada como tratamento complementar para os sintomas psicológicos de sobreviventes do câncer de mama.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, observou-se um expressivo aumento na sobrevida de mulheres com câncer de mama, resultado dos avanços nas tecnologias diagnósticas, na detecção precoce e nas terapias oncológicas mais direcionadas e eficazes (EL SAGHIR *et al.*, 2023; PULUMATI *et al.*, 2023). Embora esse progresso represente uma conquista inegável da medicina moderna, sobreviver ao câncer não implica, necessariamente, em estar livre das consequências da doença e de seus tratamentos (JADIDI; AMERI, 2022). Muitas mulheres convivem com os impactos emocionais decorrentes da doença, como o medo recorrente da recidiva, alterações na autoimagem, baixa autoestima, sintomas depressivos e estresse pós-traumático são frequentemente relatados pelas sobreviventes, comprometendo sua saúde mental e bem-estar global (TONG *et al.*, 2024).

Neste contexto, a atividade física se destaca como uma forma de tratamento não farmacológica eficaz, com benefícios como redução do risco de recorrência e melhora da sobrevida, o exercício promove importantes adaptações fisiológicas, como o fortalecimento da função cardiovascular, a modulação do sistema imunológico e o controle do peso corporal (GARCÍA-CHICO *et al.*, 2023; KUDIARASU *et al.*, 2023; LEE; LEE, 2020). Do ponto de vista psicológico, sua prática está associada à redução dos níveis de estresse e sintomas depressivos, ao aprimoramento da imagem corporal e ao fortalecimento da autoestima. Esses



benefícios, somados, reverberam positivamente na qualidade de vida das mulheres que enfrentaram o câncer de mama (DING *et al.*, 2024; RAMÍREZ-VÉLEZ *et al.*, 2021). Considerando a complexidade dos desafios enfrentados por essa população, torna-se cada vez mais essencial compreender e valorizar o papel da atividade física como parte integrante da reabilitação oncológica, com potencial para restaurar não apenas a saúde física, mas também o equilíbrio emocional e a sensação de bem-estar dessas mulheres.

OBJETIVO

Analisar a eficácia da atividade física nos sintomas psicológicos de mulheres sobreviventes do câncer de mama, bem como a qualidade metodológica e o nível de evidência das revisões incluídas.

METODOLOGIA

Esta umbrella review seguiu as diretrizes do PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (PAGE *et al.*, 2021) e foi registrada previamente no PROSPERO. Foram realizadas buscas sistemáticas, nas bases APA PsycNet, Embase, PubMed Central, Scopus, SPORTDiscus e Web of Science. Os descritores utilizados foram baseados nos termos MeSH, e a triagem dos estudos foi conduzida de forma cega e independente por cinco pesquisadores, por meio do aplicativo Rayyan.

Foram incluídas revisões sistemáticas com metanálises que investigaram os efeitos da atividade física nos sintomas psicológicos (autoestima, estresse, imagem corporal, otimismo e sintomas depressivos) de mulheres adultas (≥ 18 anos) sobreviventes do câncer de mama, publicadas entre 2014 e 2024, nos idiomas inglês, português ou espanhol.

A extração dos dados seguiu um modelo estruturado, contemplando informações sobre características dos estudos, intervenções, desfechos, instrumentos e níveis de evidência.

A avaliação metodológica foi realizada por dois revisores independentes utilizando a ferramenta AMSTAR 2 (*A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews*) (SHEA *et al.*, 2017), considerando sete domínios críticos para classificação da qualidade como alta, moderada, baixa ou criticamente baixa. O nível de evidência foi analisado com base nas diretrizes do *Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation* (GRADE) (GUYATT *et al.*, 2011), e, em casos de discordância, um terceiro revisor foi consultado. Também foi realizada a análise de sobreposição entre as revisões incluídas, com cálculo da Área Coberta Corrigida (Corrected Covered Area – CCA), classificada como leve, moderada, alta ou muito alta (PIEPER *et al.*, 2014).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dezoito metanálises publicadas entre 2015 e 2024 foram incluídas, revelando uma ampla diversidade nas intervenções com atividade física voltadas a mulheres sobreviventes do câncer de mama. As intervenções variaram significativamente em duração (1 semana a 12 meses), frequência (1 a 14 sessões/semana), tempo de sessão (15 a 150 minutos) e intensidade (leve a vigorosa). Apesar dessa heterogeneidade, os resultados convergem: as diferentes formas de atividade física demonstraram efeitos positivos consistentes, principalmente na redução dos sintomas depressivos, com tamanhos de efeito variando de pequenos a grandes, e heterogeneidade entre 0% e 98%. A melhora dos sintomas depressivos foi o achado mais robusto e recorrente, mesmo diante das diferentes escalas utilizadas (como



o BDI e o CES-D), evidenciando a força da atividade física.

Para a autoestima, os resultados foram menos expressivos, com apenas uma metanálise apresentando efeito significativo. Em relação ao estresse, os achados foram conflitantes — embora algumas análises apontem benefícios da atividade física, outras não observaram diferenças significativas, refletindo a variabilidade metodológica dos estudos primários. A imagem corporal foi abordada por apenas uma metanálise, no qual apontou efeito positivo, embora pequeno. Nenhuma metanálise abordou a variável otimismo, o que revela uma lacuna relevante a ser explorada em futuras pesquisas.

As metanálises incluídas abordaram uma variedade de tipos de atividades físicas, com destaque para atividades aeróbicas, de força, mente-corpo (como ioga e tai chi) e intervenções multicomponentes que combinam duas ou mais dessas estratégias. Cada modalidade apresentou efeitos distintos sobre os desfechos psicológicos avaliados. Onde as atividades aeróbicas se mostraram mais consistentes na redução dos sintomas depressivos e da ansiedade, e esses benefícios parecem estar relacionados à liberação de endorfinas, melhora da qualidade do sono e sensação de bem-estar geral (PATSOU *et al.*, 2017). Já as atividades envolvendo força e resistência, apresentaram resultados positivos, embora menos frequentes, para os sintomas depressivos, melhora da autoestima e da imagem corporal, uma vez que tendem a promover sensação de controle sobre o próprio corpo (MUSANTI, 2012). Os principais achados desta revisão estão relacionados às atividades mente-corpo, como ioga, tai chi e qigong, mostraram-se eficazes especialmente na redução do estresse e da ansiedade, com impacto adicional sobre a qualidade de vida. A ênfase na respiração, no relaxamento e na conexão corpo-mente pode explicar esses efeitos (CHEN *et al.*, 2021). Embora os Programas multicomponentes (que combinam aeróbico, força e/ou mente-corpo), foram associados a benefícios mais amplos e duradouros, com destaque para a redução dos sintomas depressivos e a melhora do bem-estar geral. No entanto, sua complexidade dificulta a comparação direta com intervenções isoladas. Apesar das diferenças entre as modalidades, o denominador comum entre elas foi o efeito positivo da atividade física sobre os sintomas psicológicos das mulheres sobreviventes do câncer de mama, especialmente na redução dos sintomas depressivos. A escolha da modalidade pode ser guiada tanto pelo perfil clínico quanto pelas preferências pessoais da paciente, o que reforça a importância da individualização das intervenções.

A avaliação metodológica das metanálises evidenciou fragilidades importantes, como ausência de registro de protocolo, critérios de exclusão pouco transparentes e avaliação limitada do viés dos estudos incluídos. A análise GRADE confirmou qualidade variando de alta a muito baixa, o que impõe cautela na interpretação e aplicação clínica dos achados. Além disso, a sobreposição elevada entre os estudos primários indica possível redundância e baixa novidade em algumas revisões. Ainda assim, o conjunto da evidência aponta que a atividade física é uma estratégia promissora para o enfrentamento de sintomas psicológicos em mulheres sobreviventes do câncer de mama, principalmente no que se refere aos sintomas depressivos. Para fortalecer essa recomendação, são necessárias revisões mais rigorosas metodologicamente, com maior foco em desfechos psicossociais ainda pouco explorados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A atividade física mostrou evidências positivas sobre os sintomas psicológicos de sobreviventes do câncer de mama, principalmente nos sintomas depressivos. A Yoga mostrou melhores resultados quando comparada às demais modalidades de atividade física. Além disso, modalidades tradicionais como aeróbicas e combinadas parecem precisar de períodos mais longos de intervenção para se ter efeito duradouro nas variáveis dos sintomas



psicológicos (autoestima, estresse, imagem corporal e sintomas depressivos).

Palavras-chave: Autoestima; Depressão; Estresse; Imagem corporal; Neoplasia mamária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CHEN, M. et al. Prediction of total hospital expenses of patients undergoing breast cancer surgery in Shanghai, China by comparing three models. **BMC Health Services Research**, v. 21, n. 1, p. 1334, 13 dez. 2021.
- DING, X. et al. A systematic review and meta-analysis of interventions to reduce perceived stress in breast cancer patients. **Complementary Therapies in Clinical Practice**, v. 54, p. 101803, fev. 2024.
- EL SAGHIR, N. S. et al. Improved Survival of Young Patients With Breast Cancer 40 Years and Younger at Diagnosis. **JCO Global Oncology**, n. 9, maio 2023.
- GARCÍA-CHICO, C. et al. Physical Exercise and the Hallmarks of Breast Cancer: A Narrative Review. **Cancers**, v. 15, n. 1, p. 324, 3 jan. 2023.
- GUYATT, G. et al. GRADE guidelines: 1. Introduction—GRADE evidence profiles and summary of findings tables. **Journal of Clinical Epidemiology**, v. 64, n. 4, p. 383–394, abr. 2011.
- JADIDI, A.; AMERI, F. Social support and meaning of life in women with breast cancer. **Ethiopian Journal of Health Sciences**, v. 32, n. 4, p. 709–714, 18 set. 2022.
- KUDIARASU, C. et al. What are the most effective exercise, physical activity and dietary interventions to improve body composition in women diagnosed with or at high-risk of breast cancer? A systematic review and network meta-analysis. **Cancer**, v. 129, n. 23, p. 3697–3712, 3 dez. 2023.
- LEE, J.; LEE, M.-G. Effects of Exercise Interventions on Breast Cancer Patients During Adjuvant Therapy. **Cancer Nursing**, v. 43, n. 2, p. 115–125, mar. 2020.
- MUSANTI, R. A Study of Exercise Modality and Physical Self-esteem in Breast Cancer Survivors. **Medicine & Science in Sports & Exercise**, v. 44, n. 2, p. 352–361, fev. 2012.
- PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, p. n71, 29 mar. 2021.
- PATSOU, E. D. et al. Effects of physical activity on depressive symptoms during breast cancer survivorship: a meta-analysis of randomised control trials. **ESMO Open**, v. 2, n. 5, p. e000271, 2017.
- PIEPER, D. et al. Systematic review finds overlapping reviews were not mentioned in every other overview. **Journal of Clinical Epidemiology**, v. 67, n. 4, p. 368–375, abr. 2014.
- PULUMATI, A. et al. Technological advancements in cancer diagnostics: Improvements and limitations. **Cancer Reports**, v. 6, n. 2, 6 fev. 2023.
- RAMÍREZ-VÉLEZ, R. et al. Evidence-Based Exercise Recommendations to Improve Mental Wellbeing in Women with Breast Cancer during Active Treatment: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Cancers**, v. 13, n. 2, p. 264, 12 jan. 2021.
- SHEA, B. J. et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. **BMJ**, p. j4008, 21 set. 2017.
- TONG, L. et al. Prevalence and Factors Contributing to Fear of Recurrence in Breast Cancer Patients and Their Partners: A Cross-Sectional Study. **International Journal of Women's Health**, v. Volume 16, p. 229–236, fev. 2024.



TECNOLOGIAS MÓVEIS NO MANEJO DO DIABETES GESTACIONAL: DESAFIOS NA ALFABETIZAÇÃO DIGITAL

¹Luciene Rodrigues Barbosa

¹Universidade de Brasília, Brasília, Distrito Federal, Brasil

Área temática: Enfermagem

Resumo: O uso de tecnologias móveis para o autogerenciamento do diabetes mellitus gestacional (DMG) tem crescido com os avanços em mHealth, mas poucos estudos avaliam sua eficácia considerando alfabetização digital e adequação cultural em populações vulneráveis. Este estudo avaliou a eficácia de aplicativos mHealth no controle glicêmico e nos desfechos maternos e neonatais por meio de revisão de escopo segundo o Manual JBI, em seis etapas metodológicas: definição da questão, busca (2010–2022 em PubMed, MEDLINE, Web of Science e Scopus), seleção (17 estudos finais), extração, síntese e (opcional) consulta a especialistas. Foram incluídos estudos qualitativos, quantitativos e de métodos mistos com gestantes diagnosticadas com DMG que usaram aplicativos, plataformas digitais ou telemonitoramento. Os resultados revelaram que apenas 17% das intervenções adaptaram conteúdo a níveis de letramento digital e valores culturais, embora tenham demonstrado benefícios clínicos como redução média de 0,4% na HbA1c, maior adesão ao tratamento (OR 2,4; IC 95% 1,29–4,61) e menor taxa de cesáreas de emergência (P=0,03). Observou-se escassez de treinamento prévio e exclusão de usuárias com limitações técnicas ou linguísticas, indicando barreiras significativas ao acesso. A análise sugere que integrar critérios de letramento digital e sensibilidade cultural é fundamental para a efetividade de soluções mHealth, recomendando o desenvolvimento de ferramentas mais inclusivas e adaptadas ao contexto das gestantes com DMG.

INTRODUÇÃO

A prevalência de mulheres diagnosticadas com diabetes durante a gravidez aumentou substancialmente na última década. O relatório de 2019 da International Diabetes Federation estimou que aproximadamente 20 milhões de mulheres desenvolveram hiperglicemia gestacional, sendo 84% dos casos atribuídos ao diabetes mellitus gestacional (DMG). O DMG está associado a riscos significativos e pode levar a desfechos perinatais adversos e complicações crônicas para mães e recém-nascidos. O controle glicêmico eficaz e a prevenção de complicações requerem mudanças no estilo de vida e adesão ao autocuidado, incluindo terapia nutricional, monitoramento da glicemia, controle de peso e prática regular de atividade física. No entanto, essas práticas representam uma carga expressiva para as mulheres, sobretudo aquelas com diagnóstico recente. Como resposta a essa complexidade, soluções digitais têm sido amplamente implementadas para apoiar o gerenciamento do DMG. Aplicativos de saúde móvel (mHealth), plataformas de telessaúde e sistemas de telemedicina passaram a compor o arsenal terapêutico digital, facilitando a comunicação entre gestantes e equipes de saúde. Tais tecnologias têm o potencial de atenuar desigualdades de acesso, especialmente em áreas remotas ou com cobertura precária de serviços. Apesar de suas vantagens, persiste a incerteza quanto à capacidade desses sistemas de atenderem a mulheres com distintos níveis de alfabetização digital, competências comunicativas e origens socioculturais. A alfabetização digital em saúde é definida como a capacidade de



buscar, compreender, avaliar e aplicar informações de saúde obtidas eletronicamente para tomada de decisões clínicas. À medida que sistemas de saúde incorporam cada vez mais ferramentas digitais, os usuários são confrontados com novas barreiras relacionadas à usabilidade, compreensão e confiança. Estudos recentes revelam que baixos níveis de alfabetização em saúde estão associados a dificuldades no controle do diabetes e no engajamento com o autocuidado, além de implicarem aumento na carga dos serviços de saúde. Em 2013, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos recomendou o desenvolvimento de aplicações acessíveis com base em princípios de alfabetização em saúde para mitigar tais barreiras. Entretanto, a maioria dos aplicativos mHealth e sistemas de telemedicina são desenvolvidos com foco na população geral, sem necessariamente considerar as necessidades específicas de grupos culturalmente diversos ou com baixa proficiência digital. Além disso, as diretrizes da *Academy of Nutrition and Dietetics*, em 2018, reforçam que aspectos socioculturais, como hábitos alimentares religiosos, insegurança alimentar e práticas de jejum, devem ser levados em consideração na abordagem do DMG, sob pena de comprometer a efetividade do cuidado. Nesse sentido, avaliações de adequação cultural e sensibilidade linguística são fundamentais na concepção de tecnologias de saúde voltadas ao manejo do DMG.

OBJETIVO

Este estudo teve como objetivo avaliar a eficácia dos aplicativos mHealth quanto ao controle glicêmico e aos desfechos maternos e neonatais.

METODOLOGIA

Esta revisão de escopo seguiu o Manual de Revisores do Joanna Briggs Institute (JBI). Foram seguidas seis etapas: identificação da questão de pesquisa, busca por estudos relevantes, seleção dos estudos incluídos, extração e mapeamento dos dados, síntese e apresentação dos resultados, e consulta a especialistas (etapa opcional). A abordagem metodológica foi escolhida com o objetivo de mapear os conhecimentos atuais sobre tecnologias móveis de saúde (mHealth) voltadas para o manejo do diabetes mellitus gestacional (DMG), com foco na alfabetização digital em saúde e na adequação cultural das ferramentas utilizadas, identificando lacunas existentes e evidências para orientar futuras pesquisas. A busca foi realizada entre janeiro de 2010 e janeiro de 2022 nas bases PubMed, MEDLINE (EBSCO), Web of Science e Scopus, utilizando termos como “telemedicina”, “diabetes mellitus gestacional”, “populações vulneráveis”, “áreas periféricas”, “adequação cultural” e “alfabetização digital em saúde”, combinados com operadores booleanos. Foram incluídos estudos com mulheres grávidas diagnosticadas com DMG que utilizaram aplicativos móveis, plataformas digitais ou sistemas de telemonitoramento, especialmente em populações com vulnerabilidades socioculturais e baixo letramento digital. Excluíram-se estudos com mulheres não grávidas, gestantes sem diagnóstico de DMG, revisões de literatura, relatos de experiência e estudos de usabilidade pré-implementação. Foram aceitos estudos qualitativos, quantitativos ou de métodos mistos, publicados em inglês. A busca inicial resultou em 228 registros (207 eletrônicos e 21 identificados manualmente). Após remoção de duplicatas, 119 artigos foram analisados por título e resumo. Desses, 91 foram excluídos e os 28 restantes foram lidos na íntegra. Após nova triagem, 17 estudos foram selecionados para análise final. Os dados extraídos foram organizados em planilha no Microsoft Excel, contemplando informações como título, país, população, tipo de intervenção, avaliação da alfabetização digital, adequação cultural e desfechos clínicos. A síntese dos dados considerou cinco critérios para avaliação da alfabetização digital em saúde:



capacidade de uso de smartphones, orientação sobre o uso da tecnologia, uso de linguagem simples, organização intuitiva das informações e testes prévios de viabilidade e usabilidade. Os dados foram categorizados e organizados em temas centrais sobre intervenções de mHealth, impacto clínico, sensibilidade cultural e acessibilidade tecnológica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da revisão evidenciaram que, entre os 17 estudos incluídos, a maioria foi conduzida em países como Noruega, China, Espanha e Cingapura, com delineamentos variados, incluindo ensaios clínicos randomizados multicêntricos e unicêntricos, estudos qualitativos e de métodos mistos. As intervenções envolveram sistemas de telemedicina e aplicativos de mHealth, com destaque para ferramentas como Pregnant+, WeChat, Habits-GDM e DiabeTIC. Apenas dois estudos consideraram explicitamente a adequação cultural no desenho das intervenções, incluindo tradução linguística, adaptação alimentar e recursos visuais específicos. Os demais limitaram-se a pressupostos sobre a alfabetização digital das usuárias ou aplicaram critérios de exclusão baseados na proficiência linguística, impondo barreiras significativas de acesso. Quanto à alfabetização digital em saúde, apenas uma intervenção atingiu a pontuação máxima (5/5), ao contemplar todos os critérios: capacidade de uso de smartphones, oferta de treinamento, linguagem acessível, navegação simplificada e teste de usabilidade. Intervenções que envolveram pacientes desde a fase de desenvolvimento demonstraram maior adesão, melhor compreensão do conteúdo e níveis mais altos de satisfação, como observado nos casos do Pregnant+ e DiabeTIC. No que se refere à eficácia, 82% dos estudos quantitativos apresentaram medidas de desfecho clínico relevantes. O controle glicêmico foi o principal foco das intervenções. As participantes dos grupos de intervenção demonstraram melhores resultados nos níveis de glicemia de jejum e pós-prandial, com significância estatística em diversos estudos ($P < 0,001$), menor necessidade de insulinoterapia e maior adesão ao monitoramento. Observou-se ainda redução do ganho de peso gestacional, menor número de consultas presenciais, maior conformidade ao tratamento e maior envolvimento das gestantes com a própria saúde. Alguns estudos relataram redução significativa das cesarianas de emergência ($P = 0,03$), aumento na satisfação com o atendimento ($P = 0,049$) e melhor adesão ao uso de aplicativos e à coleta de dados glicêmicos (OR 2,44; IC 95% 1,29–4,61). Apesar dos avanços, a ausência de testes de usabilidade em diversas intervenções, a exclusão de populações vulneráveis e a falta de validação cultural configuram limitações importantes. Apenas 17% dos aplicativos analisados integraram conteúdos adaptados a diferentes idiomas, hábitos alimentares e crenças culturais. Somente 25% alcançaram pontuação igual ou superior a 3 em critérios de alfabetização digital em saúde. A escassez de treinamento prévio e a exclusão de mulheres com baixa proficiência digital representam barreiras persistentes. A Estratégia Global em Saúde Digital da OMS (2020–2025) destaca a literacia como determinante crucial para a adoção de tecnologias em saúde, reforçando a importância da inclusão digital. Além disso, normas internacionais como os 14 padrões do Departamento de Saúde dos Estados Unidos para serviços culturalmente apropriados ainda não são integradas ao design de tecnologias digitais voltadas ao cuidado de mulheres com DMG. Outro entrave é a ausência de diretrizes internacionais uniformes para o diagnóstico e tratamento do DMG, dificultando a comparação entre países e comprometendo a generalização dos resultados. O uso de amostras pequenas e a omissão do cálculo de poder estatístico também limitam a validade externa dos estudos. Apesar dessas limitações, a revisão apresenta como pontos fortes a robustez metodológica, a condução por dois avaliadores independentes e a abrangência da estratégia de busca. A restrição a artigos publicados em inglês e entre os anos de 2010 e 2021



pode ter limitado o escopo da análise. Ainda assim, as evidências reforçam a necessidade de desenvolvimento de tecnologias digitalmente acessíveis e culturalmente sensíveis, que considerem os contextos sociais, econômicos e de letramento das mulheres com DMG, sobretudo em populações vulneráveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta revisão analisou a literatura científica sobre intervenções digitais voltadas ao manejo do diabetes mellitus gestacional (DMG). Embora existam iniciativas voltadas à autogestão da saúde por meio de tecnologias digitais, foram identificadas apenas 12 intervenções publicadas que abordam o uso de mHealth e sistemas de telemedicina em gestantes com DMG. Dentre essas, poucas foram desenvolvidas com atenção explícita às necessidades culturais das usuárias e aos diferentes níveis de alfabetização digital em saúde. Esse panorama evidencia uma lacuna relevante no desenvolvimento e na avaliação de tecnologias que considerem a diversidade sociocultural e as competências digitais das pacientes. Como consequência, ainda não há evidências robustas sobre a efetividade dessas intervenções em populações com características diversas. Assim, são necessárias futuras investigações que priorizem o desenho participativo das ferramentas digitais, integrem avaliações sistemáticas da adequação cultural e funcional, e proponham estratégias de implementação que ampliem o acesso equitativo ao cuidado digital em saúde para mulheres com DMG.

Palavras-chave: Alfabetização em saúde digital; Diabetes mellitus gestacional; mHealth; Saúde da mulher; Telemedicina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BERRY, D.; JOHNSON, Q.; STUEBE, A. Monitoramento e manejo de mães com diabetes mellitus gestacional: uma perspectiva de enfermagem. **Nursing Research Review**, v. 2015, p. 91, out. 2015. DOI: 10.2147/nrr.s64534.
- BRODERICK, J. et al. **Projetando aplicativos móveis voltados para a saúde**. Washington: Instituto de Medicina, 2014. Disponível em: <http://nam.edu/wp-content/uploads/2015/06/HealthLiterateApps.pdf>. Acesso em: 30 jan. 2022.
- BUHARY, B. et al. Controle glicêmico e desfechos gestacionais em pacientes com diabetes gestacional: um estudo retrospectivo. **Indian Journal of Endocrinology and Metabolism**, v. 20, n. 4, p. 481–490, 2016. DOI: 10.4103/2230-8210.183478.
- CAROLAN, M. Experiências de educadoras de enfermagem em diabetes no cuidado a mulheres com diabetes gestacional de famílias carentes. **Journal of Clinical Nursing**, v. 23, n. 9-10, p. 1374–1384, maio 2014. DOI: 10.1111/jocn.12421.
- CHEN, P. et al. Fatores de risco e manejo do diabetes gestacional. **Cell Biochemistry and Biophysics**, v. 71, n. 2, p. 689–694, 2015. DOI: 10.1007/s12013-014-0248-2.
- CHEN, Q.; CARBONE, E. T. Funcionalidade, implementação, impacto e o papel da alfabetização em saúde em aplicativos de celular para diabetes gestacional: revisão de escopo. **JMIR Diabetes**, v. 2, n. 2, p. e25, 2017. DOI: 10.2196/diabetes.8045.
- CRAIG, L. et al. Experiências de mulheres com o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional: uma revisão sistemática. **BMC Pregnancy and Childbirth**, v. 20, n. 1, p. 76, 2020. DOI: 10.1186/s12884-020-2745-1.
- DENNEY, J. M.; QUINN, K. H. Diabetes gestacional: princípios básicos, vigilância e tratamento. **Obstetrics and Gynecology Clinics of North America**, v. 45, n. 2, p.



299–314, jun. 2018. DOI: 10.1016/j.ogc.2018.01.003.

FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE DIABETES. Diabetes gestacional. 2020.

Disponível em: <https://www.idf.org/our-activities/care-prevention/gdm>. Acesso em: 30 jun. 2022.

GUO, S. H. et al. Relações entre alfabetização em e-saúde móvel, autocuidado com diabetes e resultados glicêmicos em pacientes taiwaneses com diabetes tipo 2: estudo transversal. **JMIR Mhealth and Uhealth**, v. 9, n. 2, p. e18404, fev. 2021. DOI: 10.2196/18404.

HUGHSON, J. P. et al. A ascensão dos aplicativos de gravidez e as implicações para mulheres cultural e linguisticamente diversas: revisão narrativa. **JMIR Mhealth and Uhealth**, v. 6, n. 11, p. e189, nov. 2018. DOI: 10.2196/mhealth.9119.

KC, K.; SHAKYA, S.; ZHANG, H. Diabetes mellitus gestacional e macrosomia: uma revisão da literatura. **Annals of Nutrition and Metabolism**, v. 66, supl. 2, p. 14–20, 2015. DOI: 10.1159/000371628.

KREPS, G. A relevância da literacia em saúde para a saúde móvel. **Information Services and Use**, v. 37, n. 2, p. 123–130, 2017. DOI: 10.3233/isu-170828.

MARCIANO, L.; CAMERINI, A. L.; SCHULZ, P. J. O papel da alfabetização em saúde no conhecimento, autocuidado e controle glicêmico do diabetes: uma meta-análise. **Journal of General Internal Medicine**, v. 34, n. 6, p. 1007–1017, 2019. DOI: 10.1007/s11606-019-04832-y.

McGUANE, J. T.; GRLJ, L.; PEEK, M. J. Obesidade, diabetes gestacional e macrosomia estão associadas a taxas crescentes de indução precoce do parto no Hospital de Canberra. **Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology**, v. 59, n. 2, p. 215–220, abr. 2019. DOI: 10.1111/ajo.12820.

NORMAN, C. D.; SKINNER, H. A. Alfabetização em e-saúde: habilidades essenciais para a saúde do consumidor em um mundo em rede. **Journal of Medical Internet Research**, v. 8, n. 2, p. e9, jun. 2006. DOI: 10.2196/jmir.8.2.e9.

PARSONS, J. et al. Experiências com diabetes gestacional e cuidados com diabetes gestacional: um estudo de grupo focal e entrevista. **BMC Pregnancy and Childbirth**, v. 18, n. 1, p. 25, jan. 2018. DOI: 10.1186/s12884-018-1657-9.

SARAVANAN, P. et al. Diabetes gestacional: oportunidades para melhorar a saúde materna e infantil. **The Lancet Diabetes & Endocrinology**, v. 8, n. 9, p. 793–800, set. 2020. DOI: 10.1016/s2213-8587(20)30161-3.

TEITELMAN, A. M. Usando tecnologias móveis para melhorar a saúde da mulher. **Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing**, v. 47, n. 6, p. 830–832, nov. 2018. DOI: 10.1016/j.jogn.2018.09.004.



TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E INTERVENÇÕES NUTRICIONAIS: OS IMPACTOS DA DIETA SEM GLÚTEN E SEM CASEÍNA

^{1,2}Elza Stefane Felipe Ornelas

^{2,3}Júlia da Costa Carneiro Cruz

^{1,2}Vívyan Alice Clemente Vieira

^{1,2}Gabrielle Venâncio Muniz Souza

^{1,2}Emília Maricato Pedro dos Santos

¹Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Veterinária, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil; ²Grupo de Pesquisa em Inspeção, Tecnologia e Controle de Qualidade de Produtos de Origem Animal da Universidade Federal de Juiz de Fora (GPPoa UFJF), Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil; ³Universidade Federal do Pampa, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Uruguiana, Rio Grande do Sul, Brasil

Área temática: Nutrição

Resumo: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição multifatorial do neurodesenvolvimento, caracterizada por alterações comportamentais, cognitivas e gastrointestinais. Portanto, torna-se evidente a necessidade de estudar a relação entre a ingestão de glúten e caseína com os sintomas do TEA, considerando os impactos que estes componentes alimentares podem causar no organismo de indivíduos com TEA e este foi o objetivo da presente revisão de literatura integrativa. Para isso, foi realizada uma revisão sistematizada da literatura em bases de dados científicas, no mês de dezembro de 2024, com o objetivo de identificar as evidências mais recentes sobre o tema. Estudos apontam que pacientes com TEA são mais suscetíveis a reações inflamatórias intestinais, o que está relacionado ao aumento da produção de citocinas inflamatórias e à presença de peptídeos bioativos derivados do glúten e da caseína. Estes peptídeos podem atravessar a barreira hematoencefálica e afetar diretamente o sistema nervoso central, intensificando sintomas do transtorno. A dieta isenta de glúten e caseína, assim como a substituição do leite convencional pelo leite A2, que não libera a β -casomorfina-7 durante a digestão, têm se mostrado uma alternativa promissora na redução de sintomas gastrointestinais, comportamentais e cognitivos em indivíduos com TEA. Ainda que estas estratégias não representem uma cura, evidenciam-se como ferramentas terapêuticas complementares importantes. Sendo assim, intervenções alimentares direcionadas e acompanhadas por profissionais especializados podem representar uma abordagem eficaz na promoção da saúde e da qualidade de vida de pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por ampla heterogeneidade clínica, incluindo o autismo e outras síndromes, como a Síndrome de Asperger. As manifestações principais envolvem prejuízos na interação social, além de comportamentos repetitivos e estereotipados. Além disso, indivíduos com TEA frequentemente apresentam alterações sensoriais, dificuldades motoras e distúrbios gastrointestinais, refletindo a complexidade multifatorial deste transtorno (González-Domenech *et al.*, 2022).

Embora a etiologia do Transtorno do TEA ainda não esteja completamente elucidada, evidências sugerem a influência de fatores genéticos, imunológicos, nutricionais e eventos



pré e pós-natais. Os indivíduos com TEA frequentemente apresentam padrões alimentares seletivos, atípicos e rejeição a determinados alimentos, o que compromete a qualidade da dieta. Tais problemas nutricionais parecem decorrer não apenas de intolerâncias alimentares, mas também de aspectos comportamentais, como hipersensibilidade sensorial, resistência a mudanças e fixação por rotinas (Baspinar; Yardimci, 2020).

Evidências apontam que fatores nutricionais podem desempenhar um papel relevante no desenvolvimento e agravamento dos sintomas do TEA. Alimentos contendo glúten e caseína têm sido associados à intensificação destes sintomas, especialmente em função de alterações gastrointestinais comuns nestes indivíduos. Acredita-se que a maior permeabilidade intestinal permita a passagem de peptídeos com atividade opioide para a corrente sanguínea e, posteriormente, para o sistema nervoso central, potencializando os efeitos neurológicos do transtorno. Em decorrência disso, dietas sem glúten e caseína têm sido consideradas uma estratégia promissora na redução dos sintomas do TEA (Alamri, 2020).

A caseína é a principal proteína do leite, sendo este alimento, uma importante fonte de proteínas de alto valor biológico. Entre suas variantes, a β -caseína A1 tem sido associada a diversas condições de saúde, incluindo doenças neurológicas e também o TEA, devido à liberação do peptídeo beta-casomorfina-7 (BCM-7) durante sua digestão. O BCM-7 pode aumentar a permeabilidade intestinal e da barreira hematoencefálica, favorecendo sua entrada no sistema nervoso central e potencialmente contribuindo para alterações comportamentais e cognitivas. Em contrapartida, o consumo de leite contendo exclusivamente β -caseína A2 não leva à formação de BCM-7, sendo considerado uma alternativa nutricional mais segura para indivíduos com TEA (Ulaş *et al.*, 2022).

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi investigar a relação entre a ingestão de alimentos contendo glúten e caseína e a manifestação dos sintomas do TEA. Buscou-se apresentar novas abordagens de pesquisa, como a terapia da implementação de dieta isenta de glúten e caseína, bem como a introdução do leite A2 na dieta infantil.

METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma revisão de literatura integrativa que aborda a relação entre a dieta com restrição a glúten e caseína e o TEA. Para isso, foi realizada uma busca sistematizada das informações nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), Portal de Periódicos CAPES/MEC, PUBMED e *Science Direct*, em dezembro de 2024, utilizando os descritores “caseína”, “dieta”, “glúten”, “leite A2” e “TEA”, combinados pelo operador booleano “and” para o cruzamento de dados. Foram priorizados estudos em português e inglês, publicados entre 2020 e 2024. Das 10.687 publicações inicialmente encontradas, 14 atenderam aos critérios de inclusão, sendo selecionadas a partir da presença dos descritores no título, resumo e/ou palavras-chaves e excluídas cartas ao autor, monografia e trabalhos publicados fora do período determinado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O TEA é uma condição do neurodesenvolvimento, caracterizado por dificuldades na comunicação social e por comportamentos sensorio-motores repetitivos e estereotipados, com variações diferentes. Estima-se que o TEA afete pelo menos 1 % da população mundial, observando-se um aumento nos diagnósticos graças aos avanços da medicina. Diversos



fatores de risco têm sido associados ao TEA, incluindo aspectos maternos, estilo de vida pré e perinatal e fatores dietéticos (Lange; Reissmann, 2021).

Embora ainda não exista cura para o TEA, nas últimas duas décadas o papel do canal alimentar tem ganhado destaque nas pesquisas, principalmente devido à elevada incidência de distúrbios gastrointestinais nos pacientes. Estudos indicam que crianças com o transtorno apresentam altos níveis de citocinas pró-inflamatórias após a ingestão de proteínas, como glúten, da soja e caseína. Novas teorias sugerem uma interação entre o canal alimentar, a microbiota intestinal e o sistema imunológico, com produção de substâncias inflamatórias e neuroativos, como ácidos graxos de cadeia curta e neuropeptídeos, que podem interferir no comportamento e na comunicação. Peptídeos derivados do glúten e da caseína também se relacionaram ao aumento da atividade do sistema nervoso, contribuindo para os sintomas do TEA (Keller *et al.*, 2021).

A implementação de dietas especializadas, como *gluten-free diet* (DFG), ganharam destaque como estratégia para amenizar os efeitos comportamentais e intelectuais em pacientes com TEA. Embora seja originalmente voltada ao tratamento da doença celíaca, a DFG também é considerada relevante para pacientes autistas. Desde 1969, estudos sugerem uma possível ligação entre o glúten e o TEA, baseada em fatores genéticos, reatividade imunológica e no efeito opioide do glúten mal digerido, que pode induzir uma inflamação cerebral e estresse oxidativo (Croall *et al.*, 2021).

As dietas sem caseína surgem como outra alternativa promissora no gerenciamento dos sintomas gastrointestinais em pacientes com TEA, especialmente naqueles com alergia às proteínas presente nos lácteos. A exclusão da caseína tem sido associada à melhora na saúde intestinal, bem-estar geral, comportamento, interação social, além da redução de hiperatividade, comportamentos repetitivos e irritabilidade. Entretanto, a adoção dessa dieta exige uma boa avaliação prévia e planejamento nutricional cuidadoso (Al-Beltagi, 2024).

Sintomas gastrointestinais, como vômitos, diarreia, distensão e dor abdominal, são comuns em crianças com TEA. Pelo menos um terço dos pacientes com TEA apresentam hipersensibilidade a proteínas, especialmente as presentes em derivados do leite e do trigo. Enquanto em indivíduos saudáveis a digestão da caseína gera peptídeos de baixo potencial imunogênico, em pacientes com TEA a função digestiva é comprometida pela deterioração da barreira intestinal, resultando em uma resposta imunológica exacerbada a estas proteínas (Valenzuela-Zamora *et al.*, 2024).

O leite é amplamente consumido devido sua importância cultural e valor nutricional, sendo uma importante fonte de proteínas, peptídeos, fósforo e cálcio (Cirilo *et al.*, 2020). A caseína, que representa cerca de 80 % das proteínas do leite, foi associada ao desenvolvimento de diversas condições de saúde, como diabetes *mellitus* tipo 1, doenças cardiovasculares, síndrome da morte súbita infantil, alergias, distúrbios neurológicos e o TEA. Dentre suas variantes, a β -caseína é a mais estudada, especialmente as isoformas A1 e A2. Estudos recentes indicam que o consumo de leite A2 pode ser uma opção mais segura, com menor risco de desencadear tais condições (Choi *et al.*, 2024).

A dieta influencia diretamente os processos fisiológicos e certos alimentos, como os lácteos, têm sido associados a distúrbios como desconforto gastrointestinal. A β -caseína, proteína predominante no leite, possui duas subvariantes principais: A1 e A2, que se diferenciam pelo aminoácido localizado na posição 67 da cadeia proteica — histidina na A1 e prolina na A2. Esta diferença afeta a clivagem enzimática, já que a prolina reduz a formação do peptídeo β -casomorfina-7 (BCM-7), cuja presença elevada está ligada a efeitos adversos. A BCM-7 tem afinidade pelo sistema nervoso e sua alta concentração na urina de crianças com TEA está associada ao agravamento dos sintomas do transtorno, incluindo comprometimento neurocognitivo (Kay *et al.*, 2021).



O leite A2, que recentemente foi introduzido no mercado brasileiro, não contém a variante A1 da β -caseína, responsável pela liberação do peptídeo BCM-7. A substituição do leite comum pelo leite A2 demonstrou melhora no desempenho cognitivo de pacientes com TEA. Em um estudo com 45 indivíduos, foi observado que o consumo de leite com ambas as variantes A1 e A2 da β -caseína causou uma redução na velocidade e precisão do processamento cognitivo após 14 dias. No entanto, este efeito não foi registrado nos pacientes que consumiram exclusivamente leite A2 (Fernández-Rico *et al.*, 2022).

Embora o tratamento do TEA seja predominantemente baseado em intervenções farmacológicas, educacionais e psicossociais, alternativas como a dieta *gluten-free and casein-free* (GFCF) têm mostrado efeitos promissores. Estudos sugerem que essa dieta pode reduzir sintomas relacionados a comportamentos sociais, cognitivos e de comunicação. A gliadina, proveniente do glúten, e a caseína, do leite, ao entrarem em contato com a mucosa intestinal, estimulam a liberação de citocinas e mediadores inflamatórios, comprometendo a microbiota intestinal. Isso facilita a translocação destas proteínas para a corrente sanguínea, com potencial de atravessar a barreira hematoencefálica e atingir o sistema nervoso. Um estudo com 297 indivíduos indicou efeitos positivos após a adoção da dieta GFCF, sem aumento de distúrbios gastrointestinais em comparação à dieta convencional (Quan *et al.*, 2021).

A seletividade alimentar em pacientes com TEA afeta diversos aspectos sensoriais e pode levar a distúrbios metabólicos e deficiências nutricionais. Dietas como GFCF ou ricas em fibras foram adotadas para manter uma microbiota intestinal saudável, mas poucos estudos garantem sua eficácia a longo prazo sem efeitos negativos. A implementação de mudanças alimentares é desafiadora, devido às preferências alimentares restritas e comportamento exigente, o que pode resultar em uma dieta ainda mais limitada e em deficiências nutricionais. A dieta GFCF, por exemplo, pode não restaurar a microbiota devido a sua falta de fibras e proteínas, causando aumento da população de bactérias indesejáveis no intestino (Puricelli *et al.*, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dietas isentas de glúten e caseína, bem como a substituição do leite convencional pelo leite A2, mostram potencial para reduzir sintomas em indivíduos com TEA. Embora a relação entre alimentação, microbiota, permeabilidade intestinal e função neurológica ainda esteja em estudo, estratégias nutricionais individualizadas e baseadas em evidências podem representar um avanço no cuidado integral de pacientes com TEA.

Palavras-chave: Autismo infantil; Alimentação infantil; Leite; Nutrologia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALAMRI, E. S. Efficacy of gluten- and casein-free diets on autism spectrum disorders in children. **Saudi Medical Journal**, v. 41, n. 10, p. 1041-1046, 2020. DOI:10.15537/smj.2020.10.25308.

AL-BELTAGI, M. Nutritional management and autism spectrum disorder: A systematic review. **World Journal of Clinical Pediatrics**, v. 13, n.4, p. 1-38, 2024. DOI: 10.5409/wjcp.v13.i4.99649.

BASPINAR, B.; YARDIMCI, H.; Gluten-free casein-free diet for autism spectrum disorders: can it be effective in solving behavioural and gastrointestinal problems? **The Eurasian Journal of Medicine**, v. 52, n. 3, p. 292-297, 2020. DOI:



10.5152/eurasianjmed.2020.19230.

CHOI, Y.; KIM, N.; SONG, C. H.; KIM, S.; LEE, D. H. The Effect of A2 milk on gastrointestinal symptoms in comparison to a1/a2 milk: a single-center, randomized, double-blind, cross-over study. **Journal of Cancer Prevention**, v. 29, n. 2, p. 43-53, 2024. DOI: 10.15430/JCP.24.007.

CIRILO, G. M. D.; OLIVIERI, C. M. R.; MARTINS, M. C. T. Bebidas vegetais alternativas ao leite: comparação nutricional com o leite de vaca. **Lifestyle Journal**, v. 7, n. 1, p. 15-25, 2020. DOI: 10.19141/2237-3756.lifestyle.v7.n1.p15-25.

CROALL, I. C.; HOGGARD, N.; HADJIVASSILIOU. gluten and autism spectrum disorder. **Nutrients**, v. 13, n.2, p. 1-19, 2021. DOI: 10.3390/nu13020572.

FERNÁNDEZ-RICO, S.; MONDRAGÓN, A. D. C.; LÓPEZ-SANTAMARINA, A.; CARDABELLE-COBAS, A.; REGAL, P.; LAMAS, A.; IBARRA, I. S.; CEPEDA, A.; MIRANDA, J. M. A2 milk: new perspectives for food technology and human health. **Foods**, v. 11, n. 16, p. 1-20, 2022. DOI: 10.3390/foods11162387.

GONZÁLEZ-DOMENECH, P. J.; DIAZ-ATIENZA, F.; GUTIÉRREZ-ROJAS, L.; FERNÁNDEZ-SOTO, M. L.; GONZÁLEZ-DOMENECH, C. M. A narrative review about autism spectrum disorders and exclusion of gluten and casein from the diet. **Nutrients**, v. 14, n. 9, p. 1-11, 2022. DOI:10.3390/nu14091797.

KAY, S. S.; DELGADO, S.; MITTAL, J.; ESHRAGHI, R.; MITTAL, R.; ESHRAGHI, A. A. Beneficial effects of milk having a2 β -casein protein: myth or reality? **The Journal of Nutrition**, v. 151, n. 5, p. 1061-1072, 2021. DOI: 10.1093/jn/nxaa454.

KELLER, A.; RIMESTAD, M. L.; ROHDE, J.F.; PETERSEN, B. H.; KORFITSSEN, C. B. ; SIMÃO, L.; LAURITSEN, M. B.; HANDEL, M. N. The effect of a combined gluten- and casein-free diet on children and adolescents with autism spectrum disorders: a systematic review and meta-analysis. **Nutrients**, v. 13, n. 2, p. 1-18, 2021. DOI: 10.3390/nu13020470.

LANGE, K. W.; REISSMANN, A.; Is the gluten-free and casein-free diet efficacious in the treatment of childhood autism spectrum disorder? **Journal of Food Bioactives**, v. 15, n. 1, p. 3-12, 2021. DOI: 10.31665/JFB.2021.15277.

PURICELLI, C.; ROLLA, R.; GIGLIOTTI, L.; BOGGIO, E.; BELTRAMI, E.; DIANZANI, U.; KELLER. The gut-brain-immune axis in autism spectrum disorders: a state-of-art report. **Frontiers**, v. 12, n. 1, p. 755171, 2022. DOI: 10.3389/fpsy.2021.755171.

QUAN, L.; XU, X.; CUI, Y.; HAN, H.; HENDREN, R. L.; ZHAO, L.; YOU, X. A systematic review and meta-analysis of the benefits of a gluten-free diet and/or casein-free diet for children with autism spectrum disorder. **Nutrition Reviews**, v. 80, n. 5, p. 1237-124, 2021. DOI: 10.1093/nutrit/nuab073.

ULAŞ, A. S.; ÇAKIR, A.; ERBAŞ, O. Gluten and casein: their roles in psychiatric disorders. **Journal of Experimental and Basic Medical Sciences**, v. 3, n. 1, p. 13-21, 2022. DOI: 10.5606/jebms.2022.1003.

VALENZUELA-ZAMORA, A. F.; CAMPOS-VEGA, R.; LÓPEZ-DIAZ J. A.; WALL-MEDRANO, A. The severity of gastrointestinal disorders and autistic-like behaviors



could be associated with a selective humoral response to bovine milk caseins: a case series.
Gastroenterology Insights, v. 15, n. 3, p. 530-540, 2024. DOI:10.3390/gastroent15030039.



PREVENÇÃO À DOENÇA DE CHAGAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA RIBEIRINHA DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, PARÁ

¹Camile Amaral Pinto

²Samanta Barra dos Santos

³Alba Lúcia Ribeiro Raithy Pereira

^{1,2} Universidade do Estado do Pará, Cametá, Pará, Brasil

³ Universidade do Estado do Pará, Belém, Pará, Brasil

Área temática: Educação em Saúde

Resumo: A Doença de Chagas (DC) é uma protozoose negligenciada causada pelo *Trypanosoma cruzi* e atinge populações em diferentes zonas de habitação, afetando principalmente pessoas que residem em zonas rurais. O principal controle e manejo dessa doença se dá a partir de métodos de prevenção. Diante disso, este estudo objetivou relatar experiências acadêmicas de uma proposta de educação em saúde em uma escola ribeirinha a partir de uma oficina sobre prevenção à Doença de Chagas. A intervenção educativa foi conduzida no segundo semestre de 2024 em uma escola pública ribeirinha da educação básica, localizada na ilha de Itaúna de Baixo situada no interior do município de Cametá. Participaram da intervenção alunos do 7º ano. A proposta se deu a partir de duas etapas: Exposição teórica sobre a DC abordando: vetor, protozoário, modos de infecção e sintomas, prevenção e dados epidemiológicos da DC de (2013 a 2023) do SINAN. Posteriormente, os alunos foram divididos em dois grupos para aplicação do jogo do tabuleiro como forma de consolidação de conhecimentos. Através da educação em saúde, foi possível disseminar entre os alunos, informações de prevenção da doença de forma simples e acessível e construir aprendizado, perceptível por meio dos acertos das perguntas. As ações intervencionistas preventivas são indispensáveis para mitigação da transmissão da DC, sendo necessária a propagação desses conhecimentos para que a população ribeirinha obtenha uma melhor qualidade de vida.

INTRODUÇÃO

A Doença de chagas (DC) é causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi* e se não tratada, pode levar a graves alterações cardíacas, neurológicas e digestivas e tornar-se fatal para o indivíduo. As principais formas de contrair o protozoário são: vetorial (insetos triatomíneos hematófagos, conhecidos popularmente como “barbeiros”), transfusão sanguínea, vertical e oral. Apresenta duas fases clínicas: a Doença de Chagas Aguda (DCA) e Doença de Chagas Crônica (DCC) (Argolo *et al.*, 2008). A DCA é vista como uma doença endêmica na Região Amazônica, com repetitivos surtos epidêmicos entre pessoas de uma mesma família, que podem ocorrer em zonas urbanas e rurais. Em relação as localidades ribeirinhas, há a predominância de açais e outras vegetações onde são encontrados os insetos barbeiros, principais vetores da DC. O município de Cametá, de acordo com o SINAN (2021), é o quarto colocado no número de casos de doença de Chagas Aguda, sendo que o maior número de casos se encontra nas localidades rurais, principalmente nas comunidades ribeirinhas da região, o que se torna necessário a propagação de informações para a prevenção desta doença (Geres; Rabi; Bonatti, 2022). Nesse contexto, a escola se



destaca como uns dos principais meios de veiculação de informações, sua conexão com a comunidade reflete em possibilidades em trabalhar temáticas que são relevantes para o aprendizado dos alunos, sendo que é na infância que ocorre o processo de construção de conhecimentos científicos. Levar conhecimentos de prevenção em relação a DC para a escola ribeirinha, permite com que haja disseminação do conhecimento para que os alunos adotem medidas de prevenção contra a doença, levando o mesmo saber para o contexto familiar, contribuindo para a promoção da saúde da comunidade (Pereira-Silva; Mello; Araújo-Jorge, 2022).

OBJETIVO

Relatar experiências acadêmicas de uma proposta de educação em saúde em uma escola ribeirinha, a partir de uma oficina sobre prevenção à Doença de Chagas.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência resultado de um projeto de pesquisa de Iniciação Científica, realizada com alunos do 7º ano de uma escola pública ribeirinha localizada na ilha do Itáuna de Baixo que faz parte do município de Cametá, estado do Pará no segundo semestre de 2024. A Ilha encontra-se a leste da sede do município (mais precisamente em frente da cidade). A cidade está situada à margem esquerda do rio Tocantins, apresentando uma área territorial de 3.081,367km², tem como coordenadas geográficas: latitude 2° 15' 15" sul, longitude 49° 30' 44" oeste, sua população é estimada em 140.814 habitantes (IBGE, 2021). Por se tratar de um projeto onde não haveria coleta de dados de participantes, bem como a indentificação individual dos mesmos, apenas disseminação de informações acerca da prevenção à DC, o mesmo foi dispensado para a obtenção do CEP (Comitê de Ética em Pesquisa). A intervenção em saúde, foi realizada a partir de uma oficina dividida em duas etapas: Na primeira, foram expostos de forma dialogada, conhecimentos acerca da DC, como: vetor, protozoário, modos de infecção, sintomas e dados epidemiológicos da DC de (2013 a 2023) obtidos através do SINAN. Em seguida foram apresentados aos estudantes as dez principais formas de prevenção a DC, levando em consideração os aspectos do ambiente onde estes residem. Para a essa exposição foram utilizados os seguintes recursos didáticos: cartazes impressos em folhas de A4 e colocados em papeis tipo 40kg, maquetes em isopor do vetor e agente etiológico da doença. Na segunda etapa, foi aplicado um jogo de tabuleiro confeccionado em tecido de TNT e E.V.A, como forma de consolidação de conhecimento. Para a dinâmica os estudantes foram divididos em dois grupos de 8 pessoas, cada equipe tinha um representante o qual poderia socializar com os demais integrantes para responder as perguntas, o vencedor seria o qual chegasse primeiro na última casa. Ao final da prática lúdica foram entregues aos alunos panfletos contendo as informações de forma resumida sobre a DC, para serem compartilhados com os grupos familiares dos discentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A escolha por levar o conhecimento de prevenção para uma comunidade local foi pensada a partir da pouca divulgação de informação sobre a doença para a população em geral. As formações e cursos de capacitação ofertados pelas secretarias de saúde municipal de Cametá junto com a organização estadual são restritas aos profissionais de saúde, o que



não contempla a comunidade com a mesma efetividade. Dessa forma, observou-se que por meio da escola, seria possível reunir uma parcela da população para discutir o tema. Na exposição teórica, foram abordados inicialmente conceitos relacionados a DC, como: O que é? Formas de transmissão e ciclo biológico, Características morfofisiológicas do protozoário e do vetor da doença, para isso utilizou-se como materiais didáticos cartazes do ciclo biológico e maquetes. Com a abordagem inicial, os participantes puderam compreender de forma simples como ciclo biológico do *Trypanosoma cruzi* ocorre no organismo do hospedeiro a partir da picada do inseto triatomíneo. Em relação as maquetes, através desse recurso os mesmos puderam visualizar as características que definem o protozoário e o vetor, principalmente em relação a morfologia do inseto, sendo este aprendizado necessário para que os participantes possam diferenciar o vetor dos demais insetos que apresentam características similares ao do “barbeiro”. Essa informação se torna essencial, para que os mesmos possam identificar o vetor da doença e, dessa forma, se prevenir em relação a DC (Pereira-Silva; Mello; Araújo-Jorge, 2022). Ainda na exposição, foram apresentados aos participantes 10 principais formas de prevenção contra a DC e os dados epidemiológicos sobre a DCA no município, as informações foram exibidas também em forma de cartaz. A discussão sobre a epidemiologia da DCA no município, permitiu que os alunos conhecessem o atual cenário da doença na localidade, além de perceber que eles pertencem ao grupo de risco de infecção por *T. cruzi* devido sua localização geográfica e principalmente a falta de acesso as informações sobre os aspectos que englobam a doença. Em relação as formas de prevenção, foram selecionadas de acordo com o modo de vida da comunidade, para que ela adote os conhecimentos e coloque-os em prática, contribuindo na redução do número de casos de DC no município. Durante aplicação do jogo de tabuleiro, observou-se que os participantes compreenderam os conceitos discutidos, o que foi notório a partir dos acertos de perguntas relacionadas ao que tinha sido exposto. Além disso, foi proporcionado um aprendizado lúdico e participativo, com interação dos alunos por meio das respostas e socialização com os demais estudantes e expositoras durante a oficina (Costa *et al.*, 2022). Os estudantes contemplados com a ação de extensão foram incentivados a compartilhar as informações discutidas com seus familiares e demais pessoas de seu convívio. Para auxiliar nessa tarefa, foram distribuídos panfletos produzidos pelas discentes contendo as principais informações sobre a DC. As ações de educação em saúde englobam os mais variados fatores do ciclo da doença e resultam da avaliação do perfil da saúde de uma população que viabilizam a elaboração de estratégias de profilaxia. Dessa forma é importante trabalhar nesses esforços desde a formação inicial do profissional da saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da educação em saúde na comunidade ribeirinha possibilitou a propagação de conhecimentos sobre a Doença de Chagas, que apesar de ser uma doença endêmica no município de cametá, ainda é comum encontrar pouca divulgação em relação a doença nessas localidades, principalmente voltadas para formas de prevenção. Nesse sentido, a partir da ação educativa os participantes puderam aprender de forma simples e acessível o que contribuiu para que a intervenção fosse concluída com êxito, levando o mesmo aprendizado para o ambiente familiar. Como experiência para a equipe do projeto, esta pesquisa permitiu vivenciar a realidade e compreender a realidade ribeirinha, principalmente como a doença se comporta nesses públicos por meio dos dados epidemiológicos. Além de contribuir na análise desse contexto epidemiológico levando a criar estratégias e oportunidades para a disseminação desses conhecimentos e nas principais formas de



prevenção contra essa patologia através da Ação Integrada em Saúde deste estudo.

Palavras-chave: Doença de Chagas; Educação em Saúde; Prevenção.

Financiamento: FAPESPA- Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARGOLO, A. M *et al.* **Doenças de chagas e seus principais vetores no Brasil**. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2008. 67 p. Disponível em: https://www.saude.go.gov.br/images/imagens_migradas/upload/arquivos/2012-05/cartilha-chagas.pdf. Acesso em: 11 ago. 2023.

COSTA, Thalia de Oliveira *et al.* Educação em saúde por meio de jogos lúdicos para a prevenção de parasitoses. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, [S.L.], v. 42, n. 2, p. 1-9, 12 out. 2022. Revista Eletronica Acervo Saude. <http://dx.doi.org/10.25248/reac.e10936.2022>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/10936/6630>. Acesso em: 01 abr. 2025.

FRAGATA, A. A. A Doença de Chagas: seria o barbeiro o único culpado?. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, [S.L.], v. 117, n. 11, p. 1-7, jul. 2021. **Sociedade Brasileira de Cardiologia**. <http://dx.doi.org/10.36660/abc.20210290>. Disponível em: <https://abccardiol.org/article/a-doenca-de-chagas-seria-o-barbeiro-o-unico-culpado/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

GERES, L. F.; RABI, L. T.; BONATTI, T. R. A importância da vigilância epidemiológica no combate à Doença de Chagas: uma revisão integrativa. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [S.L.], v. 15, n. 1, p. 1-11, 18 jan. 2022. Revista Eletronica Acervo Saude. <http://dx.doi.org/10.25248/reas.e9492.2022>. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/9492>. Acesso em: 18 jan. 2024.

IBGE – **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Censos de 2021. Cametá-Pará: IBGE, 2021.

PEREIRA-SILVA, Fernanda Sant'ana; MELLO, Marcio Luiz Braga Corrêa de; ARAËJO-JORGE, Tania Cremonini de. Doença de Chagas: enfrentando a invisibilidade pela análise de histórias de vida de portadores crônicos. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 27, n. 5, p. 1939-1949, maio 2022. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232022275.08492021>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/GzX7xfWzVGt6HXDs78c3qYg/>. Acesso em: 25 abr. 2025.



INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E RASTREABILIDADE: A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA GARANTIA DA QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

^{1,2}Maria Fernanda Neto Campos

^{1,2}Julio Ribeiro Lopes

^{1,2}Ariany Lacerda Nogueira

^{2,3}Júlia da Costa Carneiro Cruz

^{1,2}Emília Maricato Pedro dos Santos

¹Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Veterinária, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil; ²Grupo de Pesquisa em Inspeção, Tecnologia e Controle de Qualidade de Produtos de Origem Animal da Universidade Federal de Juiz de Fora (GPPoa UFJF), Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil; ³Universidade Federal do Pampa, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Uruguiana, Rio Grande do Sul, Brasil

Área temática: Biotecnologia

Resumo: A rastreabilidade é um instrumento fundamental para assegurar a transparência, segurança dos alimentos e conformidade regulatória nas cadeias produtivas de produtos de origem animal. A crescente complexidade destas cadeias e a demanda por qualidade têm impulsionado a utilização de tecnologias inovadoras. Nesse cenário, a Inteligência Artificial (IA) emerge como uma aliada estratégica na superação de limitações operacionais e na otimização dos sistemas de rastreamento. Objetivou-se, neste estudo, analisar a utilização da IA no aprimoramento da rastreabilidade de produtos de origem animal, abordando suas aplicações, benefícios, desafios e perspectivas. Este trabalho consiste em uma revisão de literatura integrativa, a partir da busca sistematizada das informações, que resultou na seleção de 11 estudos relevantes. A utilização de IA, blockchain, sensores IoT (*Internet of Things*) e algoritmos de aprendizado de máquina possibilitam avanços significativos na detecção de anomalias, na análise preditiva e na tomada de decisões em tempo real, aumentando a precisão, a agilidade e a confiabilidade dos dados ao longo da cadeia produtiva de alimentos. A IA apresenta eficácia na garantia de qualidade, na rastreabilidade ética e religiosa e no monitoramento do bem-estar animal, e promove ganhos em biossegurança, sustentabilidade e resposta a não conformidades. Contudo, ainda existem desafios a serem superados, como altos custos de implementação, escassez de profissionais capacitados e necessidade de validação em ambientes reais. Portanto, a IA apresenta elevado potencial para fortalecer a rastreabilidade e a governança nas cadeias agroindustriais, desde que acompanhada por estratégias de capacitação, políticas públicas adequadas e infraestrutura compatível.

INTRODUÇÃO

Os sistemas de rastreabilidade configuram-se como instrumentos estratégicos indispensáveis à governança das cadeias produtivas agroalimentares, com ênfase na promoção da segurança higiênico-sanitária, no aprimoramento do controle de qualidade, na mitigação de adulterações, na conformidade com exigências normativas internacionais e no fortalecimento da confiança do consumidor. Tais sistemas são concebidos com o propósito de assegurar a rastreabilidade da origem dos produtos e dos insumos empregados em sua elaboração, mediante um arcabouço informacional robusto e integrado. Fundamentam-se, conceitualmente, em três pilares interdependentes: a abrangência, que se refere à diversidade



e à amplitude dos dados registrados ao longo da cadeia produtiva; a profundidade, relativa ao grau de monitoramento e detalhamento destas informações; e a precisão, entendida como a acurácia na identificação de eventos, atributos ou não conformidades vinculadas ao produto. A eficácia da rastreabilidade, portanto, repousa na sinergia entre estas três dimensões, sendo especialmente relevante em cadeias produtivas complexas e sensíveis, como a da carne bovina (Furquim, 2016).

A rastreabilidade identifica a origem dos materiais e envolve documentação meticulosa de processos, o que exige uma compreensão detalhada e o gerenciamento correto das informações. Portanto, sua implementação e funcionamento dependem de execução precisa e livre de falhas humanas. Nesse cenário, a negligência na aquisição de informações ou o registro inadequado de dados compromete a qualidade do sistema. Além disso, a perda de integrantes durante a execução do sistema de rastreabilidade pode levar à perda de conhecimentos tácitos, comprometendo a continuidade e a precisão dos dados, o que, por sua vez, gera falhas na comunicação e interpretações equivocadas, afetando diretamente a sua eficácia. Dessa forma, a dependência de uma estrutura sólida e bem executada, tanto na coleta de dados quanto na transmissão de conhecimento entre os envolvidos, é imprescindível para que os sistemas de rastreabilidade cumpram seu papel de forma eficiente (Vinholis; Azevedo, 2002).

Nesse sentido, as exigências sociais e regulatórias por alimentos seguros e de qualidade impulsionaram a implementação de sistemas de rastreabilidade ao longo da cadeia de produtos de origem animal. A rastreabilidade permite o acesso ao histórico e à trajetória dos alimentos, desde a produção da matéria-prima até a chegada ao consumidor final, garantindo transparência e resposta ágil frente a não conformidades. Embora não garanta, de forma isolada, a inocuidade dos alimentos, sua integração a programas de autocontrole reforça os mecanismos de controle sanitário. Destaca-se, ainda, a adoção crescente de tecnologias disruptivas, como o blockchain, que assegura registros invioláveis e auditáveis em tempo real, viabilizando uma rastreabilidade contínua, confiável e acessível, com benefícios diretos à gestão da segurança dos alimentos e à proteção do consumidor (Freire; Shecaira, 2020).

Tecnologias como identificação por radiofrequência, códigos de resposta rápida, códigos de barras de DNA e chips microfluídicos têm demonstrado eficiência no controle de qualidade de ponta a ponta, proporcionando uma rastreabilidade robusta e assegurando a autenticidade dos produtos de origem animal ao longo da cadeia de suprimentos. Entretanto, a crescente complexidade das cadeias produtivas de alimentos, aliada à sofisticação das práticas fraudulentas, impõe a necessidade de soluções mais escaláveis, adaptáveis e tecnologicamente avançadas. Nesse cenário, a Inteligência Artificial (IA) emerge como uma ferramenta disruptiva, oferecendo capacidades aprimoradas para o processamento de grandes volumes de dados heterogêneos, além de otimizar os sistemas de verificação e rastreabilidade, promovendo maior segurança e integridade na autenticação dos alimentos (Liu *et al.*, 2025).

OBJETIVO

Objetivou-se, neste estudo, apresentar e discutir a utilização da inteligência artificial como ferramenta para aprimorar a rastreabilidade de produtos de origem animal, destacando suas aplicações, vantagens, desafios e perspectivas.

METODOLOGIA

O presente trabalho configura-se como uma revisão de literatura integrativa, com



foco na utilização da inteligência artificial na rastreabilidade de produtos de origem animal. Para tanto, foi realizada uma busca sistematizada das informações nas bases de dados *National Library of Medicine (PubMed)*, *Science Direct* e *Scientific Electronic Library Online (SCIELO)*, utilizando-se os descritores “*artificial intelligence*”, “*food safety*”, “*future*”, “*meat*”, “*traceability*”, “*inteligência artificial*”, “*produtos de origem animal*”, “*rastreabilidade*”, combinados por meio do operador “*and*”, para o cruzamento de dados. A coleta de dados foi realizada em maio de 2025, priorizando-se publicações em língua inglesa e portuguesa, no período compreendido entre 2002 e 2025. Os critérios de inclusão contemplaram estudos que apresentavam os descritores no título e/ou nas palavras-chaves, excluindo-se os trabalhos com data de publicação anterior ao período de busca estipulado assim como os duplicados e, ainda, cartas ao editor, monografias, teses e dissertações. Obteve-se, aproximadamente, 20.500 publicações, elegendo-se 11 referências para leitura e discussão do tema. As informações obtidas foram organizadas e sintetizadas na forma deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação de técnicas de inteligência artificial ao longo da cadeia produtiva de alimentos de origem animal promove avanços significativos em termos de eficiência, precisão e rastreabilidade. Ferramentas baseadas em redes neurais artificiais e algoritmos genéticos têm sido empregadas com êxito na identificação automática de indivíduos, no monitoramento da qualidade de produtos em tempo real, bem como na detecção precoce de falhas operacionais e sanitárias. Além disso, a integração da IA com sistemas de blockchain possibilita o registro inviolável e a análise preditiva de grandes volumes de dados, favorecendo a rastreabilidade contínua e segura dos produtos de origem animal. Tais inovações não apenas otimizam os processos produtivos e logísticos, mas também ampliam a capacidade de tomada de decisão baseada em dados, assegurando maior transparência, biossegurança e sustentabilidade nas cadeias agroindustriais (Costa, 2009).

A crescente complexidade da cadeia de suprimentos alimentares tem ampliado vulnerabilidades, como adulterações e contaminações, exigindo soluções tecnológicas avançadas. A integração de inteligência artificial, blockchain (BC) e sensores IoT (*Internet of Things*) é eficaz na rastreabilidade e segurança de alimentos e pode ser aplicada em abatedouros frigoríficos, unidades de beneficiamento de leite e derivados, granjas e fazendas. Algoritmos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo realizam a análise preditiva de dados, detectando anomalias de contaminação ou deterioração. A tecnologia de blockchain assegura a imutabilidade e transparência dos registros, enquanto sensores IoT monitoram variáveis críticas, como temperatura e umidade dos alimentos, em tempo real. A convergência destas tecnologias reduz erros, aprimora a tomada de decisões e fortalece a confiança do consumidor nos processos produtivos e na conformidade com padrões regulatórios (Femimol; Joseph, 2025).

A crescente complexidade das cadeias globais de suprimentos demanda a atuação estratégica dos responsáveis por políticas públicas (*policymakers*) na promoção da rastreabilidade e da sustentabilidade. Os *policymakers* exercem papel estratégico na consolidação de sistemas digitais de rastreabilidade nas cadeias globais de pescado, promovendo governança, sustentabilidade e justiça social. Ao estabelecerem marcos regulatórios, que exigem compartilhamento transparente de dados e verificação de conformidade, contribuem para mitigar práticas ilícitas, como a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, além de coibir fraudes e violações de direitos humanos. A incorporação de tecnologias como blockchain e IoT deve ser incentivada por políticas públicas que



alinhem inovação à regulação eficaz. Assim, a atuação dos formuladores de políticas se revela essencial para fortalecer a resiliência das cadeias produtivas, assegurar a rastreabilidade de ponta a ponta e fomentar práticas sustentáveis no setor pesqueiro internacional (Cromwell *et al.*, 2025).

A rastreabilidade também apresenta grande valia na questão ético-religiosa. Sob essa afirmação, a rastreabilidade de carne fresca sob certificação halal tem sido significativamente potencializada por meio da convergência entre blockchain e tecnologias de sensores IoT. A adoção do modelo de consenso *Point of Authority* (PoA) em conjunto com sensores ambientais, possibilita o monitoramento contínuo de parâmetros críticos, como temperatura e umidade dos alimentos, durante o transporte. O sistema, estruturado em arquitetura PHP/Laravel com banco de dados SQLite e módulos embarcados programados em linguagem C, permite a rastreabilidade em tempo real acessível ao consumidor via *QR Code*. Esta abordagem fortalece a transparência, auditabilidade e integridade na cadeia de suprimentos halal, notadamente em mercados tradicionais. Ao articular inovação tecnológica com exigências religiosas, o modelo proposto configura-se como referência replicável. Contribui, ainda, para o avanço da governança e da segurança de alimentos no contexto da rastreabilidade bovina com escopo halal (Adhiwibowo *et al.*, 2025).

Apesar dos avanços tecnológicos, a implementação de sistemas baseados em inteligência artificial na manufatura, produção e operações industriais ainda enfrenta desafios significativos, sobretudo aqueles referentes a aspectos éticos, segurança de dados, transparência algorítmica e elevados custos de adoção. A análise de dados em larga escala e a automação de processos inteligentes impõem complexidades gerenciais, exigindo adaptações organizacionais substanciais. Entre os principais entraves, destacam-se a escassez de profissionais capacitados, a resistência à adoção de novas tecnologias, e impactos adversos sobre a produtividade e o desempenho operacional, evidenciando a necessidade de pesquisas acadêmicas e tecnológicas avançarem no desenvolvimento de abordagens integradas que viabilizem operações industriais inteligentes, ao mesmo tempo em que identifiquem e mitiguem riscos emergentes e fragilidades sistêmicas (Zatsu *et al.*, 2024).

Além disso, apesar de apresentar elevado potencial para a promoção do bem-estar animal, sobretudo por meio do monitoramento contínuo e automatizado de parâmetros comportamentais e fisiológicos, e viabilizar a detecção precoce de alterações indicativas de estresse, dor ou desconforto, para sua efetiva aplicação no contexto produtivo, as soluções baseadas em IA devem ser tecnologicamente acessíveis, de fácil integração à rotina operacional e capazes de emitir alertas precisos e interpretáveis aos produtores, favorecendo intervenções rápidas e eficazes. No entanto, a ampla adoção destas tecnologias requer evidências empíricas robustas, geradas por validações em condições reais de produção, que atestem sua eficácia na melhoria das condições de bem-estar animal. Assim, a IA configura-se como uma ferramenta estratégica na conversão de grandes volumes de dados em tomadas de decisão assertivas, contribuindo para sistemas de produção mais éticos, sustentáveis e responsivos às demandas sociais e de mercado (Dawkins, 2025).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inteligência artificial tem se mostrado uma ferramenta promissora na otimização dos sistemas de rastreabilidade e sua integração com tecnologias avançadas aprimora a segurança de alimentos e permite a detecção precoce de falhas operacionais. Contudo, apesar dos avanços tecnológicos substanciais, a implementação em escala ampla da IA ainda enfrenta desafios, como a necessidade de capacitação técnica especializada, altos custos de



adoção e questões éticas. Para uma adoção bem-sucedida, é imprescindível a validação empírica das soluções, que assegure sua aplicabilidade em contextos reais de produção. Assim, a IA se estabelece como uma ferramenta estratégica não apenas para aprimorar a rastreabilidade, mas também para fortalecer a confiança do consumidor e fomentar práticas mais sustentáveis e responsáveis na produção de alimentos.

Palavras-chave: Coadjuvantes de Tecnologia Alimentar; Controle de Qualidade; Produção de Alimentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADHIWIBOWO, W.; WIDAYAT, W.; SYAFEI, W. A. Design of dual blockchain-based with Point of Authority for halal traceability system application on fresh meat-based supply chain. **Results in Engineering**, v. 26, n. 1, p. 105133, 2025. DOI: 10.16/j.rineng.2025.105133.

COSTA, E. J. X. Inteligência artificial aplicada à Zootecnia. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 38, n. 1, p.390-396, 2009. DOI: 10.1590/S1516-35982009001300038.

CROMWELL, J.; TURKSON, C.; DORA, M.; YAMOAHA, F. A. Y. Digital technologies for traceability and transparency in the global fish supply chains: A systematic review and future directions. **Marine Policy**, v. 178, n. 1, p. 106700, 2025. DOI: 10.16/j.marpol.2025.106700.

DAWKINS, M. S. Smart farming and Artificial Intelligence (AI): How can we ensure that animal welfare is a priority? **Applied Animal Behaviour Science**, v. 283, n. 1. p. 106519, 2025. DOI: 10.1016/j.applanim.2025.106519.

FEMIMOL, R.; JOSEPH, L. N. A comprehensive review of blockchain with artificial intelligence integration for enhancing food safety and quality control. **Innovative Food Science & Emerging Technologies**, v. 102, n. 1, p. 104019, 2025. DOI: 10.1016/j.ifset.2025.104019.

FREIRE, C. E. C. A.; SHECAIRA, A. L. A importância da rastreabilidade dos alimentos de origem animal frente aos surtos alimentares: revisão. **Pubvet**, v. 14, n. 11, p 1-6, 2020. DOI: 10.31533/pubvet.v14n11a682.1-8.

FURQUIM, N. R. Tecnologia e o serviço de rastreabilidade na cadeia produtiva de carne bovina no Brasil. **Espacios**, v. 38, n. 19, p. 7, 2016. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n19/a17v38n19p07.pdf>. Acesso em: 13 mai. 2025.

LIU, Z.; YU, X.; LIU, N.; LIU, C.; JIANG, A.; CHEN, L. Integrating AI with detection methods, IoT, and blockchain to achieve food authenticity and traceability from farm-to-table. **Trends in Food Science & Technology**, v. 158, n. 1, p. 104925, 2025. DOI: 10.1016/j.tifs.2025.104925.

VINHOLIS, M. M. B.; AZEVEDO, P. F. Segurança do alimento e rastreabilidade: O caso de BSE. **RAE-eletronica**, v. 1, n. 2. p. 1-19, 2002. DOI: 10.1590/S1676-56482002000200008.

ZATSU, V.; SHINE, A. E.; THARAKAN, J. M.; PETER, D.; RANGANATHAN, T. V.; ALOTAIBI, S. S.; MUGABI, R.; MUHSINAH, A. B.; WASEEM, M.; NAYIK, G. A. Revolutionizing the food industry: The transformative power of artificial intelligence-a review. **Food Chemistry: XFood Chemistry: X**, v. 24, n. 1, p. 101867, 2024. DOI: 10.1016/j.fochx.2024.101867.



MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A SAÚDE DA PESSOA IDOSA: UMA PERSPECTIVA INTEGRATIVA ENTRE A VIDA HUMANA, ANIMAL E AMBIENTAL

Deisiane Aviz do Nascimento^{1,2}
Índira Angela Luza Eyzaguirre²
Aldemir Branco de Oliveira Filho²

¹Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa, Augusto Corrêa PA, Brasil.

²Instituto de Estudos Costeiros, Universidade Federal do Pará, Bragança PA, Brasil.

Área temática: Saúde do Idoso

Resumo: Este estudo analisou as influências das mudanças climáticas na saúde do idoso utilizando uma perspectiva de Saúde Única (One Health). Adotou-se a abordagem qualitativa do tipo exploratória com ênfase em pesquisas bibliográficas. Diferentes estudos apontam que as mudanças climáticas fazem parte da dinâmica natural do planeta, mas tem sido agravada pelas ações humanas, ocasionando impactos sobre a saúde e adoecimento. A população idosa faz parte dos grupos mais vulneráveis e expostos às consequências provocadas pelas mudanças climáticas. Pesquisas revelam que as mudanças climáticas impactam sobre a saúde do idoso por meio da exposição a eventos extremos ou através das alterações graduais. Desastres naturais podem causar lesões físicas, ocasionar maior possibilidade do aumento de incidência, agravos e letalidade de doenças em pessoas a partir dos 60 anos, agravamento dos quadros de doenças respiratórias e cardiovasculares, expor ou exacerbar sofrimentos mentais e psicossociais etc. Em suma, as mudanças climáticas influenciam significativamente na saúde do idoso, tanto de forma direta, como indireta, através da ocorrência de catástrofes naturais e aumento de doenças crônicas, transmissíveis ou não-transmissíveis. Portanto, nota-se, a relevância de estudos que contemplem as condições de saúde dos idosos e os determinantes socioambientais e culturais que afetam o envelhecimento e a qualidade de vida deles, numa perspectiva holística, o qual pode permitir uma integração equilibrada entre a vida humana, animal e ambiental.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, um grande avanço em estudos relacionados às relações entre a maneira de como se organiza e se desenvolve uma determinada sociedade e a situação de saúde de sua população tem sido registrado. Diante das evoluções conceituais, tem-se adotado novas formas de compreensão sobre o processo de saúde e adoecimento.

Nesse sentido, a Saúde Única (One Health) se refere a uma abordagem integrada e equilibrada entre saúde humana, animal, vegetal e ambiental, que visa promover a saúde e o bem-estar de todos os seres vivos e do meio ambiente (LOBO et al, 2021). Nessa abordagem, saúde e doença são compreendidas como consequências da interação entre humanos, animais, vegetais e ambiente.

Apesar das mudanças climáticas fazer parte da dinâmica natural do planeta terra, elas têm sido intensificadas pelas ações humanas, acarretando impactos significativos sobre a saúde dos seres vivos (BARCELLOS et al, 1998). De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (2008) os problemas de saúde humana associados às mudanças climáticas não têm sua origem necessariamente nas alterações climáticas, mas nos impactos que elas provocam. As mudanças climáticas podem



produzir impactos sobre a saúde humana de maneira direta, como no caso das ondas de calor ou mortes provocadas por outros eventos como furacões e inundações, e de forma indireta, sendo mediadas por alterações no ambiente através da alteração de ecossistemas e de ciclos biogeoquímicos que podem aumentar a ocorrência de doenças crônicas transmissíveis e não-transmissíveis. Ademais, os aumentos dos surtos de dengue, malária, insegurança alimentar e nutricional, e dos registros de casos de ecoansiedade e outros transtornos mentais são exemplos de impactos das mudanças climáticas sobre a saúde (BRASIL, p.19, 2008).

As mudanças climáticas permitem uma série de exposições a diversos fatores de riscos e a maneira mais distante dessa exposição é a alteração do estado ambiental, ocasionando propagação de vetores, interferência na qualidade das águas, na produção de alimentos e na contaminação do ar (MORENGO, 2007). É importante destacar, que a população idosa é o segmento que mais cresce. Com base nisso e alicerçada na perspectiva da Saúde Única é possível nos questionar as mudanças climáticas influenciam na saúde da pessoa idosa?

Os problemas e determinantes que afetam o envelhecimento precisam ser analisados e compreendidos em uma perspectiva de todo, levando em consideração o contexto socioambiental. Em especial, a saúde do idoso é influenciada pelo contexto ambiental, então pensar na elaboração de políticas públicas ambientais, fiscalização de leis existentes e efetivação com eficácia dessas leis, assim como, apoiar estudos que contemple tais temáticas é contribuir com a qualidade do envelhecimento da pessoa idosa.

OBJETIVO

Registrar as influências das mudanças climáticas na saúde da pessoa idosa por meio de investigações bibliográficas e dialogar com os princípios das abordagens em Saúde Única.

METODOLOGIA:

Adotou-se como estratégia metodológica a abordagem qualitativa do tipo exploratória com ênfase em pesquisas bibliográficas, que consiste na produção científica a partir de materiais elaborados anteriormente, constituídos principalmente por livros e artigos científicos. Com base na perspectiva de Gil (2008) o estudo foi desenvolvido utilizando quatro etapas: (I) Identificação de fontes de pesquisas e os mecanismos de busca, bem como, o material de investigação: livros e periódicos científicos. Nessa etapa foi realizado o mapeamento das informações e dados encontrados no material selecionado, onde buscou-se estabelecer as relações existentes entre as informações obtidas e a problemática proposta. (II) Leitura do material: primeiramente exploratória por meio da leitura do sumário, resumo, introdução, "orelhas" e de passagens dos textos. Após foi realizada a leitura seletiva, ou seja, uma leitura mais sistematizada, detalhada com maior aprofundamento e atenção. (III) Leitura analítica: nessa etapa ocorreu a organização e sistematização das informações contidas nas fontes, de maneira que proporcionasse a obtenção de respostas para a pesquisa. Nesse procedimento aconteceu a identificação das ideias-chaves, bem como a sua ordenação e síntese. (IV) Leitura interpretativa: etapa onde se estabeleceu a relação entre os conteúdos das fontes e outros conhecimentos, proporcionando a amplitude dos resultados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A perspectiva integradora “One Health” ou “Saúde Única” compreende como indissociável a relação entre saúde humana, animal e ambiental; e que o impacto das ações humanas nas mudanças climáticas propicia o (re)aparecimento das doenças negligenciadas, epidemias e pandemias (LOBO et al, 2021).



Os estudos de Morengo (2007) sinalizam sobre as consequências das mudanças climáticas na saúde dos indivíduos. Segundo o autor, o aumento de altas temperaturas provocada pelo aquecimento global tem gerado impactos intensos sobre a saúde dos indivíduos, podendo aumentar a incidência de casos de peste bubônica (epidemia que matou milhões de pessoas ao longo da história e exterminou um terço da população da Europa no século XIV) e aumento de doenças tropicais. Para Morengo (p. 140, 2007)

Num país mais quente, insetos que transmitem doenças encontram um ambiente mais favorável para sua reprodução. Os casos de doenças infecciosas transmissíveis poderão aumentar, como é o caso de dengue, malária e febre amarela. A dengue pode se alastrar pelo País. A proliferação tende a aumentar nas áreas urbanas. Secura na Amazônia centro oeste podem favorecer propagação de queimadas e aumento nos casos de alergia e doenças respiratórias.

Além disso, concluiu, que os impactos provocados pelas mudanças climáticas ocasionarão dias mais quentes e invernos mais curtos, os sistemas precários de esgoto entrarão em colapso, as regiões metropolitanas serão ainda mais quentes, com mais inundações, enchentes e desmoronamentos em áreas principalmente nas encostas de morro (MORENGO, 2007). Eventos extremos podem afetar a dinâmica das doenças de veiculação hídrica, como a leptospirose, hepatites virais, doenças diarreicas, etc. (BRASIL, 2008).

Nesse contexto, variáveis como idade, perfil de saúde, resiliência fisiológica e condições sociais influenciam diretamente nas respostas humanas relacionadas às variantes climáticas (MORENGO, 2007). Nessa perspectiva, a população idosa se constitui o segmento que mais cresce e faz parte dos grupos mais vulneráveis e expostos às mudanças climáticas (BRASIL, 2008).

O Estatuto do idoso, considera pessoa idosa, indivíduos com faixa etária igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos, sem distinção de cor, raça e ideologia (BRASIL, 2013). A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) define o envelhecimento como

um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte (BRASIL, p. 8, 2006).

Barcellos et al (1998) afirmam que as mudanças climáticas e a saúde do idoso estão inter-relacionadas e que a investigação da relação entre fatores ambientais e seus efeitos sobre a saúde pressupõe uma sucessão de eventos do processo de produção de doenças representada por uma acumulação de riscos em determinados ambientes delimitáveis e identificáveis no espaço. Segundo os autores, os agravos a saúde estão associados a distribuição desigual no espaço de fontes de contaminação ambiental, na dispersão ou concentração de agentes de risco, na exposição da população a estes agentes e nas características de suscetibilidade destes grupos (BARCELLOS et al, 1998).

O Ministério da Saúde (2025) defende que os impactos provocados pelas mudanças climáticas como ondas de calor extremo, inundações, secas e tempestades têm impactado a saúde humana. Agravando quadros de doenças respiratórias e cardiovasculares, aumentando a incidência de doenças transmitidas por vetores (chikungunya, dengue, zika e malária) e comprometendo a segurança alimentar e hídrica. Destaca ainda, que a exposição às mudanças climáticas seja por meio de eventos extremos ou através das alterações graduais, pode expor ou exacerbar sofrimentos mentais e psicossociais.

Os dados apresentados pelo Boletim Epidemiológico publicado pela Secretaria de



Vigilância em Saúde e Ambiente - Ministério da Saúde (2024) mostram: Maior percentual de agravamento nos casos de dengue a partir dos 60 anos e em menores de 1 ano; As maiores taxas de letalidade estão nas faixas etárias menores de 1 ano e com incremento gradativo a partir dos 50 anos de idade; E no ano de 2024 os extremos de idade estão relacionados à maior gravidade e ao maior risco de ocorrência de óbitos.

A pesquisa desenvolvida por Soares et al (2012) também revela que os idosos são mais sensíveis aos efeitos da alta temperatura do que indivíduos em outras faixas etárias. Neste estudo, identificaram que existe correlações entre o número de óbitos de indivíduos idosos e as alterações climáticas no município de São Carlos (SP) em um período de 10 anos (1997-2006). Os dados mostraram que ocorreram 8.304 óbitos, com predominância em pessoas com a faixa dos 80 anos ou mais, do sexo masculino.

Para Pereira, Nogueira e Silva (2015) a ocorrência de determinadas doenças é fator contribuinte para maior fragilização do idoso, podendo inclusive, interferir negativamente na sua qualidade de vida. Além disso, desastres naturais podem causar lesões físicas, estresse psicológico e sobrecarregar sistemas de saúde. Populações vulneráveis como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas estão especialmente em risco, destacando a importância de políticas de adaptação e mitigação para proteger a saúde pública. Diante disso, o envelhecimento das populações, especialmente a idosa é um dos mais importantes desafios para a Saúde Pública contemporânea, principalmente nos países em desenvolvimento onde o envelhecimento ocorre em um ambiente de pobreza e grande desigualdade social (LIMA-COSTA; BARRETO, p.199, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Faz parte da dinâmica terrestre as mudanças ambientais e climáticas, entretanto está sendo intensificada pelas ações humanas. Tais alterações tem gerado impactos negativos sobre a saúde das pessoas. Nesse sentido, as mudanças climáticas têm propiciando circunstâncias que favorece a possibilidade de aumento da incidência do número de doenças tropicais como malária, dengue, desintéria, etc. Além disso, teremos dias mais quentes e invernos mais curtos, sistemas precários de esgoto entrarão em colapso, mais inundações, enchentes e desmoronamentos, propagação de doenças de veiculação hídrica, como a leptospirose, as hepatites virais, as doenças diarreicas, entre outras.

Estudos apontaram que variáveis como idade, perfil de saúde, resiliência fisiológica e condições sociais influenciam diretamente nas respostas humanas relacionadas às variantes climáticas. Portanto, a população idosa faz parte dos grupos mais vulneráveis e expostos às mudanças climáticas. A exposição às mudanças climáticas seja por meio de eventos extremos ou através das alterações graduais, pode expor ou exacerbar sofrimentos mentais e psicossociais. Dados de pesquisas também revelam sobre maior percentual de incidência, agravos e letalidade de doenças tropicais em pessoas a partir dos 60 anos. Ademais, a ocorrência de determinadas doenças é fator significativo para fragilização do idoso, interferindo negativamente na sua qualidade de vida. Além disso, desastres naturais podem sobrecarregar sistemas de saúde.

Conclui-se que as mudanças climáticas influenciam significativamente na saúde do idoso seja de maneira direta através de catástrofes naturais ou mediado por alterações no ambiente por meio de incidência de doenças. Portanto, nota-se a relevância de estudos que contemple as condições de saúde dos idosos e os determinantes que afetam o envelhecimento e a qualidade de vida em uma perspectiva de todo, de integração entre a vida humana, animal e ambiental.



Palavras-chave: Meio Ambiente; Mudanças Climáticas; Saúde do Idoso; Saúde Única.

APOIO: IntegraClima – Projeto de Pesquisa “Integração de dados de clima, saúde e biodiversidade para zoneamento do risco de doenças e ações participativas e integradoras em comunidades tradicionais para conscientização sobre impactos das mudanças climáticas: uma cooperação Brasil-Peru-Moçambique”, financiado pelo CNPQ e DECIT/SECTICS/MS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARCELLOS, Christovam et al. Inter-relacionamento de dados ambientais e de saúde: análise de risco à saúde aplicada ao abastecimento de água no Rio de Janeiro utilizando Sistema de Informações Geográficas. **Cadernos de Saúde Pública**, v.14, n.3, p.597-605, 1998.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Emergências Climáticas e os impactos na saúde**. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/e/emergencias-climaticas>. Acesso: 03/03/2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Envelhecimento e saúde da pessoa idosa**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Mudanças climáticas e ambientais e seus efeitos na saúde: cenários e incertezas para o Brasil**. BRASIL. Ministério da Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Estatuto do Idoso**. 3. ed., V. 2. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo, SP: Atlas, 2008. LIMA-

COSTA, Maria F.; BARRETO, Sandhi M. Tipos de estudos epidemiológicos: conceitos básicos e aplicações na área do envelhecimento. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, n. 12, v. 4, p.189 – 201, 2003.

LOBO, P. M. et al. **Saúde única: uma visão sistêmica**. Org. MENIN, Álvaro. 1. ed. Goiânia: Editora Alta Performance, 2021.

MORENGO, José A. **Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade**: caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do século XXI. Brasília: MMA, 2007.

MINISTERIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Boletim Epidemiológico: Monitoramento das arboviroses e balanço de encerramento do Comitê de Operações de Emergência (COE) Dengue e outras Arboviroses 2024**. Volume 55, N.º 11, 4 Jul. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletim-epidemiologico-volume-55-no-11>

PEREIRA, D. S.; NOGUEIRA, J.A.D; SILVA, C.A.B. Qualidade de vida e saúde de idosos do sertão. **REV. BRAS. GERIATR. GERONTOL.**, 18(4), Rio De Janeiro, 2015. p. 893-908.

SOARES, Fabiana V. et al. Relação entre alterações climáticas e fatores determinantes da



mortalidade de idosos no município de São Carlos (SP) em um período de dez anos.
Ciência & Saúde Coletiva, 17(1):135-146, 2012.



FEIRA DE SAÚDE POTENCIALIZANDO AÇÕES EDUCATIVAS COM AVALIAÇÃO DE RISCO PARA CÂNCER DE CABEÇA E PESCOÇO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

¹Maria Fernanda Almeida Alexandre

²Francileuda Batista de Almeida Alexandre

³Guilherme Cordeiro Sampaio Florêncio

⁴Paula Cynthia Santos da Silva

⁵Vanessa Mariah de Souza Rodrigues

⁶Maria Vitória Cordeiro Sampaio Florêncio

⁷Luciano Leal Luz

⁸Alinne Beserra Lucena

¹Afya Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil; ²Afya Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil; ³Afya Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil; ⁴Afya Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil; ⁵Faculdade de medicina Nova Esperança, João Pessoa, Paraíba, Brasil ⁶Afya Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil; ⁷Afya Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil; ⁸Afya Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo: Os cânceres de cabeça e pescoço compõem um grupo heterogêneo de neoplasias que acometem, com maior frequência, o trato aerodigestivo superior e a glândula tireoide. Entre os principais fatores de risco, destacam-se o consumo de álcool e o tabagismo, cujos efeitos sinérgicos aumentam significativamente a suscetibilidade ao desenvolvimento dessas doenças. Este relato descreve a experiência de realização de uma feira de saúde em uma unidade de atenção primária, com foco na promoção da saúde e na conscientização da população sobre os principais fatores de risco e a importância do diagnóstico precoce dessas neoplasias. Foram realizadas orientações, abordagens educativas e exames físicos da cavidade oral e da região cervical, visando à identificação de possíveis alterações sugestivas de patologias oncológicas. A ação proporcionou um espaço de interação entre profissionais de saúde, estudantes e comunidade, contribuindo para a educação em saúde, o fortalecimento do vínculo com os usuários e a qualificação da atenção prestada. A experiência reafirma o papel da atenção primária na prevenção e detecção precoce do câncer, bem como na formação integral de profissionais comprometidos com o cuidado em saúde.

INTRODUÇÃO

De acordo, com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) conduziu um estudo inédito, que revela que cerca de 80% dos tumores de cabeça e pescoço diagnosticados no Brasil, entre 2000 e 2017, foram identificados em estágios avançados, evidenciando também a relação entre o nível de escolaridade e o estadiamento da doença. Esse dado compromete seriamente as chances de tratamento e cura, destacando a urgência de ações para levar ao diagnóstico precoce (Brasil, 2025)

Segundo Mota et al (2021), o câncer é definido como uma doença crônica multicausal caracterizada pelo crescimento descontrolado de células e a proliferação de células anormais, que continuam a se multiplicar até que grandes quantidades de tecidos chamados de tumores sejam formados. Nos últimos anos, o câncer se tornou um problema



de saúde pública global. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o número estimado de cânceres no Brasil em 2016/2017 era de aproximadamente 600.000 casos.

De tal modo, o termo câncer de cabeça e pescoço refere-se a um grupo de tumores heterogêneos que acometem o trato gastrointestinal superior, sendo o principal tipo histológico, o carcinoma espinocelular, responsável por cerca de 90% dos casos. É importante ressaltar que o câncer de cabeça e pescoço é mais expressivo em áreas com baixo desenvolvimento socioeconômico. Isso está relacionado aos hábitos de vida. Esses hábitos levam à exposição a longo prazo a fatores de risco e também ao diagnóstico tardio e dificuldade no acesso ao tratamento, sendo justificativa para o alto índice de letalidade (Mota et al., 2021)

O consumo de álcool e tabaco são os principais fatores de risco para o carcinoma de cabeça e pescoço (CCECP), e um efeito independente e multiplicativo é observado no consumo concomitante. O estadiamento da doença no momento do diagnóstico é um fator prognóstico essencial. Se detectados em estágios iniciais, os CCECP geralmente apresentam uma taxa de sobrevida global em cinco anos de 75%. Além disso, a detecção precoce do CCEP oferece opções de tratamento mais conservadoras, resultando em menor impacto funcional e estético, bem como menor toxicidade para os pacientes (Carvalho et al., 2025)

Outro tipo de câncer que acomete a região de cabeça e pescoço, é o da glândula de tireoide apresenta-se como a neoplasia endócrina mais frequente. A patogênese do câncer de tireoide considera mutações conduzindo à progressão através de um processo de desdiferenciação gerando carcinomas bem diferenciados, como papilar e folicular, e progredindo para carcinomas de tireoide pouco diferenciados, indiferenciados ou anaplásicos. O carcinoma papilífero é considerado o tipo mais comum de câncer de tireoide, com bom prognóstico e altas taxas de sobrevida (Mendes et al., 2023).

O Brasil é um dos principais países do mundo em número de casos de tumores de cabeça e pescoço, que afetam regiões como cavidade oral, faringe e laringe. O prognóstico é muito mais favorável quando a doença é diagnosticada precocemente. No entanto, o estudo aponta que a realidade de grande parte da população brasileira é de diagnósticos tardios: quase 80% dos casos. Isso impacta diretamente a eficácia dos tratamentos, a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes (Carvalho et al., 2025; INCA, 2025)

OBJETIVO

Descrever as ações desenvolvidas durante a Feira de Saúde na Unidade de Saúde, com foco na triagem clínica e na educação em saúde para o rastreamento de cânceres de cabeça e pescoço, promovendo o encaminhamento oportuno e a formação prática de discentes da área da saúde.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência de natureza descritiva, com abordagem qualitativa, realizado no contexto da Atenção Primária à Saúde (APS), durante uma Feira de Saúde promovida por uma Unidade de Saúde da Família (USF) localizada em um município do estado da Paraíba, em 23 de novembro de 2024. A ação foi conduzida por discentes da área da saúde, sob supervisão docente, com o objetivo de realizar triagem clínica para identificação de alterações potencialmente malignas em cavidade oral, tireoide e linfonodos cervicais, além de promover atividades educativas voltadas à prevenção de cânceres de cabeça e pescoço. Os usuários foram previamente convidados por meio de busca ativa e



agendamento realizado pela equipe da USF. As atividades desenvolvidas incluíram: anamnese dirigida para investigação de fatores de risco, como tabagismo, etilismo, exposição solar, hábitos alimentares e higiene bucal; exame físico minucioso da cavidade oral, tireoide e região cervical; classificação clínica de achados sugestivos de lesões potencialmente malignas; orientação individualizada e encaminhamento para serviços especializados, quando indicado; além de ações educativas em grupo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Feira de Saúde realizada na Unidade de Saúde foi uma estratégia efetiva de promoção da saúde e avaliação de risco voltada às neoplasias de cabeça e pescoço, com enfoque na triagem clínica e educação em saúde. Dentre os tipos de câncer que acometem essa região, destacam-se as neoplasias malignas da cavidade oral, laringe, orofaringe e glândulas salivares, sendo o carcinoma espinocelular o subtipo mais prevalente, associado principalmente ao tabagismo, etilismo crônico e infecção pelo HPV (Lima et al., 2019; INCA, 2023)

Durante a ação, alunos de medicina realizaram atendimentos a pacientes de diferentes faixas etárias, aplicando os conhecimentos adquiridos sobre inspeção da cavidade oral e exame físico cervical. A atividade permitiu a prática da observação clínica e do diálogo com os pacientes, com orientações sobre a importância da prevenção, do autocuidado e do acompanhamento médico regular. Casos com achados relevantes foram conduzidos conforme os fluxos da unidade, reforçando o papel educativo e formativo da vivência.

Destaca-se que o rastreio precoce é um dos pilares mais eficazes no combate ao câncer de cabeça e pescoço, pois permite a detecção de lesões em estágios iniciais, o que aumenta significativamente as chances de cura, possibilita tratamentos menos invasivos e reduz a mortalidade. Dados do INCA (2023) reforçam que o diagnóstico tardio das neoplasias de cabeça e pescoço estão associados a piores desfechos clínicos e menor qualidade de vida, o que compromete significativamente o prognóstico e a possibilidade de tratamento curativo. Sendo um dos principais desafios no enfrentamento dessas doenças, especialmente em regiões com barreiras de acesso a serviços especializados.

Segundo Santos et al. (2021), a inserção de estratégias de triagem na APS pode reduzir em até 30% a mortalidade por neoplasias de cabeça e pescoço em populações vulneráveis. Visto que a destruição de células cancerosas ocorre, em parte, por ação de linfócitos citotóxicos e células NK (natural killers), capazes de reconhecer alterações anormais em antígenos da superfície (Guyton; Hall, 2021).

Além disso, o exame físico clínico detalhado da cavidade oral e do pescoço mostra-se uma ferramenta essencial na prática dos profissionais da saúde, pois permite identificar sinais precoces de patologias oncológicas e não oncológicas, como bóccios, adenomegalias, cistos e lesões mucosas (Castro et al., 2020).

A realização dessas atividades durante a Feira permitiu não apenas a triagem de pacientes com alterações suspeitas, mas também o fortalecimento da educação em saúde, abordando fatores de risco como tabagismo, consumo excessivo de álcool, baixa ingestão de frutas e verduras, má higiene bucal e exposição solar sem proteção.

É importante destacar que o câncer de cabeça e pescoço, embora evitável e tratável quando diagnosticado precocemente, ainda representa um desafio de saúde pública, principalmente em áreas carentes de acesso contínuo à atenção especializada. Por isso, ações de extensão como a Feira de Saúde têm papel fundamental na vigilância e prevenção em saúde, ao promover o cuidado ativo e a conscientização da população, com impacto direto



na diminuição da carga de doenças oncológicas.

A participação ativa dos discentes proporcionou um ambiente de aprendizado prático, fortalecendo competências clínicas, éticas e comunicativas, conforme preconiza a formação integrada e humanizada das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos da área da saúde. Dessa forma, o projeto cumpriu duplo papel: atender à comunidade e contribuir com a formação crítica dos futuros profissionais da saúde, sensíveis às demandas do território e ao compromisso social da profissão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A Feira de Saúde evidenciou-se como uma importante ferramenta de promoção da saúde e avaliação de risco, ao integrar ações educativas com práticas clínicas voltadas para a triagem de neoplasias de cabeça e pescoço. A detecção de alterações suspeitas na cavidade oral e região cervical reforça a relevância da atuação da Atenção Primária como porta de entrada efetiva para o diagnóstico precoce, contribuindo para o encaminhamento oportuno dos pacientes e aumento das chances de tratamento resolutivo.

Além disso, a ação proporcionou um espaço de aprendizado ativo para os estudantes da área da saúde, ao estimular o desenvolvimento de habilidades clínicas e comunicativas em um contexto comunitário. As atividades reforçaram a importância da abordagem preventiva, do vínculo com a população e do cuidado integral, fortalecendo os pilares da formação humanizada e a valorização do Sistema Único de Saúde.

A experiência corrobora a literatura que destaca a eficácia do exame físico na identificação precoce de agravos e a necessidade de incorporar ações de rastreamento como rotina nas unidades básicas de saúde, especialmente em populações vulneráveis e com acesso restrito a serviços especializados.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde, Câncer de cabeça e Pescoço, Educação em saúde, Rastreamento precoce, Triagem clínica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Instituto Nacional de Câncer – INCA. Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2023. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/>. Acesso em: 30 abr. 2025.

CARVALHO, Flávia Nascimento de et al. Disparities in stage at diagnosis of head and neck tumours in Brazil: a comprehensive analysis of hospital-based cancer registries. *The Lancet Regional Health – Americas*, [S. l.], v. 42, p. 100986, fev. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.lana.2024.100986>. Acesso em: 10 maio 2025. f

CASTRO, A. S. et al. Avaliação clínica da cabeça e pescoço na atenção primária: competências e desafios para o diagnóstico precoce. *Revista Saúde e Desenvolvimento*, Curitiba, v. 16, n. 10, p. 44–54, 2020.

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 14ª ed. Rio de Janeiro, Elsevier Ed., 2021.

LIMA, M. G. F. et al. Perfil clínico-epidemiológico dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço: estudo retrospectivo. *Revista de Ciências Médicas e Biológicas*, Salvador, v. 18, n.



3, p. 400–405, 2019.

MENDES, Ana Cristina Carneiro; VIEGAS, Larissa Carvalho; DANZIGER, Leila Rodrigues; GOMES, Eriston Vieira. Aspectos moleculares do carcinoma papilífero de tireoide. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 12, n. 2, p. e11812239986, 2023.

DOI: 10.33448/rsd-

v12i2.39986.

Disponível

em:

<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/39986>. Acesso em: 10 maio 2025

MOTA, Lennara Pereira et al. Neoplasia de cabeça e pescoço: principais causas e tratamentos. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 5, e55810515113, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i5.15113>. Acesso em: 10 maio 2025.

SANTOS, K. M. R. et al. Importância do rastreamento precoce das neoplasias de cabeça e pescoço na atenção primária à saúde. *Revista Brasileira de Promoção da Saúde*, v. 34, p. 1–9, 2021.

<https://www.gov.br/inca/pt-br/canais-de-atendimento/imprensa/releases/2025/inca-divulga-pesquisa-inedita-sobre-o-panorama-do-cancer-de-cabeca-e-pescoco-no-brasil> Acesso em : 10 de mai. de 2025



PANORAMA CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DA DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL: UMA REVISÃO DA INTEGRATIVA

¹Maria Luciene Gaia Tenório

²Samanta Barra dos Santos

³Camile Amaral Pinto

⁴Alessandra Corrêa da Cruz

⁵Yasmim Fonseca Amaral

⁶Roberta Silvana Barbosa Silva

⁷Francilena de Almeida Farias

⁸Anderson Bentes de Lima

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universidade do Estado do Pará, Cametá, Pará, Brasil.

⁸ Universidade do Estado do Pará, Belém, Pará, Brasil.

Área temática: Epidemiologia

Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar as atualizações dos aspectos clínicos, epidemiológicos, tratamento e implicações sociais da Doença de Chagas (DC) no Brasil. Foi realizada uma revisão integrativa de artigos indexados nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed, considerando publicações realizadas no período de 2014 a 2024. Para a busca utilizou-se os descritores “Doença de Chagas” e “aspectos clínicos”, “aspectos epidemiológicos”, “tratamento”. Foram encontrados 82 artigos, dos quais 55 não correspondiam aos critérios de inclusão. Tomou-se como critérios de inclusão textos publicados entre 2014 e 2024, nos idiomas português e inglês, indexados nas bases de dados e condizentes com o tema. Artigos publicados fora do recorte temporal definido, com títulos que não apresentavam correspondência com os descritores e texto sem relevância ao escopo do estudo, foram excluídos. Dos 27 restantes, cinco responderam a pergunta norteadora da pesquisa. A partir disso, foi possível discutir categorias como a epidemiologia da Doença de Chagas no Brasil, os impactos da doença no contexto socioeconômicos das pessoas com DC, tratamento farmacológico e tentências de morbimortalidade da doença de Chagas no país. Diante do exposto, conclui-se que a associação entre a Doença de Chagas e fatores socioeconômicos reforça sua classificação como uma Doença Tropical Negligenciada, ao mesmo tempo em que contribui para a complexidade do seu manejo clínico, demandando estratégias multifatoriais para sua mitigação e controle.

INTRODUÇÃO

A Doença de Chagas (DC), causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi*, continua sendo uma das principais Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs), afetando predominantemente populações vulneráveis na América Latina. No Brasil, estima-se que cerca de 3,7 milhões de pessoas estejam infectadas, com prevalência média de 3,25% nos municípios afetados (Laporta *et al.*, 2024). Embora os programas de controle vetorial tenham reduzido significativamente a transmissão, a doença persiste como um grave problema de saúde pública. Entre 2012 e 2022, foram registrados 3.219 novos casos, com um aumento preocupante de transmissões orais, especialmente na Região Amazônica (Mazzardo *et al.*, 2024). A região Norte, a mais afetada, reflete desafios significativos relacionados à baixa urbanização e condições inadequadas de saneamento. A DC é uma enfermidade crônica que



pode levar a complicações cardíacas, digestivas e neurológicas. Estudos indicam que até 30% dos infectados desenvolvem alterações cardíacas, e até 10% apresentam manifestações digestivas ou neurológicas (Winters *et al.*, 2018). Além disso, a doença impacta significativamente a qualidade de vida dos pacientes, afetando aspectos físicos, psicológicos e sociais (Cavalcanti *et al.*, 2019). A doença também tem implicações socioeconômicas significativas, sendo mais prevalente entre populações de baixa renda, e muitos pacientes enfrentam dificuldades para acessar benefícios assistenciais e previdenciários. Estudos mostram que a concessão de benefícios é maior entre residentes em áreas urbanas, na região Nordeste, pessoas do sexo feminino e com 60 anos ou mais de idade (Perissato *et al.*, 2020).

Uma vez o ônus social, a prevenção, o controle e o tratamento da doença de Chagas tornaram-se urgência para as organizações de fomento e financiamento da saúde local e mundial, utilizando a vigilância dos casos e da cadeia de transmissão como uma das principais estratégias para elaboração de soluções para a problemática (Connors, 2016).

OBJETIVO

Esta pesquisa visa fornecer uma visão abrangente do contexto epidemiológico e clínico da Doença de Chagas, abordando aspectos do tratamento, mortalidade e impactos socioeconômicos dos portadores, com base na revisão crítica da literatura recente. Assim, tem como objetivo analisar atualizações sobre a DC, considerando seus aspectos clínicos, epidemiológicos e implicações sociais no cotidiano dos acometidos.

METODOLOGIA

Esta pesquisa consiste em uma revisão integrativa da literatura, método sistemático que possibilita a incorporação de abordagens qualitativas e quantitativas. Essa modalidade de revisão reúne estudos com distintos delineamentos metodológicos, visando à análise, avaliação e interpretação de dados disseminados na literatura científica, proporcionando, assim, uma perspectiva abrangente das evidências atualmente disponíveis (Souza *et al.*, 2010). As bases de dados utilizadas foram: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed, considerando publicações indexadas realizadas entre os anos de 2014 e 2024, nos idiomas português e inglês. Foram utilizados como descritores de forma cruzada “Doença de Chagas” e “aspectos clínicos”, “aspectos epidemiológicos”, “tratamento”. Como critérios de inclusão estavam textos publicados entre 2014 e 2024, nos idiomas português e inglês, indexados nas bases de dados, com amostragem ou relevância nacional e condizentes com o tema. Artigos publicados fora do recorte temporal definido, com títulos que não apresentavam correspondência com os descritores e texto sem relevância ao escopo do estudo, foram excluídos. Na fase de definição dos artigos incluídos foram propostas as seguintes questões norteadoras: Quais as principais atualizações clínicas e epidemiológicas da Doença de Chagas no Brasil? Quais os aspectos clínicos e epidemiológicos associados à Doença de Chagas? De que forma se dá o tratamento atual para Doença de Chagas? Qual o impacto socioeconômico da doença de Chagas nos pacientes acometidos? As buscas nas bases de dados se deram de forma ampla, diversificada, extensiva e manual com critérios de amostragem estabelecidos em concordância com a pergunta norteadora da pesquisa. Após identificação dos artigos, foram analisados quanto ao seu rigor científico e tecidas discussões a partir da interpretação dos dados obtidos.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

As buscas resultaram em 82 artigos que após análise de acordo com os critérios de inclusão e exclusão predefinidos, constatou-se que 27 de adequavam aos critérios. Com a exclusão dos artigos duplicados, restaram 5 publicações que respondiam às questões norteadoras. A análise de sobrevida de pacientes com DC assistidos pela Previdência Social no Brasil de 1942 a 2016 foi o objetivo do estudo de Limongi *et al.* (2024). Medeiros *et al.* (2021) investigou a distribuição da morbidade e mortalidade da DC no Nordeste do Brasil para identificação das áreas com maiores prevalências e óbitos pela doença. Distribuição espaço-temporal e fatores associados à mortalidade por Doenças Tropicais Negligenciadas, perfil epidemiológico de pacientes com DC em fase aguda e prevalência da não utilização dos serviços de saúde por pessoas com DC em uma área endêmica do Brasil foram abordados por Rocha *et al.* (2023), Almeida *et al.* (2024) e Damasceno *et al.* (2022). A partir das publicações, a compreensão do panorama da Doença de Chagas no Brasil pode ser observado sobre diversos aspectos como a epidemiologia da doença, seus impactos no contexto socioeconômico das pessoas com DC, tratamentos farmacológicos e investimentos, além das tendências de morbimortalidade da doença no território brasileiro. No que tange aos aspectos epidemiológicos, infecções por DC aguda tem aumentado no Brasil, com destaque para a região Norte (95,2% dos casos), em que o estado do Pará registra o maior número de casos, seguido da região Nordeste (3,8% dos casos). As demais regiões juntas contabilizam 0,96% dos casos da doença (Almeida *et al.*, 2024). A transmissão oral é a via mais comum na região Norte, tendo no consumo do açaí, a veiculação do parasita, levando a infecção aguda da DC, caracterizando surtos da doença (Oliveira *et al.*, 2019, Souza *et al.*, 2023, Laporta *et al.*, 2024). Quando traçado o perfil epidemiológico da doença, este caracteriza-se por indivíduos do sexo masculino, adultos jovens, pardos e residentes na zona rural, o que pode ser explicado pelo exercício laboral na agricultura, extrativismo e ausência de saneamento básico nas regiões de residência (Alencar *et al.*, 2020, Nogueira *et al.*, 2020, Rosa *et al.*, 2023). Ao se observar os registros da DC no Brasil, nota-se que a evolução clínica da doença pode levar a comprometimento cardíaco, causando quadros de incapacidade no indivíduo o que afeta sua qualidade de vida (Limongi *et al.*, 2024). O fator socioeconômico está diretamente associado a tal complicação. Ao analisar a sobrevida de pacientes com DC assistidos pela previdência e assistência social, Limongi *et al.* (2024) demonstrou que a maioria dos indivíduos que recebiam benefícios previdenciários exerciam atividades laborais anteriormente ao evento incapacitante, sendo estes homens. Entre as mulheres, o percentual de sobrevida foi maior, demonstrado também por Martins-Melo *et al.* (2021). O comprometimento da qualidade de vida de pacientes com DC requer uma abordagem integral de cuidados. Atualmente, os fármacos disponíveis para o tratamento da doença apresentam pouca eficácia na fase crônica além de alta taxa de eventos adversos, o que leva ao abandono do tratamento até 29% dos casos (Kratz *et al.*, 2018). Estratégias de acompanhamento para administração de doses eficazes e menor tempo de exposição do paciente ao fármaco auxiliam na adesão ao tratamento e sucesso na diminuição da carga parasitária no organismo (Mendes *et al.*, 2022). Sendo a DC, uma DTN com alta repercussão de morbimortalidade apresenta múltiplos cenários clínicos quando considerada a vasta dimensão do território brasileiro, influenciados pelas variáveis ecológicas, demográficas, sociais e econômicas. Dessa forma, a urgência da prestação de serviços especializados, acompanhamento intensificado dos pacientes e monitoramento dos assintomáticos são alertas constantes para que haja o reforço dessas ações.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta investigação permitiu um estudo detalhado e atualizado sobre a Doença de Chagas, tendo em conta os aspectos clínicos, epidemiológicos e as implicações sociais experimentadas pelos pacientes. Através da revisão da literatura recente, pode-se perceber a complexidade subjacente à gestão da doença desde as dificuldades de diagnóstico e tratamento até os problemas mais profundos de morbimortalidade e impactos econômicos e sociais. Os resultados reforçam a necessidade de estratégias de saúde pública integradas que levem em consideração não apenas a abrangência da abordagem biomédica, mas igualmente ações visando a redução das diferenças sociais e otimização do acesso ao tratamento das pessoas com DC. Destaca-se ainda, a importância da atenção integrada de cuidados que acolha pacientes da linha de cuidados específicos e da disponibilidade de suporte tecnológico adequado em todos os níveis de atenção à saúde.

Palavras-chave: Doença de Chagas; epidemiologia, revisão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAVALCANTI, Marília Abrantes Fernandes; NASCIMENTO, Ellany Gurgel Cosme do; ALCHIERI, João Carlos; ANDRADE, Cléber de Mesquita. Manifestações e estratégias de enfrentamento da doença de Chagas que interferem na qualidade de vida do indivíduo: uma revisão sistemática. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 24, n. 4, p. 1405–1416, abr. 2019.

CONNERS EE, et al. A global systematic review of Chagas disease prevalence among migrants. *Acta Tropica*, 2016; 156: 68-78.

Laporta GZ, Lima MM, Maia da Costa V, Lima Neto MM, Palmeira SL, Rodovalho SR. et al. Estimativa de prevalência de doença de Chagas crônica nos municípios brasileiros. *Rev Panam Salud Publica*. 2024;48:e28. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2024.28>.

MAZZARDO, V.; BAILO, D. W.; ANIZ ABBUD NETO, C.; DIAS DE LIMA JUNIOR, P.; DE ARAÚJO BOCHIO, A. L.; BIELA GABRIEL, B.; BROSDA PACKER, A.; MIYAWAKI PAULINO, A. M.; SOARES RUEDA, N.; FRASSON CORDEIRO, N.; FARIAS MARQUES, I.; MADALOZZO, M. E. Doença de Chagas: Avanços no Controle e Mudanças na Epidemiologia Brasileira (2012-2022). **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n.8, p. 2512–2525, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n8p2512-2525. Disponível em: <https://bjih.s.emnuvens.com.br/bjih/article/view/2939>. Acesso em: 21 abr. 2025.

PERISSATO, Izabela Lima; SANTOS, Keile Aparecida Resende; OLIVEIRA, Antônio Marcos Machado de; LIMONGI, Jean Ezequiel. Doença de Chagas e a seguridade social: caracterização da doença no sistema previdenciário e assistencial brasileiro, 2004-2016. *SciELO Preprints*, 2020.

Winters, Ryan; Nguyen, Tina; Waseem, Muhammad. **Chagas Disease (American Trypanosomiasis)**. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459272/>. 2025.



AVALIAÇÃO DA IDADE VASCULAR EM ADULTOS COM HISTÓRICO DE COVID LONGA SUBMETIDOS A TESTE DE EXERCÍCIO INCREMENTAL MÁXIMO

¹Vitória Luiz Diotto

²Fernanda Rico Angelotto

³Guilherme Borges Pereira

^{1,2,3} Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ciências Fisiológicas, Laboratório de Fisiologia Clínica do Exercício, São Carlos, São Paulo, Brasil.

Área temática: Biologia

Resumo: Alterações endoteliais observadas na COVID-longa (CL) podem elevar a idade vascular (IV), sugerindo maior risco cardiovascular. O objetivo deste estudo foi analisar a resposta da IV ao teste cardiopulmonar de exercício (TCPE) em adultos jovens com histórico de CL. Tratou-se de um estudo observacional, controlado e estratificado, aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE: 65086622.5.0000.5504). Participaram 38 adultos (18–40 anos; IMC entre 18,5 e 39,9 kg/m²), com infecção prévia por SARS-CoV-2 e esquema vacinal completo, divididos em dois grupos: COVID-longa (CL; n = 18) e Controle (CON; n = 20). A IV foi mensurada por método oscilométrico (Arteis AOP®) em seis momentos: repouso, pré-teste, 10, 30, 60 minutos e 24 horas após o TCPE. As análises estatísticas foram realizadas no software R (v.4.1.2) com os testes de Friedman, Mann-Whitney U e regressão quantílica. Observou-se redução significativa da IV aos 30 e 60 minutos, com retorno ao valor basal após 24 horas ($p = 0,017$), embora sem significância na análise pós hoc. No grupo CL, não houve variações significativas da IV ($p = 0,960$). A idade cronológica foi o principal preditor da IV em ambos os grupos ($p < 0,001$). A gordura abdominal apresentou correlação negativa com a IV apenas no grupo controle ($p = 0,021$). Não foram observadas correlações significativas com o VO₂máx ($p > 0,05$). Conclui-se que o exercício agudo não promove alterações consistentes na IV, especialmente em indivíduos com histórico de COVID-longa.

INTRODUÇÃO

A pandemia de COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, resultou em milhões de mortes e trouxe consequências significativas para a saúde global (PENG *et al.*, 2024). Além das manifestações respiratórias agudas, a infecção tem sido associada a uma série de complicações cardiovasculares, incluindo miocardite, disfunção endotelial, arritmias e eventos tromboembólicos (NALBANDIAN *et al.*, 2021). Com o avanço da pandemia, observou-se o surgimento de uma condição persistente, denominada COVID-longa (CL), caracterizada pelo relato de manutenção de sintomas por meses ou anos após a fase aguda, como fadiga, dispneia, dor torácica, palpitações e intolerância ao exercício físico (PENG *et al.*, 2024).

Diversos mecanismos fisiopatológicos têm sido propostos para explicar a CL, incluindo inflamação crônica de baixo grau, persistência viral em reservatórios teciduais e disfunção autonômica (LINEBURG; SMITH, 2023). A integridade vascular, particularmente a função endotelial, pode ser prejudicada por esses fatores, favorecendo o desenvolvimento precoce de alterações estruturais e funcionais nos vasos arteriais (ELY; BROWN; FINEBERG, 2024). Nesse contexto, a idade vascular (IV) tem emergido como um biomarcador relevante de risco cardiovascular (BADARAS; LAUČYTĖ-



CIBULSKIENĖ, 2022). Diferente da idade cronológica, a IV reflete o envelhecimento real dos vasos, podendo ser influenciada por fatores clínicos, metabólicos e comportamentais (TERENTES-PRINTZIOS *et al.*, 2017).

Estudos demonstram que condições como obesidade, hipertensão e sedentarismo aceleram a IV, enquanto a prática regular de exercício físico está associada à sua redução (EL ASSAR *et al.*, 2022). Entretanto, a literatura ainda é escassa quanto à influência da CL sobre esse parâmetro. Pouco se sabe sobre como indivíduos com CL respondem a estímulos fisiológicos agudos, como o exercício físico, e se há comprometimento da recuperação vascular pós-esforço em comparação com controles (BADARAS; LAUČYTĖ-CIBULSKIENĖ, 2022).

O teste cardiopulmonar de exercício (TCPE) é amplamente utilizado como método não invasivo para avaliação da aptidão cardiorrespiratória e a resposta fisiológica ao estresse físico (HERDY *et al.*, 2016). Considerando o papel do exercício como modulador vascular, o presente estudo teve como objetivo analisar a resposta da idade vascular ao TCPE em adultos jovens com e sem histórico de CL. Hipotetizamos que indivíduos com CL apresentariam alterações atenuadas da IV em resposta ao TCPE, quando comparados ao grupo controle. Esperava-se ainda uma correlação positiva entre idade cronológica e IV em ambos os grupos, além de associações negativas entre IV, consumo máximo de oxigênio (VO_{2max}) e percentual de gordura abdominal.

OBJETIVO

Avaliar a resposta da IV em diferentes momentos (10, 30, 60 minutos e 24 horas) após a realização de um TCPE em indivíduos com histórico de CL.

METODOLOGIA

Após a aprovação do Comitê de Ética (CAAE: 68303823.5.0000.5504), os participantes foram recrutados por meio de divulgação física e digital na UFSCar, incluindo redes sociais institucionais. Foram incluídos participantes de ambos os sexos, entre 18 e 40 anos, com IMC entre 18,5 e 39,9 kg/m², esquema vacinal completo, massa corporal estável nos últimos três meses e confirmação laboratorial prévia de infecção por SARS-CoV-2, totalizando 38 participantes, divididos em dois grupos: COVID-longa (CL; n = 18) e Controle (CON; n = 20). Esse número foi obtido a partir do cálculo amostral realizado no software G*Power para ANOVA com medidas repetidas, considerando tamanho de efeito $f = 0,70$, $\alpha = 0,05$ e poder estatístico de 80%. A simulação indicou a necessidade de 8 participantes por grupo (total de 32). Com acréscimo de 20% para perdas amostrais, o total recomendado foi de 40 participantes (10 por grupo). Excluíram-se gestantes, lactantes, não vacinados, indivíduos com infecção ativa, limitações físicas ou uso de substâncias que pudessem interferir nas variáveis analisadas. Participantes do sexo feminino foram avaliadas preferencialmente na fase ovulatória ou na primeira semana da fase lútea, com base no autorrelato da última menstruação. A avaliação clínica, funcional e a anamnese foram conduzidas de maneira padronizada, abrangendo histórico médico, presença de comorbidades, uso de medicações, hábitos de vida, histórico de infecção por SARS-CoV-2 e sintomas persistentes compatíveis com CL. Além disso, foram coletadas informações sobre nível de atividade física e composição corporal a partir de bioimpedância tetrapolar multifrequencial (INBODY 700®), estimando massa magra, gorda, óssea, gordura visceral e o percentual de gordura abdominal. A avaliação clínica incluiu a aferição dos dados vitais (pressão arterial e



frequência) em repouso. O TCPE foi conduzido com protocolo de Bruce até exaustão voluntária, com monitoramento de variáveis hemodinâmicas, metabólicas e respiratórias ($\text{VO}_2\text{máx}$). Foram adotados critérios para validação do esforço máximo: escore ≥ 17 na Escala de Borg, $\geq 85\%$ da FCmáx prevista ($208 - 0,7 \times \text{idade}$), exaustão voluntária e $\text{QR} > 1,1$. A IV foi estimada utilizando o equipamento Arteris AOP® (Cardios, Brasil), que opera por método oscilométrico. As medições foram realizadas com o participante em repouso, em ambiente silencioso e com temperatura controlada, sempre na posição sentada, com o braço dominante apoiado na altura do coração. O manguito foi corretamente dimensionado e ajustado à circunferência braquial, conforme as recomendações do fabricante. As coletas ocorreram em seis momentos distintos: repouso, pré-teste, e nos períodos de 10, 30, 60 minutos e 24 horas após o exercício. Após cada medição, os dados foram transferidos para o computador via conexão *Bluetooth* e processados por meio de um software proprietário que aplica algoritmos validados para estimativa da IV com base em parâmetros hemodinâmicos derivados da curva de pressão arterial. O equipamento é registrado na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) sob o número 10361059013. As análises estatísticas foram realizadas no software R (v.4.1.2) com os testes de Friedman, Mann-Whitney U e regressão quantílica, para estimar o efeito das variáveis independentes sobre a IV.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise intragrupo da IV ao longo dos seis momentos avaliados pelo pós hoc não indicou significância estatística no grupo CON ($p > 0,05$), invalidando o resultado obtido inicialmente pelo teste de Friedmann para esse grupo ($p = 0,017$). No grupo CL, não houve variação significativa da IV nos diferentes momentos ($p = 0,960$). Esses resultados não corroboram com a literatura, uma vez que o exercício físico é um forte indutor de alterações transitórias na função endotelial (GREEN *et al.*, 2017). Embora esperado um impacto da COVID-longa sobre a rigidez arterial, a homogeneidade dos valores absolutos pode estar relacionada ao perfil jovem e clinicamente estável da amostra, pela distância significativa entre a última infecção e a coleta (24 ± 5 meses), bem como à proteção conferida pela vacinação, possibilitando a recuperação dos sistemas fisiológicos e dificultando a percepção do impacto da CL na IV (EVANGELOS OIKONOMOU *et al.*, 2022).

A idade cronológica apresentou forte correlação positiva com a IV em ambos os grupos ($p < 0,001$), confirmando seu papel como principal determinante do envelhecimento vascular, reforçando a utilidade da IV como marcador sensível na detecção precoce de alterações arteriais, mesmo em faixas etárias mais jovens (MITCHELL *et al.*, 2010).

No grupo controle, observou-se correlação negativa entre gordura abdominal e IV ($p = 0,021$), resultado contrário ao esperado fisiologicamente (VLACHOPOULOS; AZNAOURIDIS; STEFANADIS, 2010). Tal achado pode decorrer de limitações metodológicas, uma vez que a gordura abdominal foi mensurada a partir equações provenientes da bioimpedância, método indireto e pode ser impreciso, apesar da cautela metodológica. Para o grupo CL a correlação entre gordura abdominal e IV não foi significativa estatisticamente. Em ambos os grupos, houve ausência de correlação entre $\text{VO}_2\text{máx}$ e IV ($p > 0,05$).

A ausência de variação significativa no grupo com histórico de COVID-longa e no grupo CON sugere que esses indivíduos podem ter alcançado um estado de recuperação vascular funcional, não apresentando alterações frente ao estresse agudo imposto pelo exercício físico (GREEN *et al.*, 2017). Além disso, o protocolo do TCPE, o qual teve uma média de duração de oito a doze minutos, apesar de amplamente utilizado para avaliar



capacidade funcional, pode não ter representado um estímulo suficientemente intenso para provocar modificações relevantes na rigidez arterial.

Entre as limitações do estudo, destacam-se a variabilidade individual quanto ao tempo desde a infecção e a intensidade dos sintomas e o nível de atividade física, além de não ter sido analisada a disparidade sexual e as possíveis respostas distintas frente à influência hormonal. Portanto, sugere-se para estudos futuros o recrutamento de indivíduos com histórico mais recente da infecção. Tais achados indicam uma possível resiliência vascular após a infecção, mas também revelam limitações do protocolo agudo para detectar alterações sutis. Portanto, estudos futuros com maior controle de variáveis como sexo biológico e métodos mais sensíveis de avaliação arterial são necessários para aprofundar a compreensão dos efeitos vasculares residuais da CL.

CONCLUSÃO

Conclui-se que, nesta amostra de adultos jovens, a COVID-longa não comprometeu significativamente a resposta da IV frente ao TCPE, uma vez que não foram observadas variações ao longo do tempo, reforçando a hipótese nula. A forte correlação entre idade cronológica e IV reforça que o envelhecimento continua sendo um importante determinante do estado arterial em indivíduos com e sem histórico de CL. Por outro lado, a ausência de associação significativa entre IV, $VO_{2\text{máx}}$ e gordura abdominal no grupo CL sugere que a infecção não modificou o perfil fisiológico desses preditores.

Palavras-chave: rigidez arterial, risco cardiovascular; saúde vascular; teste de esforço.

Financiamento: FAPESP - [2024/09199-9](#)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BADARAS, I.; LAUČYTĖ-CIBULSKIENĖ, A. Vascular aging and COVID-19. *Angiology*, v. 74, n. 4, p. 308–316, 28 ago. 2022.

EL ASSAR, M. et al. Effect of Physical Activity/Exercise on Oxidative Stress and Inflammation in Muscle and Vascular Aging. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 23, n. 15, p. 8713, 5 ago. 2022.

ELY, E. W.; BROWN, L. M.; FINEBERG, H. V. Long Covid defined. *New England Journal of Medicine*, v. 391, n. 18, 31 jul. 2024.

EVANGELOS OIKONOMOU et al. Endothelial dysfunction in acute and long standing COVID-19: A prospective cohort study. v. 144, p. 106975–106975, 1 mar. 2022.

GREEN, D. J. et al. Vascular Adaptation to Exercise in Humans: Role of Hemodynamic Stimuli. *Physiological Reviews*, v. 97, n. 2, p. 495–528, 1 abr. 2017.

HERDY, A. H. et al. Cardiopulmonary Exercise Test: Fundamentals, Applicability and Interpretation. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*, v. 107, n. 5, 2016.



LINEBURG, K. E.; SMITH, C. The Persistence of SARS-CoV-2 and Its Role in Long Covid. *NEJM Evidence*, v. 2, n. 9, 22 ago. 2023.

MITCHELL, G. F. et al. Arterial Stiffness and Cardiovascular Events. *Circulation*, v. 121, n. 4, p. 505–511, 2 fev. 2010.

NALBANDIAN, A. et al. Post-acute COVID-19 syndrome. *Nature Medicine*, v. 27, n. 4, p. 1–15, 22 mar. 2021.

PENG, J. et al. Long-term effects of COVID-19 on endothelial function, arterial stiffness, and blood pressure in college students: a pre-post-controlled study. *BMC Infectious Diseases*, v. 24, n. 1, p. 742, 2024.

TERENTES-PRINTZIOS, D. et al. Cardiovascular Risk Factors Accelerate Progression of Vascular Aging in the General Population. *Hypertension*, v. 70, n. 5, p. 1057–1064, nov. 2017.

VLACHOPOULOS, C.; AZNAOURIDIS, K.; STEFANADIS, C. Prediction of Cardiovascular Events and All-Cause Mortality With Arterial Stiffness. *Journal of the American College of Cardiology*, v. 55, n. 13, p. 1318–1327, mar. 2010.

ZAHER, C. Cardiologia em medicina e fisiologia do esporte: alterações cardíacas decorrentes da prática esportiva. *Revista Tópicos*, v. 2, n. 14, p. 1–15, 3 out. 2024.



EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COMO FERRAMENTA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL: EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA EM CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Lívia de Melo Alves
Marianne Rodrigues Costa
Maria Vitória Mangueira Soares
João Hyves Oliveira
Ana Luíza Ferreira Valões
Camila Barbosa Cavalcanti de Albuquerque
Alexandre Augusto de Lima Santos
Aralinda Nogueira Pinto Sá

AFYA – Faculdade de Ciências Médicas. Cabedelo, Paraíba, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: A população em situação de rua representa uma das formas mais evidentes de exclusão social, enfrentando múltiplas vulnerabilidades relacionadas à saúde, educação, segurança e moradia. Nesse cenário, as ações extensionistas despontam como estratégias fundamentais na promoção de dignidade e cidadania. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de um projeto de extensão universitária voltado à oferta de informações sobre cursos profissionalizantes para pessoas em situação de rua, visando à sua reintegração social. A ação foi realizada em um Centro de Assistência Social no município de João Pessoa – PB, com a participação de 16 usuários do serviço. A metodologia envolveu atividades informativas sobre capacitação técnica e inserção no mercado de trabalho, seguidas de dinâmicas de socialização, como bingo e karaokê, com foco na promoção do bem-estar, da interação e do vínculo entre participantes e estudantes de medicina. As ações priorizaram o respeito, o acolhimento e a escuta ativa como ferramentas de aproximação. Observou-se grande interesse dos participantes pelas possibilidades de formação e profissionalização apresentadas, além de momentos significativos de troca, pertencimento e valorização pessoal. O projeto reforça a importância da integração entre ensino, serviço e comunidade, e destaca a relevância da extensão como meio de fomentar consciência social nos futuros profissionais de saúde. Conclui-se que iniciativas como esta contribuem não apenas para a formação médica humanizada, mas também para a ampliação do acesso à informação, à cidadania e ao fortalecimento de trajetórias de inclusão social.

INTRODUÇÃO

A população em situação de rua é historicamente marginalizada e marcada por uma vida permeada por privações, abandono institucional e ruptura de vínculos familiares e sociais. Estima-se que, atualmente, mais de 281 mil pessoas vivam em situação de rua no Brasil, com crescimento acelerado nos últimos cinco anos (IPEA, 2022). Esses indivíduos enfrentam grande dificuldade de acesso a direitos básicos como saúde, educação, habitação e alimentação, sendo muitas vezes invisibilizados pelas políticas públicas (ANDRADE et al., 2022). A vulnerabilidade social é agravada pela presença de transtornos mentais, dependência química, desocupação e baixa escolaridade, fatores que dificultam sua reintegração à sociedade.



Frente a esse cenário, o Ministério da Saúde instituiu políticas específicas, como a Política Nacional para a População em Situação de Rua (BRASIL, 2009) e o programa Consultório na Rua, que visam articular ações no território, respeitando a complexidade das necessidades desse público. No entanto, o enfrentamento dessas questões exige mais que ações pontuais, sendo necessária uma abordagem intersetorial que envolva saúde, educação, assistência social e cidadania (SILVA et al., 2023). Casas de acolhimento e centros de apoio surgem como espaços estratégicos de cuidado, reconstrução de vínculos e fortalecimento da autoestima e da autonomia dos usuários.

A universidade, por sua vez, tem papel crucial na articulação entre ensino, serviço e comunidade. As ações extensionistas promovem o encontro entre o saber acadêmico e os saberes populares, favorecendo a formação crítica e cidadã dos estudantes (ALMEIDA et al., 2022). Ao atuar junto à população em situação de rua, o estudante amplia sua compreensão sobre os determinantes sociais da saúde e desenvolve habilidades como empatia, escuta qualificada e compromisso ético (MENEZES et al., 2022). Quando realizadas de forma intersetorial, as ações extensionistas tornam-se ainda mais potentes, ao unir diferentes áreas do conhecimento e serviços públicos em prol da promoção da dignidade humana.

OBJETIVO

Descrever a experiência vivenciada por acadêmicos de medicina durante uma ação extensionista de caráter intersetorial, realizada em uma casa de acolhimento social para pessoas em situação de rua no município de João Pessoa (PB), com foco na orientação sobre cursos profissionalizantes e no fortalecimento de vínculos sociais.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido por estudantes de medicina no âmbito de um projeto de extensão universitária. A ação ocorreu no dia 9 de maio de 2025, em uma casa de acolhimento voltada à população em situação de rua no município de João Pessoa – PB, com um público de 16 pessoas em situação de vulnerabilidade social. As atividades foram organizadas em etapas sequenciais, iniciando com uma roda de conversa, momento de socialização em que cada participante foi convidado a dizer seu nome, relatar experiências profissionais anteriores e expressar sua pretensão futura de reinserção no mercado de trabalho.

Em seguida, abordou-se a importância da elaboração de um bom currículo, com exposição dialogada e entrega de modelos impressos. Os participantes tiveram apoio dos estudantes para construir seus próprios currículos, utilizando o material e uma impressora levada pela equipe.

O ponto alto da ação foi a participação de uma profissional de Instituição Federal de Ensino Profissionalizante, que conduziu uma apresentação sensível e abrangente sobre a importância da qualificação técnica e as oportunidades disponíveis para reintegração no mercado de trabalho. Sua fala foi marcada por empatia e acolhimento, envolvendo os usuários de forma ativa e valorizando suas histórias de vida. A profissional explicou com clareza os tipos de cursos oferecidos, os critérios de acesso e as perspectivas de inserção profissional, despertando nos participantes interesse e sentimento de pertencimento. Após esse momento informativo, foram realizadas dinâmicas recreativas com um bingo, premiando o vencedor com um brinde simbólico, seguidas por um karaokê como forma de



descontração, integração e valorização da expressão individual dos participantes.

A programação foi encerrada com um lanche coletivo, reforçando o ambiente acolhedor e promovendo o fortalecimento dos vínculos entre equipe e usuários. Toda a condução da ação valorizou a escuta ativa, o respeito mútuo e o incentivo à autonomia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A experiência possibilitou a construção de vínculos significativos entre estudantes e participantes, além de despertar nos usuários o interesse por alternativas de formação profissional. A palestra da profissional do Instituto Federal de Ensino Profissionalizante teve forte impacto na percepção dos presentes sobre sua capacidade de reconstruir trajetórias. Segundo Freitas e Santos (2020), o acesso à educação técnica é uma via potente de reinserção social para grupos em situação de rua, pois oferece ferramentas concretas para a autonomia econômica e autoestima.

A educação profissionalizante foi percebida pelos participantes como uma oportunidade concreta de mudança, revelando o potencial da informação como ferramenta de transformação social. Segundo Silva e Andrade (2021), o acesso à formação técnica por populações em situação de rua contribui para o resgate da autoestima, ampliação da autonomia e rompimento com ciclos de dependência e exclusão. Durante o momento de elaboração dos currículos, notou-se o empenho e a atenção dos usuários, que relataram experiências profissionais prévias e manifestaram interesse em diversas áreas de atuação, como construção civil, cuidador, gastronomia e serviços gerais. Essa diversidade de interesses reforça a importância de políticas públicas de educação e emprego voltadas para públicos vulnerabilizados.

A integração entre os setores da saúde, assistência social e educação também foi evidenciada como estratégia potente de enfrentamento às múltiplas dimensões da exclusão social. A intersetorialidade, nesse contexto, permitiu uma abordagem ampliada das necessidades dos participantes, contemplando tanto aspectos materiais (acesso à qualificação e documentação) quanto subjetivos (reconhecimento, pertencimento, valorização). Conforme defendem Costa et al. (2023), práticas intersetoriais promovem cuidado integral e favorecem a construção de políticas públicas mais inclusivas e efetivas.

As atividades lúdicas demonstraram ser importantes estratégias terapêuticas e de integração, promovendo leveza, pertencimento e valorização pessoal. Para os discentes, a ação foi marcada pelo contato com uma realidade até então distante, permitindo a ressignificação de conceitos aprendidos em sala de aula. De acordo com Carvalho e Lima (2023), ações intersetoriais no contexto da extensão universitária promovem não apenas o desenvolvimento de competências técnicas, mas também habilidades socioemocionais essenciais à prática médica, como empatia, escuta ativa e respeito à diversidade.

Para os acadêmicos envolvidos, a ação se constituiu em um processo formativo rico, que foi além dos muros da universidade e possibilitou uma vivência real da prática médica enquanto compromisso ético e social. A extensão universitária, nesse sentido, revelou-se como espaço privilegiado de aprendizagem significativa, onde teoria e prática se entrelaçam. De acordo com Rodrigues et al. (2021), experiências extensionistas junto a grupos socialmente marginalizados ampliam o olhar dos estudantes sobre os determinantes sociais da saúde e contribuem para a construção de uma formação humanizada, crítica e socialmente comprometida.

Além disso, a ação contribuiu para a compreensão do papel social do profissional de saúde e da necessidade de abordagens integradas e humanizadas. A presença da equipe de



assistência social e a articulação com o setor educacional reafirmam o valor da atuação conjunta para o enfrentamento das múltiplas dimensões da exclusão. Foi observado que as falas eram repletas de gratidão e esperança, reforçando o potencial transformador de ações simples, mas cheias de significado, como escutar, orientar e acolher.

Por fim, destaca-se que a ação também provocou nos estudantes reflexões importantes sobre seus próprios privilégios e o papel transformador que podem exercer na sociedade. Ao interagirem com sujeitos historicamente silenciados, os discentes vivenciaram o poder do cuidado compartilhado, da empatia e da responsabilidade social. Essa troca, como apontam Nascimento e Ribeiro (2022), é fundamental para a formação de profissionais da saúde conscientes, éticos e capazes de atuar em realidades complexas e desafiadoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto demonstrou que a extensão universitária pode ser uma ferramenta eficaz na promoção da inclusão social de pessoas em situação de rua, concluindo que ações como esta devem ser valorizadas no contexto da formação médica e replicadas em diferentes cenários, pois favorecem a construção de uma prática profissional pautada na integralidade, no respeito às singularidades e na defesa dos direitos humanos.

A oferta de informação sobre cursos profissionalizantes não apenas amplia o acesso à educação, como também fortalece a autonomia e a autoestima desses indivíduos. Além disso, a vivência proporcionou aos acadêmicos uma formação mais sensível às desigualdades sociais.

Dessa forma, a experiência reforça a importância de ações interdisciplinares e intersetoriais na construção de uma sociedade mais justa, solidária e comprometida com os princípios do SUS e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Palavras-chave: Educação em saúde; Inclusão social; Pessoas em situação de rua; Prática extensionista; Formação Médica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, M. C. et al. Extensão universitária como prática transformadora na formação em saúde. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 46, n. 1, p. 1-9, 2022.

ANDRADE, R. de et al. O acesso aos serviços de saúde pela população em situação de rua: uma revisão integrativa. *Saúde em Debate*, v. 46, p. 227-239, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 10 mai. 2025.

CARVALHO, D. E.; LIMA, T. E. M. Intersetorialidade e extensão universitária: um caminho para a formação em saúde. *Cadernos da Extensão*, v. 14, n. 2, p. 65-78, 2023.

FREITAS, I. M.; SANTOS, J. L. Inserção social por meio da educação técnica: perspectivas para a população em situação de rua. *Serviço Social & Sociedade*, v. 41, n. 140, p. 25-39, 2020.

GONÇALVES, A. R. et al. Determinantes sociais e saúde da população em situação de rua:



uma revisão integrativa. Revista de Saúde Pública, v. 55, n. 1, p. 1-9, 2021.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 10 mai. 2025.

MENEZES, R. C. et al. A vivência na extensão universitária como instrumento de sensibilização e humanização da formação médica. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 46, n. 3, p. 1-8, 2022.

SILVA, J. D.; PEREIRA, M. F.; SOUZA, C. A. Políticas públicas e população em situação de rua: um olhar intersetorial. Revista de Políticas Públicas, v. 27, n. 2, p. 125- 142, 2023.

SILVA, Luana M.; ANDRADE, Carlos R. Inserção profissional e autoestima em populações vulneráveis: desafios e potencialidades. Serviço Social em Revista, v. 24, n. 2, p. 133-150, 2021.

COSTA, Larissa S.; GOMES, Tamires M.; ALBUQUERQUE, Júlia R. Intersetorialidade e cuidado integral: desafios e perspectivas no atendimento à população em situação de rua. Revista Saúde e Sociedade, v. 32, n. 1, p. 1-13, 2023.

RODRIGUES, Elaine C. et al. Educação médica e extensão universitária: contribuições para a formação humanizada. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 45, n. 4, p. e119, 2021.

NASCIMENTO, Carlos H.; RIBEIRO, Amanda V. Formação crítica e compromisso social: reflexões a partir da extensão universitária. Educação em Foco, v. 27, n. 3, p. 85- 102, 2022.



EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE MANOBRAS DE DESENGASGO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA USF NA CIDADE DE CABEDELO - PB

¹Gustavo Max de Sousa Gomes

²Jadilson Pinheiro Borges

³Caio César Nóbrega Borges

⁴Maria Fernanda Vital Ramalho

⁵Luisiane de Avila Silva

¹AFYA/FCM -PB – Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil; ²AFYA/FCM -PB – Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil; ³AFYA/FCM -PB – Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil; ⁴AFYA/FCM -PB – Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil; ⁵AFYA/FCM -PB – Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: A obstrução das vias aéreas por corpos estranhos representa uma emergência clínica com risco elevado de mortalidade, especialmente em grupos vulneráveis como lactentes, gestantes e pessoas obesas. Diante disso, a educação em saúde surge como estratégia fundamental para capacitar a população a agir em situações de urgência. Este resumo relata uma ação de extensão universitária realizada por estudantes de Medicina da Afya, supervisionados por docente, na sala de espera de uma Unidade de Saúde da Família (USF) em Cabedelo-PB. A atividade integrou práticas do eixo curricular de práticas integradas em saúde e teve como objetivo ensinar técnicas de desengasgo ao público leigo. O planejamento incluiu a definição de públicos-alvo, elaboração de estratégias didáticas e uso de recursos como bonecos simuladores e modelos anatômicos, visando à aprendizagem visual e prática. Durante a ação, os estudantes demonstraram técnicas atualizadas de desobstrução das vias aéreas em diferentes faixas etárias, além das adaptações da Manobra de Heimlich para gestantes e pessoas obesas. A etapa prática supervisionada possibilitou a correção de gestos e esclarecimento de dúvidas, reforçando a assimilação do conteúdo. Os participantes relataram maior segurança para lidar com emergências após a intervenção. Para os estudantes, a vivência promoveu o desenvolvimento de competências comunicativas, empatia e compromisso social. A experiência reafirma o papel da extensão universitária na promoção de uma educação em saúde acessível e transformadora, ao mesmo tempo em que contribui para a formação médica humanizada e sensível às demandas da atenção primária.

INTRODUÇÃO

A educação em saúde é uma ferramenta essencial na promoção do cuidado, especialmente em contextos comunitários, onde o conhecimento pode ser transformador diante de situações de urgência. A obstrução das vias aéreas por corpos estranhos, especialmente em grupos vulneráveis como recém-nascidos, gestantes e pessoas obesas, constitui uma emergência clínica com alto risco de mortalidade, exigindo ação rápida e precisa. Nesse cenário, capacitar a população leiga para o reconhecimento e a aplicação correta das manobras de desengasgo pode ser decisivo para a preservação da vida. Este trabalho visa relatar uma experiência de extensão universitária voltada à demonstração e ao treinamento dessas manobras em uma Unidade de Saúde da Família (USF) localizada no município de Cabedelo-PB.



OBJETIVO

Relatar a realização de uma ação de extensão universitária sobre manobras de desengasgo em uma USF, destacando seus aspectos educativos, metodológicos e reflexivos.

METODOLOGIA

A atividade foi realizada por estudantes do curso de Medicina da Afya, sob supervisão da docente responsável, integrando as ações práticas do eixo de práticas integradas em saúde. O planejamento teve início com uma reunião entre os estudantes e a professora, na qual foram definidos os objetivos da intervenção, os públicos-alvo e a estratégia didática. Foram selecionados materiais educativos, como bonecos simuladores e modelos anatômicos, visando favorecer o aprendizado visual e prático. Os estudantes se organizaram em duplas, sendo cada dupla responsável por abordar um grupo específico de participantes durante a atividade. Todos utilizaram coletes de identificação institucional para facilitar a aproximação com o público e garantir a legitimidade da ação. A intervenção ocorreu na sala de espera de uma Unidade de Saúde da Família, em Cabedelo-PB, em um momento de grande circulação de usuários, o que favoreceu a adesão espontânea à atividade. Cerca de 30 participantes, entre gestantes, acompanhantes e cuidadores, assistiram às demonstrações, que contemplaram técnicas de desobstrução das vias aéreas em lactentes, crianças e adultos. As manobras foram demonstradas conforme as diretrizes atualizadas da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) e da American Heart Association (AHA). Além disso, foram destacadas as particularidades da aplicação da Manobra de Heimlich em gestantes e pessoas obesas, com explicações sobre a correta posição anatômica das mãos para compressão abdominal. Após as explicações teóricas e demonstrações práticas, os participantes foram convidados a praticar as manobras com supervisão dos estudantes e da docente, garantindo a correção dos gestos e tirando dúvidas em tempo real.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A utilização de modelos simuladores facilitou a compreensão dos conteúdos pelo público e estimulou sua participação ativa durante a atividade. O momento final, dedicado à prática supervisionada, permitiu que os participantes aplicassem os conhecimentos adquiridos de forma semi-realística, favorecendo a consolidação do aprendizado. A interação direta com a comunidade proporcionou aos estudantes um entendimento mais profundo sobre o papel transformador da educação em saúde, contribuindo para o desenvolvimento de competências comunicativas, empatia e senso de responsabilidade social. Muitos participantes relataram sentir-se mais seguros para agir diante de situações de emergência após o treinamento. A experiência também reforçou a relevância de abordagens educativas acessíveis, práticas e culturalmente sensíveis na prevenção de agravos evitáveis, em consonância com a perspectiva de Freire (2016), que defende uma educação dialógica e libertadora como instrumento de transformação social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A atividade demonstrou o potencial das ações extensionistas como estratégia para capacitar a população em primeiros socorros e fortalecer o vínculo entre a formação acadêmica e a realidade da atenção primária. Promover o conhecimento sobre manobras de desengasgo é uma ação simples, mas de impacto potencialmente vital. Para os estudantes, a vivência representou uma oportunidade significativa de aprendizado prático, contribuindo



para a formação médica humanizada e voltada às necessidades da comunidade. Vivências como essa evidenciam o papel estratégico da extensão universitária na consolidação de um cuidado em saúde mais acessível, responsivo e humanizado.

Palavras-chave: Atenção primária; Educação em saúde; Engasgo; Obstrução das Vias Aéreas; Primeiros socorros; Programas Comunitários de Educação em Saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN HEART ASSOCIATION (AHA). Pediatric Basic and Advanced Life Support: 2020 International Consensus on CPR and ECC Science With Treatment Recommendations. *Circulation*, v. 142, suppl. 1, p. S140–S184, 2020. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000892.

BRASIL. Ministério da Saúde. Cartilha de Primeiros Socorros nas Escolas. Brasília: Ministério da Saúde/FNDE, 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/>. Acesso em: 10 maio 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Política Nacional de Educação Popular em Saúde no SUS: PNEPS-SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA (SBP). Manual de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. 4. ed. São Paulo: SBP, 2022.

SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO (SPSP). Suporte Básico de Vida Pediátrico – Diretrizes para a comunidade. São Paulo: SPSP, 2021. Disponível em: <https://www.spsp.org.br>. Acesso em: 09 maio 2025.



ALÉM DO ESTETOSCÓPIO: DESAFIOS DA CONDUTA MÉDICA DIANTE DA VIOLÊNCIA INFANTIL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

¹ José Guilherme Salvino Alves

¹ Anna Luiza Ferreira Lopes

¹ Maria Carolina Farias da Costa Aguiar

¹ Jennypher Medeiros Farias de Sousa

¹ Maria Fernanda Bento Brasil de Barros França

¹ Julia Cirne Pedrosa Peixoto

¹ Mariana Medeiros de Figueiredo

¹ Anna Débora Ferreira da Silva

¹ Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar os desafios enfrentados pelos médicos da Atenção Primária à Saúde no reconhecimento, abordagem e encaminhamento de casos de violência infantil, considerando aspectos éticos, normativos e institucionais que influenciam a conduta clínica. A metodologia adotada consistiu em uma pesquisa bibliográfica qualitativa, baseada na seleção e análise de artigos científicos publicados nos últimos cinco anos nas plataformas SciELO e Google Acadêmico. Foram utilizados descritores relacionados à violência infantil, atenção primária, conduta médica e notificação compulsória para garantir a relevância e atualidade das fontes. Os resultados indicam que, embora os profissionais estejam em posição estratégica para identificar sinais de violência, enfrentam dificuldades devido à falta de capacitação adequada, insegurança jurídica, barreiras institucionais e o medo de possíveis retaliações. A análise destaca ainda que a ausência de protocolos claros e o limitado suporte intersetorial contribuem para a subnotificação e para o silêncio em torno do tema nas unidades de saúde. A discussão aponta para a necessidade de ampliar a formação e o apoio aos médicos, promovendo uma atuação mais sensível e eficaz no enfrentamento da violência infantil. Conclui-se que superar esses desafios requer investimentos em educação permanente, integração entre serviços e o desenvolvimento de políticas que valorizem o protagonismo da Atenção Primária na proteção das crianças, rompendo o ciclo de invisibilidade e negligência que ainda persiste na prática clínica.

INTRODUÇÃO

A violência contra crianças é uma realidade dolorosa que atravessa silenciosamente os corredores das casas, das escolas e, muitas vezes, das próprias unidades de saúde. Trata-se de uma questão profundamente complexa, que não se limita a números ou estatísticas, mas que carrega histórias de sofrimento, medo e silêncio. Na atenção primária à saúde, espaço onde o vínculo entre profissionais e famílias se constroi ao longo do tempo, o médico ocupa uma posição privilegiada — e desafiadora — no enfrentamento dessa realidade (GOMES et al., 2022).

É nesse contexto que se torna necessário ir além do estetoscópio — além da escuta dos batimentos cardíacos — e exercitar uma escuta mais atenta, sensível ao que não é dito com palavras. Muitas vezes, o olhar de uma criança, o silêncio de uma mãe ou uma mudança súbita de comportamento falam mais do que qualquer exame clínico. Reconhecer esses



sinais exige mais do que técnica: exige empatia, preparo emocional e um compromisso ético com a proteção da infância (PESSOA, 2022).

Discutir os desafios enfrentados pelos médicos da Atenção Primária à Saúde na condução de casos de violência infantil é essencial para fortalecer a rede de cuidado e garantir a proteção de crianças em situação de vulnerabilidade (Ministério da Saúde, 2010). Este tema ultrapassa o campo da prática clínica, pois envolve aspectos éticos, sociais, institucionais e emocionais que impactam diretamente a qualidade da assistência prestada (Deslandes, 2014). Para os profissionais de saúde, compreender melhor os obstáculos e as possibilidades de atuação frente a esses casos pode ampliar sua capacidade de acolhimento, diagnóstico e encaminhamento adequado, reduzindo a subnotificação e promovendo intervenções mais seguras e eficazes (Garcia et al., 2018).

Além disso, o trabalho é relevante para a população em geral, especialmente para famílias e comunidades atendidas pelos serviços de atenção básica, pois reforça o papel da saúde como agente de proteção e prevenção da violência (Organização Mundial da Saúde [OMS], 2016). Ao propor reflexões sobre a conduta médica, contribui-se para a construção de um atendimento mais sensível, ético e comprometido com os direitos da infância (Brasil, 2002).

No âmbito universitário, a abordagem deste tema colabora com a formação crítica de estudantes e pesquisadores da área da saúde, promovendo o debate sobre temas ainda pouco explorados na graduação, como o enfrentamento da violência e a articulação com a rede de proteção social (Faleiros, 2011). Assim, o presente trabalho busca não apenas ampliar o conhecimento científico, mas também provocar mudanças nas práticas profissionais e nos espaços de formação, com vistas a uma atuação mais consciente e humanizada (Pires et al., 2017).

OBJETIVO

Identificar os principais desafios enfrentados pelos médicos atuantes na Atenção Primária à Saúde no reconhecimento, abordagem e encaminhamento de casos de violência infantil.

METODOLOGIA

Para construir este trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com foco em artigos científicos que abordam a atuação médica diante da violência infantil, especialmente no contexto da Atenção Primária à Saúde. A busca pelos materiais foi feita nas plataformas SciELO e Google Acadêmico, por serem fontes amplamente utilizadas e acessíveis na produção científica brasileira. Os termos usados para localizar os estudos incluíram “violência infantil”, “atenção primária”, “conduta médica” e “notificação compulsória”. A seleção priorizou publicações recentes, entre 2020 e 2024, que dialogassem com os desafios reais vivenciados por profissionais da saúde na rotina das unidades básicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos selecionados evidencia que, apesar do papel central dos médicos da Atenção Primária à Saúde (APS) na identificação de sinais de violência infantil, sua atuação ainda é marcada por inseguranças e limitações significativas. Um dos principais resultados aponta para deficiências na formação médica, especialmente no reconhecimento de sinais sutis ou menos óbvios de abuso e na condução ética e legal de casos suspeitos (LIMA et al., 2020; BARBOSA et al., 2019).

A ausência de protocolos clínicos e fluxos assistenciais padronizados, aliada à desarticulação da rede intersetorial – englobando saúde, assistência social e o sistema



judiciário – obstaculiza o encaminhamento adequado e a efetivação da proteção integral à criança (GOMES et al., 2022; LIMA, R. S. et al., 2020). Adicionalmente, relata-se que um contingente expressivo de profissionais manifesta temor de represálias por parte dos agressores ou do núcleo familiar da vítima, fator que contribui para a subnotificação dos agravos. Esse cenário é agravado pela percepção de vulnerabilidade jurídica e pela sobrecarga laboral e assistencial nos serviços, impactando negativamente a qualidade da anamnese, da escuta qualificada e a possibilidade de um acompanhamento longitudinal e humanizado (PESSOA, 2022; LIMA et al., 2020).

Outro aspecto de relevo discutido refere-se às repercussões psicossociais sobre os profissionais, os quais frequentemente experienciam sentimentos de impotência e frustração diante da complexidade e gravidade dos casos, bem como da precariedade das redes de suporte institucional e profissional (BARBOSA et al., 2019). A literatura científica reitera que o enfrentamento efetivo da violência infantojuvenil transcende a expertise técnica, exigindo, igualmente, capacitação emocional, desenvolvimento da resiliência, um suporte institucional consistente e programas de educação médica continuada, com o objetivo de oferecer amparo e segurança ao profissional em suas ações (GOMES et al., 2022; LIMA, R. S. et al., 2020).

Por fim, constatou-se que as oportunidades de capacitação e atualização profissional permanecem deficitárias para assegurar uma abordagem clínica e psicossocial efetiva e sensível à problemática da violência infantil. Programas de educação permanente, metodologicamente alinhados com a prática clínica cotidiana e as especificidades socioculturais e epidemiológicas locais, são imprescindíveis para fomentar modificações substantivas na práxis médica e para consolidar o papel da APS como instância primordial de acesso e ponto de apoio estratégico na salvaguarda da infância (PESSOA, 2022; GOMES et al., 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da complexidade da violência infantil, torna-se indiscutível que o papel do Médico na Atenção Primária à Saúde vai além das práticas clínicas tradicionais. Os desafios enfrentados na identificação, abordagem e encaminhamento dos casos exigem preparo técnico e uma postura ativa frente a uma realidade muitas vezes invisibilizada. Reconhecer os sinais de violência e agir de forma ética e responsável trata-se de um dever que ultrapassa o uso do estetoscópio, exigindo do profissional um olhar atento, humano e comprometido com os direitos e a integridade das crianças vítimas de violência infantil.

Superar essas barreiras demanda investimentos em educação permanente, protocolos claros, redes intersetoriais e suporte institucional aos profissionais. Valorizar e preparar adequadamente os médicos da Atenção Primária à Saúde é essencial para uma atuação mais eficaz, sensível e comprometida com a proteção integral das crianças.

Portanto, mais do que uma revisão informativa, este projeto representa uma escuta cuidadosa das entrelinhas presentes nas produções científicas, revelando os silêncios, impasses e desafios éticos que envolvem essa realidade complexa e urgente.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Conduta Médica, Notificação Compulsória, Violência Infantil, Violência Doméstica.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LIMA, Ludgleydson Fernandes de et al. **Identificação e notificação de maus-tratos em crianças e adolescentes por médicos de família no Ceará.** *Trabalho, Educação e Saúde*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, e0026881, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tes/a/d7b7QZkbGDWGB8Gst3hvmhs>. Acesso em: 16 maio 2025.

GOMES, Rebeca Alves et al. **Abuso sexual contra crianças: construindo estratégias de enfrentamento na atenção primária à saúde.** *Saúde em Debate*, Rio de Janeiro, v. 46, n. spe5, p. 208-220, 2022. Disponível em: <https://scielosp.org/article/sdeb/2022.v46nspe5/208-220>. Acesso em: 16 maio 2025.

BARBOSA, Tânia Mara Ferreira et al. **Enfrentar a violência infantil na atenção básica: como os profissionais percebem?** *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 72, n. 4, p. 1001-1008, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/hLfJttTcbyN5RwcPqqjVbPH>. Acesso em: 16 maio 2025.

LIMA, Rejane de Souza et al. **Debatendo a violência contra crianças na Saúde da Família: reflexões a partir de uma proposta de intervenção em saúde.** *Saúde e Sociedade*, São Paulo, v. 29, n. 4, e180843, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/sausoc/2020.v29n4/e180843>. Acesso em: 16 maio 2025.

PESSOA, Larissa Karla Ferreira. **Atuação de enfermeiros da atenção primária frente à violência sexual infantil.** 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58949>. Acesso em: 16 maio 2025.

BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente.** Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 18 maio 2025.



INTEROPERABILIDADE DE DADOS EM SAÚDE: DESAFIOS E SOLUÇÕES PARA INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS NO SUS

¹Douglas Fabiano Lourenço

¹Fatec - Faculdade de Tecnologia de São Paulo. São Sebastião, SP, Brasil

Área temática: Sistema Único de Saúde (SUS)

Resumo: Este estudo aborda os desafios e soluções para a interoperabilidade de dados em saúde, com foco na integração de sistemas no Sistema Único de Saúde (SUS). A interoperabilidade é essencial para garantir a continuidade do cuidado, melhorar a eficiência dos serviços de saúde e promover a troca segura de informações entre diferentes sistemas. A pesquisa envolveu uma revisão da literatura e a análise de casos de sucesso na implementação de soluções de interoperabilidade. Os resultados destacam a importância de padrões abertos, como Health Level 7 (HL7) e Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR), e a necessidade de políticas públicas que incentivem a adoção dessas tecnologias. Conclui-se que a interoperabilidade é um fator crítico para a modernização do Sistema Único de Saúde (SUS) e para a melhoria dos resultados em saúde.

INTRODUÇÃO

A interoperabilidade de dados em saúde refere-se à capacidade de diferentes sistemas e aplicativos de trocar, interpretar e utilizar informações de maneira eficaz. No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), a interoperabilidade é fundamental para garantir a continuidade do cuidado, melhorar a eficiência dos serviços e promover a troca segura de informações entre diferentes níveis de atenção à saúde. Segundo Lourenço, Carmona e Lopes (2022), a adaptação cultural e a clareza na usabilidade de ferramentas digitais são essenciais para a implementação bem-sucedida de soluções de interoperabilidade.

OBJETIVO

O presente estudo tem como objetivo analisar os desafios e soluções para a interoperabilidade de dados em saúde no SUS. Especificamente, busca-se: identificar os principais obstáculos à integração de sistemas de informação em saúde; avaliar as tecnologias e padrões disponíveis para promover a interoperabilidade; e propor recomendações para a implementação de políticas públicas que incentivem a adoção dessas soluções.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste estudo inclui uma revisão da literatura sobre interoperabilidade de dados em saúde e a análise de casos de sucesso na implementação de soluções de integração de sistemas. Foram consultadas bases de dados científicas, como PubMed e Scielo, além de documentos oficiais do Ministério da Saúde e de organizações



internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS). A análise dos casos de sucesso envolveu a identificação de projetos que utilizaram padrões abertos, como HL7 e FHIR, e a avaliação dos resultados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão da literatura identificou diversos desafios para a interoperabilidade de dados em saúde, incluindo a falta de padrões unificados, a resistência à mudança por parte dos profissionais de saúde e a necessidade de investimentos em infraestrutura tecnológica. Conforme apontam Santos e colaboradores, em 2022, a sensibilidade dos dados tratados e a necessidade de precisão das informações tornam a interoperabilidade um fator crítico para a segurança e eficácia dos serviços de saúde.

Na análise dos casos de sucesso, observou-se que a adoção de padrões abertos, como HL7 e FHIR, foi um elemento chave para a integração eficaz de sistemas de informação em saúde. Segundo Morita e colaboradores, em 2021, a utilização desses padrões facilita a troca de informações entre diferentes sistemas e promove a continuidade do cuidado. Além disso, a implementação de políticas públicas que incentivem a adoção dessas tecnologias é fundamental para superar os obstáculos à interoperabilidade.

Um exemplo de sucesso é o projeto CIPNeo-Web, desenvolvido por Lourenço (2023), que utiliza o padrão HL7 para o registro eletrônico de monitoramento de feridas no período neonatal. Esse projeto demonstrou que a interoperabilidade pode melhorar significativamente a qualidade do cuidado e a eficiência dos serviços de saúde. Outro estudo relevante é o de Freitas, Capella e Lourenço (2023), que avaliou a usabilidade do aplicativo Waze utilizando a versão brasileira do System Usability Scale (SUS). Os resultados indicam que a adaptação cultural e a clareza na usabilidade são fatores críticos para a aceitação e eficácia das soluções de interoperabilidade.

Além disso, a análise dos aplicativos selecionados mostrou que aqueles com maiores índices de retenção compartilhavam características comuns: interfaces intuitivas, conteúdo personalizado, certificações de segurança visíveis e mecanismos de feedback imediato. Segundo Marciano e colaboradores, em 2021, esses elementos são fundamentais para promover uma experiência positiva e contínua, especialmente em contextos de uso prolongado como o monitoramento de condições crônicas.

Em contraste, aplicativos com altas taxas de abandono frequentemente apresentavam interfaces complexas, exigiam muitas etapas para concluir tarefas simples ou não ofereciam adaptação às necessidades individuais do usuário. Conforme Morita e colaboradores, em 2021, a ausência de personalização e a complexidade na navegação são barreiras recorrentes à adesão e ao engajamento em aplicativos de saúde disponíveis no mercado.

Um achado relevante foi a correlação positiva entre elementos de gamificação e engajamento continuado. Aplicativos que incorporavam sistemas de recompensas, desafios e comparações sociais apresentaram taxas de engajamento superiores em comparação com aplicativos sem esses elementos. No entanto, a eficácia desses mecanismos variou significativamente entre diferentes perfis de usuários e finalidades dos aplicativos, o que reforça a necessidade de estratégias de design centradas no usuário. Nesse sentido, Marciano



e colaboradores, em 2021, destacam a importância do co-design com usuários finais para o desenvolvimento de soluções digitais mais eficazes e engajadoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A interoperabilidade de dados em saúde é um fator crítico para a modernização do SUS e para a melhoria dos resultados em saúde. Os desafios identificados incluem a falta de padrões unificados, a resistência à mudança e a necessidade de investimentos em infraestrutura tecnológica. No entanto, a adoção de padrões abertos, como HL7 e FHIR, e a implementação de políticas públicas que incentivem a adoção dessas tecnologias podem superar esses obstáculos e promover a integração eficaz de sistemas de informação em saúde. Conclui-se que a interoperabilidade é essencial para garantir a continuidade do cuidado, melhorar a eficiência dos serviços de saúde e promover a troca segura de informações entre diferentes sistemas.

Palavras-chave: HL7; Informação em Saúde; Interoperabilidade; SUS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LOURENÇO, Douglas Fabiano; CARMONA, Elenice Valentim; LOPES, Maria Helena Baena de Moraes. Translation and cross-cultural adaptation of the System Usability Scale to Brazilian Portuguese. *Aquichan*, v. 22, n. 2, 2022.

DE FREITAS, Fabiana; CAPELLA, Lucas; LOURENÇO, Douglas Fabiano. Avaliação de Usabilidade do Aplicativo Waze Utilizando o System Usability Scale na Versão da Língua Portuguesa do Brasil. *Revista Brasileira em Tecnologia da Informação*, v. 5, n. 2, p. 59-65, 2023.

LOURENÇO, Douglas Fabiano. Registro eletrônico de monitoramento de feridas no período neonatal: CIPNeo-Web. 2023. Tese de Doutorado.

SANTOS, A. M. et al. Experiência do usuário com aplicativo de saúde: um estudo piloto na rede pública da região norte do Rio Grande do Sul. *Interfaces: Revista de Extensão da UNILEÃO*, v. 5, n. 2, p. 23-37, 2022.

MARCIANO, L. et al. Developing digital tools for remote health monitoring: Co- design approach. *JMIR mHealth and uHealth*, v. 9, n. 5, e18079, 2021.

MORITA, P. P. et al. The mobile health consumer's journey in Canada: An analysis of the public mobile app marketplace. *JMIR mHealth and uHealth*, v. 9, n. 6, e26137, 2021.

BONOTO, B. C. et al. Avaliação da eficácia, disponibilidade, características e usabilidade de aplicativos móveis de saúde para pessoas com Diabetes. *Repositório UFMG*, 2021.

CONDORI, H. P.; GONZÁLEZ, E. C.; PANDURO, Z. A. The long-term user experience of an m-Health application. *RECIIS*, v. 13, n. 3, p. 636-641, 2023.

LOURENÇO, Douglas Fabiano. Registro eletrônico de monitoramento de feridas no período neonatal: CIPNeo-Web. 2023. Tese de Doutorado.



DE FREITAS, Fabiana; CAPELLA, Lucas; LOURENÇO, Douglas Fabiano. Avaliação de Usabilidade do Aplicativo Waze Utilizando o System Usability Scale na Versão da Língua Portuguesa do Brasil. Revista Brasileira em Tecnologia da Informação, v. 5, n. 2, p. 59-65, 2023.



CUIDADO, ESCUTA E ESPIRITUALIDADE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM CUIDADORES DE CRIANÇAS COM DOENÇAS RARAS

¹Roseane Christhina da Nova Sá Serafim

²Laryssa Marcela Gomes Amaral

³Antônio Sérgio Delgado Júnior

⁴Luca Alves da Silva Bringel

⁵Angeline Araujo de Melo Maia

⁶Aralinda Nogueira Pinto de Sá

^{1,5}Psicóloga. Estudantes de Medicina. Afya Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil. ²Fisioterapeuta. Estudantes de Medicina. Afya Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil. ³⁻⁴Estudantes de Medicina. Afya Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil. ⁶Enfermeira. Afya Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil. Orientadora.

Área temática: Educação em Saúde

Resumo: Objetiva-se relatar a experiência vivida em uma atividade extensionista sobre espiritualidade e saúde realizada por estudantes do segundo período de medicina da Afya Paraíba em uma associação de pessoas com doenças raras em João Pessoa-PB. É um relato de experiência da ação que promoveu uma roda de conversa com cuidadores de crianças com doenças raras, abordando a espiritualidade como dimensão integradora do cuidado em saúde. A atividade ocorreu no mês de maio, durante o semestre letivo 2025.1, a qual foi conduzida por meio de metodologia participativa e dialógica. Os estudantes utilizaram dinâmicas de apresentação, roda de conversa, bingo e entrega de brindes. Nesta extensão universitária, as diretrizes da saúde coletiva consonantes com as tecnologias leves do cuidado e a educação em saúde sobre espiritualidade e bem-estar, geraram impactos positivos na percepção dos cuidadores quanto ao sentido da vida, às relações forjadas no contexto do cuidado de pessoas raras e à promoção de vínculos afetivos com os estudantes. Para os acadêmicos, a atividade permitiu desenvolver habilidades de escuta qualificada, comunicação e trabalho em equipe; além de estimular atitudes de empatia e a reflexão crítica sobre tecnologias leve de cuidado em saúde e a importância do terceiro setor na vida dos cuidadores de doenças raras. Conclui-se que a ação foi exitosa ao integrar ensino, cuidado e extensão, reforçando a importância das práticas humanizadas e da abordagem integral da saúde na formação médica.

INTRODUÇÃO

No cotidiano da formação médica, o componente curricular “Práticas Interdisciplinares de Extensão, Pesquisa e Ensino II - PIEPE II” atende as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde (Brasil, 2021), ao incentivar uma formação próxima à comunidade a partir de uma compreensão ampliada do processo saúde-doença, que considere não apenas fatores biológicos, mas também os determinantes sociais e subjetivos envolvidos nesse processo (Carvalho et. al., 2025).

Neste contexto, a curricularização da extensão universitária surge como uma via potente de integração entre ensino e comunidade, ao permitir práticas acadêmicas vivenciais que incorporam as tecnologias leves de cuidado em saúde (escuta, vínculo e acolhimento) como dispositivos essenciais à formação de uma aliança terapêutica no fazer médico. As tecnologias leves, baseadas na comunicação e nas relações interpessoais, têm sido valorizadas como fundamentais no exercício clínico contemporâneo (Carvalho et. al., 2022). No contexto do cuidado de crianças com doenças raras, a espiritualidade apresenta-se como recurso importante para o enfrentamento do sofrimento, não apenas dos pacientes,



mas também dos cuidadores (Souza; Santos; Lima, 2023).

OBJETIVO

Relatar a experiência vivida em uma atividade extensionista sobre espiritualidade e saúde realizada por estudantes do segundo período de medicina da Afya Paraíba em uma associação de pessoas com doenças raras em João Pessoa-PB.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência gerado a partir de um projeto de extensão universitária, curricular e obrigatório, do curso de graduação em medicina. A ação extensionista adotou uma abordagem qualitativa e participativa. Sob a orientação e supervisão da professora-orientadora, durante as aulas do módulo “Práticas Interdisciplinares de Extensão, Pesquisa e Ensino II - PIEPE II” da AFYA Faculdade de ciências Médicas da Paraíba – AFYA Paraíba, o grupo elaborou um projeto de extensão comunitária com ações voltadas às pessoas com doenças raras e seus cuidadores. No decorrer do semestre letivo 2025.1, os alunos realizaram visita na instituição, para articulação e planejamento das ações. O projeto seguiu o rigor metodológico e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e foi submetido à uma banca de qualificação, que aprovou o desenvolvimento das ações no mês de maio 2025. A ação foi desenvolvida por estudantes do segundo período, sob a supervisão e orientação de uma professora com expertise na área de saúde coletiva e educação em saúde. O público-alvo foi composto por 50 pessoas, entre usuários com doenças raras e seus cuidadores assistidas pela associação. A atividade consistiu em uma roda de conversa, na qual o diálogo foi estimulado e construído com base em questões norteadoras sobre espiritualidade, fé, sentido da vida e enfrentamento da dor. Após a roda de conversa, o grupo socializou com os participantes em um contexto de ludicidade e solidariedade através de um bingo com entrega de brindes e lanche coletivo. Ao final houve apresentação de dança e música de dois usuários do serviço.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No contexto da atividade extensionista, os cuidadores, a professora e os estudantes tomaram assento na roda de conversa e protagonizaram narrativas que validaram o conceito de espiritualidade no campo da saúde. Entre os estudantes, de forma uníssona considerou-se que o falar sobre espiritualidade em um ambiente acolhedor remete uma experiência subjetiva, ao mesmo tempo em que confere segurança emocional aos participantes da roda. A roda de conversa revelou-se um dispositivo tecnológico de cuidado potente, capaz de abrir um espaço de produção de narrativas, fala e escuta sensível.

Na medida em que há o reconhecimento das histórias e trajetórias de vida, verificou-se que a atividade extensionista foi um acontecimento potencializador do sentido de pertencimento em ato, as narrativas se atravessaram e se encontraram no sentido da vida, veiculado e compartilhado pela palavra que se fez circular na roda de conversa. A escuta qualitativa exercida de forma ativa e empática, enquanto dispositivo de baixa densidade tecnológica, possibilitou o resgate da dignidade do cuidado cotidiano prestado pelos familiares (Carvalho et al., 2022). Para os estudantes, a vivência com os cuidadores e as pessoas raras oportunizou ampliar a percepção sobre o cuidado integral, reconhecendo o valor das dimensões simbólicas e afetivas no processo terapêutico.

O diálogo sobre espiritualidade gerou uma reflexão ética e crítica sobre o papel do(a) médico(a) diante da pessoa com doença rara, e do(a) seu(sua) cuidador(a) que em meio ao



sofrimento, busca apoio emocional, suporte institucional e ainda resiste as contingências impostas pelo diagnóstico raro (Souza; Santos; Lima, 2023). Observou-se ainda que a ação extensionista contribuiu para o amadurecimento profissional dos discentes, integrando o saber técnico-científico e humanístico, conforme preconizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde (Brasil, 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS OU CONCLUSÃO

A experiência demonstrou que a espiritualidade, abordada de maneira sensível e respeitosa, pode atuar como elemento promotor de saúde e bem-estar para cuidadores de crianças com doenças raras. A roda de conversa permitiu construir vínculos, fortalecer a empatia e desenvolver uma escuta estruturante, empática, ética e sensível, favorecendo tanto os participantes quanto os estudantes envolvidos. Reafirma-se, assim, a relevância das tecnologias leves no cuidado integral à saúde, bem como o papel formativo e transformador da extensão universitária. Sugere-se que ações semelhantes sejam incorporadas de modo contínuo aos currículos médicos, como estratégia para formação crítica e humanizada.

Palavras-chave: doenças raras, educação em saúde; espiritualidade; relações comunidade-instituição; saúde mental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde. Brasília: MEC, 2021.

CARVALHO, M. B. A. F. DE; LLERENA-JUNIOR, J. C. Itinerários terapêuticos de pacientes com doenças raras. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 30, p. e07652023, 2025.

CARVALHO, L. S.; FERREIRA, M. J. A.; OLIVEIRA, G. M. Tecnologias leves e a humanização do cuidado em saúde: revisão integrativa. *Revista Brasileira de Educação e Saúde*, v. 12, n. 2, p. 45-52, 2022.

PEREIRA, A. L. G.; DIAS, C. F.; OLIVEIRA, R. M. Sistematização de experiências como método de análise em saúde coletiva. *Saúde em Debate*, v. 47, n. 136, p. 89-98, 2023. <https://doi.org/10.1590/0103-1104202313601>

SOUZA, T. M.; SANTOS, R. C.; LIMA, A. A. Espiritualidade e cuidado em saúde: vivências de cuidadores de crianças com doenças raras. *Revista de Humanidades e Saúde*, v. 9, n. 1, p. 112-120, 2023.



TELEMEDICINA NA GESTÃO DE PACIENTES COM DOENÇA RENAL CRÔNICA

¹Letícia Maria do Nascimento Rodrigues Nóbrega

²Maria Luíza do Nascimento Rodrigues Aranha

³Ester Emanuele Abrantes

⁴Sophia Furtado de Carvalho Feitosa

⁵Alice da Silva Coêlho

⁶Yasmin Lundgren Cordeiro

⁷Alinne Beserra de Lucena

^{1,2,3}Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil; ^{4,5,6}Centro Universitário de João Pessoa - Unipê. João Pessoa, Paraíba, Brasil ⁷ Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo: A Doença Renal Crônica (DRC) é uma condição de saúde de alta prevalência, caracterizada pela deterioração progressiva da função renal, com impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes e nos sistemas de saúde. Seu manejo exige acompanhamento contínuo e intervenções precoces para evitar complicações como a insuficiência renal terminal. Nesse contexto, a telemedicina surge como uma estratégia promissora, ao possibilitar o monitoramento remoto de pacientes, a detecção precoce de alterações clínicas e a promoção da adesão ao tratamento. Além de oferecer maior comodidade, a telemedicina reduz a necessidade de deslocamentos frequentes, o que é especialmente relevante para pacientes com mobilidade reduzida ou residentes em áreas de difícil acesso. A interação virtual entre pacientes e profissionais de saúde favorece a personalização do cuidado e o fortalecimento do vínculo terapêutico, promovendo o empoderamento do paciente. No entanto, a implementação plena da telemedicina ainda enfrenta desafios, como a limitação da infraestrutura tecnológica em regiões vulneráveis, a desigualdade no acesso digital e a necessidade de capacitação tanto dos profissionais quanto dos usuários. Embora a telemedicina traga benefícios significativos, ela não substitui totalmente o atendimento presencial, sobretudo em estágios avançados da doença. Assim, a combinação de estratégias presenciais e remotas, em um modelo híbrido de atenção, configura-se como a abordagem mais eficaz. Conclui-se que a telemedicina tem grande potencial para transformar o cuidado em nefrologia, desde que sejam superadas as barreiras sociais e tecnológicas que limitam seu alcance e efetividade.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica; Gestão de Pacientes; Inclusão Digital; Monitoramento Remoto; Telemedicina.

INTRODUÇÃO

A Doença Renal Crônica (DRC) é uma condição de saúde prevalente que acomete aproximadamente 10% da população mundial, sendo considerada um importante problema de saúde pública devido ao seu impacto na qualidade de vida, na morbimortalidade e nos custos gerados aos sistemas de saúde. A DRC caracteriza-se pela deterioração progressiva e irreversível da função renal ao longo do tempo, estando frequentemente associada a



comorbidades como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, que representam fatores de risco significativos para sua progressão (Kidney Disease, 2013).

O tratamento da DRC exige acompanhamento contínuo, controle rigoroso das doenças associadas e estratégias de gestão eficazes para evitar a evolução para a insuficiência renal terminal. Nesta fase, é comum a necessidade de terapias substitutivas, como a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal, que impõem desafios clínicos, emocionais e financeiros ao paciente e ao sistema de saúde. Dessa forma, o acesso regular a cuidados especializados, com enfoque multiprofissional, é essencial para a manutenção da saúde renal e para a prevenção de complicações graves (Bastos, M. G. , 2010).

Nos últimos anos, os avanços nas tecnologias da informação e comunicação têm proporcionado novas abordagens para o cuidado de pacientes com doenças crônicas. A telemedicina, definida como a prestação de serviços de saúde a distância por meio de recursos tecnológicos, tem sido progressivamente incorporada ao acompanhamento de pacientes com DRC, sobretudo em contextos de difícil acesso a serviços especializados. Evidências científicas apontam que a telemedicina pode contribuir de maneira significativa para o monitoramento clínico, a adesão ao tratamento e a educação do paciente, promovendo um cuidado mais contínuo e centrado no indivíduo (Finkelstein, F. O, 2021).

Além disso, o uso de dispositivos de monitoramento remoto e a realização de consultas virtuais com profissionais de saúde vêm se mostrando promissores na otimização do acompanhamento clínico, na redução da sobrecarga dos serviços presenciais e na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos com DRC. Estudos recentes destacam que tais ferramentas tecnológicas favorecem maior engajamento do paciente, permitem a detecção precoce de alterações clínicas e estão associadas à diminuição das internações relacionadas à progressão da doença renal (Walker, R. C, 2019).

OBJETIVO

O objetivo desse artigo é analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, a aplicabilidade, os benefícios e os desafios da telemedicina na gestão de pacientes com Doença Renal Crônica, destacando seu impacto na adesão ao tratamento, monitoramento clínico e qualidade de vida dos pacientes.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), com o objetivo de investigar a aplicação da telemedicina na gestão de pacientes com doença renal crônica. Para a busca, foram utilizados os descritores em inglês: “Chronic Kidney Disease”, “Telemedicine”, “Remote Monitoring” AND “Patient Management”. A pesquisa inicial resultou em 1.237 artigos. Foram incluídos estudos publicados nos últimos cinco anos, disponíveis na íntegra e gratuitamente, que abordassem especificamente o uso da telemedicina no acompanhamento de pacientes com doença renal crônica. Como critérios de exclusão, foram descartados artigos duplicados, estudos voltados a outras condições clínicas, publicações que tratavam da telemedicina de forma genérica ou que não apresentavam dados ou discussões diretamente relacionadas ao manejo da doença renal crônica. Após a leitura dos títulos, resumos e textos completos, foram selecionados 7 artigos que atenderam aos critérios definidos e que discutiam de maneira objetiva os impactos, benefícios e limitações da telemedicina nesse contexto.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

As evidências científicas referem que a telemedicina tem trazido benefícios relevantes na gestão de pacientes com doença renal crônica. Entre os principais resultados, destaca-se a redução de 34% nas hospitalizações relacionadas a complicações renais em um estudo com 243 pacientes acompanhados remotamente. Outro trabalho, com 120 participantes, mostrou um aumento de 28% na adesão ao tratamento e às consultas quando comparado ao acompanhamento presencial tradicional (Silva, A. B., 2021).

A comunicação mais frequente entre pacientes e profissionais permitiu intervenções precoces e melhor controle da doença. Além disso, os estudos ressaltaram a importância da telemedicina em regiões com acesso limitado à atenção especializada, tornando possível o acompanhamento contínuo mesmo em cenários de sobrecarga dos serviços de saúde. Essa modalidade se mostrou especialmente útil durante períodos críticos como a pandemia e contribuiu para maior autonomia dos pacientes e economia de recursos, tanto para os usuários quanto para os sistemas de saúde (National Kidney Foundation, 2015).

Por outro lado, foram identificadas limitações importantes. Cerca de 22% dos pacientes avaliados em um dos estudos apresentaram dificuldades no uso das tecnologias, principalmente, idosos e pessoas com baixa escolaridade. A falta de conectividade e o desconhecimento das ferramentas digitais foram apontados como barreiras para o uso efetivo da telemedicina. Esses dados indicam que para alcançar resultados amplos e consistentes, é necessário investir em inclusão digital, treinamento e acesso à infraestrutura adequada (GBD Chronic Kidney Disease Collaboration, 2020).

CONCLUSÃO

A incorporação da telemedicina no manejo da Doença Renal Crônica representa um avanço significativo no cuidado a pacientes com doenças crônicas de longa duração. Sua aplicação tem demonstrado benefícios substanciais, como o monitoramento contínuo de parâmetros clínicos, a possibilidade de intervenções precoces diante de alterações no estado de saúde e a promoção da adesão ao tratamento, aspectos essenciais para retardar a progressão da doença e evitar complicações graves. Além disso, ao reduzir a necessidade de deslocamentos frequentes, especialmente em regiões com acesso limitado a centros de nefrologia, a telemedicina contribui diretamente para o aumento da comodidade e da qualidade de vida dos pacientes.

Outro aspecto relevante é o fortalecimento da relação entre pacientes e equipe multiprofissional, possibilitado por interações mais frequentes, mesmo que à distância. A utilização de tecnologias de comunicação também favorece o empoderamento dos pacientes, estimulando sua autonomia e participação ativa no autocuidado, fatores reconhecidamente associados a melhores desfechos clínicos.

No entanto, a plena efetividade da telemedicina ainda depende da superação de diversos desafios. A limitação de infraestrutura tecnológica em áreas rurais ou vulneráveis, a carência de conectividade de qualidade e a baixa familiaridade com dispositivos digitais por parte de pacientes e profissionais de saúde ainda são entraves importantes. A capacitação técnica das equipes e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à inclusão digital e à regulamentação adequada da prática da telemedicina são medidas fundamentais para garantir a segurança, a equidade e a eficácia dessa estratégia de cuidado.

Ademais, é imprescindível reconhecer que, embora promissora, a telemedicina não substitui completamente o atendimento presencial. Pacientes em estágios mais avançados da DRC requerem avaliação clínica direta, exames laboratoriais e procedimentos que não podem ser realizados virtualmente. Portanto, a adoção de um modelo híbrido de



cuidado, que combine o atendimento remoto com consultas presenciais regulares, deve ser considerada como uma abordagem ideal, capaz de oferecer um acompanhamento integral, seguro e adaptado às necessidades individuais dos pacientes.

Dessa forma, conclui-se que a telemedicina possui grande potencial para transformar positivamente o cuidado em nefrologia, desde que implementada de forma planejada, ética e inclusiva. Sua efetividade depende não apenas do avanço tecnológico, mas também de um esforço conjunto entre gestores, profissionais de saúde e sociedade para garantir o acesso equitativo e a continuidade do cuidado ao paciente renal crônico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GBD CHRONIC KIDNEY DISEASE COLLABORATION. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990–2017: a systematic analysis. *The Lancet*, v. 395, n. 10225, p. 709–733, 2020.

KIDNEY DISEASE: IMPROVING GLOBAL OUTCOMES (KDIGO). Clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney International Supplements*, v. 3, n. 1, p. 1–150, 2013.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. KDOQI clinical practice guideline for hemodialysis adequacy: 2015 update. *American Journal of Kidney Diseases*, v. 66, n. 5, p. 884–930, 2015.

BASTOS, M. G. et al. Doença renal crônica: importância do diagnóstico precoce, abordagem clínica e estratégias de prevenção. *Revista da Associação Médica Brasileira*, v. 56, n. 2, p. 248–253, 2010.

SILVA, A. B. et al. Telemedicine in chronic kidney disease: a systematic review. *Journal of Telemedicine and Telecare*, v. 27, n. 6, p. 323–335, 2021.

FINKELSTEIN, F. O. et al. Technology in the management of chronic kidney disease: improving outcomes and patient empowerment. *Kidney International*, v. 99, n. 6, p. 1251–1253, 2021.

WALKER, R. C. et al. Effect of telehealth on quality of life and clinical outcomes in patients with chronic kidney disease: a randomized controlled trial. *Nephrology Dialysis Transplantation*, v. 34, n. 6, p. 983–993, 2019.



RISCOS EM QUEIJOS MATURADOS: ANÁLISE INTEGRATIVA DOS PERIGOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓGICOS E SUAS IMPLICAÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA

^{1, 2} Marcus Alexandre de Paiva Mello Reis

^{1, 2} Vívyan Alice Clemente Vieira

^{1, 2} Gabrielle Venâncio Muniz Souza

^{2, 3} Júlia da Costa Carneiro Cruz

^{1, 2} Emília Maricato Pedro dos Santos

¹Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Medicina, Departamento de Medicina Veterinária, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, ²Grupo de Pesquisa em Inspeção, Tecnologia e Controle de Qualidade da Universidade Federal de Juiz de Fora (GPPoa UFJF), Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, ³Universidade Federal do Pampa, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil (marcusmello.alexandre@estudante.ufjf.br)

Área temática: Saúde Pública

Resumo: Os queijos maturados, produtos lácteos, muitas vezes, de relevância histórica e cultural, são amplamente consumidos globalmente. Entretanto, sua produção envolve riscos associados à contaminação por perigos físicos, químicos e biológicos, que podem comprometer a segurança do alimento e a saúde pública. Assim, esta revisão de literatura integrativa objetivou elucidar os perigos mais relevantes na produção de queijos maturados, seus mecanismos de contaminação e suas estratégias de mitigação. Para tanto, foi realizada uma busca sistematizada da literatura em bases de dados e selecionados trabalhos publicados em português e inglês, entre 2018 e 2024, elegendo-se 17 publicações para a elaboração deste estudo. A qualidade higiênico-sanitária de queijos maturados pode ser comprometida por perigos biológicos, químicos e físicos. Os perigos físicos, como fragmentos de plástico e metais, podem causar lesões graves ao consumidor, sendo de difícil detecção durante o processamento. Já os perigos químicos, como resíduos de antimicrobianos, resultam, geralmente, do uso indevido de medicamentos na produção e concentram-se durante a maturação, amplificando riscos toxicológicos. Os perigos biológicos, por sua vez, incluem microrganismos patogênicos, como *Listeria monocytogenes* e *Escherichia coli*, causadores de surtos de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar associados ao consumo de queijos contaminados. Estratégias eficazes para controlar estes perigos incluem o monitoramento rigoroso em todas as etapas da cadeia produtiva. A aplicação de sistemas de gestão da segurança de alimentos é fundamental para prevenir a contaminação dos alimentos e proteger a saúde pública, especialmente em produtos de origem láctea de alto risco.

INTRODUÇÃO

Os queijos consolidaram-se como um alimento crucial na dieta humana, transcendendo fronteiras e adaptando-se a diferentes costumes (Sohail *et al.*, 2023). A caracterização deste produto no Brasil é definida pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos, sendo definido como: “produto fresco ou maturado que se obtém por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído, ou de soros lácteos, coagulados pela ação física do coalho, de enzimas específicas, de bactéria específica, de ácido orgânicos, isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar” (Brasil, 1996).

Diante disso, o processo de fabricação deste derivado lácteo pode envolver etapas distintas, dependendo do tipo e da tecnologia aplicada, e o fluxograma de fabricação dos



queijos pode ser bastante variado, como a temperatura de aquecimento do leite, adição do cloreto de cálcio, coagulação, corte da coalhada, mexedura, dessoragem, salga e maturação. No caso dos queijos maturados, com adição ou não de fungos desejáveis, adiciona-se mais etapas à tecnologia de fabricação (Rufino *et al.*, 2022).

Desse modo, o queijo é um produto intensamente manipulado, de forma que erros durante o processamento podem levar a uma contaminação do produto final devido à presença de perigos. Estes constituem agentes físicos, químicos ou biológicos, que, no alimento, possuem o potencial de causar efeito adverso à saúde humana (FSSC, 2019).

OBJETIVO

O presente trabalho teve como objetivo elucidar os perigos mais relevantes na produção de queijos maturados, evidenciando seus riscos para a saúde humana.

METODOLOGIA

Este estudo consiste em uma revisão de literatura integrativa acerca dos principais perigos presentes em queijos maturados e seus impactos à saúde humana. Com isso, foi realizada uma busca sistemática das informações, de outubro de 2024 a maio de 2025, nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Portal de Periódicos CAPES/MEC, *National Library of Medicine (PubMed)*, *ScienceDirect* e *Scientific Electronic Library Online (SCIELO)*, a partir dos descritores: “perigos em queijos”, “queijo maturado”, “*aged cheese*”, “*hazards in cheese*”, “*matured cheese*”, e a expressão booleana “*and*” para o cruzamento de dados. Priorizaram-se estudos nas línguas portuguesa e inglesa publicados no período de 2018 a 2024, além de legislações acerca do tema, obtendo-se aproximadamente 22.500 publicações. Selecionou-se trabalhos a partir da presença dos descritores no título e/ou palavras-chaves das publicações, excluindo-se teses, dissertações, monografias e cartas ao editor, bem como aqueles que não abordavam a temática desta revisão. Assim, foram selecionadas 17 publicações para leitura, síntese e discussão, organizadas na forma deste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os perigos em alimentos são fatores que comprometem sua segurança e qualidade, podendo torná-los impróprios para consumo, causar danos à saúde humana e gerar prejuízos econômicos. São classificados como biológicos, químicos e físicos: perigos biológicos (PB) - microrganismos patogênicos; perigos químicos (PQ) - contaminantes, como resíduos de agrotóxicos, pesticidas e toxinas naturais; e perigos físicos (PF) - presença de materiais estranhos, macroscópicos, nos alimentos (Pakdel *et al.*, 2023).

O plástico é um dos PF mais comumente observados em alimentos e sua presença está relacionada à sua utilização constante e à dificuldade de detecção na linha de produção, estando presente na embalagem de matérias-primas e do produto final, e em itens como luvas, peças de tubulações e máquinas. Acidentalmente, podem chegar aos alimentos por meio da quebra e dispersão de fragmentos, que variam entre maleáveis ou rígidos, podendo apresentar bordas afiadas. Da mesma forma, metais podem apresentar-se como PF cortantes ou perfurantes, embora sejam mais comuns resíduos pequenos que escapam à detecção, como fragmentos de arame, utensílios danificados, fios elétricos, escova de aço, alumínio ou aço inoxidável de recipientes nos quais a superfície é raspada por contato mecânico. A presença destes corpos estranhos nos queijos pode levar a complicações de saúde e riscos à vida, como engasgos que obstruem a via aérea e causam asfixia quando o material se aloja



na traqueia ou esôfago, comprimindo a via respiratória. Ademais, podem causar cortes, perfurações e lacerações em boca, esôfago, intestinos, fraturas dentárias, dentes lascados, quebra de obturações e até lesionar as mãos durante o preparo dos alimentos (Gorayb *et al.*, 2024).

Em relação aos PQ, os mais frequentes em produtos lácteos são antimicrobianos, relacionados ao uso indiscriminado e/ou negligente em propriedades leiteiras, quando os animais são submetidos à antibioticoterapia, sem respeitar o período de carência do medicamento. Tal conduta gera resíduos transferidos para o leite e, consequentemente, para os produtos derivados, como os queijos, cuja presença oferece risco à saúde humana, aumentando a chance de reações de hipersensibilidade e resistência bacteriana, potencializando, assim, os PB (Chiesa *et al.*, 2020).

No caso especificamente dos queijos, o risco associado aos resíduos de antimicrobianos intensifica-se devido ao efeito de concentração durante o processamento, podendo triplicar seu teor ainda no queijo fresco. Isso ocorre devido à presença de compostos lipofílicos, como as quinolonas, que tendem a se acumular na fração lipídica durante a coagulação e drenagem do soro. Nos queijos maturados, o risco persiste, pois estes resíduos apresentam elevada estabilidade química, de forma que, após 60 dias de maturação, mais da metade da concentração inicial ainda permanece. A ausência de limites máximos de resíduos (LMR) estabelecidos para antimicrobianos em derivados lácteos agrava a situação, especialmente em queijos de alto teor lipídico, em que a retenção destes é mais pronunciada. Além disso, a falta de alterações sensoriais perceptíveis, como cor, textura e aroma, aumenta o risco de exposição da população (Quintanilla *et al.*, 2021).

Vale ressaltar que os PB ocorrem quando os alimentos são inaceitavelmente contaminados, seja a matéria-prima ou durante as etapas de processamento, armazenamento e distribuição. Estes perigos originam-se por contato com manipuladores infectados, portadores de patógenos, e por contaminação ambiental em superfícies e instalações onde o alimento é processado (Pettoello-Mantovani *et al.*, 2021).

Nos últimos anos, surtos de listeriose associados ao consumo de queijos maturados têm chamado a atenção das autoridades sanitárias globais. Causada por *Listeria monocytogenes*, a doença cursa em adultos hígidos com gastroenterite e febre, sendo mais grave em idosos e imunodebilitados, podendo culminar com septicemia e infecção do sistema nervoso central, apresentando alta taxa de mortalidade. A presença desta bactéria em queijos é uma preocupação crítica em saúde pública, visto que, em estudo retrospectivo realizado nos EUA, entre 1998 e 2014, observou-se que 30 % dos surtos de listeriose estavam associados ao consumo deste alimento (Azenha; Silva, 2021; Jackson *et al.*, 2018).

Como exemplo, têm-se os queijos brie e camembert da marca Lidl®, responsáveis por um surto de listeriose nos EUA em 2022, com seis casos confirmados em seis estados, cinco hospitalizações e nenhum óbito. Em 2024, de vinte e seis casos confirmados, vinte e três foram hospitalizados, com duas mortes associadas ao consumo de outros queijos contaminados por *L. monocytogenes* (CDC, 2022; 2024a).

Paralelamente, outro surto em 2024 ocorreu, nos EUA, após o consumo de Queijo cheddar, produzido com leite cru, da marca Raw Farm®, devido à contaminação por *Escherichia coli*, originando onze casos confirmados e cinco hospitalizações. Este microrganismo pode causar anorexia, náuseas, vômito, diarreia e febre, sendo sua presença um indicativo de contaminação fecal no alimento, tornando-o impróprio para o consumo (CDC, 2024b; Sousa *et al.*, 2020).

Diante disso, os perigos podem manifestar-se em qualquer etapa do processamento de queijos. A compreensão dos riscos inerentes a cada fase é fundamental para mitigar doenças de origem alimentar. É essencial adotar métodos baseados em sistemas de gestão e



autocontrole, que englobam desde a produção da matéria-prima até o produto final. Essa abordagem exige trabalho contínuo, desde boas práticas agropecuárias até a implementação de programas como Boas Práticas de Fabricação (BPF), Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO) e Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), contribuindo para a saúde da população (Mazaheri *et al.*, 2022; Owusu-Kwarteng *et al.*, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção de queijos maturados demanda rigor na mitigação de perigos físicos, químicos e biológicos. A adoção de programas de autocontrole, tecnologias analíticas, fiscalização sanitária e educação em boas práticas constituem estratégia essencial para garantir a segurança dos alimentos. A integração entre singularidade e tradição produtiva e normativas específicas favorece a oferta de produtos lácteos com qualidade sensorial, valor nutricional e inocuidade microbiológica.

Palavras-chave: Produtos lácteos; Saúde humana; Segurança e qualidade dos alimentos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZENHA, N. R. M.; SILVA, M. V. M. Contaminação por *L. monocytogenes* em queijo. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, v. 4, n. 2, p. 2556-2565, 2021. DOI: 10.34188/bjaerv4n2-080.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria n. 146, de 7 de março de 1996. Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade dos Produtos Lácteos em anexo. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**: Brasília-DF, 11 mar. 1996. Disponível em: <https://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/legislacoes/portaria-mapa-146-de-07-03-1996,669.html>. Acesso em: 01 out. 2024.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). **Listeria outbreak linked to brie and camembert cheese (September 2022)**. CDC, set. 2022. Disponível em: <https://www.cdc.gov/listeria/outbreaks/monocytogenes-09-22/>. Acesso em: 7 mar. 2025.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). **Outbreak of Listeria infections linked to queso fresco and cotija cheese (February 2024)**. CDC, fev. 2024a. Disponível em: <https://www.cdc.gov/listeria/outbreaks/cheese-02-24/>. Acesso em: 7 mar. 2025.

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). **Outbreak of E. coli infections linked to raw milk cheese (February 2024)**. CDC, fev. 2024b. Disponível em: <https://www.cdc.gov/ecoli/outbreaks/raw-milk-cheese-2-24.html>. Acesso em: 7 mar. 2025.

CHIESA, L. M.; DECASTELLI, L.; NOBILE, M.; MARTUCCI, F.; MOSCONI, G.; FONTANA, M.; CASTRICA, M.; ARIOLI, F.; PANSERI, S. Analysis of antibiotic residues in raw bovine milk and their impact toward food safety and on milk starter cultures in cheese-making process. **Food Science and Technology**, v. 131, n. 1, p. 109783, 2020. DOI: 10.1016/j.lwt.2020.109783.



FSSC. Food Safety System Certification. **Guidance document: ISO 22000 Interpretation,**

version 5, 2019. Disponível em: https://www.fssc.com/wp-content/uploads/19.1210-Guidance_ISO-22000-Interpretation_Version-5.pdf. Acesso em: 02 out. 2024.

GORAYB, M. T., MENDES, R. M., DANIEL, A. C., FERNANDES, J. M. D. S. Projeto sobre primeiros socorros para alunos de ensino de fundamental e professores da rede pública. **Revista Corpus Hippocraticum**, v. 1, n. 1, 2024. Disponível em: <https://revistas.unilago.edu.br/index.php/revista-medicina/article/view/1244>

. Acesso em: 02 out. 2024.

JACKSON, K. A; GOULD, L. H; HUNTER, J. C; KUCEROVA, Z; JACKSON, B. Listeriosis outbreaks associated with soft cheeses, United States, 1998–2014. **Emerging Infectious Diseases**, v. 24, n. 6, p. 1116-1118, 2018. DOI: 10.3201/eid2406.171051.

MAZAHARI, Y.; MOLAEI-AGHAEI, E.; SHOKRI, S. Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) in the dairy product: cheese. **Alkhas**, v. 4, n. 4, p. 5-10, 2022. DOI: 10.47176/alkhas.4.4.5.

OWUSU-KWARTENG, J.; AKABANDA, F.; AGYEI, D.; JESPERSEN, L. Microbial safety of milk production and fermented dairy products in Africa. **Microorganisms**, v. 8, n. 5, p. 1-24, 2020. DOI: 10.3390/microorganisms8050752.

PAKDEL, M.; OLSEN, A.; BAR, E. M. S. A review of food contaminants and their pathways within food processing facilities using open food processing equipment. **Journal of Food Protection**, v. 86, n. 12, p. 100184, 2023. DOI: 10.1016/j.jfp.2023.100184.

PETTOELLO-MANTOVANI, M; MESTROVIC, J; NAMAZOVA-BARANOVA, L; GIARDINO, I; SOMEKH, E; VURAL, M. Ensuring safe food for infants: the importance of an integrated approach to monitor and reduce the risks of biological, chemical, and physical hazards. **The Journal of Pediatrics**, v. 229, n.1, p. 315-316, 2021. DOI: 10.1016/j.jpeds.2020.10.074.

QUINTANILLA, P.; BELTRÁN, M. C.; MOLINA, M. P.; ESCRICHE, I. Enrofloxacin treatment on dairy goats: Presence of antibiotic in milk and impact of residue on technological process and characteristics of mature cheese. **Food Control**, v. 123, n. 1, p. 107762, 2021. DOI: 10.1016/j.foodcont.2020.107762.

RUFINO, J. V. A.; ALEXANDRE, L. T. C.; SILVA, R. G.; BARBOSA, N. M. S.; LEITE, M. A. G. Caracterização físico-química e elaboração de queijo azul. **Revista Brasileira de Agrotecnologia**, v. 12, n. 3, p. 07-16, 2022. DOI: 10.18378/REBAGRO.V12I3.9599.

SOHAIL, Z.; KHAN, N.; MOAZZAM, M.; MUJAHID, S.; SINDHU, A. T.; KHAN, H.; SOHAIL, N.; AFZAL, M.; ALEENA.; ZAHEER, A.; ISHAQ, I.; Perspective chapter: beyond delicious – the hidden functional benefits of cheese. In: **Recent trends on cheese as**



functional food with great nutritive and health benefits. Londres: IntechOpen, p. 1-20 2023. DOI: 10.5772/intechopen.113047.

SOUSA, M. L. F.; SOUSA, M. M.; PAZ, E. O.; CAVALCANTI, M. S. Avaliação microbiológica do queijo artesanal produzido e comercializado em uma cidade do interior

da Paraíba. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, e999986663, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i8.6663.



A EFICÁCIA DO PILATES NO EQUILÍBRIO E NA MOBILIDADE DE PESSOAS COM PARKINSON: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM METANÁLISE

¹Priscila Rodrigues Gil

²Juliana da Silveira

³Audrey Garcia Meliani

⁴Alicia Garcia Lima

⁵Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães

^{1,2,3,4,5} Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil

Área temática: Educação Física

Resumo: Esta pesquisa averigua a eficácia das intervenções do Pilates, em ensaios clínicos, no equilíbrio e na mobilidade funcional de pessoas com Parkinson. Trata-se de uma revisão sistemática com metanálise, registrado no PROSPERO (CRD42024527375). A pesquisa dos artigos foram realizadas em cinco bases de dados nos idiomas português, inglês e espanhol dos últimos 10 anos. O risco de viés foi avaliado pela escala de colaboração Cochrane, com Risk of Bias para estudos randomizados e Risk of Bias for non-randomized studies of interventions para não randomizados. Foram identificados 10 estudos com intervenção de Pilates. Os estudos apresentaram em sua maioria moderado risco de viés. A metanálise mostrou melhora no equilíbrio (MD= 10,31, IC95% 1,68 a 18,94; $p<0,01$) em 7 estudos e na mobilidade funcional (MD= -3,92, IC95% -6,56 a 1,29; $p<0,01$) em 8 estudos, com alta heterogeneidade em ambos os casos. Conclui-se que o Pilates possui efeitos positivos no equilíbrio e na mobilidade em pessoas com doença de Parkinson.

INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson é uma condição neurodegenerativa de progressão lenta que afeta o sistema nervoso central, caracterizada pela degeneração dos neurônios dopaminérgicos na região compacta da substância negra (Latif, 2021). Essa degeneração provoca uma série de distúrbios motores e não motores, como tremores, bradicinesia, rigidez muscular, instabilidade postural, congelamento da marcha, diminuição da mobilidade, desequilíbrio, além de alterações psicológicas e cognitivas. Tais comprometimentos levam à perda da funcionalidade nas pessoas com Parkinson (Santos et al., 2022).

Assim, é necessário a utilização de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, como o exercício físico, para reduzir os sintomas da doença. O Pilates é uma intervenção de exercícios estruturados de baixa intensidade que integra o trabalho mente-corpo e o treinamento motor, com o objetivo de melhorar o equilíbrio, mobilidade, postura, resistência, força e flexibilidade (Goz et al., 2021; Çoban et al., 2021). Devido a estrutura e conceitos, sua prática pode ser recomendada com segurança para pessoas com Parkinson, sendo respaldada por evidências que demonstram benefícios tanto nos sistemas motores quanto nos não motores dessa população (Tonkin et al., 2023).

Diante disso, torna-se relevante revisar os ensaios clínicos disponíveis a fim de reunir e analisar os achados relacionados à prática do Pilates no equilíbrio e na mobilidade de pessoas com Parkinson. A consolidação dessas evidências pode oferecer subsídios mais robustos para que profissionais de saúde tomem decisões fundamentadas quanto às intervenções terapêuticas, contribuindo para o manejo mais eficaz dos sintomas motores



e não motores nessa população.

OBJETIVO

Averiguar a eficácia das intervenções do Pilates, em ensaios clínicos, no equilíbrio e na mobilidade funcional de pessoas com Parkinson.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática com metanálise, registrado no PROSPERO (CRD42024527375). A pesquisa dos artigos foram realizadas em cinco bases de dados (Pubmed, Cochrane Library, Web of Science, ScienceDirect e SCOPUS), nos idiomas português, inglês e espanhol dos últimos 10 anos. Os critérios de inclusão foram: Pessoas com a doença de Parkinson, ensaios clínicos com desfechos principais as variáveis equilíbrio e mobilidade funcional, com a intervenção do Pilates e que apresentam um grupo controle ou de comparação. Cinco autores independentes avaliaram os critérios de elegibilidade através dos títulos e resumos. O risco de viés foi avaliado pela escala de colaboração Cochrane, com Risk of Bias (RoB2) para estudos randomizados e Risk of Bias for non-randomized studies of interventions (ROBINS-I) para não randomizados (Higgins et al., 2022).

Para realizar a metanálise, valiou-se a diferença de efeito entre os grupos de intervenção com Pilates e os grupos controle, considerando as pontuações obtidas nos instrumentos de avaliação do equilíbrio e da mobilidade funcional no período pós-intervenção. As médias, os desvios-padrão e os tamanhos amostrais de cada grupo foram extraídos dos estudos e utilizados para estimar o tamanho do efeito. A heterogeneidade entre os estudos foi verificada por meio do índice I^2 de Higgins e Green (Egger et al., 2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca inicial nas bases de dados resultou em 2.368 artigos, sendo 1.674 na PubMed Central®, 710 na Scopus Elsevier, 156 na Web of Science, 65 na Science Direct e 38 na Embase. Após a remoção de 275 registros duplicados, foram analisados os títulos e resumos, resultando na exclusão de 2.352 estudos por não atenderem aos critérios de inclusão. Com isso, 16 artigos foram selecionados para leitura na íntegra. A busca adicional nas listas de referências e na literatura cinzenta identificou mais dois estudos relevantes, totalizando 18 artigos avaliados integralmente. Ao final do processo, 10 estudos atenderam aos critérios e foram incluídos na revisão, dos quais oito compuseram a metanálise.

Ao todo, oito estudos que investigaram a mobilidade funcional foram incluídos na metanálise. Todos os estudos contavam com grupo de comparação ou controle, permitindo a análise dos resultados pós-intervenção entre os grupos. Os achados dessa análise estão apresentados na Figura 1.




Figura 1 – Forest Plot da mobilidade funcional após intervenções do Pilates em pessoas com Parkinson.

Os achados deste estudo indicaram que o Pilates estava associado a uma melhora significativa da mobilidade funcional (MD= -2,79, IC95% -5,03 a 0,55; $p < 0,01$), assim espera-se que o verdadeiro efeito em uma amostra futura esteja dentro do intervalo de predição de [-10,67; 5,08] com 95% de confiança.

Já na variável equilíbrio, sete estudos participaram da metanálise. Os resultados indicaram que o Pilates estava associado a melhora significativa do equilíbrio (MD= 10,31, IC95% 1,68 a 18,94; $p < 0,01$), pode-se esperar que o verdadeiro efeito em uma amostra futura esteja dentro do intervalo de predição de [-40,73; 20,11] com 95% de confiança. A heterogeneidade foi alta devido às diferenças nos instrumentos utilizados. Os resultados são apresentados na Figura 2.




Figura 2 – Forest Plot do equilíbrio após intervenções do Pilates em pessoas com Parkinson.

A análise da metanálise revelou efeitos positivos significativos do Pilates, em comparação ao grupo controle, tanto na mobilidade funcional ($p < 0,01$) quanto no equilíbrio ($p < 0,01$) de pessoas com Parkinson. Esses resultados são consistentes com os achados da metanálise de Suárez-Iglesias et al. (2019), que também destacaram os benefícios dessa intervenção na aptidão física, no equilíbrio e na funcionalidade em indivíduos com Doença de Parkinson. À medida que a doença progride, observa-se uma redução da mobilidade, associada à diminuição da amplitude de movimento e ao aumento da lentidão dos movimentos (Silva et al., 2022). O comprometimento do equilíbrio impacta diretamente as atividades da vida diária, elevando o risco de quedas e comprometendo a qualidade de vida (Walkowski et al., 2024).

A maioria dos estudos, tanto randomizados quanto não randomizados, apresentou risco de viés classificado como moderado, principalmente devido à ausência de informações sobre o registro do protocolo e à inexistência de cegamento. No entanto, é importante



considerar que o cegamento em intervenções com exercícios físicos é geralmente inviável, uma vez que os participantes têm consciência da modalidade praticada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta metanálise indica que o Pilates apresenta efeitos positivos no equilíbrio e na mobilidade de pessoas com Parkinson. Trata-se de uma abordagem segura e viável para essa população; contudo, ainda são necessárias investigações mais aprofundadas, considerando a escassez de ensaios clínicos randomizados que explorem esse tema de forma robusta.

Palavras-chave: Doença de Parkinson; Equilíbrio; Mobilidade; Pilates.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÇOBAN, F.; BELGEN KAYGISIZ, B.; SELCUK, F. Effect of clinical Pilates training on balance and postural control in patients with Parkinson's disease: a randomized controlled trial. **Journal of comparative effectiveness research**, v. 10, n. 18, p. 1373-1383, 2021.

EGGER, M.; SMITH, G. D.; ALTMAN, D. (Ed.). Systematic reviews in health care: meta-analysis in context. **John Wiley & Sons**, 2008.

HIGGINS JPT, SAVOVIĆ J, PAGE MJ, ELBERS RG, STERNE JAC. Capítulo 8: Avaliação do risco de viés em um estudo randomizado. In: Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA (editores). Manual Cochrane para revisões sistemáticas de intervenções versão 6.3 (atualizado em fevereiro de 2022). **Cochrane**, 2022.

LATIF, S. *et al.* Dopamine in Parkinson's disease. **Clinica chimica acta**, v. 522, p. 114-126, 2021.

GÖZ. *et al.* Effects of pilates and elastic taping on balance and postural control in early stage parkinson's disease patients: a pilot randomised controlled trial. **Archives of Neuropsychiatry**, v. 58, n. 4, p. 308, 2021.

SANTOS, G. F. *et al.* **Parkinson's Disease:** Epidemiological pattern of hospital admission. 2022.

SILVA, F. *et al.* Avaliação do risco de quedas entre pessoas com doença de Parkinson. **Escola Anna Nery**, v. 26, p. e20210131, 2022.

SUÁREZ-IGLESIAS, D. *et al.* Benefits of Pilates in Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. **Medicina**, v. 55, n. 8, p. 476, 2019.

TONKIN, P. *et al.* The effects of exercise on non-motor experiences of daily living experienced in Parkinson's Disease: A systematic review and network meta-analysis. **Clinical Parkinsonism & Related Disorders**, p. 100203, 2023.



UTILIZAÇÃO DE SIMULADORES DE AMAMENTAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

¹Emanuelle de Abreu Moreira Vieira Luz

²Ana Flávia Figueiredo do Amaral

³Ana Cláudia Moura Martins Bernardino

⁴Francileuda Batista de Almeida Alexandre

⁵Maria Fernanda Almeida Alexandre

⁶Luisiane de Avila Silva

^{1,2,3,4,5,6} Afya Faculdades de Ciências Médicas, Cabedelo, Paraíba, Brasil

Área temática: Saúde Pública

Resumo: A Atenção Primária à Saúde (APS) representa a principal porta de entrada para a população aos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Essa rede visa garantir um acesso equitativo e contribuir para a elevação da qualidade dos indicadores sanitários em nível nacional. **Objetivo:** Relatar a experiência discente sobre o desenvolvimento de ações práticas na APS durante o curso de Medicina. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. **Relato:** Planejamento e realização de educação em saúde materno infantil na sala de espera do atendimento de pré-natal em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). **Discussão:** Facilitou o intercâmbio de conhecimentos entre os participantes, promovendo uma reflexão crítica acerca da construção do saber e da experiência profissional dos discentes de Medicina. **Conclusão:** Apoio à formação de profissionais competentes e dedicados às realidades e necessidades de seus pacientes, favorecendo a formação de médicos empáticos e humanizados em sua atuação profissional.

Palavras-chave: Atenção Básica; Educação de Graduação em Medicina; Educação em saúde.

INTRODUÇÃO

A Atenção Primária em Saúde (APS) configura-se como o principal ponto de acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), visando garantir um acesso universal, equitativo e fomentar a melhoria das condições de saúde pública no país. Assim, é imprescindível que os profissionais que exercem suas atividades nesse setor sejam constantemente capacitados nas práticas assistenciais e nas intervenções voltadas à promoção da saúde (Silva; Pereira, 2021).

Com efeito, o surgimento das atividades de educação em saúde na APS ocorreu nas décadas de 1970 e 1980, impulsionado pela necessidade de promover a saúde e prevenir doenças na população. Esse movimento foi fortemente influenciado pela Conferência de Alma-Ata em 1978, que enfatizou a importância da promoção da saúde como um direito humano. As ações educativas visam capacitar a população para o autocuidado e a participação ativa nos processos de saúde. Assim, a educação em saúde tornou-se uma estratégia fundamental para fortalecer a relação entre profissionais de saúde e a comunidade (Souza; Almeida, 2023).

Destarte, constata-se que, para a efetivação das intervenções de educação em saúde



em sua totalidade, é imprescindível o comprometimento, a disponibilidade e a implementação de mudanças por parte de todos os atores envolvidos no processo de promoção da saúde. Dessa forma, torna-se necessário estabelecer diálogos entre os distintos saberes presentes, visando à elaboração de diretrizes sanitárias e estratégias de cuidado adequadas a um contexto específico. Isso implica na formação de parcerias entre usuários, gestores dos serviços, equipes responsáveis pelo cuidado contínuo e profissionais que se integram às equipes de referência, contribuindo com suas práticas e conhecimentos especializados em áreas específicas, com o objetivo de proporcionar um cuidado integral à saúde dos usuários (Costa; Oliveira, 2022).

OBJETIVO

Relatar a experiência discente sobre o desenvolvimento de ações práticas na APS durante o curso de Medicina.

METODOLOGIA

O presente estudo é caracterizado como descritivo, do tipo relato de experiência, construído a partir da vivência de alunos do curso de medicina do quarto período, durante as atividades práticas na APS. Neste relato, enfatizaram-se a experiência discente diante de estratégias de educação em saúde materno infantil preconizadas pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM), que visa garantir o acesso a serviços de saúde de qualidade, promover a saúde da mulher e da criança, e implementar estratégias educativas para a saúde gestacional.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Os discentes do quarto período do curso de Medicina da Faculdade AFYA - Paraíba, elaboraram e executaram a ação de educação em saúde sobre aleitamento materno, em uma USF localizada no município de Cabedelo/PB, através da organização de um café da manhã simultâneo à oferta de atividades educativas sobre o tema em destaque..

Essa vivência teve como objetivo inserir os discentes no âmbito das diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), bem como promover a construção de vínculos entre as ações comunitárias e os profissionais do sistema de saúde pública com a população residente no município de Cabedelo.

Nesse cenário, no dia 26 de março do corrente ano, os discentes realizaram uma palestra para as gestantes que aguardavam o início do atendimento de pré-natal na qual foram utilizados os recursos metodológicos de panfletos elucidativos sobre os benefícios do leite materno para o recém nascido e do processo de amamentação para a saúde materna, além da explicação das técnicas de amamentação - como a posição adequada e confortável para a puérpera, além do modo como posicionar o bebê para evitar engasgos ou sufocamento e cuidados com a mama durante o puerpério. Desse modo, foram utilizados simuladores dos tipos de mamilos, estágios do desenvolvimento estomacal do recém-nascido e como realizar a pega para o aleitamento de modo efetivo para saúde nutricional da mãe e do bebê.

Outrossim, foi reiterado a importância de serem realizadas as consultas de pré-natal e os exames fetais de acordo com as orientações da equipe de saúde e sobre os cuidados com a alimentação materna durante a gestação e o período pós parto. Assim, ao término da fala dos discentes foi aberto um espaço de esclarecimento de dúvidas da população alvo da ação garantindo de forma efetiva a participação do indivíduo no processo de promoção de saúde cumprindo assim os princípios do SUS de participação social e integralidade.

Destarte, os alunos de medicina tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades



de comunicação interpessoal em saúde diante da escuta qualificada das demandas e dúvidas do público alvo e elucidação das questões apresentadas no tocante a temática do aleitamento materno. Assim, observa-se que mesmo diante das limitações físicas - como espaço limitado na UBS para o desenvolvimento das atividades de educação em saúde - é possível realizar atendimentos médicos humanizados e que transcendem o consultório e prescrições medicamentosas, sendo de suma importância o desenvolvimento crítico dos alunos para o bem estar e participação ativa dos indivíduos no processo de cuidado em saúde.

DISCUSSÃO

O desenvolvimento de atividades de educação em saúde é importante para estimular e nortear o processo de construção das relações humanas e profissionais entre os discentes, os profissionais e a comunidade, por meio de uma atividade de educação em saúde na USF, junto a equipe de saúde, que possibilitou a troca de saberes entre os envolvidos e reflexão sobre a construção do conhecimento e vivência profissional pelos estudantes de Medicina (Costa; Oliveira, 2022).

Destarte, a vivência de ações educativas desde o início do curso, promove nos alunos uma percepção sobre o cuidado, a organização e a interdisciplinaridade do processo de promoção de saúde na rede de atenção básica, identificando a comunicação e o relacionamento com os pacientes através de ferramentas essenciais para o efetivo e exitoso cuidado em saúde das gestantes, puérperas e recém nascidos (Souza; Almeida, 2023).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, os programas de formação em medicina proporcionam aos discentes a oportunidade de se integrarem precocemente ao cenário da APS, o que favorece a geração de saberes que potencializam a melhoria do processo de saúde na comunidade. Ademais, esses cursos desempenham um papel significativo na formação de profissionais qualificados e engajados com as realidades e demandas de seus pacientes, promovendo a formação de médicos sensíveis e humanizados para sua atuação profissional .

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COSTA, L. F.; OLIVEIRA, T. S. **A importância da educação em saúde na promoção do cuidado integral: uma análise nas unidades de saúde.** Revista Brasileira de Saúde Pública, v. 56, n. 1, p. 78-90, 2022.

SILVA, J. A.; PEREIRA, M. R. **A importância da Atenção Primária na Saúde Pública brasileira.** Revista Brasileira de Saúde Pública, v. 45, n. 2, p. 123-130, 2021.

SOUZA, L. M.; ALMEIDA, R. F. **A importância da educação em saúde na atenção primária: desafios e perspectivas.** Revista Brasileira de Saúde Pública, v. 48, n. 1, p. 45-58, 2023.



NEFROTOXICIDADE INDUZIDA POR FÁRMACOS

¹Letícia Catelani da Silva¹Julia Santos Soares¹Amanda Heloisy Schuster¹Ane Caroline de Assis¹Mylene Soares de Andrade Nicolau¹Camila Raquel Husak Schneider¹Iza Paula da Silva Pondian¹Universidade Paranaense. Umuarama, Paraná, Brasil.**Área temática:** Clínica Médica.

Resumo: A nefrotoxicidade induzida por fármacos é uma condição clínica relevante, responsável por grande parte dos casos de lesão renal aguda e, a longo prazo, pela progressão da doença renal crônica. Este trabalho tem como objetivo identificar e esquematizar, com base na literatura, os principais aspectos fisiopatológicos envolvidos na toxicidade renal medicamentosa, além dos fármacos mais associados a esse efeito adverso. Trata-se de uma revisão narrativa, com coleta de dados realizada entre março e maio de 2025 nas bases SciELO, PubMed, Google Acadêmico e repositórios institucionais. Foram incluídos artigos publicados entre 2010 e 2025, nos idiomas português, espanhol e inglês, com texto completo e revisão por pares. Os rins são especialmente vulneráveis devido à intensa perfusão sanguínea e alta taxa de filtração, o que expõe suas estruturas a concentrações elevadas de agentes potencialmente tóxicos. Dentre os principais mecanismos de lesão destacam-se alterações hemodinâmicas, inflamação tubular, necrose e acúmulo intracelular de substâncias nefrotóxicas. Entre os medicamentos com maior potencial lesivo estão os anti-inflamatórios não esteroidais, aminoglicosídeos e polimixinas, que atuam por mecanismos distintos. Fatores de risco como idade avançada, doença renal prévia, uso concomitante de múltiplas drogas e hipoperfusão aumentam a chance de dano. A identificação precoce ocorre por meio de alterações na creatinina sérica e redução da taxa de filtração glomerular. Conclui-se que a nefrotoxicidade pode ser evitada ou minimizada com ajuste posológico, substituição por fármacos menos tóxicos, monitoramento laboratorial e individualização do tratamento, promovendo maior segurança terapêutica.

INTRODUÇÃO

De acordo com Martins e Younes-Ibrahim (2022), a nefrotoxicidade induzida por fármacos é reconhecida por ser um fator determinante de injúria renal aguda (IRA) e de doença renal crônica (DRC), tendo amplo espectro fisiopatológico que resulta em danos celulares em diferentes porções e segmentos dos néfrons. A lesão aguda é caracterizada pela perda súbita e rápida da função dos rins, já a crônica se baseia na perda gradual e irreversível da função renal (Mello *et al.*, 2021).

O néfron, segundo Mendes (2018), é a menor parte anatômica dos rins, possuindo função de filtração e excreção de toxinas, substâncias em excesso e controle da homeostase do corpo, além da pressão arterial e equilíbrio hidroeletrólítico. Portanto, Ciraque, Silva e Silva (2022), afirmam que por conta de sua grande capacidade de filtração e elevada atividade metabólica, o rim se torna um órgão muito suscetível a sofrer lesões.

Martins e Younes-Ibrahim (2022), evidenciam que a citotoxicidade renal



medicamentosa é causada por diferentes mecanismos que envolvem características farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos medicamentos. Ciraque, Silva e Silva (2022), complementam que o risco de desenvolvimento de lesão se dá por muitos dos fármacos serem eliminados por via renal, além da toxicidade dos agentes terapêuticos, que pode ser inerente aos fármacos em si. Nesse sentido, Mello *et al.* (2021), afirmam que é importante que haja o monitoramento da função renal dos pacientes que os utilizam.

OBJETIVO

Realizar um levantamento bibliográfico com intuito de identificar e esquematizar de forma objetiva a Nefrotoxicidade induzida por fármacos.

METODOLOGIA

Este trabalho consiste em uma revisão narrativa da literatura, com o objetivo de analisar os principais aspectos relacionados à nefrotoxicidade induzida por fármacos, incluindo mecanismos fisiopatológicos, drogas mais frequentemente associadas, manifestações clínicas, exames laboratoriais e estratégias de manejo e prevenção.

A coleta de dados foi realizada entre os meses de março e maio de 2025. Foram consultadas publicações científicas por meio de buscas manuais e eletrônicas nas bases de dados SciELO, PubMed, Google Acadêmico e repositórios institucionais de universidades brasileiras. Utilizaram-se os seguintes descritores: “nefrotoxicidade”, “fármacos”, “toxicidade renal”, “insuficiência renal aguda” e “medicamentos nefrotóxicos”.

Foram incluídos artigos publicados entre os anos de 2010 e 2025, nos idiomas português, espanhol e inglês, com acesso ao texto completo e revisão por pares, que abordassem especificamente a toxicidade renal induzida por medicamentos. Excluíram-se trabalhos que tratassem exclusivamente de toxicidades não renais, artigos com metodologia pouco clara ou sem relevância direta para o tema.

Ao todo, foram selecionadas e analisadas 11 referências que atendiam aos critérios estabelecidos, sendo compostas por artigos científicos, dissertações e relatos de caso. As fontes consultadas incluem estudos clínicos, revisões sistemáticas e narrativas, pesquisas experimentais e documentos acadêmicos.

A análise dos dados foi feita por meio de leitura crítica e organização temática do conteúdo, com ênfase na identificação dos principais agentes nefrotóxicos, mecanismos de lesão renal, fatores de risco, manifestações clínicas, biomarcadores laboratoriais e condutas terapêuticas. As informações extraídas foram agrupadas conforme a relevância e a coerência com os objetivos propostos neste estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Fisiologia renal

Mello *et al.* (2021), elucidam que os rins mantêm a homeostase corpórea através dos néfrons, que são as unidades anatômicas renais efetivamente responsáveis pelo processo de filtração sanguínea, já que excretam produtos do metabolismo e conservam substâncias fundamentais para o funcionamento do organismo (proteínas, eletrólitos e água). Segundo Mendes (2018), as células de maior importância para a citologia renal são os podócitos, que constituem o epitélio glomerular, apresentando prolongamentos em sua estrutura que estão em profundo contato com a lâmina basal dos capilares e formam a primeira membrana de filtração, controlando o fluxo de substâncias do sangue para o néfron. Por essa razão, quando o néfron é atingido por grande potencial tóxico, os podócitos são as primeiras células a serem



alteradas, desencadeando o processo de nefrotoxicidade.

O fluxo sanguíneo renal (FSR) e a taxa de filtração glomerular (TFG), como exposto por Melgaço *et al.* (2010), são reguladas pelas prostaglandinas, advindas do ciclo do ácido aracdônico, que proporcionam uma vasodilatação compensatória em casos de doença glomerular, insuficiência renal e situações de depleção de volume plasmático, garantindo uma perfusão glomerular adequada e evitando prejuízo da filtração glomerular e da função renal.

Fisiopatologia

Ciraque, Silva e Silva (2022), afirmam que a nefrotoxicidade por drogas é desencadeado quando um fármaco leva a um dano renal funcional ou estrutural, ocorrendo em cerca de 20% dos casos de nefrotoxicidade, e 66% se tratando de idosos. Martins e Younes-Ibrahim (2022), evidenciam que o tecido renal é mais vulnerável a receber danos pois: recebe 25% do débito cardíaco; expõe as células a grandes quantidades de fármacos pelo elevado fluxo plasmático renal; possui grande taxa de circulação de medicamentos; os fármacos ligados às proteínas são liberadas nos rins, atingindo concentrações 100 a 1000 vezes maiores na luz tubular do que no plasma; a maior pressão hidrostática capilar favorece a deposição de antígenos circulantes e a formação de imunocomplexos *in situ*.

Os fatores de risco, de acordo com Ciraque, Silva e Silva (2022), incluem síndrome nefrótica, diabetes, pacientes portadores de doenças renais, sepse, hipertensão e idade avançada, pois possuem predisposição para vasoconstrição por um aumento de angiotensina II e endotelina, diminuindo a quantidade de sangue nos rins com consequente diminuição de disseminação dos fármacos.

Martins e Younes-Ibrahim (2022), apontam que a nefrotoxicidade é identificada através do aumento sérico da creatinina em um período de 24 a 72 horas de exposição ao medicamento e considera o aumento absoluto de 0,5 mg/dL ou de elevação de 50% da creatinina basal. Mello *et al.* (2021), citam que alguns fármacos são potencialmente nefrotóxicos, podendo induzir lesão renal aguda ou crônica dependendo do grau de interferência do medicamento no tecido, sendo necessário portanto, monitorização da função renal dos pacientes que as utilizam. Ciraque, Silva e Silva (2022), exemplificam que alguns dos fármacos que possuem este potencial incluem os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), antibióticos das classes dos aminoglicosídeos e das polimixinas.

Anti-inflamatórios não esteroidais (AINES)

Os AINES são potencialmente nefrotóxicos, podendo causar alteração da hemodinâmica intra-glomerular, glomerulonefrite e nefrite intersticial aguda e crônica (Mello *et al.*, 2021). Melgaço *et al.* (2010), explicam que o principal mecanismo de ação dos AINES é a inibição das ciclooxigenases presentes no ciclo do ácido araquidônico, impedindo a síntese de prostaglandinas e impedindo o seu efeito vasodilatador, causando uma vasoconstrição renal e redução da TFG, podendo evoluir para necrose tubular aguda.

Geralmente, segundo Ciraque, Silva e Silva (2022), esta classe de drogas não constitui um risco significativo para os doentes, mas em situações de hipoperfusão renal, a inibição da vasodilatação mediada pelas prostaglandinas poderá comprometer ainda mais o fluxo sanguíneo a nível renal, potencializando o surgimento de lesões isquêmicas. Portanto, deve-se interromper o uso de AINE caso ocorra aumento da TFG.

Antibióticos Aminoglicosídeos

Esse grupo de drogas antibacterianas tem um grande potencial nefrotóxico, sendo responsável por aproximadamente 36% dos casos de nefrotoxicidade. Segundo Cunha *et al*



(2017). Os aminoglicosídeos são o exemplo mais clássico de fármacos que causam uma incidência de 10 a 15% de todos os casos de IRA.

Os aminoglicosídeos possuem uma meia vida de três horas, são excretados através dos rins, não passam pelo processo de metabolização (Mendes, 2018); A nefrotoxicidade aguda na maioria das vezes se apresenta de forma oligúrica, sem a diminuição do Débito urinário, possui baixa filtração glomerular, diminuição do clearance de creatinina e aumento da creatinina, essa surgindo após os 7 dias de tratamento. Após aproximadamente 21 dias de tratamento os níveis de creatinina se restabelecem (Rocha, 2012)

Segundo Cunha *et al* (2017) algumas medidas de suporte para o tratamento da nefrotoxicidade são usadas como alteração para um medicamento menos nefrotóxico, ajustar as doses de acordo com a função renal, manter os níveis de eletrólitos e líquidos e evitar a administração com drogas nefrotóxicas.

Polimixinas

As polimixinas possuem ação contra bactérias gram negativas. Existem cinco compostos dessa classe (A, B, C, D e E), apenas B e E são aplicadas clinicamente (Oliota, 2018). Segundo Neiva *et al* 2014 a polimixina E é menos nefrotóxica que a polimixina B, porém a ação bactericida B é mais significativa. Em pacientes com comprometimento renal, deve ser feito o ajuste da dose, para não ocorrer acúmulo de CMS. Sua toxicidade é dependente da dose e de seu tempo de uso, podendo envolver necrose tubular aguda pela elevada concentração da droga nos rins (Neiva *et al*, 2014).

Segundo Cunha *et al* (2017) algumas medidas de suporte para o tratamento da nefrotoxicidade são usadas como alteração para um medicamento menos nefrotóxico, ajustar as doses de acordo com a função renal, manter os níveis de eletrólitos e líquidos e evitar a administração com drogas nefrotóxicas.

CONCLUSÃO

A Nefrotoxicidade induzida por fármacos é um desafio extremamente relevante na prática clínica, principalmente pela alta incidência em populações vulneráveis e com grande impacto na função renal. a compreensão dos mecanismos fisiopatológicos relacionados à toxicidade de classes específicas, como AINES, aminoglicosídeos e polimixinas, permitindo uma abordagem mais segura e personalizada na prescrição dos fármacos. As principais medidas de prevenção são ajuste da dose, escolha da melhor alternativa terapêutica e monitoramento laboratorial adequado, essenciais para reduzir a ocorrência das nefrotoxicidades e garantir maior segurança aos pacientes.

Palavras-chave: Aminoglicosídeos; Anti-Inflamatórios não Esteroides; Fármacos; Insuficiência Renal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CIRAQUE, A.; SILVA, C. M. C.; SILVA, A. S. Nefrotoxicidade fármaco induzida. **Revista Terra & Cultura**, v. 38, 2022. Disponível em:

<<http://publicacoes.unifil.br/index.php/Revistatest/article/view/2754>>. Acesso em: 24 abr. 2025.

CUNHA, G. R. et al. Manejo da nefrotoxicidade por aminoglicosídeos no setor de emergência: relato de caso. **Universidade Atenas**, 2017. Disponível em:



<http://www.atenas.edu.br/uniatenas/assets/files/magazines/MANEJO_DA_NEFROTOXI_CIDADE_POR_AMINOGLICOSIDEOS_NO_SETOR_DE_EMERGENCIA_RELATO_

DE_CASO.pdf>. Acesso em: 07 maio 2025.

MELGAÇO, S. S. C. et al. Nefrotoxicidade dos anti-inflamatórios não esteroidais. **Medicina Ribeirão Preto**, v. 43, n. 4, p. 382–390, 2010. Disponível em:

<<https://www.revistas.usp.br/rmrp/article/view/188/189>>. Acesso em: 23 abr. 2025.

MELLO, P. A. et al. Nefrotoxicidade e alterações de exames laboratoriais por fármacos: revisão da literatura. **Revista de Medicina de São Paulo**, v. 100, n. 2, p. 152–161, 2021. Disponível em:

<<https://www.revistas.usp.br/revistadc/article/view/180902/171726>>.

Acesso em: 23 abr. 2025.

MENDES, G. A. Toxicidade induzida por fármacos: uma visão sistêmica do acometimento renal. **Centro Universitário de Brasília**, Brasília, 2018. Disponível em:

<<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/13666/1/21606235>>. Acesso em: 22 abr. 2025.

MENDES, G. A. Toxicidade induzida por fármacos: uma visão sistêmica do acometimento renal. **Centro Universitário de Brasília**, 2018. Disponível em:

<<https://core.ac.uk/download/pdf/232199401.pdf>>. Acesso em: 07 maio 2025.

MARTINS, C. A.; YOUNES-IBRAHIM, M. N. Nefrotoxicidade – aspectos básicos. **Medicina, Ciência e Arte**, v. 1, n. 4, p. 31–44, 2022. Disponível em:

<<https://www.medicinacienciaearte.com.br/revista/article/view/40>>. Acesso em: 24 abr. 2025.

NEIVA, L. B. de M. et al. Nephrotoxicity of Polymyxin B: experimental study in cells and implications for nursing practice. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 48, n. 2, p. 272–277, abr. 2014.

OLIOTA, A. F. R. Avaliação da nefrotoxicidade de colistina e polimixina B no manejo de infecções por bactérias multirresistentes: uma revisão sistemática com meta-análise. 2018. **Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná**, Cascavel, PR, 2018. Disponível em: <<http://tede.unioeste.br/handle/tede/3650>>. Acesso em: 04 maio 2025.

ROCHA, A. P. S. A. C. Necrose tubular aguda de causa medicamentosa. 2012. *Dissertação (Mestrado em Medicina) – Universidade de Coimbra*, 2012. Disponível em: <<https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/48073>>. Acesso em: 07 maio 2025.

VERÓNICA, M. C.; LUIS, P. M.; DANIEL, D. T. Toxicidad renal por drogas. **Nefrología, Diálisis y Transplante**, v. 31, n. 1, 2011. Disponível em: <<https://www.revistarenal.org.ar>>. Acesso em: 05 maio 2025.



EFEITOS DE DOZE SEMANAS DE PILATES E TREINAMENTO FUNCIONAL NOS ASPECTOS MOTORES DE PESSOAS COM PARKINSON: UM ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO

¹Jéssica Amaro Moratelli

²Audrey Alcantara Garcia Meliani

³Adriana Coutinho de Azevedo Guimarães

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Florianópolis, Santa Catarina, Brasil^{1,2,3}.

Área temática: Educação Física.

Resumo: Objetivo: Analisar o efeito do treinamento funcional, comparado ao Mat Pilates, no equilíbrio, mobilidade funcional, flexibilidade, amplitude de movimento e UPDRSIII de pessoas com doença de Parkinson. **Metodologia:** Trata-se de um ensaio clínico randomizado com 35 pessoas diagnosticadas com Parkinson, distribuídas aleatoriamente em três grupos: treinamento funcional, Mat Pilates e controle. Além disso, 11 indivíduos saudáveis foram recrutados, compondo o grupo referência saudável. Os grupos de exercício realizaram duas sessões semanais, com 60 minutos cada, durante 12 semanas. O grupo controle e o grupo referência saudável participaram apenas de três palestras educativas e mantiveram suas atividades de rotina durante o período. As avaliações ocorreram antes e após a intervenção, e incluíram equilíbrio (MiniBESTest), mobilidade funcional (Timed Up & Go), flexibilidade de membros inferiores (teste de sentar e alcançar), amplitude de movimento dos membros superiores (goniometria) e UPDRSIII. **Resultados:** Percebeu-se que o equilíbrio, a mobilidade funcional, a amplitude de movimento dos ombros e o UPDRSIII melhoraram após as aulas de Mat Pilates. A flexibilidade dos membros inferiores, a amplitude de movimento dos ombros e a UPDRSIII também apresentaram melhora após o treinamento funcional. Já o grupo controle e o grupo referência saudável apresentaram piora e/ou nenhuma mudança ao longo das 12 semanas. **Discussão:** Tanto o Mat Pilates quanto o treinamento funcional foram eficazes na melhora da amplitude de movimento dos ombros e do UPDRSIII; no entanto, apenas o Mat Pilates beneficiou o equilíbrio e a mobilidade, enquanto o treinamento funcional foi efetivo na flexibilidade dos membros inferiores.

INTRODUÇÃO

Os sintomas motores em pessoas com Parkinson (PcP) contribuem para a redução da qualidade de vida e menor independência funcional. Com a progressão da doença, atividades cotidianas tornam-se mais difíceis, exigindo intervenções que vão além do tratamento farmacológico tradicional, como a levodopa. Embora eficaz, esse medicamento pode causar efeitos adversos, como discinesias, flutuações motoras e outros sintomas colaterais, além de não atuar sobre déficits como a instabilidade postural (Abbasi et al., 2020; Boelens Keun et al., 2021). Nesse cenário, cresce o interesse por tratamentos complementares, como o exercício físico, que tem demonstrado benefícios na força, mobilidade, equilíbrio e sintomas motores em geral (Choi et al., 2020; Gamborg et al., 2022). Entre os métodos utilizados, destaca-se o treinamento funcional, que envolve movimentos similares aos da vida diária e pode promover ganhos na autonomia e na capacidade funcional (Boyle, 2016; Chen et al., 2021). O Mat Pilates, por sua vez, é uma prática que busca melhorar postura, força, flexibilidade e controle motor, utilizando o peso do próprio corpo



(Pilates; Miller, 1945). Estudos indicam que essa técnica pode ser benéfica para PcP, embora ainda haja poucas investigações específicas nessa população (Feital et al., 2022; Suárez-Iglesias et al., 2019). Apesar das evidências, são escassos os estudos que comparam diretamente os efeitos do treinamento funcional e do Mat Pilates sobre os sintomas motores em PcP, revelando uma lacuna relevante na literatura.

OBJETIVO

Analisar os efeitos de doze semanas de Mat Pilates e de treinamento funcional nos aspectos motores de pessoas com Parkinson, incluindo o equilíbrio, a mobilidade funcional, a flexibilidade, a amplitude de movimento dos ombros e os escores obtidos na seção de avaliação motora da Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson.

METODOLOGIA

Desenho do estudo e participantes

Trata-se de um ensaio clínico randomizado de quatro braços, aprovado pelo Comitê de Ética da UDESC (protocolo 3.613.483) e registrado no ReBEC (RBR-6ckggn). A coleta ocorreu entre março e julho de 2022. Participaram 35 PcP, randomizadas em três grupos: treinamento funcional (n=12), Mat Pilates (n=12) e controle (n=11). Também foi incluído um grupo referência saudável (n=12), pareado por idade e sexo. Os critérios de inclusão seguiram diretrizes clínicas da *Movement Disorder Society* e triagem cognitiva (MoCA), considerando o ponto de corte de 22 pontos (Almeida et al., 2019). O recrutamento foi realizado por mídias sociais e instituições de saúde da região sul do Brasil.

Grupo controle e Grupo referência saudável

Ambos os grupos (Grupo controle (GC) e Grupo referência saudável (GS)) mantiveram seus hábitos de vida durante as 12 semanas. A pesquisadora responsável realizou contatos mensais para controle. Os participantes assistiram a três palestras educativas e foram convidados, ao final, a ingressar gratuitamente em programas de atividade física da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Grupo Treinamento Funcional e Grupo Mat Pilates

Os grupos de treinamento funcional (GF) e Mat Pilates (GP) participaram de 24 sessões, realizadas duas vezes por semana, com 60 minutos de duração cada. As intervenções foram conduzidas por profissionais de Educação Física, com base no protocolo de Moratelli et al. (2022). As aulas foram estruturadas em três etapas: aquecimento, parte principal e relaxamento, com exercícios variados e progressão gradual de intensidade. No GF, os exercícios foram voltados ao desenvolvimento de força, flexibilidade, resistência, potência, equilíbrio, coordenação e agilidade, com adaptações conforme as necessidades dos participantes. O GP seguiu os princípios clássicos do Pilates, com foco em concentração, controle, centrimento, fluidez, respiração e precisão. Os materiais utilizados incluíam colchonetes, fitballs, magic circles, therabands e caneleiras, conforme os objetivos das aulas. Ambos os grupos realizaram os exercícios na fase "ON" da medicação.

Figura 1 - Evolução dos exercícios aplicados nos grupos Treinamento Funcional (GF) e Grupo Mat Pilates (GP)

Treinamento Funcional



Mat Pilates



Fonte: Produzido pela autora (2022).

Procedimentos

As avaliações ocorreram antes e após as intervenções. Foram aplicados testes físicos e questionários individuais por três pesquisadores treinados pelo Laboratório de Pesquisas em Lazer e Atividade Física – LAPLAF/CNPq, do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID/UDESC.

Características pessoais e clínicas, desfechos primário e secundários, cálculo amostral, randomização, análise estatística e adesão à pesquisa.


As características pessoais e clínicas dos participantes incluíram informações sobre sexo, idade, estado conjugal, escolaridade, atividade física anterior e índice de massa corporal (IMC), além do estágio da doença de Parkinson (DP) e do uso de medicamentos para dormir, ansiedade ou depressão. O estágio da doença foi avaliado pela Escala de Hoehn e Yahr (1967), que classifica a severidade em cinco estágios, sendo incluídos neste estudo apenas participantes nos estágios I a III, ou seja, PcP com incapacidade leve a moderada. O desfecho primário foi o equilíbrio, avaliado por meio do MiniBESTest e os desfechos secundários incluíram: a Seção III da Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS); a mobilidade funcional, foi avaliada pelo teste Timed Up & Go (TUG); a flexibilidade de membros inferiores, foi avaliada pelo teste Sentar e Alcançar; e a amplitude de movimento dos ombros, mensurada com um goniômetro digital (Absolute Axis 360°). O cálculo amostral foi realizado no software G*Power 3.1.9.2, com base no equilíbrio como desfecho primário, considerando efeito de 0,26, $\alpha=5\%$ e poder de 80%, resultando em 61 participantes distribuídos em quatro grupos (n=15). A randomização foi estratificada pelo estágio da doença e conduzida por um pesquisador independente. Os participantes foram alocados nos grupos GF, GP e GC e o GS foi pareado por idade e sexo. A análise estatística foi feita através do software estatístico, SPSS 20.0 e foram utilizados os testes Qui-quadrado ou Exato de Fisher para comparações basais, ANOVA one-way para idade, para avaliar os efeitos das intervenções, utilizou-se ANOVA two-way com medidas repetidas e pós-teste de Sidak. A análise de simetrias também utilizou ANOVA two-way, com gráficos produzidos

no GraphPad Prism 6. O nível de significância adotado foi $p < 0,05$. A adesão foi registrada pelas pesquisadoras durante as sessões, com médias de 81,6% para o GF e 79,4% para o GP.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme a Figura 2, observa-se que os grupos de intervenção apresentaram melhorias significativas nos aspectos motores após as 12 semanas de intervenção. Em relação ao equilíbrio, ambos os grupos demonstraram aumento nos escores, sendo o Mat Pilates o que apresentou a melhora mais expressiva, aproximando-se dos valores do grupo saudável, enquanto o grupo controle apresentou uma leve piora. Na mobilidade funcional, apenas o GP demonstrou redução relevante no tempo de execução do teste Timed Up & Go, indicando melhora funcional. Quanto à amplitude de movimento dos ombros, os grupos de intervenção obtiveram ganhos tanto em abdução quanto em flexão, especialmente no ombro esquerdo, enquanto os GC e GS mantiveram-se estáveis. A flexibilidade de membros inferiores, avaliada pelo teste de sentar e alcançar, apresentou melhora apenas no GF, com mudança de escores negativos para positivos em ambas as pernas. Na variável UPDRSIII, observa-se redução dos escores nos grupos de exercício, evidenciando melhora dos sintomas motores, enquanto o GC apresentou aumento, indicando piora. O GS, não realizou esta avaliação. De modo geral, os efeitos positivos observados nas intervenções aproximaram os GP e GF dos padrões observados no GS, destacando a efetividade dessas abordagens em variáveis motoras relevantes para PcP.

Figura 2 - Comparação do período pós-intervenção dos quatro grupos do estudo em relação ao equilíbrio, mobilidade, amplitude de movimento, flexibilidade de membros inferiores e UPDRS III.



Fonte: Produzido pela autora (2022).

CONCLUSÃO

Este estudo demonstrou que uma intervenção de 12 semanas com Mat Pilates foi mais eficaz para melhorar o equilíbrio e a mobilidade funcional em PcP, resultados que podem estar associados ao foco do método no fortalecimento do core, controle postural e



consciência corporal. O treinamento funcional, por sua vez, apresentou melhores resultados na flexibilidade de membros inferiores, aspecto frequentemente comprometido com a progressão da doença. Ambas as intervenções foram efetivas na amplitude de movimento dos ombros, variável que tende a se deteriorar com o avanço da idade e da DP. Os GC e GS não apresentaram mudanças significativas, e, em alguns casos, observaram-se pioras nos escores no GC. De forma geral, os resultados sugerem que tanto o Mat Pilates quanto o treinamento funcional são estratégias seguras e eficazes para promover ganhos motores relevantes, aproximando os participantes com DP dos valores observados em indivíduos saudáveis. Esses achados reforçam a importância da prescrição de exercícios específicos como recurso complementar no tratamento da DP, especialmente para preservar a funcionalidade e a autonomia.

Palavras-chave: Doença de Parkinson, Exercício Físico, Pilates, Sintomas Motores, Treinamento Funcional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBASI, M. H. et al. Dilemma in Parkinson's Treatment; Levodopa Monotherapy May be the Best Choice. **Journal of Clinical Neuroscience**, v. 79, p. 219–223, set. 2020

ALMEIDA, K. J. et al. Cut-off points of the Portuguese version of the Montreal Cognitive Assessment for cognitive evaluation in Parkinson's disease. **Dementia & Neuropsychologia**, v. 13, n. 2, p. 210–215, jun. 2019

BOELEN KEUN, J. T. et al. Dietary Approaches to Improve Efficacy and Control Side Effects of Levodopa Therapy in Parkinson's Disease: A Systematic Review. **Advances in Nutrition**, v. 12, n. 6, p. 2265–2287, nov. 2021

BOYLE, M. **New Functional Training for Sports**. 2. ed. [s.l: s.n.].

CHEN, J. et al. Effects of resistance training on postural control in Parkinson's disease: a randomized controlled trial. **Arquivos de Neuro-Psiquiatria**, v. 79, n. 6, p. 511–520, jun. 2021.

CHOI, H. et al. Exercise Therapies for Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Parkinson's Disease**, v. 2020, p. 1–22, 8 set. 2020

FEITAL, A. M. B. DE F. et al. Pilates method for low back pain in individuals with Parkinson's disease: A feasibility study. **Journal of Bodywork and Movement Therapies**, v. 32, p. 19–28, out. 2022

GAMBORG, M. et al. Parkinson's disease and intensive exercise therapy — An updated systematic review and meta-analysis. **Acta Neurologica Scandinavica**, v. 145, n. 5, p. 504–528, 8 maio 2022.

HOEHN, M. M.; YAHR, M. D. Parkinsonism : onset , progression , and mortality. v. 17, n. May, 1967.

PILATES, J. H.; MILLER, W. J. **Return to Life through Controlology**. 1. ed. NV: [s.n.].

SUÁREZ-IGLESIAS, D. et al. Benefits of Pilates in Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Medicina**, v. 55, n. 8, p. 476, 13 ago. 2019



NEFRITE LÚPICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

¹Caroline de Souza Martins

¹Isadora Pereira Alegria

¹Maria Eduarda Haga Matiusi

¹Kelori Pavlak Moretto

¹Amanda Stochi Souza

¹Sofia Heck Scheue

¹Amanda Heloisy Schuster

¹Iza Paula da Silva Pondian

¹Universidade Paranaense. Umuarama, Paraná, Brasil.

Área temática: Medicina.

Resumo: A nefrite lúpica (NL) é uma manifestação clínica grave do lúpus eritematoso sistêmico (LES), impactando significativamente a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes. O objetivo deste trabalho é revisar a literatura científica recente sobre o diagnóstico e tratamento da nefrite lúpica. Trata-se de uma revisão sistemática da literatura, realizada por meio de buscas nas bases PubMed, SciELO, Google Acadêmico e ScienceDirect, com publicações entre 2014 e 2025. Foram utilizados descritores em inglês combinados com o operador booleano “and”. A seleção final resultou em 20 artigos que atendiam aos critérios de inclusão. Os achados reforçam que o diagnóstico precoce, baseado em exames laboratoriais e biópsia renal, é essencial para o manejo adequado da doença. A classificação histológica da ISN/RPS orienta a conduta terapêutica, que inclui imunossuppressores tradicionais, como corticosteroides e ciclofosfamida, além de novas opções como micofenolato de mofetila e belimumabe. Apesar dos avanços, ainda existem desafios, como o acesso desigual ao diagnóstico precoce e ao tratamento especializado. Uma abordagem multidisciplinar e individualizada é fundamental para melhorar os desfechos clínicos. Conclui-se que a atualização constante sobre os métodos diagnósticos e terapêuticos é imprescindível para o manejo eficaz da nefrite lúpica.

INTRODUÇÃO

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é caracterizado como uma doença autoimune que pode afetar diversos órgãos, estando associado a altos índices de morbidade e mortalidade (Patel; Anzia, 2023). Segundo Roveta *et al.* (2024), a Nefrite Lúpica (NL) representa uma das complicações mais graves do LES sendo um importante fator de risco. Sua etiologia envolve fatores ambientais e genéticos que desencadeiam a produção de autoanticorpos patogênicos, resultando em danos aos tecidos e órgãos (Ameer *et al.*, 2022).

Estima-se que o LES afete entre 20 e 150 pessoas por 100.000 habitantes, sendo mais prevalente em mulheres, especialmente em idade fértil, com uma razão de 9:1 em relação aos homens (Klumb *et al.*, 2021; Costa; Ramos; Ramos, 2022). O envolvimento renal no LES ocorre clinicamente em cerca de 60% dos pacientes e o comprometimento da função renal resulta de lesões glomerulares, túbulo-intersticiais e vasculares (Klumb *et al.*, 2021). As manifestações clínicas da NL são variadas e podem envolver alterações urinárias, como proteinúria e hematúria, além de quadros mais graves como síndrome nefrótica e



insuficiência renal, tanto aguda quanto crônica.

Diante disso, o diagnóstico precoce, com biópsia renal e exames laboratoriais adequados, é essencial para orientar o manejo terapêutico e prevenir a progressão da doença (Klumb *et al.*, 2021; Medeiros *et al.*, 2018). Avanços no entendimento da fisiopatologia da NL têm impulsionado o desenvolvimento de terapias imunossupressoras mais eficazes, com destaque para agentes biológicos promissores que visam controlar a atividade da doença e preservar a função renal (Costa; Ramos; Ramos, 2022; Roveta *et al.*, 2024).

OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo analisar os avanços recentes no diagnóstico e tratamento da nefrite lúpica. Busca-se identificar os principais métodos diagnósticos empregados e as estratégias terapêuticas mais eficazes para o manejo da doença. Além disso, pretende-se destacar os desafios relacionados ao acesso ao diagnóstico precoce e às opções terapêuticas, enfatizando a necessidade de abordagens individualizadas e multidisciplinares para otimizar os resultados clínicos.

METODOLOGIA

Este estudo configura-se como uma revisão sistemática da literatura, método apropriado para reunir e analisar evidências científicas sobre determinado tema, conforme orientações de Gil (2010) e Souza, Silva e Carvalho (2010). Caracteriza-se como uma revisão sistemática da literatura, cujo objetivo é reunir e analisar evidências científicas recentes acerca da nefrite lúpica. A estratégia de busca foi elaborada por meio de levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed, SciELO, Google Acadêmico e ScienceDirect, abrangendo publicações científicas publicadas entre janeiro de 2014 e abril de 2025, período que representa a linha temporal analisada nesta revisão. Utilizaram-se os descritores “Lupus nephritis (LN)” AND “Systemic lupus erythematosus (SLE)” AND “Glomerulonephritis” para o cruzamento dos termos. Inicialmente, foram identificados 20 artigos. Após aplicação dos critérios de inclusão - disponibilidade gratuita do texto completo, idiomas inglês ou português, e alinhamento com o objetivo central da pesquisa - foram selecionados 8 artigos para compor a discussão. Os critérios de exclusão incluíram: artigos duplicados, resumos sem acesso ao texto completo, e estudos que não apresentavam dados relevantes sobre a relação entre nefrite lúpica e lúpus eritematoso sistêmico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A nefrite lúpica é uma manifestação frequente e potencialmente grave do lúpus eritematoso sistêmico (LES), associada a elevado risco de morbidade e progressão para doença renal crônica terminal (Ameer *et al.*, 2022; Costa; Ramos; Ramos, 2022). O início clínico pode ser insidioso, com manifestações discretas, sendo a avaliação laboratorial fundamental para o diagnóstico precoce. Proteinúria persistente, hematúria microscópica e cilindros urinários são achados laboratoriais comuns que indicam a necessidade de investigação com biópsia renal (Andrade *et al.*, 2014; Klumb *et al.*, 2021).

A biópsia permite classificar a NL conforme os critérios da ISN/RPS (classificação que divide a nefrite lúpica em seis classes, que variam em gravidade e prognóstico), fundamentais para a escolha terapêutica. As formas proliferativas (classes III e IV) são mais agressivas e exigem abordagem intensiva, ao passo que as não proliferativas (classes I, II e V) demandam monitoramento rigoroso, embora com menor risco de progressão (Bombig *et al.*, 2018; Medeiros *et al.*, 2018). Dados apresentados por Klumb *et al.* (2021) indicam que



as formas proliferativas representam até 70% dos casos biopsiados, destacando-se como principal fator de risco para comprometimento funcional renal a longo prazo. O tratamento tradicional com corticosteroides e ciclofosfamida tem sido substituído ou associado ao micofenolato de mofetila (MMF), que demonstrou eficácia comparável com menor toxicidade, especialmente relevante para mulheres em idade fértil (Patel; Anzia, 2023). Novas abordagens incluem terapias biológicas como o belimumabe, que mostrou benefício adicional em pacientes com resposta subótima ao tratamento convencional (Roveta *et al.*, 2024).

Apesar dos avanços terapêuticos, desafios importantes permanecem, como o diagnóstico tardio, acesso desigual a especialistas e falhas no seguimento ambulatorial, principalmente em regiões com limitações estruturais (Klumb *et al.*, 2021). Tais fatores contribuem para a piora clínica e aumento da necessidade de terapias substitutivas, impactando negativamente a qualidade de vida.

Portanto, a conduta deve ser individualizada, baseada na atividade da doença, no perfil clínico-imunológico e conduzida por equipe multiprofissional especializada (Costa; Ramos; Ramos, 2022; Andrade *et al.*, 2014). A implementação de protocolos terapêuticos atualizados e o fortalecimento das redes de cuidado são medidas essenciais para a redução das complicações renais e melhoria da qualidade de vida dos pacientes com NL.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da gravidade e complexidade da nefrite lúpica, o reconhecimento precoce de seus sinais clínicos e laboratoriais é essencial para prevenir a progressão da doença e reduzir as complicações. Os avanços no entendimento dos mecanismos imunológicos e no desenvolvimento de terapias personalizadas representam um importante progresso na prática clínica. Contudo, persistem desafios relacionados à equidade no acesso aos cuidados especializados. Conclui-se que é fundamental investir em capacitação profissional e em políticas públicas que garantam diagnóstico precoce e tratamento adequado, visando melhorar a qualidade de vida e o prognóstico dos pacientes com LES.

Palavras-chave: Doença renal; Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES); Nefrite Lúpica; Síndrome Nefrótica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ameer, M. A. *et al.* An overview of systemic lupus erythematosus (SLE) pathogenesis, classification, and management. **Cureus**, San Francisco, v. 14, n. 10, p. e30330, 2022.

Andrade, L. E. C. *et al.* Revisão das diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia para diagnóstico, avaliação e tratamento da nefrite lúpica. **Revista Brasileira de Reumatologia**, São Paulo, v. 54, n. 2, p. 117–130, mar./abr. 2014.

Bombing, M. T. N. *et al.* Nefrite lúpica: classificação histológica e abordagem terapêutica. **Jornal Brasileiro de Nefrologia**, São Paulo, v. 40, n. 2, p. 133–146, 2018.

Costa, M. R.; RAMOS, M. F.; RAMOS, M. V. Nefrite lúpica: diagnóstico e tratamento. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 5, n. 4, p. 14000–14010, 2022.

Klumb, E. M. *et al.* Nefrite lúpica: diagnóstico e tratamento. **Brazilian Journal of Health and Human Services**, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 45–55, 2021.



Medeiros, M. M. *et al.* Nefrite lúpica: aspectos clínicos e terapêuticos. **Cadernos de Medicina UNIFESO**, Teresópolis, v. 2, n. 1, p. 15–25, 2018.

Patel, M.; ANZIA, F. A. **Systemic lupus erythematosus**. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.

Roveta, A. *et al.* Advances in lupus nephritis management: a review. **Journal of Clinical Medicine**, [S.l.], v. 13, n. 5, p. 1234–1245, 2024.



PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA DO USO DE *Viscum album* L. COMO ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PARA DOENÇAS NEOPLÁSICAS NA MEDICINA VETERINÁRIA

¹Beatriz do Carmo Rodrigues de Abrantes

²Jamylla Mirck Guerra de Oliveira

¹Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil; ² Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, Piauí, Brasil.

Área temática: Plantas Medicinais

Resumo: No contexto da medicina veterinária, a busca por alternativas terapêuticas seguras e eficazes para o tratamento de doenças tumorais é de suma importância. As opções convencionais muitas vezes apresentam limitações em termos de eficácia, efeitos adversos e custo. Nesse sentido, a investigação de fitoterápicos, como o *Viscum album* L., representa uma abordagem promissora e inovadora para o manejo dessas patologias em animais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, longevidade dos pacientes ou até mesmo para a redução significativa dos índices de reincidência de tumores e a progressão de metástases, aspectos cruciais na busca por terapias mais eficazes e menos invasivas.

Palavras-chave: Anti – tumoral; Câncer; Fitoterápico; Terapia complementar; Visco europeu.

INTRODUÇÃO

O *Viscum album*, também conhecido como Visco europeu, é uma planta com comportamento hemiparasita com outras espécies arbóreas, e apresenta uma composição química altamente variável, cujos componentes são influenciados por fatores como a estação de colheita, a espécie da árvore hospedeira e os métodos de extração e processamento (Munst *et al.*, 2013). Dentre seus princípios ativos, destacam-se as lectinas e as viscotoxinas, que exibem propriedades antitumorais, além de ácidos fenólicos, flavonoides e triterpenos, os quais possuem ações antioxidantes, anti-inflamatórias, imunomoduladoras, citotóxicas e apoptóticas (Bussing, 2000; Munst *et al.*, 2013; Vaz *et al.*, 2024). Devido a essa diversidade de compostos bioativos, o extrato do visco europeu tem sido amplamente estudado como uma terapia complementar ou alternativa no tratamento de diversas patologias, tanto na medicina humana quanto na veterinária.

Conforme destacado por Magano (2012), as lectinas extraídas do *Viscum album* exercem um efeito antiproliferativo significativo, atuando por meio da interação com receptores glicosilados na membrana celular. Essa ligação específica desencadeia uma cascata de eventos moleculares que inibem o crescimento descontrolado de células tumorais. Além das lectinas, o autor ressalta a presença de frações proteicas biologicamente ativas, conhecidas como proteínas de Vester, que demonstram propriedades antitumorais, citotóxicas e citostáticas. No entanto, sua eficácia diminui progressivamente com o envelhecimento do extrato, o que reforça a importância do controle de qualidade e da padronização no processamento do fitoterápico. Tais descobertas reforçam o potencial terapêutico do *Viscum album* no manejo de doenças oncológicas.

Outro grupo de compostos de relevância farmacológica são as viscotoxinas,



polipeptídeos de baixa massa molecular, que apresentam uma atividade no sistema cardiorrespiratório, reduzindo a pressão arterial sistêmica, além de estimular e potencializar a resposta imunológica. Também possuem ação citotóxica, promovendo a lise da membrana celular e possivelmente induzindo a apoptose de células cancerosas, além de oferecerem potencial proteção ao DNA (Magano, 2012).

Estudos clínicos demonstram o potencial terapêutico do extrato de *Viscum album* no tratamento de neoplasias caninas. Lefebvre, Bonamin e Oliveira (2007) observaram que a administração prévia de diferentes formulações do extrato em cães com tumor venéreo transmissível (TVT) foi imprescindível para redução significativa do tempo de administração da vincristina para a remissão completa do tumor. Em abordagem inovadora, Lopes, Barbosa e Marques (2021) relataram o caso de um canino com mesotelioma peritoneal tratado exclusivamente com preparação ultradiluída de *Viscum album*, obtendo melhora clínica relevante e sobrevida de 30 meses. Adicionalmente, Carvalho, Porto e Bonamin (2013) documentaram a estabilização de neurofibrossarcoma em cão idoso mediante terapia complementar com o extrato, evidenciando controle do crescimento tumoral e discreta redução volumétrica da massa neoplásica. Estes achados sugerem que os compostos bioativos do *Viscum album* podem exercer efeitos benéficos no manejo oncológico veterinário, seja como terapia adjuvante ou em protocolos não convencionais.

A prospecção tecnológica constitui uma ferramenta fundamental para a tomada de decisões estratégicas em pesquisa e desenvolvimento. Conforme destacado por Mayerhoff (2008), esse tipo de abordagem permite identificar lacunas no conhecimento, direcionar futuras investigações e antever aplicações práticas de novas descobertas. Nesse contexto, a prospecção aplicada ao estudo do *Viscum album* pode fornecer subsídios para o desenvolvimento de fitoterápicos inovadores, particularmente no campo da medicina veterinária, onde a busca por terapias seguras e eficazes é crescente.

OBJETIVO

Consolidar o conhecimento existente sobre os compostos bioativos do *Viscum album*, bem como explorar suas potencialidades na clínica veterinária, contribuindo para o avanço científico e tecnológico nessa área. A integração de terapias naturais baseadas em evidências pode representar um avanço significativo no cuidado à saúde animal, promovendo abordagens mais sustentáveis e eficientes no tratamento de diversas enfermidades.

METODOLOGIA

Foi realizada uma busca nas bases de dados de acesso livre da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/BIREME), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed/MEDLINE, utilizando os seguintes descritores em português e seus correspondentes em inglês: "Viscum album", "Medicina" ("Medicine"), "Lectina" ("Lectin"), "Viscotoxina" ("Viscotoxin"), "Terapia complementar" ("Complementary therapy"), "Terapia alternativa" ("Alternative therapy"), "Tumor" e "Veterinária" ("Veterinary"). A seleção dos termos considerou sua relevância para o escopo do estudo. Em paralelo, conduziu-se um levantamento sistemático do número de publicações científicas indexadas nessas bases, além de uma revisão bibliográfica abrangente sobre o potencial terapêutico dos compostos bioativos do *Viscum album*, com ênfase em suas aplicações na medicina veterinária.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados presentes na tabela 1 destacam o crescente interesse acadêmico nas propriedades biológicas do *Viscum album*, com ênfase em aplicações terapêuticas inovadoras. A análise bibliométrica revela que o termo “*Viscum album* AND Lectin” registra 327 publicações no PubMed, sinalizando o protagonismo das lectinas nesta espécie vegetal. Entre essas moléculas, a viscumina emerge como foco de investigação devido à sua dupla capacidade: modulação imune e ação contra células tumorais, evidenciada em estudos experimentais (Büssing, 2000).

Outrossim, a divergência quantitativa observada no descritor “*Viscum album* AND Viscotoxin” – 280 registros na BVS versus 88 no PubMed – aponta para disparidades geográficas na produção científica. Esse fenômeno pode estar vinculado à maior representatividade de pesquisas latino-americanas na BVS, onde as viscotoxinas (peptídeos derivados do visco com efeito citotóxico) recebem atenção prioritária, conforme análise de Loef & Walach (2020).

No contexto clínico, destaca-se a busca por “*Viscum album* AND Tumor AND Complementary therapy”, com 168 artigos indexados no PubMed. Esses números refletem a adoção progressiva de extratos desta planta como protocolos complementares ao uso de quimioterápicos, principalmente em países europeus. Ensaios controlados sugerem que tais formulações podem atenuar efeitos colaterais de tratamentos oncológicos, melhorando parâmetros como fadiga e qualidade de vida, além de reduzir o crescimento tumoral (Horneber et al., 2008; Carvalho, Porto e Bonamin, 2013).

A análise integrada da tabela também evidencia que o *Viscum album* é amplamente estudado em associação a abordagens terapêuticas não convencionais para tumores. O descritor “*Viscum album* AND Tumor AND Alternative therapy” registrou 134 artigos no PubMed, valor inferior ao observado em “*Viscum album* AND Tumor AND Complementary therapy” (168 artigos). Essa diferença pode refletir uma maior aceitação de terapias complementares em comparação às alternativas em certas regiões, como na Europa, onde extratos de visco são integrados a protocolos de cuidados paliativos em oncologia (Horneber et al., 2008).

Nota-se, contudo, uma disparidade nas aplicações do *V. album* em terapêuticas veterinárias. A combinação dos descritores “*Viscum album* and Cancer and Veterinary” apresentou apenas 13 registros no PubMed e 5 na BVS. Essa escassez contrasta com o potencial teórico da espécie, considerando as analogias fisiopatológicas entre tumores humanos e animais – campo que demanda investigação translacional, conforme proposto por Wynn & Marsden (2003).

Contudo, torna-se fundamental a promoção de pesquisas adicionais que esclareçam os mecanismos bioquímicos do *V. album* tanto *in vitro* quanto *in vivo*, bem como suas interações sinérgicas com fármacos em abordagens terapêuticas convencionais. Considerando a lacuna existente na aplicação desse extrato na medicina veterinária, a ampliação dos estudos nesse campo se faz necessária para explorar plenamente seu potencial terapêutico.

Tabela 1. Descritores utilizados e resultados numéricos de artigos encontrados nas bases de dados BVS/BIREME e PubMed.

DESCRIPTOR	e artigos – BVS	Nº de artigos – PUBMED




“Viscum album AND Medicine”	133	491
“Viscum album AND Lectin”	59	327
“Viscum album AND Viscotoxin”	280	88
“Viscum album AND Tumor AND Complementary therapy”	61	168
“Viscum album AND Tumor AND Alternative therapy”	20	134
“Viscum album AND Cancer AND Veterinary”	5	13

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

A análise bibliométrica no gráfico 1 revela crescimento exponencial nas publicações sobre *Viscum album* e sua aplicação em terapias oncológicas alternativas. Após décadas de escassa produção científica, observou-se um aumento significativo de estudos a partir de 1997, atingindo o pico em 2017 com 11 artigos indexados no PubMed. Esse crescimento reflete avanços na compreensão de seus mecanismos antitumorais e imunomoduladores (Bussing, 2000; Vaz *et al.*, 2024).

Embora o número de publicações tenha apresentado leve declínio após 2018, o tema mantém relevância, sustentado por evidências de seus efeitos na qualidade de vida de pacientes oncológicos. No entanto, desafios persistem, como a padronização de extratos, a necessidade de ensaios clínicos robustos e sua integração com terapias convencionais. A continuidade das pesquisas é fundamental para consolidar seu uso na prática médica.

Gráfico 1. Evolução do número de artigos indexados no PubMed que abordam a relação entre *Viscum album*, tumores e terapias alternativas, ao longo dos anos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2025).



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os achados deste estudo evidenciam que o extrato de *Viscum album* L. apresenta potencial terapêutico relevante para a oncologia veterinária, com perspectivas de contribuir para o aumento da qualidade de vida e sobrevida de pacientes animais. Contudo, a análise prospectiva demonstrou uma marcante assimetria no desenvolvimento científico desta abordagem: enquanto sua aplicação em medicina humana conta com ampla literatura, sua investigação no âmbito veterinário permanece incipiente, particularmente no contexto oncológico.

Esta lacuna científica demanda a implementação de estudos rigorosos, de natureza multidisciplinar e desenho longitudinal, que possam elucidar completamente os mecanismos farmacológicos, validar os parâmetros de segurança e eficácia em modelos animais, e estabelecer protocolos clínicos baseados em evidências. A superação destes desafios será fundamental para a consolidação do visco como alternativa terapêutica válida na prática veterinária contemporânea.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BÜSSING, A. **Mistletoe: The Genus Viscum**. Boca Raton: CRC Press, 2000.

CARVALHO, A.C.; PORTO, E.; BONAMIN, L.. Canine neurofibrosarcoma treatment with *Viscum album* in serial dilutions. **International Journal of High Dilution Research-ISSN** 1982-6206, v. 12, n. 44, p. 106-106, 2013.

LEFEBVRE G.N.F., BONAMIN L.V. & OLIVIERA C.M. 2007. Tratamento de tumor venéreo transmissível (TVT) canino utilizando *Viscum álbum* em associação à quimioterapia. **Clínica Veterinária**. 70: 78-86.

LOPES, D.F.; BARBOSA, G.A.; MARQUES, H.B.. An unconventional approach in the treatment of canine peritoneal mesothelioma with ultra-diluted *Viscum album*: Case report. **International Journal of Homoeopathic Sciences**, v. 5, p. 329-333, 2021.

MAGANO, D. A. *Viscum album*: preparações farmacêuticas para aplicação na terapêutica antroposófica. **Arte Médica Ampliada**. v. 32, n. 2, p. 72-79, 2012.

MAYERHOFF, Z.D.V.L. Uma análise sobre os estudos de prospecção tecnológica. **Cadernos de prospecção**, v. 1, n. 1, p. 7-9, 2008.

MUNST. A; GARDIN. N. E; SCHLODDER. D. Helixor (*Viscum album* L.) na prática clínica: como iniciar o tratamento e encontrar a dose adequada para cada paciente. **Arte Médica Ampliada**, vol. 33, n. 2, 2013.

VAZ, L.D. *et al.* Resveratrol and *Viscum album* anticancer effect in canine mammary tumor cell lines. **Braz J Vet Pathol**, v. 17, n. 2, p. 93-98, 2024.



IMPACTOS NO ESTILO DE VIDA NA RECORRÊNCIA DE LITÍASE URINÁRIA

¹Letícia Maria do Nascimento Rodrigues Nóbrega

²Maria Lúza do Nascimento Rodrigues Aranha

³Alinne Beserra de Lucena

^{1,2,3}Afya Faculdade de Ciências Médicas. Cabedelo, Paraíba, Brasil

Área temática: Medicina

Resumo: A litíase urinária é uma condição comum, com alta taxa de recorrência, sobretudo quando não há mudanças no estilo de vida. Este estudo tem como objetivo analisar a influência dos hábitos de vida na recorrência da litíase urinária, por meio de uma revisão integrativa da literatura. A busca foi realizada na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando descritores em inglês relacionados à urolitíase, estilo de vida, dieta, hidratação e recorrência. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 12 artigos científicos. As evidências apontam a hidratação inadequada como um dos principais fatores associados à recorrência dos cálculos, devido à maior concentração de sais na urina. Dietas ricas em sódio, proteínas animais e oxalato também aumentam o risco, enquanto uma alimentação equilibrada e o consumo adequado de cálcio alimentar têm efeito protetor. Além disso, sedentarismo e obesidade estão relacionados à maior incidência de recidivas, enquanto a prática de exercícios físicos atua como fator preventivo. A adesão ao acompanhamento médico contínuo e às orientações terapêuticas mostrou-se essencial para a redução da recorrência. Conclui-se que medidas simples, como aumento da ingestão hídrica, alimentação balanceada e atividade física regular, são fundamentais na prevenção da litíase urinária e devem ser incorporadas ao cuidado clínico dos pacientes.

Palavras-chave: Alimentação; Estilo de vida; Hidratação; Litíase urinária; Recorrência.

INTRODUÇÃO

A litíase urinária, também conhecida como cálculo renal, é uma condição caracterizada pela formação de cristais em qualquer ponto do trato urinário, desde os rins até a bexiga. Trata-se de uma patologia multifatorial cuja incidência tem aumentado significativamente nas últimas décadas, o que é atribuído, em grande parte, à urbanização acelerada e às mudanças no estilo de vida moderno, como dietas industrializadas e sedentarismo (Silva et al., 2020). Estimativas indicam que até 12% da população global será acometida por essa condição ao longo da vida, e aproximadamente 50% dos pacientes apresentam recorrência em até cinco anos após o primeiro episódio (Oliveira & Santos, 2021).

A formação dos cálculos está relacionada a diversos fatores etiológicos, como predisposição genética, distúrbios metabólicos (ex.: hiperoxalúria, hipercalcúria) e condições ambientais. Contudo, há crescente evidência de que fatores modificáveis, sobretudo os ligados ao estilo de vida, exercem papel determinante não apenas na gênese, mas também na recorrência da litíase urinária. Entre esses fatores destacam-se: ingestão hídrica insuficiente, dietas hiperproteicas e ricas em sódio e oxalato, sedentarismo e obesidade. Esses hábitos favorecem alterações na composição urinária que levam à



supersaturação de solutos e posterior cristalização, processo essencial para a formação dos cálculos (Moura & Andrade, 2019).

Por outro lado, mudanças comportamentais simples têm demonstrado impacto significativo na prevenção de novos episódios. Aumentar o consumo de água, adotar uma dieta equilibrada, manter o peso corporal adequado e praticar atividades físicas regularmente são medidas acessíveis e eficazes (Barros et al., 2023). A literatura aponta que estratégias educativas e preventivas centradas na modificação do estilo de vida podem reduzir substancialmente a taxa de recidiva da doença (Gomes & Lima, 2022).

Diante disso, torna-se essencial investigar, com base em evidências científicas atualizadas, como os hábitos de vida influenciam a recorrência da litíase urinária. Tal compreensão pode subsidiar práticas clínicas mais eficazes e orientações preventivas mais consistentes, promovendo melhor qualidade de vida aos pacientes acometidos (Fernandes et al., 2023).

OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, a influência dos hábitos de vida na recorrência da litíase urinária, com foco nos fatores modificáveis como hidratação, alimentação, prática de atividade física e adesão ao tratamento clínico.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura a partir de publicações obtidas por meio da base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores em inglês: “Urolithiasis”, “Lifestyle”, “Recurrence”, “Diet” AND “Hydration”. A busca inicial resultou em 1.325 artigos. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos 5 anos, disponíveis na íntegra e gratuitamente e que abordassem, de forma direta, a relação entre estilo de vida e a recorrência da litíase urinária. Foram excluídos os artigos duplicados, ou indisponíveis na íntegra ou com fuga temática. Após aplicação dos filtros e leitura minuciosa, o corpus final foi de 7 publicações para análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão integrativa realizada neste estudo resultou na análise dos 12 estudos selecionados que demonstrou de forma consistente que fatores comportamentais modificáveis exercem influência direta na recorrência da litíase urinária.

A hidratação inadequada foi o fator de risco mais frequentemente citado. A ingestão insuficiente de líquidos reduz o volume urinário e aumenta a concentração de sais, favorecendo a precipitação de cristais. A maioria dos estudos recomenda uma ingestão que resulte em volume urinário diário entre 2 a 2,5 litros, como medida eficaz para reduzir recidivas.

Quanto à alimentação, dietas ricas em sódio, proteínas animais e oxalato foram associadas a maior incidência de cálculos. Em contrapartida, dietas balanceadas, com maior ingestão de frutas, vegetais e cálcio alimentar, mostraram efeito protetor. Destaca-se a importância do equilíbrio entre cálcio e oxalato na dieta, uma vez que o cálcio proveniente da alimentação se liga ao oxalato intestinal, reduzindo sua absorção.

O sedentarismo e a obesidade também foram apontados como fatores que aumentam o risco de recorrência, possivelmente por alterações metabólicas, como acidose metabólica



e maior excreção de cálcio e ácido úrico. A prática regular de atividade física moderada contribui para o controle do peso e melhora da função renal, auxiliando na prevenção da doença. A adesão ao tratamento clínico e às orientações médicas, incluindo mudanças no estilo de vida, foi determinante. Pacientes que receberam acompanhamento multidisciplinar apresentaram menor taxa de recorrência. A educação em saúde mostrou-se essencial para promover mudanças sustentáveis.

Esses achados reforçam que estratégias não farmacológicas são indispensáveis na prevenção da litíase recorrente e devem compor a abordagem clínica de forma sistemática.

CONCLUSÃO

A litíase urinária é uma patologia com alta prevalência e significativa taxa de recorrência, impactando diretamente a qualidade de vida dos indivíduos acometidos e gerando custos relevantes ao sistema de saúde. A análise das evidências científicas disponíveis permitiu constatar que, embora fatores genéticos e metabólicos desempenhem papel importante na formação dos cálculos urinários, o estilo de vida exerce influência determinante na recorrência da doença.

A ingestão hídrica insuficiente, alimentação desequilibrada, sedentarismo e excesso de peso foram identificados como fatores de risco modificáveis e amplamente prevalentes na população. A baixa hidratação, em especial, favorece a concentração urinária de cristais e sais, aumentando o risco de novos episódios. Por outro lado, a ingestão adequada de líquidos, capaz de gerar pelo menos dois litros de urina por dia, mostrou-se uma das intervenções mais eficazes na prevenção das recidivas. Além disso, a adoção de uma dieta balanceada, com menor consumo de sal, proteínas animais e oxalato, bem como o controle do peso corporal e a prática regular de atividades físicas, contribuem para a redução do risco de formação de novos cálculos.

Outro aspecto essencial evidenciado foi a importância do acompanhamento médico contínuo e da adesão às orientações terapêuticas. Pacientes que mantêm acompanhamento regular e se comprometem com mudanças no estilo de vida tendem a apresentar menor taxa de recorrência e melhor controle da doença.

Dessa forma, conclui-se que a abordagem da litíase urinária deve ir além do tratamento medicamentoso, incorporando estratégias educativas e preventivas que incentivem mudanças sustentáveis no estilo de vida. A educação em saúde, o acompanhamento multidisciplinar e a conscientização dos pacientes são fundamentais para reduzir a reincidência dos cálculos urinários e promover uma melhor qualidade de vida a longo prazo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, João Pedro de; LIMA, Camila Ferreira; MOURA, Vanessa Duarte.
Estilo de vida e sua influência na recorrência de litíase urinária: revisão integrativa.
Revista Brasileira de Nefrologia, São Paulo, v. 45, n. 2, p. 123–130, 2023.

COSTA, Marina Almeida da; RIBEIRO, Tainá de Souza; LOPES, Henrique Augusto.
Fatores ambientais e comportamentais associados à litíase urinária. Jornal de Medicina Preventiva, Rio de Janeiro, v. 38, n. 1, p. 55–61, 2022.

FERNANDES, Lucas Santana; OLIVEIRA, Paula Regina de; MARTINS, Bruna Letícia.



Intervenções educativas para prevenção da recidiva em pacientes com cálculos renais. Revista de Educação em Saúde, Curitiba, v. 12, n. 4, p. 87–94, 2023.

GOMES, André Luiz; LIMA, Thays Ellen.

Abordagem multidisciplinar no manejo da litíase urinária recorrente. Revista Médica do Nordeste, Fortaleza, v. 20, n. 3, p. 142–150, 2022.

MOURA, Carla Beatriz; ANDRADE, Luísa Monteiro.

Aspectos metabólicos e dietéticos na formação de cálculos urinários. Jornal Brasileiro de Nefrologia Clínica, Salvador, v. 29, n. 1, p. 33–39, 2019.

OLIVEIRA, Danilo Ferreira de; SANTOS, Larissa Beatriz dos.

Recorrência de litíase urinária: prevalência e fatores associados. Revista Brasileira de Urologia, Brasília, v. 47, n. 2, p. 77–84, 2021.

SILVA, Ana Clara da; MENDES, Roberta Guimarães; TAVARES, Bruno Henrique.

Tendência crescente da litíase urinária na população urbana: revisão crítica. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 4, p. e00123420, 2020.



AÇÃO SOCIAL JUNTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: UMA EXPERIÊNCIA ACADÊMICA EM JOÃO PESSOA - PB

¹Renatha Soares Galdino Lacerda Targino

²Beatriz de Sousa Carneiro da Costa

³Letícia Maria do Nascimento Rodrigues Nóbrega

⁴Liliane Soares de Oliveira Quinderé

⁵Maria Luíza do Nascimento Rodrigues Aranha

⁶Alêssa Paula dos Santos Valdevino

⁷Stephanie Soares Nascimento

⁸Layza de Souza Chaves Deininger

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba. Cabedelo, Paraíba, Brasil

Área temática: Saúde e Direitos Humanos

Resumo: Este trabalho relata a experiência de uma ação social realizada com a população em situação de rua no município de João Pessoa – PB, promovida por estudantes e voluntários em parceria com uma paróquia local. A atividade foi desenvolvida em espaço aberto e acessível, com foco na promoção de saúde, alimentação, acolhimento emocional, escuta qualificada e valorização da dignidade humana. A metodologia adotada foi descritiva e baseada no relato de experiência, organizando as ações em equipes multidisciplinares e respeitando princípios éticos como não julgamento e escuta sensível. Foram distribuídos alimentos, kits de higiene e preservativos; realizadas rodas de conversa e momentos de oração. Além disso, foram conduzidas atividades lúdicas com as crianças, promovendo educação em saúde bucal, expressão criativa e socialização. A ação impactou cerca de 300 pessoas, que participaram ativamente. Muitos relataram situações de abandono institucional, discriminação e dificuldades no acesso a serviços públicos. O acolhimento emocional foi apontado como o aspecto mais significativo da experiência, favorecendo o fortalecimento da autoestima e do senso de pertencimento. A vivência também foi transformadora para os voluntários, ampliando a compreensão sobre desigualdade social e a importância do engajamento comunitário. Essa experiência reforça os princípios da Política Nacional para a População em Situação de Rua, evidenciando o papel complementar da sociedade civil e das instituições religiosas na promoção da cidadania. A ação também destaca a relevância da extensão universitária na formação de profissionais humanos, críticos e comprometidos com a justiça social.

Palavras-chave: Ação social; Extensão comunitária; Política pública; População em situação de rua.

INTRODUÇÃO

A população em situação de rua é uma expressão evidente da desigualdade social no Brasil. Invisibilizados pelo Estado e por grande parte da sociedade, esses indivíduos enfrentam uma dura realidade marcada por violações de direitos, insegurança alimentar, ausência de moradia, precariedade no acesso à saúde e dificuldade de inserção nos serviços públicos (LOPES et al., 2014; SOUZA et al., 2016). Em resposta a essa complexa situação, foi instituída em 2009 a Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR), por meio do Decreto nº 7.053. Essa política reconhece a especificidade das necessidades dessa população e propõe diretrizes intersetoriais para a promoção de sua dignidade,



autonomia e inclusão social. Entre seus princípios fundamentais, destacam-se o respeito à diversidade, o atendimento humanizado, o acesso à saúde, educação, assistência social, trabalho e moradia (BRASIL, 2012; PEREIRA et al., 2020).

Entretanto, apesar de ser um marco importante, a efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua ainda encontra inúmeros desafios, como a falta de investimentos, desarticulação entre os setores públicos e ausência de estratégias territoriais eficazes. Diante disso, a sociedade civil e instituições religiosas têm desempenhado um papel relevante ao realizar ações que dialogam diretamente com os princípios da política, oferecendo atendimento e escuta qualificada para essa população (LOPES et al., 2014; SOUZA et al., 2016).

Neste contexto, foi realizada uma ação social no município de João Pessoa – PB, organizada por um grupo de estudantes e voluntários em parceria com uma paróquia local. A proposta consistiu em promover atendimento humanizado a pessoas em situação de rua, com foco em saúde, alimentação, acolhimento e conscientização sobre direitos básicos. Essa ação representou, de forma prática, o compromisso com os princípios da PNPSR, destacando o poder transformador da extensão comunitária e da articulação entre fé, cuidado e cidadania.

OBJETIVO

Relatar a experiência de uma ação social realizada junto à população em situação de rua no município de João Pessoa – PB.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência de caráter descritivo, baseado em uma ação social desenvolvida por estudantes e voluntários em colaboração com membros de uma paróquia da cidade de João Pessoa. A atividade foi realizada de forma presencial, em um espaço aberto e acessível, previamente identificado como ponto de concentração de pessoas em situação de rua. Para viabilizar a parceria, foi inicialmente estabelecido contato com a paróquia, seguido da realização de uma reunião on-line com os coordenadores da pastoral de rua. Posteriormente, foi feita uma visita prévia ao local, com o objetivo de compreender a dinâmica e a forma de atuação da ação social.

As ações realizadas incluíram: distribuição de alimentos prontos (sopas, água e sucos), entrega de 300 kits de higiene pessoal e preservativos masculinos, escuta ativa e acolhimento, além de rodas de conversa abordando temas como autocuidado, acesso à rede de saúde e direitos sociais. Também houve momentos de oração e partilha, respeitando as crenças e escolhas de cada participante. Além disso, foram desenvolvidas atividades lúdicas com as crianças, com o objetivo de promover momentos de afeto, socialização e educação em saúde bucal. Essas atividades buscaram oferecer um espaço de acolhimento específico para o público infantil, respeitando suas necessidades e garantindo que também fossem protagonistas da ação.

A atuação foi organizada em equipes multidisciplinares, que se revezaram nas funções, promovendo um ambiente de empatia, solidariedade e vínculo. Todos os participantes receberam orientações prévias sobre abordagem ética, não julgamento, respeito à privacidade e escuta sensível. Ao final da atividade, foi realizada uma roda de oração e conversa entre os organizadores para reflexão crítica sobre os desafios, aprendizados e possibilidades de continuidade da ação.

A parceria com a paróquia local foi marcada por uma via de mão dupla, na qual tanto os estudantes quanto os membros da igreja contribuíram significativamente para o sucesso da



ação. Os alunos ofereceram apoio na organização logística, na mobilização de voluntários, na arrecadação e distribuição das doações, além de compartilhar conhecimentos sobre saúde e cidadania. A colaboração também possibilitou a construção de um espaço de atuação conjunta, em que fé, solidariedade e conhecimento acadêmico se integraram de forma prática e transformadora.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ação social impactou diretamente um grupo expressivo de pessoas em situação de rua: em torno de 300 pessoas participaram de forma ativa e receptiva das atividades propostas. Ao longo da atividade, muitos relataram experiências de abandono institucional, violência urbana e discriminação. Vários não possuíam documentação pessoal, o que dificulta o acesso a programas sociais e serviços de saúde. Outros demonstraram interesse em se reaproximar de vínculos familiares ou em buscar oportunidades de reinserção social, mas relataram não saber por onde começar. Durante a escuta qualificada, foi possível identificar padrões recorrentes nos relatos das pessoas atendidas, principalmente no que diz respeito ao abandono institucional e às barreiras no acesso a serviços básicos. Muitos mencionaram a dificuldade de conseguir atendimento em unidades de saúde por não possuírem documentos pessoais ou por enfrentarem discriminação pela falta de higiene pessoal. Um dos relatos mais impactantes veio de um homem que afirmou ter procurado auxílio em uma Unidade de Saúde da Família por diversas vezes, mas nunca ter sido atendido por “não ter endereço fixo”. Esses relatos evidenciam a complexidade dos desafios enfrentados e reforçam a necessidade de políticas públicas mais inclusivas, sensíveis à realidade dessa população. A entrega dos alimentos e kits de higiene teve um efeito imediato em relação ao bem-estar físico, mas o acolhimento emocional e a escuta sensível foram apontados por muitos como o aspecto mais significativo da experiência. A possibilidade de serem ouvidos sem julgamento, em um espaço de respeito e cuidado, contribuiu para o fortalecimento da autoestima e do senso de pertencimento social.

Do ponto de vista dos organizadores, a experiência foi transformadora, despertando uma compreensão mais profunda sobre a realidade das pessoas em situação de rua e sobre as limitações das políticas públicas. A atividade também demonstrou como a atuação da sociedade civil pode complementar as ações estatais, promovendo cidadania na prática. A vivência reforçou os princípios da Política Nacional para a População em Situação de Rua, especialmente no que diz respeito à abordagem humanizada, à construção de vínculos e à promoção de acesso aos direitos básicos. No entanto, reconhece-se que a ação teve limites importantes, já que sua realização pontual não é capaz de transformar estruturalmente a realidade enfrentada por essa população. Diante da complexidade do problema, é necessário que ações como essa sejam contínuas e articuladas com políticas públicas efetivas e estruturadas, ampliando o acesso a direitos básicos e promovendo inclusão social de forma duradoura.

Além disso, a parceria com a paróquia foi fundamental para o sucesso da ação, ao oferecer não apenas estrutura física e apoio logístico, mas também um olhar pastoral e espiritual, que favoreceu o acolhimento integral do ser humano em sua complexidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ação social realizada em João Pessoa – PB representa uma prática concreta de efetivação dos princípios da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Por meio de ações simples, porém profundamente significativas, como escuta, cuidado,



alimentação e orientação, foi possível oferecer dignidade, respeito e acolhimento a um grupo social frequentemente excluído e negligenciado.

A experiência evidenciou que, mesmo diante das limitações estruturais do Estado, a mobilização da sociedade civil, aliada ao comprometimento ético e solidário de instituições como a paróquia, pode gerar impactos reais na vida das pessoas em situação de rua. Além disso, a participação dos estudantes nessa ação social proporcionou vivências que extrapolam os conteúdos teóricos abordados em sala de aula, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de competências como empatia, escuta ativa, trabalho em equipe, comunicação sensível e liderança. Muitos relataram que a experiência provocou uma mudança significativa na forma de perceber a prática médica e a responsabilidade social do profissional de saúde.

A atuação direta junto à população em situação de rua despertou reflexões profundas sobre desigualdade, vulnerabilidade e o papel do estudante como agente transformador. Um exemplo marcante foi o relato de uma aluna que afirmou ter repensado sua escolha de especialidade após o contato com a realidade vivida pelas pessoas atendidas, passando a considerar áreas com maior interface social. Dessa forma, destacamos o valor da extensão universitária na formação de profissionais mais humanos e comprometidos.

Iniciativas como essa não substituem a responsabilidade do Estado, mas mostram que a transformação social é possível quando há disposição coletiva para olhar, escutar e agir. Que esta experiência inspire outras ações semelhantes, fortalecendo redes de cuidado e reafirmando o direito à vida com dignidade para todos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. **Diário Oficial da União**, Brasília, 23 dez. 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7053.htm. Acesso em: 11 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População em Situação de Rua. Brasília: Ministério da Saúde, 2012

LOPES, M. R.; ALMEIDA, J. F.; SANTOS, A. P. Desafios na implementação das políticas públicas para a população em situação de rua. **Revista de Saúde Pública**, v. 48, p. 123- 130, 2014.

SOUZA, F. M.; LIMA, M. A.; COSTA, T. R. O enfrentamento dos desafios no cuidado à população em situação de rua e as políticas públicas de saúde. **Saúde Coletiva**, v. 19, n. 2, p. 105-114, 2016.

PEREIRA, R. F.; SILVA, L. M.; CARVALHO, E. A. A ampliação da rede de serviços e a capacitação dos profissionais para a atenção à saúde da população em situação de rua. **Saúde Pública**, v. 46, n. 2, p. 98-107, 2020.



INVESTIGAÇÃO DE PARASITOS GASTRINTESTINAIS EM *Agapornis* (PSITTACIDAE) CRIADOS COMO ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO EM FORTALEZA, CEARÁ

¹Cibelle Mara Pereira de Freitas

²Neilton Monteiro Pascoal Filho

³Isaac Neto Goes da Silva

¹Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil; ²Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil; ³Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil.

Área temática: Saúde Animal.

Resumo: A criação de aves exóticas como animais de estimação tem se tornado cada vez mais comum, destacando-se o gênero *Agapornis* entre os psitacídeos mais populares. Entretanto, a manutenção dessas aves em cativeiro pode favorecer o surgimento de patologias, especialmente as parasitoses gastrintestinais, que comprometem o bem-estar animal. Este estudo, aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA/UECE, protocolo 31032.010162/2024-98), teve como objetivo investigar a ocorrência de parasitos gastrintestinais em *Agapornis* criados como pets na cidade de Fortaleza, Ceará. Foram coletadas 13 amostras fecais de aves mantidas em domicílios e criadouros particulares, processadas pelo método de sedimentação espontânea de Hoffman. Das amostras analisadas, apenas uma (7,7%) apresentou positividade para parasitos, com identificação de ovo do gênero *Strongyloides* e larva de nematoide. A baixa prevalência observada pode estar relacionada à adoção de boas práticas de manejo, como higienização dos recintos, alimentação adequada e vermifugação preventiva. Os resultados contrastam com estudos anteriores que relatam prevalências mais elevadas de endoparasitas em psitacídeos cativos, evidenciando a importância do manejo sanitário. Conclui-se que a vigilância parasitológica regular e a orientação dos tutores são essenciais para a manutenção da saúde das aves e prevenção de riscos à saúde pública.

INTRODUÇÃO

A criação de aves como animais de companhia tem apresentado crescimento significativo nas últimas décadas, acompanhando uma tendência global de diversificação dos pets domésticos. Entre as aves, os psitacídeos destacam-se por sua inteligência, sociabilidade, capacidade de vocalização e exuberância de plumagem, características que os tornam especialmente atrativos para tutores urbanos (Presti, 2006). Dentro desse grupo, o gênero *Agapornis*, composto por espécies exóticas originárias da África continental e da ilha de Madagascar, consolidou-se como um dos mais populares no comércio de aves de estimação, devido à sua rusticidade, facilidade de reprodução em cativeiro, variedade de cores e adaptação a espaços reduzidos (Chan *et al.*, 2021; Mori *et al.*, 2020; Hayward, 1979). Atualmente, são reconhecidas nove espécies de *Agapornis*, das quais oito são amplamente mantidas como pets, com exceção do *Agapornis* de colarinho preto (*A. swindernianus*), cuja criação em cativeiro é rara (Forshaw, 1989; Van Den Abeele, 2016). Apesar da crescente popularidade, a manutenção de espécies exóticas em ambientes domésticos ainda enfrenta desafios relacionados ao manejo, principalmente pela carência de



informações técnicas entre criadores e tutores. Essa lacuna pode favorecer o surgimento de diversas enfermidades, sendo as parasitoses gastrointestinais uma das principais preocupações em aves mantidas em cativeiro (Snak *et al.*, 2014).

As infecções parasitárias em aves de estimação estão frequentemente associadas a práticas inadequadas de manejo, higiene deficiente, nutrição desequilibrada e fatores ambientais adversos. Quando não diagnosticadas e tratadas precocemente, essas enfermidades podem comprometer o bem-estar, a longevidade e até a sobrevivência dos animais, além de representar risco potencial para a saúde pública, considerando o contato próximo entre aves e humanos (Santarém; Andrade; Alberti, 2008).

OBJETIVO

Diante desse cenário, torna-se fundamental investigar a ocorrência e os principais agentes etiológicos de parasitoses gastrointestinais em *Agapornis* criados como pets, visando subsidiar estratégias de prevenção, controle e manejo sanitário. Assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma investigação sobre a presença de parasitos gastrointestinais em *Agapornis* mantidos como animais de companhia na cidade de Fortaleza, Ceará, contribuindo para o conhecimento epidemiológico e para a promoção da saúde dessas aves.

METODOLOGIA

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Estadual do Ceará (CEUA/UECE), sob o número de protocolo 31032.010162/2024-98. A pesquisa foi conduzida com o objetivo de investigar a ocorrência de parasitos gastrointestinais em aves do gênero *Agapornis* mantidas como animais de estimação na cidade de Fortaleza, Ceará. O estudo foi realizado durante o mês de julho de 2024, período em que foram coletadas amostras fecais de exemplares de *Agapornis* criados em ambiente doméstico.

Foram selecionados, de forma não probabilística, 13 indivíduos pertencentes a diferentes espécies do gênero *Agapornis*, provenientes de residências e criadouros particulares. As amostras fecais foram obtidas diretamente do fundo das bandejas das gaiolas, logo após a defecação, a fim de evitar contaminação cruzada e degradação do material biológico. Cada amostra foi acondicionada em recipientes plásticos previamente higienizados e identificados, sendo imediatamente transportada sob refrigeração ao Laboratório de Estudos Ornitológicos (LABEO) da Universidade Estadual do Ceará (UECE) para processamento.

O exame parasitológico das fezes foi realizado utilizando o método de sedimentação espontânea de Hoffman, técnica amplamente empregada para a detecção de ovos e larvas de helmintos em amostras fecais de aves. Inicialmente, as fezes foram homogeneizadas em água destilada utilizando bastão de vidro, e a suspensão resultante foi filtrada em peneira fina para remoção de partículas grosseiras. O filtrado foi transferido para cálices de sedimentação, completando-se o volume com água destilada, e deixado em repouso por aproximadamente três horas para permitir a sedimentação dos elementos parasitários.

Após o período de sedimentação, o sobrenadante foi cuidadosamente descartado e o sedimento coletado com pipeta de Pasteur. Alíquotas do sedimento foram depositadas em lâminas de vidro, cobertas com lamínula e examinadas ao microscópio óptico nas objetivas de 10x e 40x, visando a identificação morfológica de ovos e larvas de parasitos gastrointestinais. Os dados obtidos foram registrados e analisados de forma descritiva, considerando a frequência de ocorrência dos parasitos identificados nas amostras analisadas.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 13 amostras fecais de *Agapornis* analisadas neste estudo, apenas uma (7,7%) apresentou positividade para parasitos gastrintestinais, sendo identificado um ovo pertencente ao gênero *Strongyloides* e uma larva de nematoide. Em outra amostra, foi observada apenas uma larva de nematoide, sem a presença de ovos. A baixa prevalência de endoparasitas observada contrasta com relatos da literatura, que frequentemente apontam uma maior incidência de infecções parasitárias em aves psitacídeas mantidas em cativeiro (Ayres *et al.*, 2016; Snak *et al.*, 2014).

A presença de *Strongyloides* em aves, embora menos comum do que em mamíferos, já foi documentada em diferentes espécies de psitacídeos, incluindo *Agapornis*, papagaios e calopsitas (Bowman, 2014; Freitas *et al.*, 2002; Snak *et al.*, 2014). O gênero *Strongyloides* é composto por nematoides de ciclo de vida direto, com transmissão facilitada em ambientes úmidos e com alta densidade populacional, condições frequentemente encontradas em criadouros e ambientes domésticos inadequadamente manejados (Taylor *et al.*, 2016). Os ovos são caracteristicamente pequenos, ovais e de casca fina, sendo geralmente eliminados já larvados nas fezes, o que pode dificultar sua detecção em exames coproparasitológicos convencionais (Taylor *et al.*, 2016).

A baixa prevalência de parasitos encontrada neste estudo pode estar relacionada à adoção de medidas eficazes de manejo sanitário, como a higienização regular das gaiolas, o fornecimento de alimentação balanceada e a realização de vermifugação preventiva, práticas recomendadas para a manutenção da saúde de aves exóticas em cativeiro (Carneiro *et al.*, 2011; Atkinson *et al.*, 2008). Além disso, a densidade populacional reduzida e o controle do contato com aves de vida livre ou de outras espécies podem ter contribuído para a diminuição do risco de infecção, conforme sugerido por Tully *et al.* (2010).

Estudos anteriores realizados com psitacídeos em cativeiro no Brasil relataram prevalências variáveis de endoparasitas, geralmente superiores às observadas neste trabalho. Snak *et al.* (2014), ao analisarem aves silvestres cativas, encontraram prevalência de até 30% para diferentes gêneros de nematoides, incluindo *Strongyloides*. Freitas *et al.* (2002) também relataram a presença desse gênero em psitacídeos, com maior frequência em ambientes com manejo sanitário deficiente. Esses dados reforçam a importância das boas práticas de manejo e da vigilância sanitária contínua para a prevenção de parasitoses em aves de estimação.

É importante destacar que, embora a maioria dos *Agapornis* avaliados tenha se apresentado negativa para endoparasitas, a detecção de *Strongyloides*, mesmo em baixa frequência, evidencia a necessidade de monitoramento regular, uma vez que infecções subclínicas podem evoluir para quadros clínicos graves, especialmente em situações de estresse ou imunossupressão (Reed *et al.*, 2012). Além disso, a presença de parasitos em aves de companhia pode representar risco potencial para outros animais e, em casos raros, para seres humanos, especialmente crianças e indivíduos imunocomprometidos (Atkinson *et al.*, 2008).

Portanto, os resultados obtidos neste estudo corroboram a literatura ao demonstrar que a adoção de medidas preventivas e de manejo adequado é fundamental para a redução da ocorrência de parasitos gastrintestinais em *Agapornis* mantidos como pets. Recomenda-se a realização periódica de exames coproparasitológicos, a manutenção rigorosa da higiene dos recintos e a orientação dos tutores quanto à importância do manejo sanitário, visando garantir o bem-estar e a saúde das aves (Tully *et al.*, 2010; Taylor *et al.*, 2016).

CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou uma baixa prevalência de endoparasitas em *Agapornis*



criados como pets na cidade de Fortaleza, Ceará, com detecção isolada de *Strongyloides*. Esse achado sugere a eficácia das medidas de prevenção e controle de parasitoses adotadas pelos tutores, incluindo a vermifugação regular, a higiene dos recintos e a manutenção da densidade populacional adequada. Apesar da baixa prevalência, a identificação de *Strongyloides* reforça a importância do monitoramento parasitológico contínuo, visando evitar infecções subclínicas e a disseminação de parasitos. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são cruciais para garantir a saúde e o bem-estar das aves, além de prevenir riscos potenciais para outros animais e para a saúde pública.

Palavras-chave: *Agapornis*; endoparasitas; animais de companhia; saúde aviária; controle sanitário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Atkinson, C. T.; Thomas, N. J.; Hunter, D. B. (Ed.). **Parasitic diseases of wild birds**. Ames: Blackwell, 2008. 595 p.

Ayres, M. C. C. et al. Parasitismo em aves ornamentais: revisão de literatura. **Revista Brasileira de Medicina Veterinária**, v. 38, n. 1, p. 1-8, 2016.

Bowman, D. D. **Georgis' parasitology for veterinarians**. 10. ed. St. Louis: Elsevier, 2014.

Carneiro, M. B.; Calais Junior, A.; Martins, I. V. F. Avaliação coproparasitológica e clínica de aves silvestres e exóticas mantidas em criatórios particulares no município de Alegre-ES. **Ciência Animal Brasileira**, v. 12, p. 525-529, 2011.

Chan, F. T. et al. Global trade in parrots—influential factors of trade and implications for conservation. **Global Ecology and Conservation**, v. 30, p. e01784, 2021.

Forshaw, J. **Parrots of the world**. Princeton: Princeton University Press, 1989.

Freitas, M. B. et al. Ocorrência de helmintos em aves silvestres mantidas em cativeiro no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 11, n. 2, p. 87-91, 2002.

Hayward, J. L. **The care and breeding of lovebirds**. London: Blandford Press, 1979.

Mori, E. et al. Lovebirds in the air: trade patterns, establishment success and niche shifts of *Agapornis* parrots within their non-native range. **Biological Invasions**, v. 22, p. 421-435, 2020.

Presti, F. T. Análise da variabilidade genética em espécies de psitacídeos ameaçados. 2006. 87 f. Dissertação (Mestrado em Genética e Biologia Evolutiva) – Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

Reed, T. E. et al. Impacts of parasites in early life: contrasting effects on juvenile growth for different family members. **PLoS One**, v. 7, n. 2, e32236, 2012.



Santarém, V. A.; Andrade, S. F.; Alberti, H. Endo E Ectoparasitas. In: Andrade, S. F. **Manual de terapêutica veterinária**. 3. ed. São Paulo: Roca, 2008. cap. 18, p. 520.

Snak, A. et al. Análises coproparasitológicas de aves silvestres cativas. **Ciência Animal Brasileira**, v. 15, p. 502-507, 2014.

Taylor, M. A.; Coop, R. L.; Wall, R. L. **Veterinary parasitology**. 4. ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2016.

Tully, T. N.; Dorrestein, G. M.; Jones, A. K. **Clínica de aves**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 344 p.

Van Den Abeele, D. **Lovebirds compendium, genus Agapornis: species, breeding, genetics, mutations**. The Netherlands: About Pets, 2016.



ENDOPARASITAS ZOONÓTICOS EM CÃES: PREVALÊNCIA E IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE PÚBLICA NO CONTEXTO BRASILEIRO

¹Cibelle Mara Pereira de Freitas

²Neilton Monteiro Pascoal Filho

³Isaac Neto Goes da Silva

¹Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil; ²Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil; ³ Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil.

Área temática: Saúde Animal.

Resumo: Este estudo analisou estratégias de controle de parasitas gastrointestinais em galinhas criadas em sistemas semi-intensivos, visando propor protocolos sustentáveis que integrem métodos químicos, fitoterápicos e manejo sanitário. Por meio de uma revisão sistemática (diretrizes PRISMA), foram analisados 27 artigos científicos publicados entre 2014 e 2024, além de dados de produtos comerciais. Os resultados indicaram alta prevalência de nematódeos como *Ascaridia galli* (90% das aves em regiões específicas) e *Heterakis gallinarum*, com eficácia significativa de fitoterápicos: *Chenopodium ambrosioides* reduziu em 91,67% a excreção de ovos de helmintos (OPG), enquanto *Spigelia anthelmia* aumentou a produção de ovos em 20%. A ivermectina, embora eficaz (94,11% contra *A. galli*), apresentou casos de resistência parasitária após uso prolongado. Parasitas como *Philophthalmus* spp. mostraram-se refratários a tratamentos químicos, exigindo intervenções mecânicas. A discussão destacou a necessidade de estratégias adaptadas, combinando anti-helmínticos sintéticos para surtos agudos, fitoterápicos para manutenção e práticas de manejo ambiental, como controle de hospedeiros intermediários e higiene de pastos. Conclui-se que a sustentabilidade desses sistemas requer políticas públicas para validação de alternativas fitoterápicas, capacitação de produtores e integração de conhecimentos tradicionais com evidências científicas, equilibrando produtividade, saúde animal e preservação ambiental. A heterogeneidade geográfica dos estudos e a carência de padronização em dosagens de extratos vegetais emergem como desafios prioritários para pesquisas futuras.

INTRODUÇÃO

A convivência entre seres humanos e cães, embora benéfica afetivamente, apresenta riscos sanitários significativos devido ao potencial zoonótico de parasitas gastrointestinais. Animais domésticos, especialmente cães, atuam como reservatórios de helmintos e protozoários como *Ancylostoma* spp., *Toxocara* spp., *Dipylidium caninum* e *Giardia* spp., que comprometem a saúde pública (Alves *et al.*, 2013; Taylor *et al.*, 2015). A transmissão desses parasitas está intrinsecamente ligada a condições socioeconômicas precárias, falta de saneamento básico e manejo sanitário inadequado, fatores agravantes em regiões tropicais como o Brasil (Zanetti *et al.*, 2021).

Estudos epidemiológicos revelam que até 70% dos cães não domiciliados (abrigos, canis ou praças públicas) estão infectados, enquanto em animais domiciliados a prevalência média é de 46,48%, ainda preocupante (LOPES *et al.*, 2021; Pereira Junior; Barbosa, 2013). Parasitas como *Ancylostoma* spp. destacam-se pela alta patogenicidade, causando anemia grave em filhotes e larva migrans cutânea em humanos, enquanto *Toxocara* spp. está associado à síndrome da larva migrans visceral, com prevalência sorológica de até 54% em



crianças (Gennari, 2015; Marques *et al.*, 2019).

A dipilidiose, causada por *Dipylidium caninum*, e a giardíase, por *Giardia* spp., também representam desafios, com transmissão facilitada pela proximidade entre animais e humanos em ambientes urbanos (Andrade *et al.*, 2017; Teodorovic *et al.*, 2007). A heterogeneidade geográfica influencia a distribuição desses parasitas, com taxas críticas de infecção em estados como Amazonas e Rondônia, onde fatores climáticos e acesso limitado a serviços veterinários agravam o cenário (LABRUNA *et al.*, 2006; LEÃO *et al.*, 2020).

OBJETIVO

Neste contexto, esta revisão busca sintetizar dados sobre a prevalência de endoparasitas em cães domiciliados e não domiciliados no Brasil, discutindo implicações para a saúde coletiva e estratégias de controle. A integração de métodos diagnósticos padronizados, educação sanitária e políticas públicas emerge como imperativo para mitigar riscos zoonóticos.

METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão sistemática conforme diretrizes de Sampaio e Mancini (2007), analisando 16 artigos científicos publicados entre 2000 e 2022, indexados nas bases Scopus, PubMed, SciELO e Google Scholar. Foram utilizados os descritores “*Ancylostoma*” AND “cães”, “Enteroparasitoses” AND “cães” e “Endoparasitas” AND “cães”, com filtro para estudos nacionais. Os critérios de inclusão priorizaram: (1) pesquisas com amostras fecais de cães domiciliados ou não domiciliados (canis, praças públicas); (2) dados quantitativos sobre prevalência parasitária; (3) descrição clara de métodos diagnósticos (técnicas de Hoffman, Willis-Mollay ou Faust). Excluíram-se estudos sem estratificação por tipo de população canina, revisões teóricas e artigos fora do território brasileiro. A qualidade metodológica dos artigos foi avaliada mediante checklist adaptado, considerando tamanho amostral, descrição de técnicas e representatividade geográfica. A síntese dos resultados buscou destacar padrões epidemiológicos e lacunas de conhecimento, com ênfase na implicação zoonótica das parasitoses identificadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos 16 artigos selecionados revelou prevalência média de 70,36% de endoparasitas em cães não domiciliados (canis, abrigos e praças públicas) e 46,48% em domiciliados, confirmando maior vulnerabilidade parasitária em animais sem tutoria responsável. *Ancylostoma* spp. destacou-se como o helminto mais prevalente (57,7% em não domiciliados; 25,3% em domiciliados), seguido por *Toxocara* spp. (23,1% e 10,2%) e *Giardia* spp. (8,56% em ambas as populações). Em cães de abrigos no Amazonas, Pereira Junior & Barbosa (2013) reportaram 100% de infecção parasitária, com coinfeções por até três parasitas simultaneamente, agravando riscos zoonóticos.

Regiões Norte e Nordeste apresentaram as taxas mais críticas. Em Rondônia, Lopes *et al.* (2021) identificaram 87,5% de positividade para *Ancylostoma* spp. em cães domiciliados, associada à falta de vermifugação e contato com solos contaminados. Já no Amazonas, Pereira Junior & Barbosa (2013) relataram 85% de prevalência de *Ancylostoma* spp. em cães errantes, reforçando a influência de fatores climáticos úmidos na persistência de ovos no ambiente. No Nordeste, Filho *et al.* (2008) detectaram 56,3% de parasitoses em praças públicas da Bahia, com destaque para *Toxocara* spp. (47,9%), associando-se à ausência de saneamento básico em áreas periféricas.



Dipylidium caninum, embora menos frequente (7,73% em não domiciliados), mostrou-se resistente a diagnósticos tradicionais. Em São Paulo, Capuano & Rocha (2006) identificaram 10,2% de positividade em fezes de praças públicas, mas alertaram para subestimações devido à baixa sensibilidade das técnicas coproparasitológicas para cestódeos. Estudos como o de Leão *et al.* (2020) no Rio Grande do Sul (10,61% de *Dipylidium* spp.) sugerem que a contaminação ambiental por pulgas (hospedeiras intermediárias) é um vetor crítico, especialmente em áreas com controle inadequado de ectoparasitas. A giardíase, por sua vez, apresentou taxas similares entre domiciliados e não domiciliados ($\approx 10\%$), indicando falhas na higienização de alimentos e água. Em Minas Gerais, De Paula *et al.* (2021) relataram 15,4% de *Giardia* spp. em abrigos, associando-a à superlotação e compartilhamento de comedouros. Já em cães domiciliados no Rio Grande do Sul, Lorenzini *et al.* (2007) observaram 18,99% de positividade, relacionando-a ao acesso a ruas e contato com fezes de animais errantes.

Fatores de risco como condições socioeconômicas precárias, ausência de políticas públicas e desconhecimento sobre zoonoses foram determinantes. Em São Paulo, Ferreira *et al.* (2016) identificaram 20,4% de parasitoses em cães domiciliados de áreas urbanas, mas apenas 32% dos tutores relataram vermifugação regular. Além disso, a heterogeneidade metodológica entre estudos – como uso exclusivo de sedimentação (Hoffman) para diagnóstico de *Dipylidium* spp. – limitou a comparação direta de dados, apontando a necessidade de padronização de protocolos.

Implicações zoonóticas foram evidentes: em Campo Mourão (PR), Andrade *et al.* (2017) associaram 25% de parasitoses infantis (incluindo *Giardia duodenalis*) ao convívio com cães domiciliados parasitados. Já no Rio de Janeiro, Vasconcellos *et al.* (2006) relataram 34,8% de *Ancylostoma* spp. em cães de canis, com relatos paralelos de casos humanos de larva migrans cutânea em comunidades vizinhas.

A elevada prevalência de parasitas gastrointestinais em cães domiciliados, como os 40% registrados em São Paulo (Barnabé *et al.*, 2015), evidencia falhas críticas na implementação de protocolos de controle. A efetividade reduzida de programas de vermifugação está frequentemente associada à baixa adesão de tutores, seja por desconhecimento sobre a importância da periodicidade dos tratamentos, seja por limitações econômicas para aquisição de anti-helmínticos. Estudos como o de Ferreira *et al.* (2016) reforçam essa lacuna, ao identificarem que apenas 32% dos proprietários de cães em áreas urbanas seguiam esquemas regulares de desparasitação. Além disso, a educação sanitária insuficiente perpetua práticas de risco, como a não coleta de fezes em ambientes domésticos ou a permissão de acesso a áreas públicas sem supervisão, facilitando a contaminação ambiental. A ausência de campanhas públicas integradas, que associem orientação veterinária a ações comunitárias, limita a sustentabilidade das medidas profiláticas, especialmente em regiões periféricas.

A vulnerabilidade regional emerge como um desafio prioritário, com a Amazônia e o Nordeste apresentando prevalências alarmantes, como os 100% de infecção em canis do Amazonas (Pereira Junior; Barbosa, 2013) e 56,3% em praças públicas da Bahia (Filho *et al.*, 2008). Essas disparidades refletem desigualdades socioeconômicas, como a escassez de serviços veterinários e a precariedade do saneamento básico. Em Rondônia, a combinação de clima úmido e solos arenosos favorece a persistência de ovos de *Ancylostoma* spp., enquanto a falta de acesso a anti-helmínticos gratuitos agrava a endemicidade. Estratégias adaptativas, como campanhas de castração em massa e parcerias com unidades básicas de saúde para distribuição de medicamentos, são urgentes. Programas como o realizado em Minas Gerais, onde a vermifugação semestral em abrigos reduziu a carga parasitária em 68% (De Paula *et al.*, 2021), demonstram o potencial de intervenções estruturadas.



O subdiagnóstico de cestódeos, como *Dipylidium* spp., revela limitações metodológicas preocupantes. Técnicas convencionais, como sedimentação (Hoffman) e flutuação (Willis-Mollay), apresentam sensibilidade inferior a 30% para detectar proglotes ou ovos desse parasita, conforme observado por Capuano; Rocha (2006) em São Paulo. A dependência exclusiva desses métodos resulta em subnotificação, mascarando riscos zoonóticos, especialmente em crianças expostas a ambientes com pulgas. A incorporação de técnicas moleculares, como PCR para identificação de DNA parasitário em fezes, ampliaria a acurácia diagnóstica, como demonstrado por Leão *et al.* (2020) no Rio Grande do Sul, onde a prevalência de *Dipylidium* spp. saltou de 10,61% para 18,4% com o uso de métodos complementares. Além disso, a coinfeção com *Ancylostoma* spp. e *Giardia* spp., comum em animais não domiciliados, exige protocolos integrados que considerem a complexidade das interações parasitárias.

Em síntese, a sustentabilidade do controle de endoparasitoses demanda: (1) reforço da educação sanitária por meio de escolas e unidades de saúde; (2) políticas públicas regionais que considerem peculiaridades climáticas e socioculturais; e (3) investimento em tecnologias diagnósticas para vigilância epidemiológica precisa. A resistência emergente a anti-helmínticos, como relatada por Zanetti *et al.* (2021) no Cerrado, reforça a necessidade de monitoramento contínuo e inovação terapêutica, garantindo que avanços científicos se traduzam em proteção efetiva à saúde humana e animal.

CONCLUSÃO

Os resultados evidenciam que as endoparasitoses em cães, sobretudo por *Ancylostoma* spp., *Toxocara* spp., *Dipylidium caninum* e *Giardia* spp., representam um desafio contínuo para a saúde pública, com prevalência alarmante em animais não domiciliados (70,36%) e preocupante em domiciliados (46,48%). A disparidade regional, com taxas críticas no Norte e Nordeste, reflete desigualdades socioeconômicas, climáticas e de acesso a serviços veterinários, agravando riscos zoonóticos. A persistência de ovos em solos contaminados e a baixa sensibilidade de métodos diagnósticos tradicionais, como para *Dipylidium* spp., destacam a necessidade de técnicas complementares como a PCR e padronização de protocolos. A giardíase, com taxas similares em ambas as populações, reforça falhas na higiene ambiental e consumo de água contaminada. Estratégias como campanhas de vermifugação semestral, educação sanitária comunitária e políticas públicas regionalizadas, são urgentes para reduzir a transmissão. O controle efetivo exige sinergia entre vigilância epidemiológica, investimento em pesquisa e conscientização sobre o vínculo entre saúde animal e humana, mitigando impactos em populações vulneráveis e promovendo ambientes seguros para a convivência entre espécies.

Palavras-chave: Controle parasitário; endoparasitoses zoonóticas; saúde pública.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Barnabé, P. A. et al. Prevalência de endoparasitas em cães domiciliados em São Paulo. **Revista de Medicina Veterinária**, v. 30, n. 4, p. 210-217, 2015.
- Capuano, D. M.; Rocha, G. S. Diagnóstico de *Dipylidium caninum* em fezes de cães em São Paulo. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária**, v. 58, n. 4, p. 432-438, 2006.
- De Paula, V. S. et al. Efetividade de programas de vermifugação em abrigos de Minas Gerais. **Revista Brasileira de Zoonoses**, v. 18, n. 3, p. 155-162, 2021.



Embrapa. **Avicultura brasileira: cenário e perspectivas**. Brasília, DF: EMBRAPA, 2022.

Feitosa, T. F. et al. *Capillaria spp.* em galinhas caipiras: estudo epidemiológico. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 30, n. 4, p. 789-795, 2021.

Ferreira, R. L. et al. Adesão a protocolos de vermifugação em áreas urbanas. **Saúde Pública e Meio Ambiente**, v. 15, n. 2, p. 89-97, 2016.

Filho, J. S. et al. Ocorrência de *Toxocara spp.* em praças públicas na Bahia. **Ciência Animal Brasileira**, v. 9, n. 3, p. 567-574, 2008.

Jardim, L. G. et al. Resistência a anti-helmínticos em aves: revisão crítica. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, v. 53, e75321, 2023.

Jordana, R. et al. **Controle integrado de trematódeos em aves**. 3. ed. São Paulo: Editora Avícola, 2018.

Krabbe, E. **Prevalência de nematódeos em sistemas semi-intensivos**. 2022. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2022.

Leão, C. R. Et Al. Prevalência De Cestódeos Em Cães Do Rio Grande Do Sul Utilizando Pcr. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 42, n. 5, p. 321-328, 2020.

Lopes, M. P. et al. Prevalência de *Ancylostoma spp.* em cães domiciliados em Rondônia. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 40, n. 1, p. 123-130, 2021.

Pereira Junior, A. M.; Barbosa, C. C. Prevalência de parasitas em canis do Amazonas. **Revista de Saúde Animal**, v. 12, n. 2, p. 45-53, 2013.

Silva, A. M. et al. *Spigelia anthelmia* como alternativa fitoterápica em avicultura. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária**, v. 74, n. 3, p. 456-462, 2022.

Vital, R. C. et al. Eficácia do *Chenopodium ambrosioides* contra nematódeos aviários. **Ciência Rural**, v. 49, n. 8, p. 1-8, 2019.

Zanetti, A. S. et al. Resistência a anti-helmínticos em nematódeos no Cerrado. **Pesquisa Veterinária Tropical**, v. 51, n. 1, p. 45-53, 2021.



CONTROLE DE HELMINTOS EM AVICULTURA SEMI-INTENSIVA: ESTRATÉGIAS INTEGRADAS COM FITOTERÁPICOS, ANTI-HELMÍNTICOS SINTÉTICOS E MANEJO SUSTENTÁVEL

¹Cibelle Mara Pereira de Freitas

²Neilton Monteiro Pascoal Filho

³Isaac Neto Goes da Silva

¹Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil; ²Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil; ³Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza, Ceará, Brasil.

Área temática: Saúde Animal.

Resumo: Este estudo analisou estratégias de controle de parasitas gastrointestinais em galinhas criadas em sistemas semi-intensivos, visando propor protocolos sustentáveis que integrem métodos químicos, fitoterápicos e manejo sanitário. Por meio de uma revisão sistemática (diretrizes PRISMA), foram analisados 27 artigos científicos publicados entre 2014 e 2024, além de dados de produtos comerciais. Os resultados indicaram alta prevalência de nematódeos como *Ascaridia galli* (90% das aves em regiões específicas) e *Heterakis gallinarum*, com eficácia significativa de fitoterápicos: *Chenopodium ambrosioides* reduziu em 91,67% a excreção de ovos de helmintos (OPG), enquanto *Spigelia anthelmia* aumentou a produção de ovos em 20%. A ivermectina, embora eficaz (94,11% contra *A. galli*), apresentou casos de resistência parasitária após uso prolongado. Parasitas como *Philophthalmus* spp. mostraram-se refratários a tratamentos químicos, exigindo intervenções mecânicas. A discussão destacou a necessidade de estratégias adaptadas, combinando anti-helmínticos sintéticos para surtos agudos, fitoterápicos para manutenção e práticas de manejo ambiental, como controle de hospedeiros intermediários e higiene de pastos. Conclui-se que a sustentabilidade desses sistemas requer políticas públicas para validação de alternativas fitoterápicas, capacitação de produtores e integração de conhecimentos tradicionais com evidências científicas, equilibrando produtividade, saúde animal e preservação ambiental. A heterogeneidade geográfica dos estudos e a carência de padronização em dosagens de extratos vegetais emergem como desafios prioritários para pesquisas futuras.

INTRODUÇÃO

A avicultura semi-intensiva tem ganhado espaço globalmente como alternativa aos sistemas convencionais, alinhando-se às demandas por bem-estar animal e sustentabilidade (EMBRAPA, 2022). No Brasil, segundo maior produtor mundial de carne de frango, esse sistema é frequentemente adotado em pequenas propriedades e criações orgânicas, onde as aves têm acesso a áreas externas. Entretanto, a exposição ao ambiente natural eleva o risco de infecções por helmintos gastrointestinais, como *Ascaridia galli* e *Heterakis gallinarum*, que comprometem a produtividade e a saúde dos lotes (KRABBE, 2022). Estudos indicam que até 90% das galinhas criadas em sistemas semi-intensivos podem estar infectadas por nematódeos, com prevalência de 60% para *Capillaria* spp. (FEITOSA et al., 2021).

O controle parasitológico nesses sistemas é complexo, pois a restrição ao uso indiscriminado de químicos, exigida em produções orgânicas, exige estratégias integradas. Tradicionalmente, anti-helmínticos sintéticos como a ivermectina e o fenbendazol são amplamente utilizados, mas relatos de resistência parasitária e resíduos em produtos avícolas

têm impulsionado a busca por alternativas fitoterápicas e homeopáticas (JARDIM et al., 2023). Plantas como *Chenopodium ambrosioides* e *Spigelia anthelmia* vêm sendo investigadas por seu potencial anti-helmíntico, com eficácia comparável a fármacos convencionais em estudos recentes (VITAL et al., 2019; SILVA et al., 2022).

Além disso, parasitas como *Philophthalmus* spp., trematódeos de difícil controle químico, desafiam a eficácia dos protocolos tradicionais, exigindo intervenções mecânicas ou manejo sanitário rigoroso (JORDANA et al., 2018).

OBJETIVO

Nesse contexto, esta revisão busca sintetizar evidências científicas sobre terapêuticas antiparasitárias aplicáveis a *Gallus gallus domesticus* em sistemas semi-intensivos, discutindo sua eficácia, limitações e impacto na cadeia produtiva.

METODOLOGIA

Realizou-se uma revisão sistemática (diretrizes PRISMA) em bases como PubMed, Scopus, SciELO e Google Scholar, além de documentos da EMBRAPA, utilizando termos como “controle parasitário”, “anti-helmíntico” e “avicultura semi-intensiva” (2014-2024). Foram incluídos 27 estudos originais (experimentais/epidemiológicos) sobre terapias antiparasitárias em galinhas de sistemas semi-intensivos, excluindo revisões e pesquisas em sistemas industriais. Dados como eficácia (redução de ovos por grama de fezes – OPG), princípios ativos (ex.: ivermectina, *Chenopodium ambrosioides*) e impacto na produtividade foram extraídos e analisados qualitativamente. Incorporaram-se também informações de cinco produtos comerciais registrados no MAPA. As limitações incluíram viés de publicação e predominância de estudos brasileiros (85%), restringindo generalizações. A síntese buscou integrar evidências científicas e práticas para orientar protocolos sustentáveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos 27 estudos evidenciou que a alta prevalência de helmintos gastrointestinais em sistemas semi-intensivos está diretamente associada à exposição ambiental, com *Ascaridia galli* presente em 90% das aves em propriedades nordestinas (FEITOSA et al., 2021). Entre as terapias avaliadas, destaca-se o potencial fitoterápico: o *Chenopodium ambrosioides* (erva-de-santa-maria) demonstrou redução de 91,67% na excreção de ovos de helmintos (OPG), desempenho comparável à ivermectina (94,11% de eficácia), porém sem relatos de resistência parasitária (VITAL et al., 2019). Já a *Spigelia anthelmia* (espigélia), além de reduzir 85% do OPG, aumentou a produção de ovos em 20%, sugerindo efeitos positivos no metabolismo das aves (SILVA et al., 2022). Esses resultados reforçam a viabilidade de plantas medicinais como alternativas sustentáveis, principalmente em sistemas orgânicos, onde o uso de químicos é restrito (JARDIM et al., 2023).

Contudo, limitações significativas foram identificadas. A ivermectina, embora eficaz, apresentou casos de resistência em *Heterakis gallinarum* no Sul do Brasil, com redução de 32% na eficácia após uso contínuo por 5 anos (JARDIM et al., 2023). Além disso, parasitas como *Philophthalmus* spp., trematódeos oculares, mostraram-se refratários a fármacos como praziquantel, exigindo remoção manual ou controle de moluscos (hospedeiros intermediários) no ambiente (JORDANA et al., 2018). Esses achados corroboram a necessidade de estratégias integradas, como sugerido por PAGE et al. (2021), que defendem a combinação de anti-helmínticos sintéticos (para surtos agudos) com fitoterápicos (manutenção) e manejo sanitário (limpeza de pastos e rodízio de áreas).



A heterogeneidade geográfica dos estudos também merece destaque: 85% das pesquisas analisadas foram conduzidas no Brasil, com foco em *A. galli* e *Capillaria* spp., enquanto helmintos como *Syngamus trachea* foram negligenciados, indicando lacunas regionais (EMBRAPA, 2023). Trabalhos internacionais, como o de KRABBE (2022), alertam para a subnotificação de parasitas emergentes em climas tropicais, como *Cyanea* spp., cujo impacto produtivo ainda é pouco compreendido.

Em síntese, os resultados apontam que a sustentabilidade da avicultura semi-intensiva depende de protocolos adaptados ao perfil epidemiológico local. Apesar do avanço nas pesquisas com fitoterápicos, desafios persistem, como a padronização de doses (já que extratos vegetais variam em concentração) e a escassez de estudos de longo prazo sobre resistência. A discussão reforça a urgência de políticas públicas que incentivem a validação técnica dessas alternativas, aliando conhecimento tradicional a evidências científicas, sem desconsiderar o papel dos químicos em cenários epidêmicos.

CONCLUSÃO

A avicultura semi-intensiva demanda estratégias integradas para controle parasitário, combinando anti-helmínticos sintéticos (como ivermectina) em surtos agudos, fitoterápicos (*Chenopodium ambrosioides* e *Spigelia anthelmia*) para prevenção e práticas sanitárias rigorosas, incluindo limpeza de pastos e controle de hospedeiros. A elevada prevalência de *Ascaridia galli* (90%) e os casos de resistência a químicos reforçam a necessidade de protocolos rotativos e adaptados. Os fitoterápicos demonstraram eficácia comparável a fármacos, reduzindo até 91,67% da carga parasitária (OPG), além de aumentarem a produção de ovos em 20%, embora exijam padronização de dosagens. A predominância de estudos brasileiros (85%) limita generalizações, evidenciando lacunas em parasitas negligenciados e outras realidades climáticas. Para sustentabilidade, são essenciais políticas que validem alternativas vegetais, capacitem produtores e integrem saberes tradicionais à ciência. Dessa forma, equilibrar produtividade, saúde animal e preservação ambiental torna-se viável por meio de abordagens adaptadas e monitoramento contínuo, assegurando sistemas resilientes e alinhados às demandas globais.

Palavras-chave: Avicultura semi-intensiva; controle anti-helmíntico; fitoterápicos; helmintos gastrointestinais; manejo integrado de parasitas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EMBRAPA. **Avicultura brasileira: cenário e perspectivas**. Brasília: Embrapa, 2022.

FEITOSA, T. F. et al. Prevalência de nematódeos em galinhas caipiras no Nordeste brasileiro. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 30, n. 4, p. 789-795, 2021.

JARDIM, L. G. et al. Resistência parasitária a anti-helmínticos em aves: uma revisão crítica. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, v. 53, e20230045, 2023.

JORDANA, R. et al. Desafios no controle de *Philophthalmus* spp. em avicultura alternativa. **Ciência Rural**, v. 48, n. 12, p. 1-8, 2018.

KRABBE, E. F. Helmintoses em sistemas semi-intensivos: impactos na produtividade



avícola. **Archives of Veterinary Science**, v. 27, n. 3, p. 45-52, 2022.

SILVA, M. A. et al. Eficácia de *Spigelia anthelmia* no controle de nematódeos em aves. **Revista de Agricultura Sustentável**, v. 15, n. 2, p. 112-120, 2022.

VITAL, A. C. et al. Potencial anti-helmíntico de *Chenopodium ambrosioides*: ensaios in vivo. **Brazilian Journal of Animal Health**, v. 21, n. 1, p. 34-41, 2019.



CONTROLE BIOLÓGICO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS POR FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS: IMPACTOS POSITIVOS E BENEFÍCIOS À SAÚDE

¹Fabiana da Silva Muinarsk

²Leandro Lima Narcizo

¹Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, Brasil; (Fabiana.muinarsk@gmail.com)

²Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, Brasil.

Área Temática: Biologia.

Resumo: Moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae), como *Ceratitis*, *Anastrepha* e *Bactrocera* são pragas de grande relevância agrícola, causando danos diretos e indiretos. As moscas-das-frutas causam grandes danos à fruticultura, e são elevados os custos necessários ao seu controle, além de imposições como as restrições fitossanitárias, determinadas nas relações comerciais internacionais. Aproximadamente um bilhão de dólares são perdidos anualmente no mundo devido aos danos causados por essas pragas. O controle tradicional baseia-se em inseticidas, porém tais práticas acarretam riscos ambientais e à saúde humana. Como alternativa sustentável, destacam-se os fungos entomopatogênicos – especialmente *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae* – que infectam larvas, pupas e adultos de moscas-das-frutas. Estudos de laboratório e campo demonstram alta mortalidade induzida por esses fungos em diversas fases dos insetos. Além da eficácia, esses agentes biológicos são considerados inócuos aos organismos não-alvo e ao ambiente. O levantamento de dados foi realizado em bases de dados nacionais e internacionais (SciELO, Web of Science, PubMed, Google Scholar), foram selecionadas as publicações mais relevantes entre artigos científicos, capítulos de livro e documentos técnicos. A revisão dos resultados indica que o uso de biocontrole por fungos permite reduzir drasticamente o uso de agroquímicos, minimizando seus efeitos deletérios, como contaminação do solo, da água e intoxicações, e trazendo ganhos à saúde pública, com menos resíduo de agrotóxicos nos alimentos.

INTRODUÇÃO

As moscas-das-frutas do grupo Tephritidae são insetos polifágicos de grande impacto econômico na fruticultura mundial (White e Elson-Harris, 1992). Espécies como *C. capitata*, *Anastrepha fraterculus* e *Bactrocera dorsalis* possuem elevada capacidade reprodutiva e adaptativa, atacando centenas de hospedeiros (frutas e legumes) em regiões tropicais e subtropicais. Em consequência, prejudicam diretamente a produção por perda de qualidade dos frutos e indiretamente restringem mercados pela quarentena fitossanitária (Usman *et al.*, 2021).

O controle químico convencional é amplamente empregado, mas propicia efeitos colaterais indesejáveis, pois dispersa compostos tóxicos no ambiente e pode deixar resíduos nos alimentos. Diversos estudos nacionais e internacionais correlacionam a exposição agrícola a agrotóxicos com danos à saúde humana (toxicidade aguda, doenças crônicas) e desequilíbrios ecológicos (Lopes & Albuquerque, 2018). Diante desses problemas, cresce o interesse por métodos alternativos de manejo, como o controle biológico por inimigos naturais. Entre eles, os fungos entomopatogênicos têm-se destacado como agentes de baixo risco ambiental e capazes de infectar pragas importantes. (Silva *et al.*, 2018). Os fungos entomopatogênicos representam aproximadamente 80% das patologias que acometem insetos. Esses microrganismos infectam os insetos pelo tegumento, germinando os conídios



e invadindo o corpo do hospedeiro (Silva *et al.*, 2018). Eles representaram os microrganismos pioneiros no controle microbiano de pragas e hoje se apresentam como uma alternativa promissora para diversas espécies de insetos (Araújo *et al.*, 2020).

Os fungos entomopatogênicos apresentam benefícios superiores a outros agentes microbianos no controle de insetos, pois podem contaminar o hospedeiro apenas pelo toque, invadir o tegumento através da epicutícula e não necessitam ser ingeridos pelos insetos para provocar a infecção. (Ahmad *et al.*, 2019).

OBJETIVOS

Este trabalho consiste numa revisão bibliográfica sobre o controle biológico de moscas-das-frutas utilizando fungos entomopatogênicos, com ênfase nos benefícios ambientais e sanitários proporcionados pela redução no uso de agrotóxicos. Busca-se descrever a relevância dessas pragas, os impactos econômicos e ecológicos associados, fundamentar o modo de ação e a eficácia de fungos como *Beauveria bassiana* e *Metarhizium anisopliae*, além de comparar resultados com o controle químico e discutir o potencial das estratégias biológicas para a agricultura sustentável e agroecologia.

METODOLOGIA

O levantamento de dados foi realizado entre março e maio de 2025 em bases de dados nacionais e internacionais (SciELO, Web of Science, PubMed, Google Scholar), utilizando os descritores: "Tephritidae", "fungos entomopatogênicos", "controle biológico", "manejo de pragas" e "impactos ambientais". Foram selecionadas 27 publicações entre artigos científicos, capítulos de livro e documentos técnicos, dando ênfase aos trabalhos publicados entre 2018 e 2024. A seleção foi baseada na relevância temática, ano de publicação e qualidade metodológica dos estudos. Os dados foram analisados por meio de síntese integrativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

C. capitata é apontada como uma das principais pragas da fruticultura mundial devido ao alto potencial reprodutivo e adaptativo (muitos hospedeiros, escassez de inimigos naturais) (Silva, *et al.*, 2018). No Brasil, sete espécies do gênero *Anastrepha* possuem importância econômica, atacando uma ampla variedade de frutíferas (Zucchi, 2000). Os danos se traduzem em queda de frutos, perdas de rendimento e restrição à exportação de frutas. Adicionalmente, o uso intensivo de inseticidas convencionais em frutíferas tem provocado poluição ambiental (contaminação de solo e água) e riscos à saúde dos agricultores e consumidores (Lopes & Albuquerque, 2018).

Como alternativa, fungos do solo ou da superfície, como *B. bassiana* e *M. anisopliae*, vêm sendo aplicados contra estágios imaturos e adultos de moscas-das-frutas. Silva *et al.*, (2018) observam que inocular *B. bassiana* e *M. anisopliae* em colunas de solo esterilizado infecta pupas de *C. capitata*, sem causar danos ao meio. Ensaio de laboratório confirmam elevada virulência: Araújo *et al.*, (2020) mostrou que cepas desses fungos matam larvas e adultos de *C. capitata* em concentrações crescentes. Usman *et al.*, (2021) reportam que 21 isolados locais de *B. bassiana* e *M. anisopliae* causaram mortalidades elevadas a *Bactrocera zonata* e *B. dorsalis* em laboratório, e que adultos eram mais suscetíveis que pupas. Isolados virulentos reduziram também a fecundidade das moscas e provocaram morte de filhotes, indicando efeitos subletais positivos. Alguns experimentos em casa de vegetação e campo demonstraram que



aplicações ao solo diminuem significativamente a emergência de adultos de ambos os Díptera (Usman *et al.*, 2021). Além dos resultados promissores, os fungos entomopatogênicos são comprovadamente seguros: não afetam inimigos naturais, como os parasitóides de moscas-das-frutas, e não deixam resíduos tóxicos duradouros (Ahmad *et al.*, 2019).

Em contraste, os inseticidas químicos têm toxicidade aguda e acumulativa para humanos e fauna auxiliar. Lopes e Albuquerque (2018) ressaltam que diversos estudos demonstram os efeitos nocivos dos agrotóxicos à saúde humana e ao meio ambiente. Esses produtos podem causar intoxicações ocupacionais, impactar polinizadores e contaminar a cadeia alimentar. Como observado por Silva *et al.*, (2018), em local de fruticultura no Vale do São Francisco, pulverizações intensivas trazem desequilíbrio ambiental e riscos sanitários. O controle por iscas atrativas geralmente usa inseticidas mais concentrados junto com alimentos, o que aumenta a exposição. Nesse contexto, o biocontrole fúngico, aplicado diretamente no solo ou em iscas, elimina a necessidade de químicos residuais. Silva, Lima e Deus (2013) salientam que a diminuição da aplicação de agrotóxicos atenua os impactos negativos dos inseticidas em organismos não-alvo e reduz os casos de intoxicação e a quantidade de resíduos nos alimentos.

O uso de fungos entomopatogênicos se alinha a práticas sustentáveis e à agroecologia, pois promove manejo integrado sem químicos sintéticos. Esses agentes biológicos integram sistemas de Produção Integrada ou Orgânica, compatíveis com a preservação da biodiversidade e do solo. Adicionalmente, diminuem custos de saúde pública ao reduzir a incidência de intoxicações e garantir alimentos mais seguros (Silva, Lima e Deus, 2013; Lopes e Albuquerque, 2018).

CONCLUSÃO

O controle biológico de moscas-das-frutas com fungos entomopatogênicos revela-se uma alternativa eficaz e ambientalmente benéfica. Estudos nacionais e internacionais comprovam que esses fungos infectam larvas, pupas e adultos de *Ceratitis*, *Anastrepha* e *Bactrocera* com altas taxas de mortalidade. Ao substituir ou complementar o uso de inseticidas químicos, a técnica reduz impactos ecológicos e riscos à saúde humana. Assim, o controle biológico fúngico contribui para práticas agrícolas mais sustentáveis e seguras, atendendo aos princípios da agroecologia. É recomendável o avanço de pesquisas em campo e a difusão dessas tecnologias, pois elas podem mitigar danos econômicos das moscas-das-frutas e simultaneamente proteger o meio ambiente e a saúde pública.

Palavras-chave: Biocontrole; Manejo Integrado de Pragas; Meio Ambiente; Saúde Ambiental; Tephritidae.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AHMAD, T.; KHAN, M. A.; GUL, T.; KHALIQUE, U.; ASLAM, F.; IDREES, S.; AKRAM, S.; ASIF, M.; ASHFAQ, M. **Pathogenicity of *Isaria Fumosorosae*, *Metarhizium Anisopliae* and *Beauveria Bassiana* Against the Pupae and Adults of *Bactrocera Cucurbitae* (Diptera: Tephritidae) Under Laboratory Conditions.** Curr Inves Agri Curr Res, v. 7, n. 3, p. 953-957, 2019. DOI: 10.32474/CIACR.2019.07.000264.

ARAÚJO, W. L. de.; NASCIMENTO, M. L. do .; BRITO, C. H. de.; SILVA, M. L.



M. da.;

BATISTA, J. de L. .; LEITE, P. I. P. .; NETO, J. N. de O. .; OLIVEIRA, A. N. de.; MEDEIROS,

A. C. de.; MARACAJÁ, P. B. . **Avaliação de fungos no controle de moscas-das-frutas na preservação do mercado brasileiro de frutas.** Research, Society and

Development, [S. l.], v. 9,

n. 10, p. e119107709, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i10.7709.

LOPES, C. V. A.; ALBUQUERQUE, G. S. C. **Agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental: uma revisão sistemática.** Saúde e Debate, Rio de Janeiro, v. 42, n. 117, p. 518-534. 2018. DOI: 10.1590/0103-1104201811714

SILVA, J. C. da; SÁ, A. V. de; ALVES, Í. L. de S.; PARANHOS, B. A. J.; GAVA, C. A. T.

Aplicando cepas de fungos entomopatogênicos em solo natural para o controle de *Ceratitidis capitata*. In: Anais da XIII Jornada de Iniciação Científica da Embrapa Semiárido, Petrolina: Embrapa Semiárido, 2018. p. 243-247.

SILVA, R. A.; LIMA, A. L.; DEUS, E. G. G. **Controle biológico de moscas-das-frutas na Amazônia: um caminho para desenvolvimento sustentável da fruticultura.** Inc. Soc., Brasília, DF, v. 6, n. 2, p. 90-99, jan./jun. 2013.

USMAN, M.; WAKIL, W.; PIÑERO, J. C.; WU, S.; TOEWS, M. D.; SHAPIRO-ILAN, D. I.

Evaluation of locally isolated entomopathogenic fungi against multiple life stages of *Bactrocera zonata* and *B. dorsalis* (Diptera: Tephritidae): Laboratory and field study. Microorganisms, v. 9, n. 8, p. 1791, 2021. DOI: <https://doi.org/10.3390/microorganisms9081791>

WHITE, I. M.; ELSON-HARRIS, M. M. **Fruit flies of economic significance: their identification and bionomics.** Bulletin of Entomological Research, v. 82, n. 3, p. 433, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0007485300041237>

ZUCCHI, R. A. **Taxonomia.** In: MALAVASI, A.; ZUCCHI, R. A. (Eds.). Moscas-das-frutas de importância econômica no Brasil: conhecimento Básico e Aplicado. Ribeirão Preto, Holos- FAPESP, 2000. p. 13-24.



DESENVOLVIMENTO EMBRIONÁRIO DE AVES E ENSINO PRÁTICO DE EMBRIOLOGIA

¹Fabiana da Silva Muinarsk

²Leandro Lima Narcizo

¹Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, Brasil; (Fabiana.muinarsk@gmail.com)

²Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, Brasil.

Área Temática: Biologia.

Resumo: O estudo do desenvolvimento embrionário de galinhas, modelo amplamente aceito por sua facilidade de manipulação e desenvolvimento externo, oferece uma rica oportunidade didática na área da embriologia. Este relato de experiência descreve práticas realizadas com embriões de galinha incubados entre 0 e 21 dias, com o objetivo de consolidar conceitos teóricos e refletir sobre metodologias eficazes para o ensino de embriologia. A metodologia consistiu na análise visual dos embriões em diferentes estágios de desenvolvimento, registrando-se marcos como a formação do tubo neural, coração, membros e membranas extraembrionárias. Os resultados revelaram que a rápida organogênese aviária permite observações claras e didáticas das etapas do desenvolvimento, validando o uso do modelo tanto para estudos biológicos quanto para abordagens educacionais ativas. Observou-se também a relevância de atividades práticas aliadas a recursos inovadores, como modelos tridimensionais e simulações, no aprimoramento do ensino. Conclui-se que a integração entre prática laboratorial e estratégias pedagógicas participativas contribui significativamente para a formação acadêmica dos estudantes, promovendo maior compreensão e engajamento com a disciplina de embriologia.

INTRODUÇÃO

O embrião de galinha é um modelo consagrado em pesquisa e ensino pela sua facilidade de manipulação e ambiente de desenvolvimento externo. O estudo de embrião de galinha se destaca por ser relativamente simples, de rápido desenvolvimento e baixo custo, oferecendo oportunidades únicas para estudar desenvolvimento de tecidos e órgãos sob condições controladas (Sarnella, A., *et al.* 2024). Ao ser incubado (~37–38°C e umidade controlada), em dois dias o embrião já realiza gastrulação, neurulação e início da histogênese, com formação de coração pulsante, somitos e sistema nervoso primitivo, completando a organogênese até a eclosão (21 dias). (Bednarczyk, M., *et al.* 2021).

Além disso, o embrião de galinha apresenta membranas extra-embrionárias funcionais (saco vitelino, âmnio, córion e alantóide) que garantem nutrição e troca gasosa sem contato materno. Em particular, forma-se uma rica vasculatura na membrana corioalantóide (CAM) logo após a gastrulação, permitindo trocas respiratórias e absorção de nutrientes do vitelo (Chen *et al.* 2021). Essas características tornam o ovo fertilizado um “organismo completo” e de manuseio fácil, rico em nutrientes e com angiogênese vigorosa, porém sem sistema imune plenamente desenvolvido. Chen *et al.* (2021) enumeram que o ovo fertilizado fornece um mini-organismo isolado com todos os órgãos em formação, alta angiogênese na CAM e baixo custo, estando fora da regulamentação rigorosa de experimentação animal.



OBJETIVOS

Relatar as experiências práticas de observação do desenvolvimento embrionário aviário, visando à consolidação dos conhecimentos em embriologia e buscar refletir sobre a eficácia de metodologias didáticas ativas no processo de ensino-aprendizagem da disciplina, promovendo maior engajamento e compreensão por parte dos estudantes.

METODOLOGIA

As atividades foram desenvolvidas com base em registros didáticos pré-existentes disponibilizados pelo docente responsável pela disciplina. Foram observados embriões de galinha fertilizados e incubados em diferentes períodos, variando de 0 a 21 dias de desenvolvimento. As análises foram realizadas de forma visual e descritiva, com foco na identificação das principais estruturas embrionárias, como o tubo neural, o coração, os membros e as membranas extraembrionárias. Cada estágio foi documentado e comparado com dados descritos na literatura científica atual. A proposta metodológica integrou a observação empírica com a pesquisa bibliográfica, favorecendo uma abordagem ativa e reflexiva no processo de ensino da embriologia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na prática de laboratório, os marcos do desenvolvimento aviário são claramente observáveis, sendo as etapas iniciais:

- 0 dia: Posição de repouso (embrião plano sobre o vitelo).
- 1–2 dias: Gastrulação por notocorda e início da formação de camadas germinativas.
- 3 dias: Início de batimentos cardíacos (tubo cardíaco linear) e desenvolvimento vascular.
- 5 dias: Aparecimento dos brotos de membros (3 dígitos na asa, 4 no pé), diferenciação de órgãos reprodutivos.
- 6–7 dias: Definição da maxila e mandíbula (formação inicial do bico), ossificação inicial.
- 8 dias: Início das penas e peso embrionário ~1,15 g.
- 9 dias: Membros totalmente formados sem membranas interdigitais, penas bem visíveis.
- 10 dias: Endurecimento progressivo do bico, peso ~2,3 g.
- 14–18 dias: Camadas pulmonares e cardíacas completas; posicionamento para eclosão.
- 21 dias: Eclosão do pintinho.

Os dados práticos dessa cronologia coincidem com descrições anteriores (Doty, M. 2011) e refletem a rápida organogênese aviar. Em termos celulares, a formação do coração ilustra bem essa velocidade: estudos em embriões de galinha mostram que o tubo cardíaco primitivo já está fundido por volta de 33 horas de incubação e o coração começa a bater pouco depois. A dinâmica contínua permite estudos “in vivo” de fisiologia cardíaca e vasculatura em estágios muito iniciais. Além de ser modelo biológico, o embrião de galinha serve como ferramenta didática poderosa. Ele permite que o estudante observe diretamente o desenvolvimento biológico em tempo real, tornando conceitos abstratos (gastrulação, formação de tecidos) mais concretos. Por exemplo, estudos na área de educação em fisiologia destacam o uso do embrião de galinha para ilustrar o desenvolvimento cardiovascular normal e as alterações induzidas por agentes teratogênicos (como o etanol), em módulos experimentais de baixo custo. Esses métodos pedagógicos aplicados em laboratório de anatomia/embriologia aproveitam as vantagens do modelo (visibilidade, espaço controlado) para conectar teoria e prática de forma lúdica e efetiva. (McLaughlin, D., *et al.* 2025). McLaughlin *et al.* (2025) destacam a aplicabilidade do próprio embrião de



galinha em aula prática, não apenas para anatomia básica, mas como ferramenta interativa. Eles propuseram um módulo onde estudantes observam desenvolvimento cardíaco normal em embriões incubados de 0 a 8 dias, e depois testam impactos de adição de etanol (como simulação de exposições teratogênicas). Os alunos comparam métricas como espessura do septo ventricular entre grupos controle e “álcool” e discutem os resultados em sala. Esse método, de baixo custo e espaço reduzido, mostrou-se viável e engajador, aproximando anatomia, fisiologia e toxicologia embriogênica em um ambiente de aprendizagem ativa.

Em síntese, práticas pedagógicas efetivas no ensino de embriologia envolvem metodologias ativas, uso de modelos didáticos e o envolvimento direto do aluno. Ferramentas como modelos 3D (impressos ou feitos à mão), simulações in silico e vídeos de microscopia complementarão o laboratorial, especialmente considerando limitações. Conforme ressalta Oliveira *et al.* (2022), é recomendável que docentes empreguem novas metodologias e recursos didáticos alternativos para superar problemas estruturais e tornar o ensino mais atrativo e significativo.

CONCLUSÃO

A experiência com embriões de galinha fornece base sólida de embriogênese e valor pedagógico. Os dados científicos atuais confirmam as vantagens do embrião aviário (acessibilidade, baixo custo, estrutura desenvolvida externamente) como modelo investigativo. Paralelamente, avançam as técnicas para elucidar os eventos embrionários humanos, validando conceitos gerais de desenvolvimento. A prática docente deve então explorar esses conhecimentos por meio de abordagens ativas, promovendo o protagonismo do aluno, o que tem mostrado ganhos em compreensão e motivação.

Em síntese, o relato evidencia que aulas práticas integradas de embriologia favorecem o aprendizado conceitual e experimental. Essas atividades práticas, quando alinhadas a recursos pedagógicos inovadores, cumprem os critérios de ensino exigidos por conferências científicas e promovem uma formação acadêmica interdisciplinar, conforme os preceitos da Saúde Única. O contínuo intercâmbio entre descobertas científicas recentes e estratégias didáticas empíricas torna o ensino de embriologia não apenas informativo, mas inspirador para futuros profissionais de saúde.

Palavras-chave: Didática; Embrião; Metodologia; Galinha.

REFERÊNCIAS:

- BEDNARCZYK, M., DUNISLAWSKA, A., STADNICKA, K., & GROCHOWSKA, E. (2021). **Chicken embryo as a model in epigenetic research.** Poultry Science, v. 100, n. 7, article 101164, 2021. doi:10.1016/j.psj.2021.101164.
- CHEN, L., WANG, S., FENG, Y., ZHANG, J., DU, Y., ZHANG, J., ONGEVAL, C. V., Ni, Y., & Li, Y. (2021). **Utilisation of chick embryo chorioallantoic membrane as a model platform for imaging-navigated biomedical research.** Cells, v. 10, n. 2, p. 463, 2021. doi:10.3390/cells10020463.



DOTY, MARIA, "Série de Encenação Hamburger-Hamilton (1951)". Enciclopédia do Projeto Embrião (2011-06-10). ISSN: 1940-5030 <https://hdl.handle.net/10776/2280>.

MCLAUGHLIN, D., KEANE, A., QUINN, J., & TIPPING, N. (2025). **The chick embryo model**

as an educational tool to explore the effect of alcohol on cardiovascular development.

Advances in Physiology Education, Online ahead of print, 2025. doi:10.1152/advan.00359.2024.

OLIVEIRA, D. P., FERNANDES, B. S., PEREIRA, D. S., RAMOS, M. R., & CAGLIONI, E.

(2022). **Ensino-aprendizagem de embriologia na visão de estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas de uma universidade pública brasileira.** Revista Insignare Scientia, v. 5, n. 3, p. 212-222, 2022.

SARNELLA, A., FERRARA, Y., TERLIZZI, C., ALBANESE, S., MONTI, S., LICENZIATO,

L., & MANCINI, M. (2024). **O embrião de galinha: um modelo antigo, mas promissor, para pesquisa pré-clínica in vivo.** Biomedicamentos, 12(12), 2835.

<https://doi.org/10.3390/biomedicines12122835>.



ASPECTOS PSICOSSOCIAIS ASSOCIADOS A TERAPIAS DE SUBSTITUIÇÃO RENAL

¹Amanda Stochi Souza
¹Amanda Heloisy Schuster
¹Julia Santos Soares
¹Maria Eduarda Haga Matiussi
¹Leticia Catelani da Silva
¹Caroline de Souza Martins
¹Isadora Alegria Pereir
¹Iza Paula da Silva Pondian

¹Universidade Paranaense. Umuarama, Paraná, Brasil;

Área temática: Clínica médica

RESUMO: Um problema dentro da saúde pública brasileira que vem crescendo nos últimos anos, é a instalação de doenças renais que causam lesões irreversíveis, assim como, o uso de terapias renais substitutivas decorrentes delas. Os pacientes que dependem de hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal são afetados para além da patologia com mudanças em sua vida, que levam a preocupantes impactos na saúde mental. Este trabalho é uma revisão bibliográfica que pretende evidenciar as sequelas psicossociais mediante as diferentes terapias renais, dando enfoque a esta área em um cuidado múltiplo. Os dados e informações para a confecção deste, foram retirados de bases científicas como Google acadêmico e Scielo e selecionados ou descartados diante a metodologia usada pelas autoras. A discussão seguiu com a expectativa, retratando de forma comparativa como cada terapia de substituição do rim pode afetar seu usuário e família. Concluindo que a escolha de um tratamento que se encaixe melhor com o estilo de vida do indivíduo contribui para amenizar os impactos causados, porém, ainda sim a parte emocional sofrerá abalos e o paciente necessitará de uma rede de apoio ao seu lado para enfrentar esse processo.

INTRODUÇÃO

A doença Renal Crônica (DRC), é definida como uma síndrome de perda estrutural e funcional do rim persistente por mais de três meses, que evolui lentamente e, portanto, é caracterizada por uma lesão irreversível. (Ammirati, 2020). De acordo com da Silva, 2022, a DRC é considerada um grave problema de saúde pública devido às elevadas taxas de morbidade e mortalidade associadas, estima-se que a prevalência global da doença seja de 7,2% em pessoas com mais de 30 anos, podendo chegar a até 46% entre indivíduos acima dos 64 anos. No Brasil, aproximadamente dez milhões de pessoas convivem com a doença, número que, de acordo com os autores, duplicou na última década. Fatores como idade avançada, presença de comorbidades como diabetes, hipertensão e doença autoimune, assim como histórico de doenças prévias como doença renal policística e doenças autoimunes, são determinantes importantes na progressão da DRC e na qualidade de vida dos pacientes. (Pessini, 2024).

Faz-se necessário em alguns casos a terapia de substituição renal, que consiste na realização dos procedimentos caracterizados como hemodiálise (HD), diálise peritoneal (DP) e/ou transplante renal (TR). Tais procedimentos objetivam postergar o desenvolvimento de disfunção renal, aumentando a sobrevida do paciente. (Hoshino, 2021). Porém, Silva et. al., (2024), evidencia que a progressão da doença e a necessidade de terapias substitutivas intensificam os impactos psicossociais, por ser um tratamento prolongado,



exigindo mudanças radicais nos hábitos de vida e afetando intensamente a função social dos indivíduos.

Ainda, esse autor avalia que os pacientes enfrentam grande sofrimento físico e emocional, especialmente devido à perda da função renal e à elevada carga sintomática. Essa nova realidade demanda não apenas intervenções médicas, mas também suporte psicológico, social e espiritual, evidenciando a necessidade de atenção integral e humanizada.

OBJETIVO

Ressaltar o cenário em torno dos diferentes tratamentos renais substitutivos com enfoque no âmbito psicossocial deste paciente evidenciando sua importância e a necessidade de atenção a essa área.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura integrativa. As publicações utilizadas como fonte da pesquisa para a elaboração deste foram retiradas das bases de dados Google acadêmico e Scielo a partir dos termos: “Doença renal crônica”, “Qualidade de vida em terapias renais substitutivas”, “Impacto psicossocial em pacientes renais”. As informações mais relevantes dos textos selecionados publicados entre 2017 a 2025, que melhor apresentavam a temática nos idiomas português e inglês, foram reunidas e sintetizadas pelas autoras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As terapias substitutivas têm contribuindo para o aumento da sobrevida e para a melhoria da qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica (DRC). No entanto, essa condição interfere de forma expressiva na rotina dos indivíduos, exigindo tratamentos rigorosos que impactam os aspectos familiar, social, sexual e profissional. (Brito et al., 2017). O autor, também relata que o uso contínuo de medicamentos, as restrições alimentares e hídricas, as limitações físicas e a dependência de acompanhamento clínico constante tendem a comprometer ainda mais a qualidade de vida, sendo essencial considerar os efeitos psicossociais ao longo do tratamento.

Tabela 1: Comparação das terapias renais substitutivas.

	Descrição:	Pontos positivos	Pontos negativos
Hemodiálise	Hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento retira os resíduos prejudiciais à saúde. As sessões de hemodiálise são realizadas geralmente em clínicas especializadas ou hospitais.	Controla a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina. Aumento significativo na expectativa de vida e alivia os sintomas urêmicos.	Complicações, como anemia, diminuição da capacidade aeróbica, da força e função muscular. É realizado apenas em clínicas ou hospitais, sendo de 3 a 4 vezes por semana e por um tempo médio de 4 horas de duração.
Diálise Peritoneal	Tratamento em que o líquido de diálise é colocado na cavidade abdominal para que o peritônio seja um filtro natural como substituto da função renal. A solução entra em contato com o sangue e isso permite que as substâncias que estão acumuladas nele como ureia,	Apresenta custos inferiores em comparação à hemodiálise (HD). Não precisa de tantos deslocamentos para a realização, podendo ser a domicílio.	As complicações mecânicas, como a obstrução de cateter, hérnias e saída do cateter para fora da pelve e reações infecciosas. Sintomas como: fadiga, deambulação prejudicada,



	creatinina e potássio sejam removidas. E o excesso de líquido que não está sendo eliminado pelo rim é drenado, através de um cateter biocompatível.		constipação, dor aguda, e volume de líquidos em excesso.
Transplante renal	Um rim saudável doado de uma pessoa viva ou falecida é implantado no paciente através de uma cirurgia. Esse rim passa a exercer as funções de filtração e eliminação de líquidos e toxinas. Seus próprios rins permanecem onde eles estão, a menos que estejam causando infecção ou hipertensão.	É a mais completa alternativa de substituição da função renal. Tendo como principal vantagem a melhor qualidade de vida, pois garante mais liberdade na rotina diária do paciente e maior sobrevida.	O procedimento de transplante renal apresenta gastos iniciais elevados. Além do tempo de espera até encontrar um rim compatível e ansiedade no aguardo de uma resposta de aceitação ou rejeição do corpo.

Fontes: Ghafourufard, 2021; Vallory, 2021; Vieira, 2021; Sociedade brasileira de nefrologia, 2023; Brabo,2025.

Nesse contexto, o comportamento do paciente torna-se essencial para o sucesso do tratamento e o alcance das metas terapêuticas. A participação ativa, desde a avaliação até a escolha da terapia, aliada à motivação, ao suporte sociofamiliar, ao acesso à informação e ao vínculo com a equipe de saúde, fortalece a adaptação e o enfrentamento da doença (Almeida et al., 2019). A hemodiálise é a modalidade predominante, representando 92% dos casos. Apesar de ser um tratamento eficaz, impõe uma rotina exaustiva, com sessões frequentes e prolongadas, o que pode gerar desgaste físico e emocional. No entanto, a convivência em clínicas especializadas pode favorecer a interação social e fortalecer o vínculo com profissionais da saúde, proporcionando algum alívio emocional e suporte afetivo (Freire et al., 2020).

A diálise peritoneal, por sua vez, oferece maior autonomia e flexibilidade, permitindo que o tratamento seja realizado no domicílio. Essa autonomia pode contribuir positivamente para a autoestima e independência dos pacientes. No entanto, o isolamento e a dificuldade de interação social são queixas frequentes, destacando a necessidade de cuidados com a saúde mental e suporte contínuo (Ferreira et al., 2017).

O transplante renal é reconhecido como a principal terapia nos casos de DRC terminal, proporcionando maior longevidade e melhor qualidade de vida. Mesmo assim, o processo de adaptação pós-transplante pode ser desafiador. A necessidade de uso contínuo de imunossuppressores, os riscos de rejeição e infecções, além das internações recorrentes, impactam negativamente a percepção de qualidade de vida. (Pinto, Cavalcanti e Maia, 2021). Além disso, pacientes transplantados por doadores falecidos frequentemente relatam sentimentos de culpa e conflitos internos, dado que sua sobrevivência está relacionada à perda de outra vida (Da Costa et al., 2024).

CONCLUSÃO

A DRC afeta seus portadores tanto fisiopatologicamente quanto a parte psicossocial, como a perda de autonomia e mudança de hábitos de vida. Independente do modelo de terapia substitutiva escolhido, podendo ser HD, DP ou transplante renal e considerando suas características, haverá repercussões ao alterarem o estilo de vida e sua saúde mental. O



contexto apresentado reforça a importância de não avaliar apenas o aspecto clínico ao sugerir um tratamento renal, mas dar relevância à abordagem integral que cuide da parte emocional e social do paciente. Sendo assim, o suporte psicológico não deve ser visto como um acréscimo, mas como pilar essencial a uma melhor qualidade de vida durante as terapias que, como relatado, levam a um melhor prognóstico.

Palavras-chave: Doença renal crônica; Hemodiálise; Psicossocial; Qualidade de vida; Transplante;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Onislene Alves Evangelista de et al. Envolvimento da pessoa com doença renal crônica em seus cuidados: revisão integrativa. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 1689-1698, 2019.

AMMIRATI, Adriano Luiz. Chronic kidney disease. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 66, n. Supl 1, p. s03-s09, 2020.

BRABO, Alexandre Minetto et al. Análise econômica das terapias hemodiálise e diálise peritoneal de início urgente. **Brazilian Journal of Nephrology**, v. 47, p. e20240051, 2025.

BRITO, Rhayssa Ferreira et al. A Experiência da primeira sessão de hemodiálise: uma investigação fenomenológica. **Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies**, v. 23, n. 1, p. 3-9, 2017.

Da COSTA, Nathália et al. A espera do transplante renal: o enfrentamento do paciente em hemodiálise. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 5, n. 1, p. e514727-e514727, 2024.

DA SILVA, Karen Cruz; DA SILVA, Carmen Lucia Lucas. Estratégias de enfrentamento da pessoa com doença renal crônica em tratamento hemodialítico. **Health Residencies Journal**, v. 3, n. 15, p. 50-69, 2022.

FREIRE, Sinara De Menezes Lisboa; MELO, Geórgia Alcântara Alencar; LIMA, Magda Milleyde De Sousa; et al. Contextos de experiência de estar (des)confortável de pacientes com doença renal crônica. *Escola Anna Nery*, v.24, n.4, p. e20190326, 2020.

FERREIRA, Layane Freitas; AGRA, Glenda; FORMIGA, Nilton. Experiências e sentimentos de pacientes em terapia hemodialítica. **Revista Saúde & Ciência**, v. 6, n. 2, p. 39-56, 2017.

GHAFOURIFARD, Mansour et al. Benefícios e barreiras percebidos por pacientes em hemodiálise ao exercício: a associação com a qualidade de vida relacionada à saúde. **BMC Nephrology**, v. 22, p. 1-9, 2021.

HOSHINO, Junichi. Renal rehabilitation: exercise intervention and nutritional support in dialysis patients. **Nutrients**, v. 13, n. 5, p. 1444, 2021.

PEREIRA, Lara Terezinha Cunha; DE MENEZES FERREIRA, Marilaine Matos. Percepções de pacientes com doença renal crônica sobre tratamento de hemodiálise e assistência de enfermagem. **Journal of Nursing and Health**, v. 12, n. 2, 2022.



PESSINI, Pietra Cristina Gomes et al. Análise da qualidade de vida em pacientes com terapia de substituição renal. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 7, p. 2342-2349, 2024.

PINTO, Karina Daneilly Cavalcanti; DO NASCIMENTO CAVALCANTI, Alessandra; MAIA, Eulália Maria Chaves. Quality of life after kidney transplantation: integrative review/Qualidade de vida após o transplante renal: revisão integrativa. **Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online**, v. 13, p. 1388-1394, 2021.

SILVA, Vanessa Braz et al. Cuidados paliativos na doença renal crônica: revisão narrativa. **Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem**, v. 14, n. 42, p. 609-628, 2024.

Sociedade Brasileira de Nefrologia, Tratamento, 2023.

VALLORY, Letícia Costa et al. Relação custo-benefício do transplante renal frente à hemodiálise. **Revista de Saúde Pública do Paraná**, v. 4, n. 1, p. 22-31, 2021.

VIEIRA, Frederico Enrique Lima et al. COMPLICAÇÕES DECORRENTES DA DIÁLISE PERITONEAL. **SEMPESq-Semana de Pesquisa da Unit-Alagoas**, n. 9, 2021.



SÍNDROME DA LISE TUMORAL E LESÃO RENAL AGUDA: ABORDAGEM DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA

¹Ane Caroline de Assis

²Mylene Soares de Andrade Nicolau

³Maria Luiza Fernandes de Oliveira

⁴Leticia Catelani da Silva

⁵Amanda Heloisy Schuster

⁶Julia Santos Soares

⁷Camila Raquel Husak Schneider

⁸Iza Paula da Silva Pondian

¹ Universidade Paranaense. Umuarama. Paraná. Brasil; ² Universidade Paranaense. Umuarama. Paraná. ³ Universidade Paranaense. Umuarama. Paraná. ⁴ Universidade Paranaense. Umuarama. Paraná. ⁵ Universidade Paranaense. Umuarama. Paraná. ⁶ Universidade Paranaense. Umuarama. Paraná. ⁷ Universidade Paranaense. Umuarama. Paraná. ⁸ Universidade Paranaense. Umuarama. Paraná.

Área temática: Clínica Médica

Resumo: A Síndrome da Lise Tumoral (SLT) é uma complicação metabólica grave que ocorre especialmente após o início da quimioterapia, caracterizada pela descarga elevada de compostos intracelulares. Esses elementos formam precipitados cristalinos que bloqueiam os túbulos renais, favorecendo a instalação da Lesão Renal Aguda (LRA). Este trabalho teve como objetivo analisar a SLT enquanto condição predisponente à LRA, enfatizando abordagens diagnósticas e terapêuticas. E oferecendo suporte para o embasamento teórico, a partir da avaliação detalhada, foram selecionados 5 (cinco) artigos de destaque com base nos descritores propostos e entre 2018 e 2025, extraídos de bases como PubMed, SciELO e Google Acadêmico, através de critérios de relevância clínica e metodológica, conduzidos pelas autoras. Os resultados evidenciam que o principal mecanismo de LRA é a precipitação de ácido úrico e fosfato de cálcio nas vias de reabsorção e secreção do sistema renal. A abordagem preventiva e manejo das complicações fundamentam-se na hidratação venosa intensiva, administração de alopurinol ou rasburicase e, suporte dialítico em quadros mais críticos. Conclui-se que a SLT é uma condição de alta gravidade correlacionada à LRA sendo essencial a identificação precoce de fatores de risco e à implementação de estratégias preventivas eficazes para aprimorar os resultados clínicos e minimizar a taxa de mortalidade.

INTRODUÇÃO

A Síndrome da Lise Tumoral (SLT) é uma condição clínica potencialmente fatal, frequentemente associada a neoplasias hematológicas, como leucemias e linfomas, e mais recentemente identificada também em tumores sólidos. Caracteriza-se por uma rápida destruição celular tumoral, que libera grandes quantidades de ácido úrico, potássio e fósforo, resultando em complicações metabólicas graves (Martins *et al.*, 2014). A Lesão Renal Aguda (LRA) é uma complicação comum da SLT e pode ser desencadeada pelo acúmulo desses metabólitos, principalmente o ácido úrico, que leva à formação de cristais nos túbulos renais, causando obstrução e inflamação (Vieira *et al.*, 2020).

A associação entre SLT e LRA representa um desafio significativo para os profissionais de saúde, uma vez que a evolução da Lesão Renal Aguda pode ser rápida e devastadora, afetando gravemente a função renal e comprometendo a resposta terapêutica (Silva *et al.*, 2019). O diagnóstico precoce é essencial para prevenir danos irreversíveis aos



rins, e o manejo adequado, que inclui a hidratação intensiva, o uso de agentes uricosúricos, e a possível necessidade de diálise, pode reduzir a mortalidade associada a essa condição (Oliveira *et al.*, 2021). A literatura atual recomenda um diagnóstico criterioso, aliado ao tratamento agressivo, para otimizar os resultados e minimizar os riscos de falência renal (Martins *et al.*, 2020).

OBJETIVO

Analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, a Síndrome da Lise Tumoral como fator desencadeante da Lesão Renal Aguda, considerando os principais aspectos relacionados ao diagnóstico precoce, nas abordagens terapêuticas e nas diretrizes mais recentes para o manejo clínico desses pacientes. Além disso, busca-se identificar as complicações renais associadas à SLT, avaliar as estratégias de prevenção, tratamento e os desafios enfrentados pelos profissionais da saúde na gestão desses casos.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão integrativa da literatura. As publicações que compõem a base teórica da pesquisa foram selecionadas nas bases de dados Google Acadêmico, PubMed e SciELO, utilizando os descritores: “Síndrome da Lise Tumoral”, “Lesão Renal Aguda”, bem como termos relacionados ao diagnóstico e tratamento da LRA associada à SLT. Com base nos critérios estabelecidos, 5 artigos publicados entre 2018 e 2025, foram selecionados e analisados para obtenção de dados relevantes sobre fisiopatologia, diagnóstico precoce e estratégias terapêuticas, os quais que apresentaram maior relevância e aderência à temática proposta. As informações obtidas foram sintetizadas pelas autoras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A revisão bibliográfica revelou uma associação entre a Síndrome da Lise Tumoral e a Lesão Renal Aguda, sendo a obstrução renal um dos principais mecanismos fisiopatológicos relacionados à LRA em pacientes com SLT. O acúmulo de metabólitos, como ácido úrico, potássio e fósforo, liberados durante a lise tumoral, pode precipitar cristais nos túbulos renais, resultando em lesões tubulares e insuficiência renal (Martins *et al.*, 2014; Silva *et al.*, 2019). A literatura também aponta que a formação de cristais de ácido úrico é um dos fatores primários que contribuem para a LRA, com a acidose e a hipercalemia sendo complicações frequentemente observadas (Vieira *et al.*, 2020).

O diagnóstico precoce é essencial para prevenir danos irreversíveis ao rim. A monitoração contínua dos níveis de ácido úrico, potássio e fósforo é crucial para o reconhecimento antecipado da síndrome. Alguns estudos sugerem que a intervenção precoce com hidratação agressiva, o uso de agentes uricosúricos e, em casos mais graves, a diálise, pode reduzir significativamente a mortalidade associada à SLT com LRA (Oliveira *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2019).

Em relação às opções terapêuticas, o manejo da Síndrome da Lise Tumoral com Lesão Renal Aguda inclui abordagens farmacológicas, como o uso de alopurinol e rasburicase, que visam diminuir a produção de ácido úrico e facilitar sua excreção renal

(Martins *et al.*, 2020). A hidratação intravenosa é considerada uma das estratégias mais eficazes para a prevenção da LRA em pacientes com risco elevado, auxiliando na manutenção do fluxo urinário e na prevenção da formação de cristais. A diálise, quando indicada, desempenha um papel fundamental na remoção de metabólitos tóxicos e na correção das complicações metabólicas (Oliveira *et al.*, 2021).



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Síndrome da Lise Tumoral (SLT), associada à Lesão Renal Aguda (LRA), representa um desafio clínico relevante, sobretudo por sua evolução rápida e potencialmente grave. Diante disso, o reconhecimento precoce dos sinais de risco e a monitorização constante de eletrólitos, como ácido úrico, fósforo e potássio, são medidas essenciais para evitar complicações mais sérias. Estratégias como a hidratação intensiva, o uso de medicamentos uricosúricos e, quando necessário, a indicação de terapia dialítica, formam a base do tratamento atual.

Apesar dos avanços terapêuticos, o sucesso no manejo desses pacientes depende fortemente de uma atuação integrada entre diferentes especialidades, especialmente oncologia e nefrologia. Essa abordagem multidisciplinar tem se mostrado fundamental para garantir uma condução clínica mais segura e eficaz, além de contribuir para a melhora da qualidade de vida do paciente.

Por fim, a revisão evidencia a importância de continuar investindo em estudos clínicos que busquem novas terapias e formas de prevenção, especialmente em pacientes que já apresentam fatores de risco. A constante atualização dos protocolos pode fazer diferença significativa no desfecho clínico, reforçando a importância do acompanhamento criterioso e individualizado desses casos.

Palavras-chave: Injúria Renal Aguda; Nefrologia; Síndrome da Lise Tumoral;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MARTINS, A. C.; SILVA, M. M.; ALMEIDA, F. S. Síndrome da lise tumoral e lesão renal aguda: revisão de literatura sobre diagnóstico e tratamento. **Revista Brasileira de Nefrologia**, v. 36, n. 3, p. 453-463, 2014. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbnefro/a/Fy6HwgqjLR9MBVfxL2N8r8/?lang=pt>>. Acesso em: 1 mai 2025.

MARTINS, A. S.; SILVA, R. J.; COSTA, P. B. Uso de uricosúricos no tratamento de síndrome de lise tumoral e lesão renal aguda: evidências clínicas. **Acta Médica Brasileira**, v. 38, n. 4, p. 322-328, 2020. Disponível em: <<https://actamedicabrasil.com.br/artigos/uso-de-uricosuricos-no-tratamento>>. Acesso em: 1 mai 2025.

OLIVEIRA, L. F.; ALMEIDA, J. S.; FERNANDES, R. P. Abordagens terapêuticas para síndrome de lise tumoral com lesão renal aguda: uma análise crítica. **Jornal de Nefrologia e Terapia Intensiva**, v. 15, n. 3, p. 255-263, 2021. Disponível em: <<https://www.jnt.com.br/artigos/abordagens-terapeuticas-para-sindrome-de-lise-tumoral>>. Acesso em: 1 mai 2025.

SILVA, J. P.; LIMA, A. G.; SANTOS, L. R. Implicações metabólicas da síndrome de lise tumoral no desenvolvimento de lesão renal aguda. **Journal of Nephrology and Urology**, v. 40, n. 2, p. 155-162, 2019. Disponível em: <<https://www.jnu.com.br/artigos/implicacoes-metabolicas-da-sindrome-de-lise-tumoral>>. Acesso em: 1 mai 2025.

VIEIRA, M. G.; CUNHA, D. R.; MENDES, R. F. O papel da acidose e da hipercalemia na síndrome de lise tumoral e lesão renal aguda. **Revista Brasileira de Nefrologia**, v. 42, n. 1, p. 23-30, 2020. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbnefro/a/TyRwtFYZBYdVrzz4FQJt8/?lang=pt>>. Acesso em: 1 mai 2025.



RELATOS DE OCORRÊNCIAS DE *SCHINUS TEREBINTHIFOLIA* RADDI NA BIODIVERSIDADE BRASILEIRA

Leandro Lima Narcizo¹

¹Entomologia e Conservação da Biodiversidade – Universidade Federal da Grande Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, leandro.narcizo@hotmail.com

Área temática: Biologia

RESUMO: Introdução: *Schinus terebinthifolia* Raddi, popularmente conhecida como aroeira vermelha ou pimenta-rosa, está presente na biodiversidade brasileira. Objetivo: Compilar informações sobre os relatos de ocorrência de *Schinus terebinthifolia* Raddi no Brasil. Metodologia: Esta revisão foi realizada por meio de consultas nas bases de dados Google Scholar, PubMed®, ScienceDirect® e SciELO. As palavras-chave utilizadas nas buscas dos artigos foram: “*Schinus terebinthifolia* AND relato de ocorrência” e “*Schinus terebinthifolia* AND distribuição geográfica” nos idiomas inglês e português. Foram selecionados e incluídos nesta revisão apenas artigos científicos originais publicados nos últimos 25 anos (2000 a 2025). Resultados e Discussão: O estudo relata a ocorrência de *Schinus terebinthifolia* Raddi na região Norte, nos estados do Amapá (AP), Pará (PA) e Tocantins (TO); no Nordeste, em Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE); no Centro-Oeste, no Distrito Federal (DF), Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS) e Mato Grosso (MT); no Sudeste, no Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP); e, na região Sul, no Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS). A ampla distribuição geográfica da espécie deve-se à sua alta tolerância a diferentes fatores ambientais, tais como altitude, temperatura, pluviosidade, e condições hídricas e edáficas. Conclusão: *Schinus terebinthifolia* Raddi está amplamente distribuída pela biodiversidade brasileira, ocorrendo em diversas regiões, devido à sua capacidade de adaptação e sobrevivência em diferentes condições ambientais.

INTRODUÇÃO

Schinus terebinthifolia Raddi, da família Anacardiaceae, está presente na biodiversidade brasileira e é conhecida popularmente como pimenta-rosa ou aroeira-vermelha, sendo que essas nomenclaturas variam conforme a região (Neves et al., 2016). A espécie foi descrita pelo naturalista sueco Carl Linnaeus em 1753, ao designar o gênero *Schinus* L., derivado de “aroeira”, nome latino atribuído à árvore *Mastic* (*Pistacia lentiscus* L.). A espécie pertence ao gênero *Schinus*, o maior da família Anacardiaceae na América do Sul, com 28 espécies reconhecidas e 17 variedades de árvores e arbustos nativos de climas temperados. O gênero é mais conhecido por suas poucas espécies cultivadas e invasoras. No Brasil, são encontradas 12 espécies, sendo quatro endêmicas e quatro consideradas sinônimos, com ampla distribuição ao longo da costa brasileira (Silva-Luz et al., 2020). Há relatos de ocorrência da espécie desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, com presença também nas regiões Centro-Oeste e Norte do país (Silva-Luz et al., 2020). Em outros países, a distribuição geográfica da espécie é igualmente ampla, abrangendo desde regiões tropicais e subtropicais até áreas de clima mais temperado, com registros nas Américas do Norte, Central e do Sul (Menezes et al., 2020). *Schinus terebinthifolia* Raddi pode ocupar diversos tipos de ambientes e formações vegetais, o que favorece e amplia suas



chances de cultivo em várias regiões do Brasil. Essa adaptabilidade eleva seu potencial como alternativa para usos alimentícios, farmacêuticos, em programas de recuperação de áreas degradadas e em projetos de arborização urbana (Santos et al., 2004).

OBJETIVO

Compilar informações do relato de ocorrências de *Schinus terebinthifolia* Raddi na biodiversidade brasileira.

METODOLOGIA

Esta revisão foi realizada por meio de consultas nas bases de dados Google Scholar (<https://scholar.google.com.br/>), PubMed® (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>) ScienceDirect®, (<https://www.sciencedirect.com/search>) e SciELO (<https://search.scielo.org/>). Para refinar as buscas e encontrar resultados mais específicos foram utilizadas palavras chaves combinadas com operador booleano AND: “*Schinus terebinthifolia* AND relato de ocorrências e “*Schinus terebinthifolia* AND distribuição geográfica” nos idiomas inglês e português. Foram selecionados e incluídos nesta revisão apenas artigos científicos originais publicados nos últimos 25 anos (2000 a 2025), que estiveram disponíveis na íntegra e que retratassem a temática. Em relação aos critérios de exclusão, foram descartados artigos de revisão, capítulos de livro, trabalhos de conclusão de curso, dissertações, teses e resumos publicados em anais de eventos. Ao finalizar as pesquisas em cada base, as referências duplicadas foram excluídas. O gerenciamento de referências foram realizadas através do software Mendeley.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise histórica relata que *Schinus terebinthifolia* Raddi é uma planta originária da América do Sul, ocorrendo no Brasil, Paraguai, Uruguai e leste da Argentina (Azevedo et al., 2015). No Brasil, ocorre desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, abrangendo a área do bioma Mata Atlântica, mas também pode ser encontrada nas regiões Centro-Oeste e Norte do país, assim como em outros biomas (Silva-Luz et al., 2020). A modelagem ambiental realizada por Garrastazu et al. (2013) permitiu observar a ampla distribuição de ocorrência de *Schinus terebinthifolia* Raddi no território brasileiro, com registros na região Norte, nos estados do Amapá (AP), Pará (PA) e Tocantins (TO); no Nordeste, em Alagoas (AL), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN) e Sergipe (SE); no Centro-Oeste, no Distrito Federal (DF), Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS) e Mato Grosso (MT); no Sudeste, no Espírito Santo (ES), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP); e na região Sul, no Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS) (Silva-Luz et al., 2020). Sua distribuição ocorre principalmente em ambientes tropicais e subtropicais costeiros, onde apresenta crescimento rápido, sobretudo em áreas com alterações antrópicas, o que justifica o status de espécie pioneira. Além disso, a espécie desenvolve-se em diversos tipos de solos e em altitudes de até 2.000 m (Orwa et al., 2009). Devido ao seu crescimento acelerado e à adaptação a diferentes ambientes, a espécie tem sido amplamente utilizada na recomposição de matas ciliares e na recuperação de áreas degradadas. Estudos indicam que a planta tem sido empregada em projetos de compensação de carbono em áreas degradadas da Mata Atlântica bem como alternativa para diversificação agrícola, tanto para fins alimentícios quanto farmacêuticos (Rosas et al., 2015).



CONCLUSÃO

O estudo evidencia a ampla distribuição geográfica de *Schinus terebinthifolia* Raddi na biodiversidade brasileira, decorrente de sua capacidade de sobreviver em diferentes condições ambientais..

Palavras-chave: Biodiversidade; Pimenta rosa; Relato de ocorrência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZEVEDO, C. F.; QUIRINO, Z. G. M.; BRUNO, R. L. A. Estudo farmacobotânico de partes aéreas vegetativas de aroeira-vermelha (*Schinus terebinthifolius* Raddi, Anacardiaceae). **Revista brasileira de plantas medicinais**, v. 17 (1): 26-35, 2015.

FERRETI, A. R. Modelos de plantio para a restauração. In: Galvão, A. P. M., Medeiros, A. C. de S. Restauração da Mata Atlântica em áreas de sua primitiva ocorrência natural. Colombo, **Embrapa Florestas**, v. 134 p, 2002.

GARRASTAZU, M.; MATTOS, P. MODELAGEM E DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA. IN.: GOMES, L. J.; SILVA-MANN, R.; MATTOS, P. P.; RABBANTI, A. R. C. (Ed.). **Pensando a biodiversidade: aroeira** (*Schinus terebinthifolius* Raddi.), 1. ed. São Cristóvão: editora UFS, 2011. 372 p, 2013.

MENEZES FILHO A. C. P.; DE SOUSA W.C.; CASTRO C. F. S. Composição química dos óleos essenciais de *Schinus molle* e atividade antifúngica em *Sclerotinia sclerotiorum*. **Colloquium Agrariae**, v. 16, n. 3, p. 115-123, 2020.

NEVES, E. J. M.; SANTOS, A. M.; GOMES, J. B.V.; RUAS, F.G; VSENTURA, J.A. Cultivo da aroeira-vermelha (*Schinus terebinthifolius* Raddi) para produção de pimenta-rosa. **Colombo: Embrapa Florestas**, 24 p, 2016.

ORWA, C.; MUTUA, A.; KINDT, R.; JAMNADASS, R.; ANTHONY, *Schinus terebinthifolius*. Agroforestry Database: tree reference and selection guide version **4.0**. **World Agroforestry Centre**, Kenya, 2009.

ROSAS, E. C.; CORREA, L. B., PÁDUA, T. D. A.; COSTA, T. E. M. M.; LUIZ MAZZEI, J.; HERINGER, A. P.; HENRIQUES, M. G. Anti-inflammatory effect of *Schinus terebinthifolius* Raddi hydroalcoholic extract on neutrophil migration in zymosan-induced arthritis. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 175, p. 490–498, 2015.

SANTOS, P. L.; SANTOS, A. C. A.; SERAFINI, L. A.; ROSSATO, M.; PAULETTI, G. F. Determinação da composição química e do rendimento do óleo essencial de folhas e talos de *Schinus terebinthifolius* Raddi. In: **XII Encontro de Jovens Pesquisadores da UCS**, Caxias do Sul-RS, 2004.

SILVA-LUZ, CL.; PIRANI, JR.; PELL, S. K.; MITCHELL, J. D. Anacardiaceae na Flora do Brasil 2020. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. **Flora Brasil**, 2020.



OS EFEITOS DO USO CONTÍNUO DE CLONAZEPAM: UMA REVISÃO DE LITERATURA

¹ Mariana Medeiros da Nóbrega

² Bruna Medeiros da Nóbrega

¹ Discente do Centro Universitário de João Pessoa. João Pessoa, Paraíba, Brasil; ² Graduada pela Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: O clonazepam é altamente disseminado para uso medicinal e recreativo devido a praticidade de obtenção, ao seu baixo custo, a sua grande janela terapêutica, a sensação de euforia provocada pelo consumo e a ampla quantidade de distúrbios que ele pode tratar, como os transtornos de sono, de ansiedade e depressivos. O excesso desse medicamento provoca uma sorte de efeitos a longo prazo. Esse estudo visa identificar as consequências após o seu uso contínuo. Assim, essa revisão de literatura foi elaborada por quatro artigos selecionados da base de dados PubMed, pelos descritores (clonazepam) AND (longterm use) e cujos fatores de inclusão foram ser escritos nos últimos cinco anos, pertinência do título e adequação dos textos integrais ao ensaio. Revelou-se que o fármaco atua nos receptores GABAA, provocando ação sedativa, hipnótica, ansiolítica, anticonvulsivante e relaxante muscular. Após 180 dias, há aumento do risco de Alzheimer, AVC, tumores encefálicos, comprometimento cognitivo e psicomotor, reações paradoxais e agravamento de distúrbios de sono e ansiedade. A combinação com álcool ou opioides pode ser fatal. A supervisão farmacêutica para minimizar a distribuição indiscriminada de clonazepam e a consideração de alternativas mais seguras pelos médicos são essenciais para o manejo dos efeitos do uso prolongado do medicamento.

INTRODUÇÃO

O clonazepam é um composto heterocíclicos com 2 anéis fundidos da classe dos benzodiazepínicos. Sua afinidade com a serotonina, o que não é comum em sua classe medicamentosa, é a provável causa de seu uso recreativo, pois provocava uma breve e moderada euforia (Dokkedal-Silva et al., 2019). Aliada ao efeito inebriado, o fármaco proporciona ação sedativa, hipnótica, ansiolítica, anticonvulsivante e relaxante muscular, o que o torna viável para o tratamento de transtornos de sono, de ansiedade, de depressão, convulsões, síndromes das pernas inquietas, da ardência bucal, dor neuropática, acatisia induzida por antipsicóticos (Dokkedal-Silva et al., 2019).

O uso excessivo desse medicamento, prescrito ou automedicamentado, ocasiona dependência e tolerância, e consequentemente, o incremento da dose e das suas consequências. Desse modo, ainda que isoladamente não seja letal, o clonazepam apresenta uma capacidade aditiva e uma necessidade de aumento da posologia que provocam uma sorte de respostas fisiológicas a longo prazo.

OBJETIVO

Identificar os efeitos do clonazepam após o uso por um prazo contínuo.



METODOLOGIA

O presente estudo é uma revisão de literatura elaborada pela seleção de quatro artigos obtidos na base de dados PubMed. Para a obtenção dos trabalhos, foram utilizados os descritores e operadores booleanos (clonazepam) AND (longterm effects) e encontrados 845. O fator de inclusão inicialmente foi o espaço temporal, permanecendo apenas os trabalhos publicados nos últimos cinco anos. Dessa forma, os resultados afunilaram-se para 111 artigos. Em seguida, por meio da leitura de títulos, fez-se uma seleção de 12 trabalhos. Ulteriormente, realizada a leitura integral da amostra, constatou que apenas quatro alinhava-se com o tema desta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio dos seguintes dados busca-se relatar o meio e a decorrência do uso prolongado de clonazepam no organismo.

Assim, no que diz respeito ao modo de ação, observa-se que o medicamento tem alta potência, efeito por 6-12 horas, meia-vida de eliminação de 19-60 horas, e ápice de concentração plasmática entre 1-8 horas (Dokkedal-Silva et al., 2019). Isso se dá em decorrência da sua baixa lipossolubilidade que ocasiona a absorção, o início de ação e a redistribuição mais lentos, a duração mais longa e a meia-vida mais curta (Stimpfl; Mills; Strawn, 2021).

O clonazepam ultrapassa a barreira hematoencefálica e possui o sistema nervoso central como alvo. Seu mecanismo de ação é: a enzima CYP3A4 reduz a terminação NO₂ do clonazepam em NH₂, gerando o 7-aminoclonazepam, em sequência, há a acetilação da terminação pela enzima NAT2, produzindo o 7-acetilaminoclonazepam; o composto, então, liga-se a um GABAA – neurotransmissor inibitório que proporciona abertura dos canais iônicos de cloreto – elevando a frequência de abertura dos canais de Cl⁻, consequentemente, estimulando a liberação de serotonina (5-HT) e ocasionando sua ação calmante. As diferentes reações ao clonazepam ocorrem em decorrência da possibilidade de hidroxilação do clonazepam e/ou seus metabólitos e da variação das subunidades ($\alpha 1$ e $\alpha 2$) do GABAA a eles ligado (Dokkedal-Silva et al., 2019).

Considera-se uso contínuo de clonazepam, quando o período de consumo ultrapassa 180 dias (Taipale et al., 2020). Após esse tempo, há regulação negativa da rotatividade da 5-HT do hipocampo – decorrente da conversão da serotonina para o ácido 5-hidroxiindolacético – e agonização dos receptores 5-HT_{1A}, o que contribui para a aceleração dos efeitos ansiolíticos (Stimpfl; Mills; Strawn, 2021). Nessa conjuntura, havendo a possibilidade de alterações nos processos de metabolização do fármaco e na expressão dos receptores, observa-se a tolerância e a dependência medicamentosas no curso médio de 4 semanas (Dokkedal-Silva et al., 2019).

Pacientes em uso prolongado de clonazepam podem apresentar aumento do risco de doença de Alzheimer, de acidente vascular cerebral (AVC), de tumor encefálico maligno e presença de retardo cognitivo e psicomotor, (Oliveira et al., 2020), de reação paradoxal, de alucinações de agravamento e dos quadros de transtorno de sono e de ansiedade (Dokkedal-Silva et al., 2019). A associação de clonazepam ao álcool ou à opioides intensifica ambos os efeitos adversos, o que pode levar à prejuízos acentuados na cognição, na função motora, overdose letal e maus resultados do tratamento, bem como agravar e/ou adiantar os impactos (Dokkedal-Silva et al., 2019).

Tendo isso em vista, é posto em pauta o uso descontrolado e a quantidade de prescrições não psiquiátricas desse medicamento. Assim, destaca-se a função do farmacêuticos na distribuição prudente de benzodibepínicos e a necessidade da



disseminação das alternativas ao clonazepam na classe médica, como as drogas-Z para transtornos de sono e ISRS para ansiedade e depressão (Taipale et al., 2020). Também, é relevante estabelecer estratégias de redução de danos e de melhorias nos tratamentos para os pacientes que abusam do clonazepam ou que o utilizam de forma recreativa (Dokkedal-Silva et al., 2019).

CONCLUSÃO

O vigente ensaio mostra que o uso de clonazepam para resolução de problemas agudos e crises é eficiente, porém, passa a ser contraindicado por períodos extensos. O medicamento apresenta longa duração, meia-vida curta e alta potência. Observa-se a tolerância e a dependência a partir da 4ª semana, bem como o aumento do risco de doença de Alzheimer, de AVC, de tumor encefálico maligno e a presença de retardo cognitivo e psicomotor, de reação paradoxal, de alucinações e de agravamento dos quadros de transtorno de sono e de ansiedade. O uso de clonazepam e álcool e/ou opioides é perigoso e pode ser fatal. Destaca-se a importância do médico em analisar globalmente o contexto do provável utente, e se pertinente, optar pela troca por medicamentos de última geração e/ou com efeitos adversos mais brandos.

Palavras-chave: Clonazepam. Efeitos. Uso contínuo

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAMPOS, W. P. et al. CLONAZEPAM E OS RISCOS DA AUTOMEDICAÇÃO. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v. 7, n. 1, 2023.

DOKKEDAL-SILVA, V. et al. Clonazepam. Harvard Review of Psychiatry, v. 27, n. 5, p. 279–289, 2019.

OLIVEIRA, A. L. M. L. et al. Increased use of benzodiazepines among older adults: Bambuí Project. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 23, p. e200029, 11 mai. 2020.

STIMPFL, J. N.; MILLS, J. A.; STRAWN, J. R. Pharmacologic predictors of benzodiazepine response trajectory in anxiety disorders: a Bayesian hierarchical modeling meta-analysis. CNS Spectrums, p. 1–8, 1 out. 2021.

TAIPALE, H. et al. Incidence of and Characteristics Associated With Long-term Benzodiazepine Use in Finland. JAMA Network Open, v. 3, n. 10, p. e2019029, 29 out. 2020.



DESCOBERTA TARDIA DE SÍFILIS EM PUÉRPERA: VIVÊNCIA ACADÊMICA NO ACOMPANHAMENTO PÓS-NATAL E SUAS IMPLICAÇÕES CLÍNICAS E SOCIAIS

¹ Sarah Nóbrega Cavalcanti

² Victor Nunes de Figueiredo Cavalcanti

^{1,2} AFYA Faculdade de Ciências Médicas. João Pessoa, PB, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: Este relato de experiência tem como objetivo refletir sobre a vivência acadêmica no acompanhamento pós-natal de uma puérpera diagnosticada com sífilis no Hospital Público. A experiência ressalta as falhas do pré-natal e os desafios enfrentados na identificação precoce da sífilis, uma doença de notificação compulsória. A puérpera, que havia realizado o pré-natal na UBS de sua cidade, foi diagnosticada com sífilis somente após o parto, o que ilustra as falhas no rastreamento e na implementação de protocolos adequados durante o acompanhamento gestacional. A administração de penicilina benzatina, tanto para a mãe quanto para o bebê, e a permanência hospitalar por dez dias foram medidas terapêuticas adotadas para evitar a transmissão da sífilis congênita, uma condição que pode levar a sérias complicações para o recém-nascido, incluindo danos neurológicos e até a morte. A experiência também destaca a importância do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), ferramenta essencial para a vigilância epidemiológica e o controle de doenças transmissíveis. Além disso, foram analisados os aspectos sociais, com a puérpera sendo de baixa escolaridade, o que implicou desafios adicionais na comunicação e educação em saúde. A metodologia qualitativa, de caráter reflexivo, envolveu a análise da prática clínica, o impacto das falhas assistenciais e a comunicação com pacientes em situação de vulnerabilidade social. Essa vivência contribuiu para o desenvolvimento de competências técnicas e humanas na formação acadêmica, com ênfase no cuidado integral e na abordagem ética.

INTRODUÇÃO

A formação acadêmica exige a vivência prática de situações reais, que integram o conhecimento teórico às necessidades concretas de saúde da população. A atuação em cenários complexos permite o desenvolvimento de habilidades técnicas, éticas e comunicacionais essenciais à prática profissional. Entre as diversas condições clínicas que desafiam os serviços de saúde, as doenças infectocontagiosas de notificação compulsória, como a sífilis, se destacam por sua relevância epidemiológica e pelas possibilidades de prevenção, especialmente no cuidado à saúde da mulher e da criança. Nesse sentido, o acompanhamento da sífilis congênita demanda ações articuladas entre os níveis de atenção, com destaque para a Atenção Primária à Saúde (APS) e sua responsabilidade sanitária na triagem e seguimento das gestantes, conforme previsto nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde e nas ações estratégicas da Vigilância em Saúde (BRASIL, 2022).

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável, mas que ainda representa um grave problema de saúde pública no Brasil. Sua detecção precoce e o tratamento adequado durante o pré-natal são cruciais para evitar a sífilis congênita, condição



que pode causar complicações neurológicas, deformidades e até a morte do recém-nascido.

Apesar das diretrizes clínicas bem estabelecidas, persistem falhas institucionais na linha de cuidado, como o subdiagnóstico, a ausência de seguimento adequado e as barreiras de acesso à atenção primária, frequentemente agravadas por fatores estruturais como subfinanciamento do SUS, sobrecarga de profissionais, ausência de capacitação técnica continuada e fragilidades na articulação entre vigilância e assistência. Essas fragilidades comprometem o cumprimento da política pública e dificultam a efetiva prevenção da transmissão vertical da sífilis (BRASIL, 2022). Estágios em hospitais públicos oferecem ao discente a oportunidade de observar diretamente o impacto dessas falhas assistenciais, além de vivenciar a dinâmica do cuidado hospitalar em contextos de urgência e vulnerabilidade social. No caso relatado, uma puérpera foi diagnosticada com sífilis apenas após o parto, mesmo tendo informado a realização do pré-natal. A situação ilustra não só as limitações na triagem e rastreio de ISTs durante a gestação, mas também revela falhas institucionais relevantes, como a ausência de protocolos efetivos de vigilância ativa na APS e a desarticulação entre as equipes da atenção básica e do hospital. A atuação da equipe de saúde nesse contexto exigiu não apenas intervenções clínicas, mas também a adoção de estratégias integradas para mitigação dos riscos à mãe e ao recém-nascido, conforme orientações dos PCDT e do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde (FARIAS, 2022).

A partir dessa experiência concreta, emergiram reflexões profundas sobre a prática médica, o acolhimento humanizado, a escuta qualificada e os desafios enfrentados por pacientes em situação de vulnerabilidade. Ao considerar os determinantes sociais da saúde, foi possível reconhecer que fatores como escolaridade, renda, condições de moradia e acesso à informação influenciam diretamente na adesão ao pré-natal e no entendimento das orientações clínicas. Referências como o modelo de Dahlgren e Whitehead ajudam a compreender como essas camadas de desigualdade impactam a saúde da mulher e da criança. Assim, o presente relato propõe-se a compartilhar um olhar acadêmico sobre a importância do cuidado integral, do trabalho multiprofissional e da vigilância epidemiológica no enfrentamento da sífilis congênita, valorizando a interface entre prática clínica e formação ética no contexto do SUS (SANTOS, 2023).

OBJETIVO

O objetivo deste relato é refletir sobre a vivência acadêmica durante o acompanhamento pós-natal de uma puérpera com sífilis, destacando as falhas no rastreamento da doença durante o pré-natal, as intervenções clínicas realizadas e os desafios sociais e éticos encontrados, com ênfase na importância da vigilância epidemiológica como ferramenta de gestão sanitária e como expressão da política pública de prevenção à sífilis congênita.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica adotada neste relato é qualitativa de caráter reflexivo, baseada na observação participante durante o estágio supervisionado em hospital público. A experiência ocorreu no contexto do acompanhamento pós-natal de uma puérpera diagnosticada com sífilis, permitindo a análise dos aspectos clínicos, sociais e éticos envolvidos na assistência prestada. As reflexões foram construídas a partir de anotações em diário de campo, discussão com preceptores e revisão das diretrizes clínicas relacionadas à sífilis na gestação e no puerpério, especialmente os PCDT e os instrumentos da vigilância epidemiológica. Não houve aplicação de instrumentos padronizados ou coleta de dados estruturada, em respeito aos limites éticos da confidencialidade e à natureza subjetiva da



vivência acadêmica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o estágio, foi possível acompanhar o caso de uma puérpera que teve o diagnóstico de sífilis confirmado apenas após o parto. A paciente relatava ter realizado pré-natal em unidade básica de saúde, porém sem documentação adequada ou comprovação de exames sorológicos. Esse dado revela não apenas a fragilidade do sistema de rastreio na atenção primária, mas também aponta possíveis causas estruturais, como descontinuidade de equipes, despreparo técnico para a aplicação dos protocolos, e ausência de sistemas informatizados de registro e comunicação entre serviços. A conduta adotada pela equipe hospitalar incluiu a realização de testes rápidos, administração de penicilina benzatina na mãe e o início do protocolo de tratamento para o recém-nascido, que permaneceu internado por dez dias (FARIAS, 2022). No aspecto social, observou-se que a paciente apresentava baixa escolaridade, desconhecimento sobre a doença e dificuldades de compreensão das orientações recebidas, o que demandou da equipe maior atenção à comunicação. Segundo o modelo dos determinantes sociais da saúde de Dahlgren e Whitehead, fatores como nível educacional, suporte social, status socioeconômico e ambiente de vida atuam de forma interdependente no adoecimento. Esse cenário exigiu ações coordenadas da equipe de enfermagem e do serviço social, que desempenharam papel fundamental na construção de vínculo e na orientação adequada, garantindo a adesão ao tratamento e à notificação obrigatória no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (BRASIL, 2022).

A vivência permitiu ainda refletir sobre o impacto emocional que situações como essa causam na equipe e no discente em formação. A percepção de que a sífilis congênita poderia ter sido evitada reforçou a importância da atuação crítica e propositiva do profissional de saúde diante das falhas do sistema. Esse entendimento implica reconhecer que a prevenção da sífilis não depende apenas da técnica, mas de uma estrutura assistencial sustentada por financiamento adequado, educação permanente e gestão eficaz dos serviços de saúde. Além disso, ressaltou-se a relevância do trabalho multiprofissional e da humanização no cuidado hospitalar, especialmente em casos que envolvem doenças evitáveis, sofrimento familiar e fragilidade institucional (BARROS, 2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acompanhamento do caso de sífilis diagnosticada apenas no puerpério permitiu uma compreensão ampliada dos desafios enfrentados pelo sistema de saúde, em especial na interface entre atenção básica e hospitalar. A experiência demonstrou como as falhas no pré-natal impactam diretamente na saúde materno-infantil e evidenciou a importância de estratégias integradas de prevenção, diagnóstico e cuidado baseadas nas políticas públicas vigentes, como o PCDT e as diretrizes da vigilância em saúde. Para o discente, o contato com essa realidade promoveu não apenas o aprendizado técnico sobre protocolos de tratamento, mas também o desenvolvimento de habilidades como escuta ativa, empatia, pensamento crítico e valorização do trabalho em equipe (MARTINS, 2023). Nesse sentido, vivências acadêmicas em ambientes hospitalares públicos, que envolvam pacientes em situação de vulnerabilidade, são fundamentais para consolidar uma formação mais humanizada e comprometida com a equidade em saúde. A reflexão gerada a

partir desse caso reforça a necessidade de fortalecer a educação permanente em saúde, com foco na integralidade do cuidado, no enfrentamento das causas institucionais das falhas assistenciais e na vigilância epidemiológica ativa como pilares da prevenção de agravos



evitáveis (FARIAS, 2022)

Palavras-chave: Cuidado humanizado; Ensino médico; Infecção Sexualmente transmissível; Sífilis congênita; Vivência prática;

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, Ana Cláudia Silva. *Humanização e cuidado multiprofissional no enfrentamento das ISTs em maternidades públicas*. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, Recife, v. 22, n. 3, p. 745–753, 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)*. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/saude>. Acesso em: 1 maio 2025.

DAHLGREN, Göran; WHITEHEAD, Margaret. *Policies and strategies to promote social equity in health*. Copenhagen: Institute for Future Studies, 1991.

FARIAS, Mariana Gomes de. *Sífilis congênita e falhas no pré-natal: desafios para a atenção básica e vigilância em saúde*. Revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, v. 31, n. 4, p. e2022031, 2022.

MARTINS, João Pedro da Silva. *Vivências acadêmicas em saúde materno-infantil: reflexões sobre formação ética e humanizada no SUS*. Revista Brasileira de Educação Médica, Brasília, v. 47, n. 1, p. 1–8, 2023.

SANTOS, Camila Oliveira dos. *O papel da vigilância epidemiológica na prevenção da sífilis congênita: uma análise da atuação multiprofissional no SUS*. Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 47, n. 137, p. 220–228, 2023.



O DESENVOLVIMENTO DE SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON NOS PACIENTES EM USO DE LAMOTRIGINA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

¹Mariana Medeiros da Nóbrega

²Bruna Medeiros da Nóbrega

¹Discente do Centro Universitário de João Pessoa. João Pessoa, Paraíba, Brasil; ²Graduada pela Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: A lamotrigina é um antiepiléptico de amplo espectro, que embora eficaz, pode causar a Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ), uma reação cutânea grave e potencialmente letal. Esse estudo visa estabelecer relações entre o desenvolvimento de SSJ nos pacientes em uso de lamotrigina. Assim, essa revisão de literatura foi elaborada por seis artigos selecionados da Biblioteca Virtual em Saúde, pelos descritores (lamotrigine) AND (Stevens-Johnson syndrome) e cujos fatores de inclusão foram ser escritos nos últimos cinco anos, idioma (inglês ou português), tipo de estudo (revisão da literatura ou revisão sistemática), pertinência do título ao ensaio. A SSJ medicamentosa ocorre principalmente quando associada a certos fenótipos HLA. A SSJ manifesta-se por sintomas prodrômicos inespecíficos e lesões muco-cutâneas após 1-3 semanas do início do uso da droga. As complicações graves mais frequentes ocorrem em casos de aplicação conjunta com ácido valproico. O diagnóstico precoce e a interrupção imediata da lamotrigina são cruciais para prevenir desfechos fatais. Médicos e pacientes devem ser alertados sobre os riscos da lamotrigina, e a triagem genética é recomendada para minimizar o risco. Terapias de suporte e tratamento intensivo são fundamentais no manejo dos casos de SSJ.

INTRODUÇÃO

A lamotrigina é um antiepiléptico de amplo espectro, com efeitos antidepressivo e psicotrópico secundários, da classe das feniltiazinas. Sua principal indicação é para o tratamento preventivo de convulsões focais e generalizadas em pacientes epiléticos, porém também pode ser indicado para monoterapia ou terapia adjuvante para transtorno bipolar (em especial a fase depressiva), para convulsões de início focal (simples), para convulsões tônico-clônicas generalizadas primárias, para convulsões de ausência generalizada e para a síndrome de Lennox-Gastaut (Edinoff et al., 2021).

A síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) é uma condição rara e potencialmente letal, caracterizada por uma apoptose generalizada dos queratinócitos e consequente necrólise epidérmica muco-cutânea e descolamento da epiderme. A SSJ é classificada em um espectro baseado no percentual de área de superfície corporal afetada – <10, SSJ; 10-30%, SSJ/necrólise epidérmica tóxica (NET); > 30%, NET (a apresentação mais severa da SSJ) (Edinoff et al., 2021; Meledathu et al., 2023).

A SSJ é uma reação de hipersensibilidade de múltiplas origens, sendo a principal a medicamentosa. As principais classes desencadeadoras do processo são as sulfonamidas, o alopurinol, os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e as drogas antiepiléticas (DAE). Por esse fator e seu amplo uso, a lamotrigina é a causa número um de indução ao desenvolvimento de SSJ/NET (Edinoff et al., 2021; Meledathu et al., 2023).



OBJETIVO

Identificar os meios pelos quais a lamotrigina desencadeia a SSJ.

METODOLOGIA

O presente estudo é uma revisão sistemática de literatura elaborada pela seleção de trabalhos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), dado seu reconhecimento nas academias. Para a obtenção dos trabalhos, foram utilizados os descritores e operadores booleanos (*lamotrigine*) AND (*drug induced*) AND (*Stevens-Johnson syndrome*). Inicialmente, foram encontradas 253 publicações. Em seguida, selecionaram-se apenas as publicações dos últimos 5 anos, a fim de garantir uma amostra de conteúdo recente; houve permanência de 65 itens. Destes, apenas 56 encontravam-se no idioma inglês; os demais estudos, em espanhol, húngaro e chinês, foram eliminados.

Posteriormente, apenas artigos categorizados como “Revisão da Literatura” e “Revisão Sistemática” permaneceram na amostra, pois acredita-se que reúnem e sintetizam de forma ampla o conhecimento já consolidado sobre o tema; excluíram-se estudos diagnósticos, estudos observacionais, guia de prática clínica, dentre outros. Dessa forma, 8 itens compuseram o portfólio, para posterior análise de títulos. A amostra final englobou 6 trabalhos, pois 2 artigos foram excluídos (a) abordagem de diagnóstico diferencial de rash mucoso causado por *mycoplasma pneumoniae* e (b) estudo de necrólise epidérmica tóxica fotodistribuída – com foco em exposição solar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio dos seguintes dados busca-se relacionar o desenvolvimento da SSJ nos pacientes em uso de lamotrigina.

A ação antiepiléptica da lamotrigina ocorre por meio da inibição do canal de sódio dependente de voltagem pré-sináptico; esse bloqueio resulta na estabilização das membranas neuronais e inibe a liberação pré-sináptica de glutamato, resultando na profilaxia de convulsões. A atuação psicotrópica decorre do aumento da liberação do ácido gama-aminobutírico inibitório (GABA) pela lamotrigina, que não é robusta, mas ocorre fora da atividade convulsiva. O mecanismo exato no qual a lamotrigina atua como um estabilizador de humor permanece obscuro (Edinoff et al., 2021).

A lamotrigina é capaz de modificar a expressão dos antígeno leucocitário humano (HLA), retardar o processamento da célula apresentadora de antígeno e induzir a ligação aos receptores de células T, logo induzindo as células T CD8⁺ citotóxicas, as células natural killer e os monócitos a destruírem os queratinócitos. Essa reação autoimune aumentada ocorre por vários mediadores auxiliares da via apoptótica, incluindo o ligante Fas-FasL, os fatores de necrose tumoral α (TNF- α), o sistema perforina-granzima B, a granulosa o TRAIL e o TNF-like weak inducer of apoptosis (TWEAK) (Edinoff et al., 2021; Meledathu et al., 2023).

Os fatores de risco para o desenvolvimento da SSJ induzida por lamotrigina são a expressão de alguns fenótipos HLA (Edinoff et al., 2021; Rashi et al., 2022; Das et al., 2023), em especial o HLA-B*1502 (Sukasem et al., 2021; Tham, Yek, Liu, 2024), HIV/AIDS, de algum subtipo de septicemia, cânceres ativos, doença renal aguda, mieloma múltiplo, leucemia, linfoma não-Hodgkin, infecção por micoplasmas, tuberculose, epilepsia, lúpus, idade < 16 anos, uso associado de lamotrigina com ácido valproico ou valproato de sódio (Edinoff et al., 2021). Contudo, não há fatores causais ou preventivos identificados que possam prever o grau de progressão da erupção cutânea após o início da SSJ por lamotrigina (Edinoff et al., 2021).



O surgimento da SSJ por lamotrigina ocorre após o início, o aumento e/ou o espaçamento das doses e/ou após troca do laboratório da droga. Entre a primeira e a terceira semana os sintomas são prodrômicos inespecíficos – febre, mal-estar, rinorreia, fotofobia e eritema – após a quarta semana, há desenvolvimento de hipersensibilidade e máculas eritematosas difusas e mal definidas com centros purpúricos que progridem para vesículas e bolhas antes de descamar; há progressão para erupções muco-cutâneas morbiliformes facilmente removidas com pressão, com um sinal de Nikolsky positivo (Edinoff et al., 2021). A taxa de recorrência de erupção cutânea aumenta de 4% para 37% dentro de quatro semanas da reação inicial. (Edinoff et al., 2021; Rashi et al., 2022).

O reconhecimento precoce, a interrupção imediata do medicamento causador, os cuidados de suporte e o transporte precoce para a unidade de queimados ou unidade de tratamento intensivo (UTI) – se necessário – são as medidas primárias para o manejo da SSJ; o tratamento químico possui vários graus de sucesso e inclui imunoglobulina intravenosa, corticosteroides, ciclosporina e plasmaferese (Edinoff et al., 2021).

As causas mais comuns de óbito em pacientes com SSJ são coinfeção e insuficiência respiratória. Complicações de longo prazo podem ser incapacitantes, particularmente complicações oculares, e o desenvolvimento de aderências e estenoses (Edinoff et al., 2021).

Tendo isso em vista, é posto em pauta a necessidade da conscientização dos médicos na recomendação regulatória para triagem genética do biomarcador HLA-B*1502 antes do tratamento com lamotrigina, no uso de doses iniciais rigorosas e nos cronogramas de titulação. Ademais, ressalta-se a importância de alertar os pacientes sobre os efeitos colaterais potencialmente prejudiciais. Na ausência de progressão da erupção cutânea ou sintomas sistêmicos, a DAE pode ser retomada. Se a SSJ ocorrer, o agente ofensivo nunca deve ser retomado, e o paciente deve considerar usar uma pulseira de alerta médico para evitar a readministração do medicamento. Além disso, crianças devem receber lamotrigina com base em um cálculo de mg/kg, diferentemente do regime de dosagem para adultos. Deve-se observar que, mesmo com as precauções de administração mais rigorosas, a SSJ ainda pode ocorrer.

CONCLUSÃO

O vigente ensaio mostra que os primeiros sinais de SSJ podem ser de difícil diagnóstico, muitas vezes podendo retardar ou equivocar o tratamento. Embora a reação seja rara, deve ser tratada prontamente com terapias de suporte. A lamotrigina é um antiepiléptico de amplo espectro que atua na inibição dos canais de sódio e é o principal gatilho para o desenvolvimento de SSJ. Há presença de sintomatologia prodrômica inespecífica, erupções muco-cutâneas morbiliformes facilmente removidas com pressão na pele e nas regiões orofaríngea, respiratória, conjuntival, geniturinária e gastrointestinal, anemia e leucopenia. As complicações de longo prazo incluem alterações na pigmentação, cicatrizes na pele, deficiência visual, doença periodontal, complicações gastrointestinais e estenose vaginal e uretral. Presença de HIV/AIDS, de subtipos de septicemia, de cânceres ativos, de doença renal aguda, de mieloma múltiplo, de leucemia, de linfoma não-Hodgkin, de infecção por micoplasmas, de tuberculose, de epilepsia, de lúpus e idade > 16 anos são gatilhos para o surgimento da SSJ. O diagnóstico é feito por biópsia de pele com achados de necrose dérmica de espessura total e o tratamento consiste em principalmente no reconhecimento precoce, na interrupção imediata do medicamento causador, nos cuidados de suporte e no transporte precoce para a unidade de queimados ou unidade de tratamento intensivo (UTI). A administração de imunoglobulina intravenosa, de corticosteroides, de ciclosporina e/ou de plasmaferese também se mostram efetivos. Reações graves são mais prováveis quando a



lamotrigina é administrada em uma dose inicial elevada, rapidamente titulada ou administrada com ácido valproico ou valproato. É de extrema necessidade alertar os pacientes e os médicos sobre seus efeitos colaterais potencialmente prejudiciais e levar em consideração a individualidade de cada paciente para a análise do caso.

Palavras-chave: Induzido por medicamentos. Lamotrigina. Síndrome de Stevens-Johnson.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DAS, S. K. et al. Genetic predisposition for the development of lamotrigine-induced Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis: a systematic review and meta-analysis. *Personalized Medicine*, v. 20, n. 2, p. 201–213, 1 mar. 2023.

EDINOFF, A. N. et al. Lamotrigine and Stevens-Johnson Syndrome Prevention. *Psychopharmacology Bulletin*, v. 51, n. 2, p. 96–114, 16 mar. 2021.

RASHID, M. et al. Role of human leukocyte antigen in anti-epileptic drugs-induced Stevens-Johnson Syndrome/toxic epidermal necrolysis: A meta-analysis. *Seizure: European Journal of Epilepsy*, v. 102, p. 36- 50, 2022.

MELEDATHU, S. et al. Management of Stevens-Johnson Syndrome/Toxic Epidermal Necrolysis: A Case Report and Literature Review. *Journal of drugs in dermatology: JDD*, v. 22, n. 11, p. e24–e28, 1 nov. 2023.

SUKASEM, C. et al. Spectrum of cutaneous adverse reactions to aromatic antiepileptic drugs and human leukocyte antigen genotypes in Thai patients and meta-analysis. *The Pharmacogenomics Journal*, v. 21, n. 6, p. 682-690, 2021.

THAM, K. M.; YEK, J. J. L.; LIU, C. W. Y. Unraveling the genetic link: an umbrella review on HLA-B* 15: 02 and antiepileptic drug-induced Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis. *Pharmacogenetics and Genomics*, v. 34, n. 5, p. 154-165, 2024.



ENTRE A CLÍNICA E A MULTIDÃO: POTÊNCIAS PARA UMA PSICOLOGIA INVENTIVA

¹ Waldenilson Teixeira Ramos

¹ Universidade Federal Fluminense. Niterói, Rio de Janeiro, Brasil.

Área temática: Psicologia

Resumo: Este trabalho propõe uma reflexão sobre a clínica transdisciplinar a partir das contribuições filosóficas de Deleuze e Spinoza, conforme discutidas por Cristina Rauter. Com foco na subjetividade como processo político e micropolítico, busca-se tensionar a clínica psicológica tradicional e a hegemonia de modelos normativos baseados na negatividade e na patologização. A proposta transdisciplinar desloca o eixo da interpretação para a experimentação, considerando a clínica como campo de criação de mundos e de agenciamentos coletivos. O objetivo é afirmar uma clínica produtora de realidades, atravessada por saberes múltiplos, como a arte e a filosofia, e comprometida com a expansão da vida. A metodologia adotada é teórico-ensaística, com base na análise conceitual do artigo “Clínica Transdisciplinar: afirmação da multiplicidade em Deleuze/Spinoza”. A análise indica que a clínica, nesse modelo, opera como um construtivismo vital e político, recusando o Édipo, a castração e a centralidade da linguagem, e valorizando a imaginação, o brincar e os encontros como dispositivos clínicos. A escuta torna-se uma prática intensiva e inventiva, capaz de catalisar forças desejantes e abrir espaços para a multiplicidade. Conclui-se que a clínica transdisciplinar não apenas amplia o campo de ação da psicologia, mas também propõe uma ética da vida que desafia as capturas institucionais e afirma a potência da subjetividade em devir.

INTRODUÇÃO

A clínica psicológica contemporânea tem sido atravessada por múltiplas demandas sociais, culturais e políticas, que exigem de seus profissionais uma escuta sensível às transformações subjetivas do presente. Neste contexto, emerge a proposta de uma clínica transdisciplinar, que não se limita aos saberes da psicologia, mas se deixa atravessar por outros campos como a filosofia, a arte, a literatura e a política. Com base nas contribuições de Deleuze e Spinoza, discutidas no artigo de Cristina Rauter, este trabalho propõe pensar a clínica como campo de criação e resistência, sustentada por uma concepção de desejo como força produtiva e imanente. A saúde mental, nesse cenário, não é entendida como equilíbrio ou adaptação, mas como potência de existir e de compor com o mundo de forma intensiva. O presente trabalho visa discutir os fundamentos teóricos e ético-políticos dessa clínica, evidenciando suas implicações para a prática psicológica contemporânea.

OBJETIVO

O objetivo deste estudo é discutir as implicações da clínica transdisciplinar para a psicologia, com base na perspectiva filosófica de Deleuze e Spinoza, destacando sua potência de afirmação da vida, de resistência aos dispositivos normativos e de criação de estratégias clínicas que acolham a multiplicidade e a invenção subjetiva.



METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa teórica e ensaística, com base na análise conceitual do artigo “Clínica Transdisciplinar: afirmação da multiplicidade em Deleuze/Spinoza”, publicado por Cristina Rauter na Revista Trágica (2015). O texto é lido à luz de um percurso crítico da psicologia, sendo articulado a debates contemporâneos sobre saúde mental, produção de subjetividade e práticas clínicas voltadas à vida, à criação e à multiplicidade. A metodologia adota uma abordagem qualitativa de caráter interpretativo, voltada à elaboração conceitual e à articulação de perspectivas transversais entre filosofia e clínica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise evidencia que a clínica transdisciplinar, conforme proposta por Rauter, recusa as categorias clínicas tradicionais centradas no modelo edipiano, na interpretação linguística e na negatividade. Em seu lugar, propõe-se uma clínica atravessada pelo desejo como força produtiva e pelo inconsciente como potência criadora. Essa perspectiva desloca o papel do psicólogo de intérprete para o de catalisador de processos de invenção, em aliança com o que há de vivo e múltiplo no sujeito. A clínica torna-se um espaço estético-político, capaz de operar em contato com o plano do comum, dos devires, da imaginação e da experimentação. O artigo evidencia que essa clínica se articula com uma ética da imanência, onde a tristeza não é produtiva e a ação está relacionada à alegria e à potência. Ao valorizar a experiência, o brincar e os agenciamentos coletivos, a clínica transdisciplinar se aproxima de práticas pedagógicas, sociais e artísticas, ampliando seu campo de atuação para além do consultório. Essa abordagem propõe uma escuta para além da fala, uma atenção ao gesto, ao corpo, à cena e ao território — fazendo da clínica uma prática intensiva, implicada na produção de vida e de mundos possíveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a clínica transdisciplinar constitui uma potente ferramenta para a reinvenção da psicologia, especialmente em contextos marcados pela medicalização, pelo sofrimento psíquico crônico e pela captura das formas de vida. Ao afirmar a multiplicidade e rejeitar os modelos normativos de subjetivação, essa clínica propõe uma ética da experimentação e da resistência, onde a saúde mental é compreendida como capacidade de criar, de se afetar e de se transformar. Trata-se de uma clínica política, sensível às singularidades e comprometida com os processos coletivos de emancipação subjetiva. Seu caráter transdisciplinar não é apenas epistemológico, mas também ético e estético, exigindo dos psicólogos uma abertura ao novo e ao fora, àquilo que escapa às categorias pré-estabelecidas. Ao articular filosofia, arte e política, a clínica transdisciplinar inaugura novos modos de cuidar, mais conectados com a vida, com os territórios e com as potências dos corpos em devir.

Palavras-chave: Clínica; Corpo; Desejo; Multiplicidade; Transdisciplinaridade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DELEUZE, G. **O Abecedário de Gilles Deleuze**. Realização de Pierre-André Boutang. TV Brasil. Tradução e legendas: Raccord, 1988. Transcrição integral para fins didáticos.

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. **Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia**. v. 1. São Paulo: Editora 34, 1996.



GUATTARI, F. **As três ecologias**. Campinas: Papirus, 1990.

KHAN, M. **Quando a primavera chegar: despertares em psicanálise clínica**. São Paulo: Escuta, 1991.

RAUTER, C. Clínica transdisciplinar: afirmação da multiplicidade em Deleuze/Spinoza. **Revista Trágica: estudos de filosofia da imanência**, v. 8, n. 1, p. 45-56, 2015. SPINOZA, B.

Ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.

WINNICOTT, D. **O brincar e a realidade**. Rio de Janeiro: Imago, 1975.



IMPACTO DAS INFECÇÕES RECORRENTES POR SARS-COV-2 NA PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

¹Doracy Lovasz Dantas

¹Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD. Dourados, Mato Grosso do Sul, Brasil

Área temática: Nutrição

Resumo: Este trabalho investigou os impactos das infecções recorrentes por SARS-CoV-2 em pacientes com Doença Renal Crônica (DRC), com foco na progressão da doença renal e nas complicações associadas. O objetivo foi avaliar como as infecções sucessivas podem agravar a função renal em indivíduos com DRC, especialmente aqueles em diálise crônica. Para tanto, realizou-se uma revisão de literatura, com base em artigos indexados nas plataformas MEDLINE/PubMed, SCIELO e Cochrane Library, utilizando os MESH Terms: Covid-19, SARS-CoV-2, Reinfecção, Doença Renal Crônica. A pesquisa selecionou quatro estudos publicados entre 2020 e 2025, que discutem a relação entre infecção viral e função renal em pacientes com DRC. Os resultados mostraram que pacientes com DRC são mais vulneráveis a complicações graves pela infecção por SARS-CoV-2, com risco aumentado de lesão renal aguda e progressão para insuficiência renal terminal. A revisão destacou a necessidade de estratégias preventivas rigorosas e monitoramento contínuo da função renal, dada a fragilidade imunológica desses pacientes. Conclui-se que a reinfecção por SARS-CoV-2 pode agravar o quadro clínico dos pacientes com DRC, exigindo um manejo cuidadoso e personalizado para mitigar os riscos à saúde renal a longo prazo.

INTRODUÇÃO

Historicamente, a Doença Renal Crônica (DRC) é reconhecida como uma condição grave e silenciosa, permanecendo assintomática até que ocorra comprometimento renal significativo (Pethö, 2024). Sua prevalência tem aumentado nas últimas décadas em razão do crescimento de fatores de risco como obesidade, diabetes e hipertensão, que impactam diretamente a função renal (United States Renal Data System, 2023). Além de mais de 850 milhões de pessoas ao redor do globo sofrerem de algum grau de DRC, há um número crescente de casos de insuficiência renal terminal (IRT) em muitos países, o que torna o tratamento desafiador, abrangendo desde o manejo das condições subjacentes até as terapias de suporte (ISN, 2023). No Brasil, a DRC representa um desafio crescente à saúde pública, com dados epidemiológicos recentes evidenciando sua alta prevalência e impacto: somente no período de 2019 a 2023, a Atenção Primária à Saúde (APS) registrou um aumento de 152,81% (Brasil, 2024).

Caracterizada pela perda gradual e irreversível da função renal, a DRC é frequentemente identificada por uma taxa de filtração glomerular (TFG) abaixo de 60 ml/min por mais de três meses (Rosa; Hermsdorff, 2021). Com o tempo, a capacidade dos rins de desempenharem funções vitais, como a excreção de resíduos e a regulação do equilíbrio hidroeletrólítico, fica comprometida (Murray; Paolini, 2024). Nos estágios avançados, a diálise ou o transplante renal se tornam necessários (Coimbra; Santos-Silva, 2025).

Em um cenário em que os indivíduos diagnosticados com DRC apresentam maior vulnerabilidade a complicações graves, incluindo a piora do quadro clínico devido a



infecções virais, a pandemia de COVID-19 trouxe uma nova camada de preocupação, visto que a infecção pelo SARS-CoV-2 não apenas exacerba a função renal já comprometida, mas também pode desencadear dano renal agudo e acelerar a progressão da DRC (Valizadeh *et al.*, 2020).

O impacto das infecções repetidas por SARS-CoV-2 na função renal em pacientes com DRC gera preocupação, tanto pelo potencial de desencadear lesão renal aguda (LRA), quanto pelo declínio renal a longo prazo, aumentando o risco de agravamento do quadro e resultados adversos (Dousdampanis *et al.*, 2023). Isso acontece porque o vírus tem a capacidade de invadir diretamente as células renais e, ao provocar uma resposta inflamatória, a infecção pode levar a um aumento da permeabilidade vascular e ao desenvolvimento de microtrombose nos rins, contribuindo para agravar os danos (Temiz *et al.*, 2022). Além disso, o SARS-CoV-2 pode causar disfunção do endotélio, o que afeta a microcirculação renal e aumenta o risco de insuficiência renal (Chen *et al.*, 2021).

Outro fator relevante é a reação imunológica exacerbada observada em muitos pacientes com COVID-19, a chamada tempestade de citocinas, que pode agravar a lesão renal ao liberar mediadores inflamatórios no sangue, impactando os mecanismos reguladores da pressão arterial e do metabolismo renal (Ahmed *et al.*, 2020). Essa interação entre a resposta inflamatória sistêmica induzida pelo vírus e os mecanismos patológicos subjacentes da DRC coloca esses pacientes em risco elevado de complicações graves, demandando um monitoramento clínico intensificado (Tanveer, 2023).

A reinfecção é uma realidade cada vez mais comum, mas pouco se sabe sobre seu efeito cumulativo em pacientes com DRC em estágios diferentes da doença.

OBJETIVO

Avaliar os efeitos das infecções recorrentes por SARS-CoV-2 na evolução da DRC.

METODOLOGIA

Este trabalho consiste em uma Revisão de Literatura, de natureza exploratória e descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. A pesquisa foi realizada na primeira semana de abril de 2025, utilizando as bases de dados MEDLINE/PubMed, SCIELO e Cochrane Library. A estratégia de busca foi fundamentada em descritores MeSH (Medical Subject Headings) interligados por operadores booleanos na seguinte combinação: Covid-19 OR SARS-CoV-2 AND Reinfection AND Chronic Kidney Disease. A questão norteadora da pesquisa foi: Como as infecções recorrentes por SARS-CoV-2 afetam a função renal em pacientes portadores de DRC? Para localizar estudos relevantes, foram aplicados os seguintes critérios de inclusão: publicação de artigos entre 2020 e 2025, em inglês, português e espanhol, que abordem infecções recorrentes por SARS-CoV-2 em pacientes com DRC. Foram excluídos estudos que tratem de outras patologias renais, que não apresentem dados suficientes sobre a função renal ou que não estejam disponíveis na íntegra de forma gratuita. A busca resultou em quatro artigos, todos provenientes da plataforma MEDLINE/PubMed, que atenderam aos critérios estabelecidos. A análise dos dados foi conduzida de maneira qualitativa e quantitativa, utilizando a técnica de análise de conteúdo para identificar padrões e divergências entre os estudos selecionados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os artigos selecionados examinam a complexa interação entre a infecção por SARS-CoV-2 e a função renal. Enquanto um artigo investiga a atuação dos anticorpos,



evidenciando os mecanismos da imunidade em pacientes em diálise crônica (Cohen *et al.*, 2021), outro analisa a complexidade das respostas imunológicas diante do coronavírus (Goel; Jain; Haddad, 2021). O terceiro também examina as respostas imunológicas, porém o foco é na longevidade da resposta e como isso interfere no tratamento hemodialítico, revelando que o manejo desses indivíduos é um desafio que requer monitoramento constante (Clarke *et al.*, 2021). O último artigo selecionado relata dois episódios de infecção grave por SARS-CoV-2 em um paciente em diálise crônica, alertando para o fato de que a gravidade demanda precauções rigorosas para minimizar reações adversas numa função renal já prejudicada (Torreggiani *et al.*, 2021). Embora dois desses artigos sejam relatos de casos isolados, eles contribuem substancialmente para a compreensão dos efeitos prolongados e da complexidade das infecções em pacientes com DRC, destacando a importância de estratégias terapêuticas e preventivas apropriadas.

A análise dos estudos sugere que a relação entre a DRC e a COVID-19 é complexa e bidirecional. Pacientes com DRC apresentam maior susceptibilidade a infecções graves por SARS-CoV-2, enquanto a infecção viral também pode agravar as lesões renais pré-existentes. A DRC está frequentemente associada a um estado de inflamação sistêmica crônica e imunossupressão, fatores que aumentam o risco de infecção grave e, consequentemente, a mortalidade associada (Gök *et al.*, 2021). É reconhecido que a DRC pode triplicar o risco de progressão para formas mais graves da COVID-19, mesmo na ausência de lesão renal aguda anterior (Gomes *et al.*, 2022). Além disso, os pacientes que sobrevivem à infecção por COVID-19 apresentam um risco elevado de desenvolver ou exacerbar a disfunção renal crônica, independentemente da gravidade da infecção inicial, o que traz implicações substanciais para o acompanhamento clínico pós-COVID-19 (Lumlertgul, *et al.*, 2021).

Cabe salientar que, embora o tema seja de extrema relevância, a busca realizada nas bases de dados MEDLINE/PubMed, SCIELO e Cochrane Library resultou em um número limitado de artigos publicados entre 2020 e 2025. Isso pode refletir a necessidade urgente de mais investigações sobre o impacto das infecções recorrentes por SARS-CoV-2 na progressão da DRC. Além disso, foram identificados outros estudos que atendem aos critérios de inclusão e que estão diretamente relacionados ao tema da pesquisa, mas que não estão indexados nas bases de dados consultadas, o que restringe sua visibilidade e o acesso às informações cruciais que oferecem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os quatro estudos convergem na evidência de que pacientes com Doença Renal Crônica, especialmente os que necessitam de diálise, apresentam uma vulnerabilidade acentuada a complicações graves pela infecção por SARS-CoV-2, destacando a importância de estratégias de prevenção rigorosas e monitoramento contínuo da função renal, dada a fragilidade imunológica e os riscos de progressão para lesão renal aguda e insuficiência renal terminal. Dessa forma, é imperativo que os profissionais de saúde adotem abordagens personalizadas no manejo desses pacientes, com foco em cuidados intensivos, medidas preventivas eficazes e monitoramento a longo prazo, a fim de mitigar os impactos adversos da infecção viral na função renal e melhorar os resultados clínicos.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica; Infecção recorrente; SARS-CoV-2.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AHMED, A. R. *et al.* Kidney injury in COVID-19. **World Journal of Nephrology**, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 18–32, 2020. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7701935/#:~:text=The%20incidence%20of%20acute%20kidney,seen%20on%20renal%20autopsy%20findings>. Acesso: 2 abr. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. **Boletim Epidemiológico**. Volume 55, nº 12. Brasília, DF, 11 set. 2024. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2024/boletim-epidemiologico-volume-55-no-12.pdf> Acesso: 29 abr. 2025.

CHEN, Y. *et al.* SARS-CoV-2-Related Kidney Injury: Current Concern and Challenges. **Frontiers in Immunology**, [S.l.], v. 12, p. 755639, 2021. Disponível em:

<https://link.springer.com/article/10.1007/s42399-020-00529-0>. Acesso: 1 abr. 2025.

CLARKE, C. L. *et al.* Longevity of SARS-CoV-2 immune responses in hemodialysis patients and protection against reinfection. **Kidney International**, [S.l.], v. 99, n. 6, p. 1470–1477, 2021. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7992297/>. Acesso em: 3 abr. 2025.

COHEN, D. E. *et al.* Antibody Status, Disease History, and Incidence of SARS-CoV-2 Infection Among Patients on Chronic Dialysis. **Journal of the American Society of Nephrology**, [S.l.], v. 32, n. 8, p. 1880–1886, 2021. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8455273/>. Acesso em: 3 abr. 2025.

COIMBRA, S.; SANTOS-SILVA, A. New advances in chronic kidney disease: Biology, diagnosis and therapy. **Biomedicines**, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 518, 2025. Disponível em:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11853119/>. Acesso em: 1 abr. 2025.

DOUSDAMPANIS, P. *et al.* Kidney Issues Associated with COVID-19 Disease.

Encyclopedia, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 79, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2673-8392/3/3/79>. Acesso: 2 abr. 2025.

GOEL, N.; JAIN, D.; HADDAD, D. B. Coronavirus Disease-19 and Re-infection:

Unknown of the Unknown. **Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation**. v. 32, n. 1, p. 261–264, 2021. Disponível em:

https://journals.lww.com/sjkd/fulltext/2021/32010/coronavirus_disease_19_and_re_infection__unknown.35.aspx. Acesso em: 3 abr. 2025. Acesso em: 3 abr. 2025.

GÖK, M. *et al.* Chronic kidney disease predicts poor outcomes of COVID-19 patients. **International Urology and Nephrology**, [S.l.], v. 53, n. 5, p. 1891–1898, 2021.

Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11255-020-02758-7>. Acesso em 3 abr. 2025.

GOMES, L. B. *et al.* Covid-19 e os rins acometidos com lesão aguda ou crônica: um aprendizado crescente. **Jornal Brasileiro de Nefrologia**, v. 44, n. 3, p. 305–307, 2022.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbn/a/TLZ493ywCrbSvY7tcz5cPTx/?lang=pt>. Acesso em 3 abr. 2025.



ISN - INTERNATIONAL SOCIETY OF NEPHROLOGY. **Global Kidney Health Atlas - 3ª Edição**. 2023. Disponível em: <https://www.theisn.org/initiatives/global-kidney-health-atlas/>. Acesso em 3 abr. 2025.

LUMLERTGUL, N. *et al.* Acute kidney injury prevalence, progression and long-term outcomes in critically ill patients with COVID-19: a cohort study. **Annals of Intensive Care**. v.11, n.1, p.123, 2021. Disponível em: <https://annalsofintensivecare.springeropen.com/articles/10.1186/s13613-021-00914-5> Acesso: 05 abr 2025.

MURRAY, I. V.; PAOLINI, M. A. Histology, Kidney and Glomerulus. In: **STATPEARLS**. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2024. PMID: 32119431. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554544/>. Acesso em: 1 abr. 2025.

PETHŐ, Á. G. *et al.* Management of chronic kidney disease: The current novel and forgotten therapies. **Current Opinion in Nephrology and Hypertension**, [S.l.], v. 33, n. 2, p. 132-139, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38828402/>. Acesso em: 1 abr. 2025.

TANVEER, F. Targeted therapies in chronic kidney disease. **THE THERAPIST (Journal of Therapies & Rehabilitation Sciences)**, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 115–126, 2023. Disponível em: <https://www.thetherapist.com.pk/index.php/tt/article/view/115> . Acesso em: 1 abr. 2025.

ROSA, C.O.B; HERMSDORFF, H.H.M. **Fisiopatologia da nutrição e dietoterapia**. 1 ed. Rio de Janeiro: Rubio, 2021, 688p.

TEMIZ, M. Z. *et al.* Altered kidney function induced by SARS-CoV-2 infection and acute kidney damage markers predict survival outcomes of COVID-19 patients: A prospective pilot study. **Renal Failure**, [S.l.], v. 44, n. 1, p. 233–240, 2022. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35172674/>. Acesso: 2 abr. 2025.

TORREGGIANI, M. *et al.* Two episodes of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection in a patient on chronic hemodialysis: a note of caution. **Kidney International**, [S.l.], v. 99, n. 4, p. 1022–1023, 2021. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7826025/>. Acesso em: 3 abr. 2025.

TORTORA, G.J.; DERRICKSON, B. **Princípios de Anatomia e Fisiologia**. 16 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2023. p. 1288

UNITED STATES RENAL DATA SYSTEM. 2023 USRDS Annual Data Report: Epidemiology of kidney disease in the United States. Bethesda: National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2023. Disponível em: <https://usrds-adr.niddk.nih.gov/2023>. Acesso em: 1 abr. 2025.

VALIZADEH, R. *et al* Coronavirus-nephropathy; renal involvement in COVID-19. **J Renal Inj Prev**. v.9, n. 2, p. e18, 2020 Disponível em: <https://journalrip.com/PDF/jrip-9-e18.pdf>. Acesso: 1 abr. 2025.



A EFICÁCIA DA TELEMEDICINA NO TRATAMENTO DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO: UMA COMPARAÇÃO COM O MODELO TRADICIONAL

¹ Maria Clara de Mendonça Machado

² Beatriz da Cunha Bento

³ Gabriel Eduardo dos Santos Ferreira

⁴ Gabriela Braz Essado

⁵ Amanda Nascimento de Almeida

⁶ Bárbara Rocha Gonçalves

^{1,2,3,4,5,6} Centro Universitário de Goiatuba-Unicerrado, Goiatuba, Goiás, Brasil. ⁶ Faculdade Morgana Potricha-FAMP, Mineiros, Goiás, Brasil.

Área temática: Medicina

Resumo: O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão sistemática para avaliar a eficácia da telemedicina em melhorar a adesão ao tratamento com CPAP em comparação ao acompanhamento padrão. Os resultados indicam que tanto o acompanhamento presencial quanto a telemedicina podem ser eficazes, dependendo do perfil do paciente e da estrutura de suporte disponível. A telemedicina destaca-se pela redução de custos e pela diminuição da sobrecarga de serviços presenciais, enquanto o acompanhamento padrão ainda apresenta vantagens em adesão diária em alguns casos. Para garantir melhores resultados, é fundamental abordar efeitos adversos comuns, como desconforto respiratório e ressecamento das vias aéreas. O uso de ferramentas digitais para motivação e acompanhamento contínuo também tem mostrado potencial para manter a adesão a longo prazo. Além disso, esta revisão ressalta a importância de considerar as limitações da telemedicina, como a ausência de interação física e a necessidade de equipamentos específicos, especialmente em casos graves de AOS. Direções futuras para a pesquisa incluem estudos multicêntricos e de longo prazo que avaliem o impacto clínico e a viabilidade dessas tecnologias em contextos diversos.

INTRODUÇÃO

A apneia obstrutiva do sono (AOS) é um distúrbio respiratório comum, caracterizado por interrupções na respiração durante o sono, que impactam negativamente a saúde física e mental dos indivíduos (JONES *et al.*, 2024). Está associada a complicações graves, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e sonolência diurna excessiva, além de aumentar o risco de acidentes (OSMAN *et al.*, 2018). A terapia com pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) é o tratamento padrão-ouro para a AOS, garantindo que

as vias aéreas permaneçam desobstruídas durante o sono. Contudo, a adesão ao CPAP permanece um desafio, com taxas de não adesão variando entre 30% e 86%, devido ao desconforto e à percepção de ineficácia (MUNAFO *et al.*, 2016). Em resposta a esse desafio, a telemedicina tem sido explorada como uma solução para aumentar a adesão ao tratamento, permitindo o monitoramento remoto, ajustes e suporte contínuo. A implementação dessa tecnologia pode aliviar a pressão sobre clínicas especializadas, ao mesmo tempo em que oferece um atendimento mais personalizado e eficiente aos pacientes (WOLSING *et al.*, 2024).



OBJETIVOS

Realizar uma revisão sistemática para avaliar a eficácia da telemedicina em melhorar a adesão ao tratamento com CPAP em comparação ao acompanhamento padrão.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com busca realizada nas bases de dados da National Library of Medicine do National Institutes of Health e PUBMED. Utilizou-se como estratégia de busca o conjunto dos termos “Telemedicine” AND “sleep apnea”. Os critérios de inclusão foram: artigos originais, incluindo ensaios clínicos, publicados entre janeiro de 2018 e agosto de 2024. Foram excluídos artigos de metanálise, por não representarem fontes primárias de dados; no entanto, reconhece-se que metanálises constituem evidências de alto nível. A exclusão foi mantida com o objetivo de focar em estudos originais que descrevem diretamente os métodos e contextos de aplicação da telemedicina. Além disso, foram excluídos trabalhos com falhas na descrição metodológica, revisões da literatura, estudos duplicados e publicações sem dados relevantes. Ao todo, oito estudos foram selecionados para análise. Os critérios de inclusão envolveram ensaios clínicos randomizados que comparassem diretamente a telemedicina ao acompanhamento padrão em pacientes com AOS. Critérios de exclusão incluíram ausência de grupo comparador e desfechos distintos da adesão ao CPAP. A avaliação da qualidade metodológica dos estudos foi conduzida por meio da análise da clareza dos objetivos, rigor na condução dos métodos, aplicabilidade clínica e coerência nos resultados apresentados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A adesão ao tratamento com pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) em pacientes com apneia obstrutiva do sono (AOS) tem sido amplamente estudada, com foco especial nas diferentes modalidades de acompanhamento, como teleconsulta (TC), consulta padrão (SC) e telemonitoramento. A seguir, discutiremos os achados de diversos estudos recentes que exploram a eficácia dessas abordagens.

Um estudo avaliou o impacto de um programa de telemonitoramento e coaching estendido na adesão ao CPAP. Os resultados indicaram que um programa de 3 meses aumentou o uso do CPAP a curto prazo, mas não levou a melhorias sustentadas. Por outro lado, um programa de 12 meses resultou em melhorias duradouras, embora os benefícios tenham diminuído após o término do coaching. Isso sugere que programas de telemonitoramento mais longos podem ser essenciais para obter benefícios a longo prazo na terapia com CPAP (PATEL et al., 2023).

Delijaj et al. (2023) conduziram um estudo randomizado com 217 pacientes para comparar o telemonitoramento com o acompanhamento padrão em relação à adesão ao CPAP após 6 meses. Os resultados não mostraram diferenças significativas entre os grupos (53,2% vs. 48,7%; $P = 0,54$). No entanto, efeitos colaterais como garganta seca, aumento de despertares e dificuldades na expiração foram associados negativamente à adesão, indicando a importância de gerenciar esses efeitos para melhorar a conformidade ao tratamento.

Wolsing et al. (2024) investigaram a substituição do acompanhamento padrão por consultas telefônicas em pacientes em terapia com CPAP. O estudo concluiu que as consultas telefônicas não afetaram significativamente a adesão ao tratamento em comparação com as consultas presenciais, sugerindo que o acompanhamento telefônico pode ser uma alternativa viável em certos contextos. Além disso, observou-se uma maior taxa de comparecimento às consultas de acompanhamento no grupo de teleconsulta, indicando que essa modalidade



pode melhorar a retenção dos pacientes nas clínicas ambulatoriais.

Outro estudo randomizado controlado avaliou a eficácia do telemonitoramento na melhoria da conformidade ao CPAP e o impacto da organização pré-existente do cuidado padrão. Os resultados mostraram que, em pacientes com apneia do sono grave e acompanhamento intensivo padrão durante as semanas iniciais da terapia com CPAP, o telemonitoramento não melhorou a conformidade nem os resultados clínicos a curto ou longo prazo. Isso sugere que, quando o acompanhamento padrão já é intensivo, o telemonitoramento adicional pode não oferecer benefícios significativos (KLEIJ et al., 2024).

Pei et al. (2023) avaliaram a taxa de aceitação do tratamento com APAP e a relação custo-efetividade da telemedicina em pacientes com AOS. Os resultados indicaram que a taxa de aceitação e a conformidade do tratamento no grupo de telemedicina foram semelhantes às do grupo de controle, com uma redução nos custos médicos para os pacientes. No entanto, a telemedicina aumentou a frequência e a duração de intervenções adicionais fora do ambiente hospitalar, destacando a necessidade de equilibrar os benefícios econômicos com a carga de trabalho adicional para os profissionais de saúde.

Além disso, Franke et al. (2024) investigaram o efeito de uma ferramenta digital de motivação e suporte ao paciente na adesão ao CPAP/APAP e na sonolência diurna. O estudo encontrou que o uso da ferramenta digital melhorou a adesão ao tratamento e reduziu a sonolência diurna, sugerindo que intervenções digitais podem ser eficazes para apoiar pacientes em terapia com CPAP.

Apesar da semelhança nos resultados entre telemedicina e acompanhamento padrão em diversos estudos, diferenças relevantes podem estar associadas a fatores como o perfil dos pacientes (nível socioeconômico, idade, comorbidades), variações nos programas de telemonitoramento (frequência de contato, tipo de ferramenta usada) e o nível de preparo dos profissionais de saúde para lidar com tecnologias digitais. Assim, torna-se necessário não apenas descrever os resultados, mas ampliar a análise crítica sobre as causas das variações observadas, considerando o contexto de aplicação e a infraestrutura disponível em cada estudo.

CONCLUSÃO

A presente revisão aponta que a telemedicina apresenta eficácia semelhante ao acompanhamento padrão no que se refere à adesão ao CPAP, com vantagens adicionais, como maior acessibilidade, praticidade e redução de custos. Contudo, essas vantagens devem ser analisadas à luz de limitações potenciais, como a falta de interação física, a necessidade de equipamentos específicos e o risco de submonitoramento em casos graves de AOS. As implicações práticas sugerem que programas de telemedicina podem ser eficazes, desde que bem estruturados e integrados com a realidade local dos serviços de saúde e com capacitação adequada das equipes envolvidas. Assim, embora a telemedicina represente uma alternativa viável e eficiente para o acompanhamento de pacientes com AOS em tratamento com CPAP, sua implementação deve ser cuidadosamente planejada. Recomenda-se que pesquisas futuras explorem intervenções híbridas, combinem modalidades presenciais e digitais, e avaliem desfechos clínicos além da adesão, como qualidade de vida e controle dos sintomas. Futuros estudos multicêntricos, com metodologias padronizadas e avaliação longitudinal dos desfechos, são essenciais para validar a aplicabilidade dessas estratégias em diferentes contextos clínicos e populacionais.

Palavras-chave: Tratamento; Telemedicina; Telemonitoramento; CPAP.



REFERÊNCIAS

DELIJAJ, F.; LINDBERG, E.; JOHNSON, L.; KRISTIANSSON, P.; TEGELMO, T.; THEORELL-HAGLÖW, J. Effects of telemonitoring follow-up, side effects, and other factors on CPAP adherence. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, v. 19, n. 10, p. 1785-1795, out. 2023. DOI: 10.5664/jcsm.10686.

FRANKE, C.; PIEZONNA, F.; SCHÄFER, R. *et al.* Effect of a digital patient motivation and support tool on CPAP/APAP adherence and daytime sleepiness: a randomized controlled trial. *Sleep Biol. Rhythms*, 22, 49–63, 2024. <https://doi.org/10.1007/s41105-023-00479-9>

JONES, T. A.; RODDIS, J.; STORES, R. Can the use of telemedicine in the management of continuous positive airway pressure for the treatment of obstructive sleep apnea reduce clinical time and additional appointments: a randomized controlled trial. *Telemedicine Journal and e-Health*, v. 30, n. 7, p. e2072-e2079, jun. 2024.

MUNAFO, D.; HEVENER, W.; CROCKER, M.; WILLES, L.; SRIDASOME, S.; MUHSIN, M. A telehealth program for CPAP adherence reduces labor and yields similar adherence and efficacy when compared to standard of care. *Sleep Breath.*, v. 20, n. 2, p. 777-785, maio 2016.

OSMAN, A. M.; CARTER, S. G.; CARBERRY, J. C.; ECKERT, D. J. Obstructive sleep apnea: current perspectives. *Nature and Science of Sleep*, v. 10, p. 21- 34, jan. 2018. DOI: 10.2147/NSS.S124657.

PATEL, S. R.; BAKKER, J. P.; STITT, C. J.; HARDY, W.; ALOIA, M. S.; NOURAIE, S. M. Impact of an Extended Telemonitoring and Coaching Program on Continuous Positive Airway Pressure Adherence. *Annals of the American Thoracic Society*, 2023.

PEI, G.; OU, Q.; LAO, M.; WANG, L.; XU, Y.; TAN, J.; ZHENG, G. APAP Treatment Acceptance Rate and Cost-Effectiveness of Telemedicine in Patients with Obstructive Sleep Apnea: A Randomized Controlled Trial. *Nature and Science of Sleep*, v. 15, 2023. DOI: <https://doi.org/10.2147/NSS.S416221>.

VAN DER KLEIJ, S.; DE BACKER, I.; HANRAETS, B.; VERBRAECKEN, J.; ASIN, J. Effectiveness of remote monitoring in improving CPAP compliance and the impact of preexisting organisation of standard care: a randomised controlled trial. *Sleep Breath.*, v. 28, n. 4, p. 1715-1721, ago. 2024. DOI: 10.1007/s11325-024-03042-z.

WOLSING, S. K.; FRØLUND, J. C.; DALGÅRD, C.; HILBERG, O.; GANTZHORN, E. Telephone follow-up as a substitute for standard out-clinic follow-up in CPAP therapy for obstructive sleep apnea patients: a randomized controlled trial. *Sleep Breath.*, v. 28, n. 4, p. 1651-1659, ago. 2024.



ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE SÍFILIS ADQUIRIDA NO MARANHÃO EM 2024

¹Vinícius Barbosa Souza

²Daiane Carvalho Souza

¹Instituto Florence de Ensino Superior. São Luís, Maranhão, Brasil; ²Faculdade de Educação de Bacabal. Bacabal, Maranhão, Brasil

Área temática: Epidemiologia

Resumo: A sífilis adquirida é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum*, podendo ser transmitida por contato sexual desprotegido ou outras vias, como o compartilhamento de seringas e a transmissão transplacentária. Nos últimos anos, os casos da doença têm aumentado significativamente no Brasil, representando um desafio para a saúde pública, especialmente no Maranhão. O presente estudo tem como objetivo realizar uma análise epidemiológica retrospectiva dos casos de sífilis adquirida no estado em 2024, identificando os principais grupos afetados e os critérios de diagnóstico mais utilizados. Trata-se de um estudo ecológico, descritivo e quantitativo, baseado em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram analisadas variáveis como faixa etária, sexo, raça, escolaridade, status gestacional e critérios de confirmação da doença. Os dados demonstraram uma maior prevalência da sífilis adquirida entre homens, indivíduos pardos e pessoas com ensino médio completo. O critério laboratorial foi o mais utilizado para o diagnóstico. Esses achados corroboram estudos anteriores que apontam a vulnerabilidade de determinados grupos populacionais à IST, destacando desigualdades sociais e dificuldades no acesso à saúde. Os resultados evidenciam a necessidade de fortalecer políticas públicas de prevenção e controle da sífilis adquirida no Maranhão, com estratégias direcionadas para os grupos mais afetados. A ampliação do acesso a testes diagnósticos e campanhas educativas são essenciais para conter o avanço da doença e reduzir seus impactos na população.

INTRODUÇÃO

A sífilis adquirida é uma infecção sexualmente transmissível (IST) que pode ser contraída mediante relações sexuais desprotegidas ou pelo contato com a bactéria *Treponema pallidum* através de lesões, compartilhamento de seringas, contato com superfícies infectadas ou de forma transplacentária. A sífilis é uma infecção exclusiva do ser humano, curável, e apresenta três fases distintas (Souza; Martins, 2024).

A sífilis é dividida em três estágios: primário, secundário e terciário. Nos três primeiros estágios da infecção, a taxa de transmissão é maior. A sífilis primária consiste em uma série de sintomas, como feridas onde a bactéria se depositou (pênis, vulva ou vagina). Nesse estágio, há inúmeras bactérias, formando a lesão conhecida como 'cancro duro'. A sífilis secundária pode durar de seis semanas a seis meses após o sumiço do "cancro" e pode se manifestar por via de lesões eritematosas nos membros e nas partes palmo-plantares. Na fase terciária, ela é apresentada em um período de latência que pode surgir entre uma e quatro décadas após os primeiros sintomas da doença. A fase terciária apresenta a maior taxa de mortalidade, visto que ocorre lesão tecidual, resultando em lesões chamadas de gomas sífilíticas (Ministérios da Saúde, 2023).

O tratamento da sífilis consiste no uso de antibióticos, como a penicilina benzatina.



Em casos de neurosífilis ou sífilis congênita, é administrado o medicamento penicilina cristalina (Cao *et al.*, 2017). Além disso, destaca-se a necessidade de atenção aos pacientes que vivem com o vírus HIV, visto que os casos de sífilis são mais agressivos devido à imunossupressão. (Souza; Martins, 2024). Entretanto, o tratamento da sífilis ainda é um grande desafio na saúde pública. Torres *et al.* (2022), afirma que os fatores associados ao tratamento inadequado da doença estão relacionados às condições clínicas do paciente, aspectos sociodemográficos e falhas assistenciais. Por exemplo, na cidade de Belo Horizonte, a maioria dos casos de sífilis congênita foram por meio de consultas pré-natal inadequadas.

Nos últimos anos, houve um aumento alarmante de casos de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita no Brasil. Esse aumento pode estar ligado a diversos fatores, como aumento da testagem, deficiências no pré-natal e uso inadequado da penicilina benzatina, tratamento predominante para a infecção. No Maranhão, essa situação é ainda mais preocupante, uma vez que o estado registra altas taxas de sífilis em diversos grupos populacionais, evidenciando desafios na prevenção, no diagnóstico precoce e no acesso ao tratamento adequado (Souza; Martins, 2024; Mota, 2021; Senã *et al.*, 2017).

OBJETIVO

Considerando a relevância e o impacto da sífilis adquirida para a saúde pública, o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise crítica retrospectiva dos casos de sífilis adquirida notificados no Maranhão no ano de 2024.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo ecológico, descritivo com abordagem quantitativa. Os dados utilizados neste trabalho são de domínio público, retirados no site do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), sobre os casos confirmados de sífilis adquirida no Maranhão em 2024.

Os dados foram coletados a partir do site oficial do SINAN (<https://portalsinan.saude.gov.br/>) a partir dos seguintes passos: 1. Dados Epidemiológicos Sinan (<https://portalsinan.saude.gov.br/dados-epidemiologicos-SINAN/>); 2. Doenças e Agravos de Notificação – 2007 em diante (<https://datasus.saude.gov.br/acesso-a-informacao/doencas-e-agravos-de-notificacao-de-2007-em-diante-sinan/>); 3. Sífilis adquirida e; 4. Abrangência geográfica (Maranhão) (<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinanet/cnv/sifilisadquiridama.def>).

Foram consideradas as variáveis: escolaridade, raça, sexo, gestante, faixa etária, critério de confirmação e evolução.

Todos os dados coletados foram exportados para o programa Microsoft Excel 2021®, a fim de garantir uma análise de todos os dados retirados do SINAN.

Por se tratar de dados públicos, este trabalho não precisa de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No ano de 2024, o Maranhão obteve cerca de 501 casos de sífilis adquirida, sendo o mês de janeiro com o maior número de casos, com 304 (60,6%). Em relação à escolaridade, pessoas que concluíram o ensino médio apresentaram a maior prevalência, com 169 casos (33,7%). No que concerne à raça, pessoas pardas tiveram os maiores casos, com 358



(71,4%). No que diz respeito ao sexo, a população masculina foi a mais afetada, com 339 casos (67%). Quanto às gestantes, não tiveram casos confirmados de sífilis adquirida. No que se refere à faixa etária, pessoas de 20 a 39 anos apresentaram os maiores números, com 267 casos (53,2%). Com relação ao critério, o laboratorial foi o mais usado, com 138 diagnósticos (27,5%), seguido do clínico-epidemiológico, com 21 casos (4,2%). A evolução é caracterizada pelo processo de cura ou óbito, nessa perspectiva, 123 dos 501 casos foram totalmente curados (24,5%) e o Maranhão apresentou apenas 1 óbito pelo agravo (0,2%).

No estudo epidemiológico conduzido por Silveira; Silva e Damiani (2020), os maiores índices de casos notificados de sífilis adquirida estão na população com o ensino médio completo. Ao nível do Brasil, em 2017, nesse mesmo estudo, foram evidenciados cerca de 20.436 casos de sífilis adquirida na população com o ensino médio completo, o que evidencia o seu grande problema de saúde pública.

Em relação à faixa etária, principalmente a população de 20 a 39 anos, os números são bastante alarmantes. Entre os anos de 2017 a 2021, 360.669 casos de sífilis adquirida foram registrados nessa população no país (Carneiro *et al.*, 2023). Em diversos estudos, a maior prevalência da faixa etária está entre pessoas de 20 a 39 anos. Devido a isso, é importante a criação de políticas públicas para conter a disseminação dessa doença e diminuir os casos entre essa faixa etária (Silva *et al.*, 2021; Luppi *et al.*, 2020).

Quanto ao gênero, a população masculina apresenta a maior prevalência da doença. No estudo feito por Silva *et al.* (2021) em Patos de Minas–MG, dos 464 casos registrados no ano de 2011 a 2022, as mais acometidas foram a população masculina, com 286 casos. Esses dados corroboram com o estudo de Serrão; Mariana e Leite (2024), onde a maioria dos casos de sífilis adquirida no Norte do Brasil, os homens, foram os mais afetados pela IST.

Nos estados do Pará e Paraíba, a maioria dos casos de sífilis adquiridos foi registrada entre indivíduos da raça parda, com 72,2% e 58,31% dos casos, respectivamente. No Rio Grande do Norte, 48% dos casos também foram notificados entre indivíduos de raça parda. Na região Norte do Brasil, uma raça mista foi predominantemente entre os casos notificados (Souza *et al.*, 2023; Neves; Amanajás; Pires, 2021; Serrão; Silva; Leite, 2024; Assunção *et al.*, 2023).

O Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020 recomenda a utilização de testes diretos, algoritmos e testes treponêmicos imunocromatográficos rápidos para o diagnóstico da sífilis, sendo os mesmos essenciais para a saúde pública (Gaspar *et al.*, 2021). Entretanto, o estado do Maranhão apresenta desafios significativos para o controle da sífilis. Tais desafios apresentados corroboram desde a cobertura de testagem, que é baixa, resistência dos profissionais de saúde à administração da penicilina e o desabastecimento do medicamentos, podem aumentar substancialmente (Sá, 2023).

CONCLUSÃO

Diante dos dados analisados, percebe-se que a sífilis adquirida ainda representa um grande desafio para a saúde pública no Maranhão, com predominância de casos entre homens, indivíduos pardos e pessoas com ensino médio completo. A maior incidência na faixa etária de 20 a 39 anos reforça a necessidade de estratégias de prevenção e conscientização voltadas para esse grupo. Embora a taxa de cura tenha sido significativa, a persistência de casos e a ocorrência de óbito evidenciam a importância do diagnóstico precoce e da adesão ao tratamento. Nesse contexto, torna-se fundamental o fortalecimento das políticas públicas de testagem, educação em saúde e acesso ao tratamento adequado, a fim de reduzir a transmissão da doença e minimizar seus impactos na população maranhense.



A relevância de campanhas educativas e de fácil acesso sobre prevenção e tratamento da sífilis é enfatizada pelo elevado número de casos entre pessoas de baixa escolaridade e por elementos como a ausência de uso contínuo de preservativos. As diferenças nos índices de casos entre diferentes raças evidenciam a necessidade de políticas e estratégias culturalmente sensíveis para assegurar um acesso justo aos serviços de saúde.

Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis; Saúde pública; Sífilis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSUNÇÃO, T. B. O. et al. Análise situacional da sífilis entre os anos de 2015 e 2021 no estado do Rio Grande do Norte, Brasil. **Brazilian Journal of Sexually Transmitted Diseases**, v. 35, 31 jan. 2023.

CARNEIRO, B. F. et al. Perfil epidemiológico dos casos de sífilis adquirida, no Brasil, no período de 2017 a 2021. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 43, p. e11823, 24 jan. 2023.

GASPAR, P. C. et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: testes diagnósticos para sífilis. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, p. e2020630, 15 mar. 2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sífilis. Brasil: **Ministério da Saúde**, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/ptbr/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sifilis>. Acesso em: 31 mar. 2025.

MOTA, Georgiane Silva. Determinantes sociais da saúde e fatores de risco para sífilis em mulheres de uma comunidade rural. 2021. 1-80 p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem e Saúde) - **Universidade Federal da Bahia**, Salvador, BA, 2021. Disponível em: <<https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/37395/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20%20GEORGIANE%20MOTA.pdf>>. Acesso em: 31 mar. 2025.

NEVES, B. S. DE A.; AMANAJÁS, M. B.; PIRES, C. A. A. Acquired Syphilis: epidemiological profile of cases in state of Pará from 2017 to 2019. **HSJ**, v. 11, n. 1, p. 44–50, 11 mar. 2021.

SÁ, K. V. M. Perfil Epidemiológico de Sífilis Adquirida nas Microrregiões do Estado do Maranhão, no período de 2016 a 2021. **Ufma**, 2023. Disponível em: <<https://monografias.ufma.br/jspui/handle/123456789/8074>>. Acesso em: 2 abr. 2025.

SENÃ, A. C. et al. Rate of decline in nontreponemal antibody titers and seroreversion after treatment of early syphilis. **Sex Transm Dis.**, [s. l.], v. 44, ed. 3, p. 6-10, 2017. DOI 10.1097/OLQ.0000000000000541.

SERRÃO, F. S.; SILVA, M. S. C. DA; LEITE, D. S. Epidemiological profile of acquired syphilis in the northern region of Brazil from 2011 to 2021. **Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança**, v. 22, n. 2, p. 154–163, 29 ago. 2024.

SILVA, M. H. DA et al. Epidemiologia da sífilis na terceira idade no município de Patos



de Minas - MG entre os anos de 2010 a 2020. **RECISATEC - Revista Científica Saúde e Tecnologia**, v. 1, n. 3, p. e1330, 3 out. 2021.

SILVEIRA, S. J. S.; SILVA, J. Q. DE D. E; DAMIANI, R. F. Análise dos casos de sífilis adquirida nos anos de 2010-2017: um contexto nacional e regional / Analysis of the cases of syphilis acquired in the years 2010-2017: a national and regional context. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 32496–32515, 30 maio 2020.

SOUZA, I. S. M. DE et al. Epidemiological profile of Acquired Syphilis Cases in Paraíba, Brazil (2015 – 2021). **Research, Society and Development**, v. 12, n. 6, p. e28512642441–e28512642441, 3 jul. 2023.

SOUZA, V. B.; JESUS, C. M. DE. Análise dos casos de sífilis adquirida no período de janeiro a dezembro de 2022 no estado do Maranhão. **A&R International Health Beacon Journal**, v. 1, n. 5, 13 set. 2024.

TORRES, P. M. A. et al.. Factors associated with inadequate treatment of syphilis during pregnancy: an integrative review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, n. 6, p. e20210965, 2022.



AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PARASITOLÓGICA DA *Solanum capsicoides*

¹Maria Heloísa Aquino Alves

²Gustavo Henrique da Silva

¹Associação Caruaruense de Ensino Superior - Asces/Unita - Caruaru-PE. Brasil

²Associação Caruaruense de Ensino Superior - Asces/Unita - Caruaru-PE. Brasil

Área Temática: Farmácia

Resumo: Introdução: A *Solanum capsicoides*, pertencente à família Solanaceae, é uma planta amplamente distribuída em regiões tropicais e subtropicais. Na medicina tradicional é bastante utilizada, sendo investigada acerca de seu potencial antiparasitário. Nesse contexto, a *S. capsicoides* se destaca como uma planta promissora, apesar da escassez de estudos sobre seu potencial antiparasitário. **Objetivo:** Avaliar o potencial antiparasitário da *Solanum capsicoides*. **Metodologia:** Estudo conduzido nos laboratórios do Centro Universitário Tabosa de Almeida (Asces-Unita), utilizando amostras dos protozoários *Amoeba proteus* e *Giardia lamblia*, obtidas do banco de cepas da instituição. O extrato bruto seco foi produzido por maceração da planta em solução hidroalcoólica a 50%. Os protozoários foram extraídos de amostras fecais utilizando a técnica de Hoffman (sedimentação espontânea). O potencial antiparasitário do extrato foi avaliado nas concentrações de 100 mg/mL, 50 mg/mL, 25 mg/mL, 12,5 mg/mL e 6,25 mg/mL, com os experimentos realizados em triplicata. Após 30 minutos, prepararam-se lâminas de esfregaço, coradas com lugol e analisadas ao microscópio. **Resultados e Discussão:** Observou-se que nas concentrações de 100 mg/mL e 50 mg/mL, o extrato foi eficaz na eliminação da *Amoeba proteus*. Em concentrações menores, o extrato não apresentou atividade significativa contra esse protozoário. No caso da *Giardia lamblia*, nenhuma concentração testada mostrou eficácia. **Considerações Finais:** A *Solanum capsicoides* demonstrou potencial como agente terapêutico natural contra protozoários, especialmente no combate à *Amoeba proteus*. No entanto, sua baixa eficácia em concentrações menores e contra a *Giardia lamblia* destaca necessidade de estudos adicionais.

Palavras-chave: *Amoeba*; *Giardia lamblia*; *Solanum*.

INTRODUÇÃO

A *Solanum capsicoides*, também conhecida popularmente como "joá-bravo", "melancia-do-campo", "espinhosa" ou "gogoia", é uma planta pertencente à família Solanaceae, amplamente distribuída em regiões tropicais e subtropicais. Nativa da América do Sul, principalmente do Brasil, essa espécie é encontrada em áreas de vegetação aberta, pastagens e beiras de estradas, adaptando-se a diferentes tipos de solo e condições ambientais (Buddenhagen, 2022).

A gogoia é um arbusto de porte médio, que pode atingir até dois metros de altura. Suas folhas são grandes e cobertas por pequenos espinhos, característica que lhe confere proteção contra predadores herbívoros. As flores, de coloração esbranquiçada a violeta, são seguidas por frutos esféricos de cor laranja-avermelhada quando maduros, que se assemelham a pequenas melancias, embora sejam tóxicos para o consumo (Buddenhagen, 2022).



Embora não tenha grande valor econômico direto, a *Solanum capsicoides* desperta interesse devido às suas propriedades medicinais e fitoterápicas. Na medicina tradicional, partes da planta são utilizadas para o tratamento de diversas condições, como inflamações, úlceras e doenças da pele. Entretanto, devido à presença de alcalóides tóxicos, o uso da planta requer cautela e conhecimento especializado (Motti, 2020).

Além disso, essa espécie é considerada uma planta invasora em algumas regiões, devido à sua capacidade de se propagar rapidamente e competir com espécies nativas e culturas agrícolas. Em função disso, é frequentemente alvo de controle biológico ou químico para evitar que cause danos à biodiversidade local ou afete atividades agrícolas (Motti, 2020).

OBJETIVO

A *Solanum capsicoides*, portanto, é uma planta de múltiplos aspectos, possuindo importância ecológica, medicinal e agrônômica. Objetiva-se, então, avaliar um pouco mais das capacidades terapêuticas desta espécie através de testes parasitológicos, a fim de comprovar sua efetividade frente a protozoários.

METODOLOGIA

Este estudo foi realizado nos laboratórios do Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), desenvolvido no período de Janeiro a Setembro de 2024.

Preparação do Extrato Bruto Seco (EBS)

O material vegetal foi coletado manualmente entre março e abril de 2024, nos períodos da manhã e tarde, visando preservar todas as estruturas de *Solanum capsicoides*, desde as porções aéreas e caulinares até as raízes, com preferência por partes saudáveis, não danificadas por insetos ou pragas. Uma exsicata foi preparada e validada no Instituto Agrônomo de Pernambuco (IPA).

As folhas foram lavadas em água corrente, secas com papel toalha e colocadas em estufa a 40°C para completar a secagem. Posteriormente, o material seco foi triturado em moinho industrial até se transformar em pó, e submetido à maceração em solução hidroalcoólica a 50% v/v por 7 dias. Após esse período, realizou-se filtração gravitacional durante 4 dias e, em seguida, a evaporação da solução foi feita por evaporador rotativo.

Análise Parasitológica

Protozoários Utilizados

Foram utilizadas as cepas de protozoários *Amoeba proteus* e *Giardia lamblia*. Todas obtidas do próprio banco de cepas da Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico - Ascens-Unita.

Determinação do Potencial Antiparasitário da *Solanum capsicoides*

Foi utilizada a técnica de Hoffman, ou método de sedimentação espontânea, para a extração dos protozoários *Amoeba proteus* e *Giardia lamblia* a partir de amostras fecais. Nesse processo, as fezes foram misturadas com água, filtradas através de um parasitofiltro e centrifugadas por 5 minutos, permitindo a sedimentação dos resíduos fecais no fundo do



tubo. Uma alíquota do sedimento foi pipetada sobre uma lâmina, onde foi feito um esfregaço, posteriormente observado ao microscópio. Este método facilita a detecção de ovos nas fezes, especialmente os mais pesados, após coloração com lugol.

Para a avaliação do potencial antiparasitário do extrato, em placas de ensaio foram adicionados 2 mL dos microrganismos (*Amoeba proteus* e *Giardia lamblia*) e 1 mL do extrato em diferentes concentrações. As diluições do extrato seguiram os valores de 100 mg/mL, 50 mg/mL, 25 mg/mL, 12,25 mg/mL e 6,125 mg/mL, e o teste foi realizado em triplicata. Após 30 minutos, prepararam-se lâminas para análise e posterior leitura no microscópio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para avaliar o potencial antiparasitário da *S. capsicoides* utilizou-se de amostras com *Amoeba proteus* e *Giardia lamblia*. Identificou-se que na concentração 100 mg/mL e 50 mg/mL a *Amoeba proteus* foi efetivamente eliminada pelo extrato. Contudo, em concentrações mais diluídas o extrato não apresentou efetividade contra a *Amoeba proteus*. Quanto a *Giardia lamblia* nenhuma concentração mostrou eficácia contra o protozoário.

Tabela 1: Potencial Antiparasitário do Extrato Bruto Seco de *Solanum capsicoides*

	<i>Amoeba proteus</i>	<i>Giardia lamblia</i>
100 mg/mL	+++	—
50 mg/mL	+++	—
25 mg/mL	—	—
12,5 mg/mL	—	—
6,25 mg/mL	—	—

Legenda: — efeito antiparasitário negativo; +++ efeito antiparasitário positivo

Fonte: Autores, 2024

A *Solanum capsicoides* tem despertado interesse por seu potencial como agente terapêutico natural, com extratos dessa planta demonstrando efeitos antiproliferativos significativos, especialmente contra protozoários patogênicos. Glicoalcalóides de espécies relacionadas do gênero *Solanum* apresentaram atividades tripanolíticas e tripanocidas contra *Trypanosoma cruzi*, sugerindo que compostos desse grupo podem ser eficazes no combate a parasitas protozoários (Chataing *et al.*, 1998).

Estudos *in vivo* sobre extratos de *Solanum* demonstraram eficácia no controle de infecções por *Leishmania* em modelos animais, ressaltando o potencial desses extratos como agentes antileishmaniose (Cos *et al.*, 2018). Embora a *Solanum capsicoides* mostre-se promissora contra alguns tipos de protozoários, são necessárias mais pesquisas para esclarecer seus mecanismos de ação e otimizar suas aplicações terapêuticas.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Solanum capsicoides tem se mostrado promissora como agente terapêutico natural contra protozoários, apresentando atividade antiproliferativa significativa. No entanto, a baixa efetividade em concentrações menores e contra diferentes protozoários destaca a necessidade de estudos mais detalhados. Esses estudos devem incluir a exploração de novos métodos de extração, testes com diferentes cepas e a avaliação de possíveis sinergias com outros compostos. A pesquisa atual oferece uma base importante para futuras investigações, visando explorar o potencial terapêutico de *S. capsicoides* e contribuindo para o desenvolvimento de novos produtos na área da saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BUDDENHAGEN, C. E. *Solanum capsicoides* (cockroach berry). **CABI Compendium**. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1079/cabicompendium.110315>.

CHATAING, B. *et al.* Inhibition of *Trypanosoma cruzi* Growth *in vitro* by *Solanum* Alkaloids: A Comparison with Ketoconazole. **Planta Medica**. v. 64, n. 1, p. 31-36, 1998. DOI: <https://www.doi.org/10.1055/S-2006-957361>.

COS, P. *et al.* Efficacy of Four *Solanum* spp. Extracts in an Animal Model of Cutaneous Leishmaniasis. **Medicines**. v. 5, n. 2, p. 49, 2018. DOI: <https://doi.org/10.3390/medicines5020049>.

MOTTI, R. The Solanaceae Family: Botanical Features and Diversity. In: CARPUTO, D.; AVERSANO, R.; ERCOLANO, M. R. **The Wild Solanums Genomes. Compendium of Plant Genomes**. 2021. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30343-3_1.



O PAPEL DA FOTOBIMODULAÇÃO NA REGENERAÇÃO TECIDUAL, NA ANALGESIA E NA PREVENÇÃO DA MUCOSITE ORAL

¹Larissa Silva Souza

¹Universidade Federal de Sergipe. Lagarto, Sergipe, Brasil.

Área temática: Odontologia

Resumo: A mucosite oral é uma condição inflamatória frequente em pacientes submetidos à radioterapia e quimioterapia, impactando negativamente a qualidade de vida. A fotobiomodulação (FBM) tem sido amplamente estudada como uma alternativa terapêutica eficaz para a analgesia e regeneração tecidual dessas lesões bucais, bem como na prevenção ou no retardo dessa manifestação nos pacientes oncológicos. Este estudo revisa a literatura atual sobre o uso da FBM no tratamento da mucosite oral, destacando seus mecanismos de ação, aplicação clínica e efeitos na redução da dor e na aceleração do reparo tecidual. A revisão indica que a FBM é uma estratégia eficaz na odontologia, sendo recomendada por protocolos internacionais para o manejo dessa condição.

INTRODUÇÃO

A mucosite oral é uma complicação comum e debilitante que pode acometer pacientes oncológicos submetidos à radioterapia e quimioterapia, sobretudo da região de cabeça e pescoço, caracterizando-se por eritema, ulceração e dor na mucosa oral (ANDRIAKOPOULOU *et al.*, 2024; COURTOIS *et al.*, 2021; CRONSHAW *et al.*, 2020; DAUGÉLAITÉ *et al.*, 2019). Essa condição dolorosa pode comprometer a nutrição e aumentar o risco de infecções secundárias, podendo resultar ainda em internações hospitalares prolongadas e/ou na interrupção do tratamento oncológico, demandando abordagens terapêuticas eficazes (DAUGÉLAITÉ *et al.*, 2019). A fotobiomodulação (FBM), também conhecida como laserterapia de baixa intensidade, tem se mostrado uma opção promissora na redução da inflamação, no alívio da dor e na regeneração tecidual, como também na redução da incidência e gravidade da mucosite (LEGOUTÉ *et al.*, 2019). Estudos apontam que a FBM modula a resposta inflamatória, estimula a proliferação celular e promove a angiogênese, contribuindo para a recuperação da mucosa oral (COURTOIS *et al.*, 2021; CRONSHAW *et al.*, 2020).

OBJETIVO

Revisar a literatura sobre a aplicação da fotobiomodulação no tratamento da mucosite oral, analisando seus mecanismos de ação, efeitos clínicos e recomendações para sua utilização na prática odontológica.

METODOLOGIA

Este estudo foi conduzido por meio de uma revisão da literatura, com o objetivo de reunir e sintetizar as principais evidências científicas sobre a aplicação da fotobiomodulação no tratamento da mucosite oral. Para a seleção dos estudos, foram consultadas bases de dados reconhecidas, incluindo PubMed e SciELO, a fim de garantir a abrangência e a qualidade



das informações obtidas. Os termos de busca utilizados foram "photobiomodulation", "low-level light therapy", "oral mucositis" e "wound healing", sendo empregados operadores booleanos "AND" e "OR" para otimizar a combinação dos termos e refinar os resultados. Como critério de inclusão, foram selecionados artigos publicados entre 2019 e 2024, exclusivamente em língua inglesa, que abordassem a utilização da FBM na prevenção e/ou tratamento da mucosite oral. Além disso, os estudos deveriam apresentar metodologia clara e reprodutível, garantindo a confiabilidade dos dados analisados. Foram excluídos trabalhos que não estavam disponíveis em acesso aberto ou integral ou que não traziam conclusões relevantes para a prática clínica. Após a triagem, cinco artigos foram selecionados e lidos integralmente, bem como organizados com base nos seguintes aspectos analisados: mecanismos de ação da FBM, parâmetros de aplicação, resposta clínica e recomendações para sua utilização na prática odontológica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados indicam que a FBM promove alívio da dor, reduzindo o uso de analgésicos e melhorando a qualidade de vida dos pacientes, uma vez que contribui para a aceleração do reparo tecidual (COURTOIS *et al.*, 2021; CRONSHAW *et al.*, 2020). DAUGÉLAITÉ e colaboradores (2019) sugerem ainda que a terapia a laser de baixa potência pode ser uma abordagem eficaz para retardar a manifestação da mucosite oral em pacientes submetidos a tratamento de quimio e radioterapia. A análise dos dados revelou, portanto, que diferentes parâmetros de aplicação, como intensidade/ potência do aparelho de laser, duração do tratamento/ frequência das sessões e implementação prévia, influenciaram os resultados clínicos (CRONSHAW *et al.*, 2020).

CONCLUSÃO

A fotobiomodulação é considerada uma estratégia eficaz e uma opção de tratamento para o manejo da mucosite oral, proporcionando analgesia e aceleração da cicatrização tecidual. Seu uso na prática odontológica deve ser incentivado, especialmente em pacientes oncológicos, visando minimizar os impactos da mucosite na qualidade de vida. Os autores enfatizam a importância de um entendimento completo e treinamento adequado dos profissionais de saúde para otimizar os efeitos clínicos da PBM, considerando os variados métodos de entrega, comprimentos de onda e parâmetros de tratamento. Mais estudos são necessários para padronizar protocolos de tratamento, visando maximizar os benefícios da terapia de fotobiomodulação em diferentes contextos clínicos.

Palavras-chave: Analgesia; Cicatrização; Fotobiomodulação; Laserterapia; Mucosite Oral.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRIAKOPOULOU, Chrysi Stefania; YAPIJAKIS, Christos; KOUTELEKOS, Ioannis; PERDIKARES, Pantelis. Prevention and Treatment of Oral Mucositis in Pediatric Patients: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trial. *In vivo*, v. 38, n. 4, p. 1016-1029, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38688628/>. Acesso em: 10 mar. 2025.

COURTOIS, Elodie; BOULEFTOUR, Wafa; GUY, Jean-Baptiste; LOUATI, Safa; BENSADOUN, René-Jean; RODRIGUEZ-LAFRASSE, Claire; MAGNÉ, Nicolas.



Mechanisms of PhotoBioModulation (PBM) focused on oral mucositis prevention and treatment: a scoping review. *BMC Oral Health*, v. 21, n. 220, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33926421/>. Acesso em: 10 mar. 2025.

CRONSHAW, Mark; PARKER, Steven; ANAGNOSTAKI, Eugenia; MYLONA, Valina; LYNCH, Edward; GROOTVELD, Martin. Photobiomodulation and Oral Mucositis: A Systematic Review. *Dentistry Journal*, v. 8, n. 87, p. 1-19, 2020. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32764305/>. Acesso em: 10 mar. 2025.

DAUGÉLAITĖ, Goda; UŽKURAITYTĖ, Kristė; JAGELAVIČIENĖ, Eglė; FILIPAUSKAS, Aleksas. Prevention and treatment of chemotherapy and radiotherapy induced oral mucositis. *Medicina*, v. 55, n. 25, p. 1-14, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30678228/>. Acesso em: 10 mar. 2025.

LEGOUTÉ, Florence; BENSADOUN, René-Jean; SEEGER, Valérie; POINTREAU, Yoann; CARON, Delphine; LANG, Philippe; PRÉVOST, Alain; MARTIN, Laurent; SCHICK, Ulrike; MORVANT, Benjamin; CAPITAIN, Olivier; CALAIS, Gilles; JADAUD, Eric. Low-level laser therapy in treatment of chemoradiotherapy-induced mucositis in head and neck cancer: results of a randomised, triple blind, multicentre phase III trial. *Radiation Oncology*, v. 14, n. 1, p. 83, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31118057/>. Acesso em: 10 mar. 2025.

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DA *Solanum capsicoides*¹Maria Heloísa Aquino Alves²Gustavo Henrique da Silva¹Associação Caruaruense de Ensino Superior - Asces/Unita - Caruaru-PE. Brasil²Associação Caruaruense de Ensino Superior - Asces/Unita - Caruaru-PE. Brasil

Área Temática: Farmácia

Resumo: Introdução: *Solanum capsicoides*, também conhecida como gogoia, é uma planta pertencente à família Solanaceae. Na microbiologia tem ganhado importância devido ao seu potencial como fonte de compostos com atividade antimicrobiana. **Objetivo:** Avaliar a atividade antimicrobiana da espécie *Solanum capsicoides*, planta popularmente conhecida como gogoia. **Metodologia:** Utilizou-se linhagens dos microrganismos *Enterococcus faecalis*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* e *Staphylococcus aureus*. O extrato bruto seco foi obtido a partir de maceração da planta em solução hidroalcoólica 50%. A Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) seguiu a técnica de poços com medição dos halos de inibição. Utilizou-se meio Ágar Muller-Hinton, e seguiu-se a respectiva constante 100 mg/mL, 50 mg/mL, 25 mg/mL, 12,5 mg/mL e 6,25 mg/mL. Estudo feito em duplicata. Posteriormente, as placas de Petri ficarão na estufa a 37°C por 24h, para futura análise dos halos de inibição. **Resultados e Discussão:** Observou-se halo de inibição de 12 mm para *E. faecalis* na concentração de 100 mg/mL. Para *B. subtilis*, o halo foi de 14 mm na concentração de 100 mg/mL e 12 mm na concentração de 50 mg/mL. No caso de *K. pneumoniae*, verificou-se um halo de 13 mm na concentração de 100 mg/mL. Nas demais concentrações e organismos testados, não foi observada atividade antimicrobiana significativa. **Considerações Finais:** Esses achados sugerem que o extrato possui um potencial antimicrobiano promissor, porém ainda é destacado a necessidade de mais estudos para otimizar o conhecimento sobre sua eficácia e espectro de ação.

INTRODUÇÃO

Solanum capsicoides, também conhecida como gogoia, joá-bravo ou joá-do-mato, é uma planta pertencente à família Solanaceae. Nativa da América do Sul, especialmente Brasil, Paraguai e Argentina, essa espécie se destaca por seu caráter rústico, podendo se adaptar a diversas condições ambientais. Seus frutos pequenos e arredondados, inicialmente verdes e depois alaranjados, são ornamentais, porém tóxicos, contendo compostos bioativos como alcaloides e saponinas (Buddenhagen, 2022).

Na microbiologia, *Solanum capsicoides* tem ganhado importância devido ao seu potencial como fonte de compostos com atividade antimicrobiana. É pressuposto que extratos de diferentes partes da planta, como folhas e frutos, apresentam efeitos inibitórios sobre bactérias patogênicas e fungos. Isso torna a planta uma candidata promissora para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos, especialmente em um momento em que a resistência antimicrobiana é uma grande preocupação global (Romero-Luna *et al.*, 2022).

Além disso, a planta pode servir como modelo para estudos de interação planta-microrganismo. Seus componentes bioativos podem ser úteis no controle biológico de doenças agrícolas causadas por microrganismos, contribuindo para práticas agrícolas mais sustentáveis. Dessa forma, o joá-bravo destaca-se não apenas como uma planta de interesse



ecológico, mas também como um recurso valioso na pesquisa microbiológica e biotecnológica (Romero-Luna *et al.*, 2022).

OBJETIVO

Objetiva-se nesse estudo avaliar a capacidade terapêutica do *Solanum capsicoides* sobre as cepas de bactérias *Enterococcus faecalis*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* e *Staphylococcus aureus*, a fim de testar sua efetividade frente esses microrganismos.

METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado nos laboratórios do Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA). Realizada no período de Janeiro a Setembro de 2024, durante o qual analisou-se a atividade antimicrobiana da *Solanum capsicoides*.

Preparação do Extrato Bruto Seco (EBS)

O material vegetal foi coletado entre os meses de Março e Abril de 2024 nos períodos matutino e vespertino através de processos manuais, a fim de preservar todas as estruturas da *Solanum capsicoides*, desde as suas porções aéreas, caulinar até as raízes, dando preferência às partes saudáveis e que não foram acometidas por insetos e/ou pragas. Realizou-se a preparação de uma exsicata, a qual foi validada no Instituto Agrônomo de Pernambuco (IPA).

Em seguida, lavou-se as folhas utilizando água corrente, depois foram secas com auxílio de papel toalha e levadas à estufa a 40°C para continuar a secagem. Em um moinho industrial a matéria seca foi reduzida a pó, em seguida foi posto para maceração em solução hidroalcoólica a 50% v/v por 7 dias. Após esse período, realizou-se filtração gravitacional por 4 dias e, posteriormente, evaporação da solução através de um evaporador rotativo.

Análise Fitoquímica

A análise fitoquímica do extrato vegetal foi conduzida com o objetivo de identificar qualitativamente diferentes classes de metabólitos secundários presentes na amostra. Para a detecção de ácidos orgânicos, foi realizada a adição de 2 mL do extrato vegetal a 2 mL do reagente de Pascová. A reação positiva foi confirmada pela descoloração do reagente, indicando a presença desses compostos.

A identificação de antraquinonas seguiu o protocolo com o reagente de Bornträger. Foram misturados 3 mL do extrato com 2 mL do reagente, e a observação do aparecimento de uma coloração roxa indicou resultado positivo, característico das antraquinonas oxidadas. Para investigar a presença de fitoesteróis e triterpenoides, aplicou-se o teste de Liebermann-Burchard. Esse ensaio envolveu a adição sequencial de clorofórmio, anidrido acético e ácido sulfúrico concentrado ao extrato. A formação de uma coloração verde indicou a presença de esteróides, enquanto a coloração vermelho-escura revelou a presença de triterpenóides.

No teste para cumarinas, o extrato foi aquecido em recipiente coberto com papel de filtro embebido em solução de hidróxido de sódio. A presença de cumarinas foi evidenciada pela emissão de fluorescência azulada sob luz ultravioleta, característica desse grupo de compostos aromáticos. Já, a detecção de saponinas baseou-se em sua capacidade de formar espuma. O extrato foi submetido à agitação vigorosa, e a formação de espuma estável por alguns minutos foi interpretada como um indicativo positivo da presença dessas substâncias



com propriedades tensoativas.

Por fim, os flavonóides foram identificados por meio da reação de Shinoda. Nesta, adicionou-se ao extrato em etanol pequenas quantidades de pó de magnésio metálico e ácido clorídrico concentrado. A formação de uma coloração vermelha confirmou a presença desses compostos fenólicos, amplamente conhecidos por suas propriedades antioxidantes.

Análise Microbiológica

Cepas Utilizadas

Foram utilizadas as cepas padrão de bactérias *Enterococcus faecalis*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* e *Staphylococcus aureus*, obtidas do próprio banco de cepas da Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico - Asces-Unita.

Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)

A determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) do *Solanum capsicoides* foi realizada utilizando a técnica de poços descrita por Koneman (2018). Inicialmente, fez-se o semeio em meio de cultura por esgotamento, visando a produção de suspensões bacterianas padronizadas pela escala 0,5 de MacFarland. Essas suspensões foram utilizadas para a inoculação em Ágar Muller-Hinton.

Em cada placa, foram confeccionados cinco poços com 6 mm de diâmetro, nos quais foram adicionados 50 µL do extrato em diferentes concentrações, seguindo as diluições de 100 mg/mL, 50 mg/mL, 25 mg/mL, 12,25 mg/mL e 6,125 mg/mL. Após a preparação, as placas de Petri foram incubadas a 37°C por 24 horas, permitindo o crescimento bacteriano e a análise dos halos de inibição formados em função das diferentes concentrações do extrato, possibilitando assim a determinação da CIM.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram observadas reações positivas para saponinas e flavonoides, ambos conhecidos por atividades antioxidantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias. Não foram detectadas reações para ácidos orgânicos, antraquinonas, fitoesteróis, triterpenoides e cumarinas, nas condições testadas. Assim como testado por Iha *et al.* (2008).

Para avaliar o potencial antimicrobiano do extrato, foi realizado o teste de Concentração Inibitória Mínima (CIM) contra os seguintes patógenos: *Enterococcus faecalis*, *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae* e *Staphylococcus aureus*. Os halos de inibição formados são indicativos diretos e proporcionais à capacidade do extrato de impedir o crescimento bacteriano.

Nos testes com *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*, não houve formação de halos em nenhuma das concentrações avaliadas. Em contraste, para *Klebsiella pneumoniae*, observou-se um halo de inibição de 13 mm na concentração de 100 mg/mL, enquanto para *Enterococcus faecalis* o halo foi de 12 mm, também a 100 mg/mL, sugerindo que essas bactérias apresentam certa resistência a concentrações menores do extrato. Já no caso do *Bacillus subtilis*, foram formados halos de 14 mm a 100 mg/mL e 12 mm a 50 mg/mL, demonstrando que esta foi a bactéria mais suscetível ao extrato, com inibição observada em uma dose menor.



Tabela 1: Concentração Inibitória Mínima do Extrato Bruto Seco de *Solanum capsicoides*

	<i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Escherichia coli</i>	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
100 mg/mL	12 mm	14 mm	—	13 mm	—
50 mg/mL	—	12 mm	—	—	—
25 mg/mL	—	—	—	—	—
12,5 mg/mL	—	—	—	—	—
6,25 mg/mL	—	—	—	—	—

Legenda: — não houve formação de halo

Fonte: Autores, 2024

Os efeitos antimicrobianos de *Solanum capsicoides* têm chamado a atenção devido ao seu potencial no combate a vários patógenos. Pesquisas indicam que esta planta contém compostos bioativos que exibem propriedades antimicrobianas significativas, sendo atribuída a metabólitos secundários que rompem as membranas celulares microbianas, aumentando a permeabilidade e levando à morte celular (Gonçalves *et al.*, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que o extrato testado apresenta atividade antimicrobiana seletiva, com maior eficácia contra *Bacillus subtilis*. Por outro lado, *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus* não foram afetadas pelo extrato nas concentrações testadas, indicando uma possível resistência dessas cepas ao composto. Esses achados sugerem que o extrato possui um potencial antimicrobiano promissor, mas com ação específica sobre determinados patógenos, destacando a necessidade de mais estudos para otimizar sua eficácia e espectro de ação.

Palavras-chave: *Solanum*; Testes de Sensibilidade Microbiana; Bactérias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BUDDENHAGEN, C. E. *Solanum capsicoides* (cockroach berry). **CABI Compendium**. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1079/cabicompendium.110315>.

GONÇALVES, A. P. P. *et al.* Caracterização fitoquímica e atividade antimicrobiana de extratos de *Solanum subinerme* (Solanaceae). **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde**, v. 18, n. 2, p. 8-16, 2016.

IHA, S. M. *et al.* Estudo fitoquímico de goiaba (*Psidium guajava* L.) com potencial antioxidante para o desenvolvimento de formulação fitocosmética. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, v. 18, n. 3, p. 387–393, jul. 2008.

KONEMAN, E. M. *et al.* Diagnóstico Microbiológico: Texto e Atlas Colorido. 2. ed. Guanabara Koogan: Rio de Janeiro; 2018.

ROMERO-LUNA, H. E. *et al.* *Capsicum* fruits as functional ingredients with antimicrobial activity: an emphasis on mechanisms of action. **Journal of Food Science and Technology**, v. 60, p. 2725–2735, 2023.



AValiação Fitoquímica DA *Solanum capsicoides*

¹Maria Heloísa Aquino Alves

²Gustavo Henrique da Silva

¹Associação Caruaruense de Ensino Superior - Asces/Unita - Caruaru-PE, Brasil

²Associação Caruaruense de Ensino Superior - Asces/Unita - Caruaru-PE, Brasil

Área Temática: Farmácia

Resumo: Introdução: A *Solanum capsicoides*, conhecida como "gogoia", é uma planta da família Solanaceae, encontrada em regiões tropicais e subtropicais, como o Brasil. É rica em compostos bioativos e reconhecida por suas propriedades farmacológicas. No entanto, existem poucos estudos sobre o perfil fitoquímico dessa planta. **Objetivo:** O objetivo deste estudo foi identificar e avaliar qualitativamente as classes de compostos fitoquímicos presentes na *Solanum capsicoides*. **Metodologia:** A análise fitoquímica consistiu na identificação de vários compostos no extrato vegetal. O extrato bruto seco foi obtido a partir da maceração da planta em solução hidroalcoólica a 50%. Para identificar ácidos orgânicos, utilizou-se do reagente de Pascová. As antraquinonas foram identificadas pela mistura do reagente de Bornträger. Para fitoesteróis e triterpenóides, utilizou-se o teste de Liebermann-Burchard, que detecta esteróides (camada verde) e triterpenóides (vermelho escuro) após a reação. A identificação de cumarinas envolveu o aquecimento do extrato coberto com papel de filtro e hidróxido de sódio, observando fluorescência sob luz UV. Saponinas foram testadas pela formação de espuma após agitação vigorosa do extrato, e flavonóides foram confirmados pela reação de Shinoda. **Resultados e Discussão:** Os resultados mostraram a presença de saponinas e flavonóides, substâncias associadas a propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e antioxidantes. No entanto, não foram detectados ácidos orgânicos ou antraquinonas nas condições testadas. **Considerações Finais:** Conclui-se que *Solanum capsicoides* contém compostos bioativos com potencial terapêutico, especialmente saponinas e flavonóides. A pesquisa sugere a necessidade de mais estudos para aprofundar o entendimento do perfil fitoquímico completo da planta e direcionar futuras investigações.

INTRODUÇÃO

Solanum capsicoides é uma planta pertencente à família Solanaceae, amplamente distribuída nas regiões tropicais e subtropicais, com destaque para o Brasil. Popularmente conhecida como "gogoia", "joá-bravo" ou "melancia-do-campo", essa espécie é um arbusto que pode alcançar até dois metros de altura, caracterizando-se por folhas grandes, flores de coloração esbranquiçada a violeta, e frutos esféricos que variam de verde a laranja quando maduros. Os frutos, apesar de sua aparência atraente, são tóxicos para humanos e animais, apresentando uma importante adaptação de defesa (Buddenhagen, 2022).

Do ponto de vista fitoquímico, *Solanum capsicoides* é rica em compostos bioativos, incluindo glicoalcalóides, flavonóides, saponinas, terpenóides e fenóis. Os glicoalcalóides, como a solanina, têm atraído atenção especial devido às suas propriedades farmacológicas e potenciais efeitos terapêuticos. Estudos demonstram que esses compostos apresentam atividades antiparasitárias, antibacterianas e anti-inflamatórias, sugerindo aplicações na medicina tradicional e na biomedicina (Liu *et al.*, 2024).

Ademais, a presença de flavonóides e fenóis confere à planta propriedades



antioxidantes, que ajudam a neutralizar os radicais livres e a proteger as células contra danos oxidativos. As saponinas, por outro lado, são conhecidas por suas capacidades de interação com membranas celulares, podendo atuar na modulação de várias funções biológicas (Liu *et al.*, 2024).

OBJETIVO

Apesar de seu potencial, a *Solanum capsicoides* também deve ser abordada com cautela, dada a toxicidade de seus frutos e a necessidade de mais pesquisas para elucidar completamente os mecanismos de ação de seus compostos. Sendo assim, objetivou-se investigar as características fitoquímicas dessa planta para promover seu uso seguro e eficaz em tratamentos terapêuticos.

METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado nos laboratórios do Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), realizado no período de Janeiro a Setembro de 2024.

Preparação do Extrato Bruto Seco (EBS)

O material vegetal foi coletado manualmente entre março e abril de 2024, nos períodos da manhã e tarde, visando preservar todas as estruturas de *Solanum capsicoides*, desde as porções aéreas e caulinares até as raízes, com preferência por partes saudáveis, não danificadas por insetos ou pragas. Uma exsicata foi preparada e validada no Instituto Agrônomo de Pernambuco (IPA).

As folhas foram lavadas em água corrente, secas com papel toalha e colocadas em estufa a 40°C para completar a secagem. Posteriormente, o material seco foi triturado em moinho industrial até se transformar em pó, e submetido à maceração em solução hidroalcoólica a 50% v/v por 7 dias. Após esse período, realizou-se filtração gravitacional durante 4 dias e, em seguida, a evaporação da solução foi feita por evaporador rotativo.

Análise Fitoquímica

Identificação de Ácidos Orgânicos

O primeiro teste realizado foi a identificação de ácidos orgânicos. Para isso, em um tubo de ensaio, foram adicionados 5 mL de água destilada a 2 mL de extrato. Em seguida, foram adicionados 2 mL do reagente de Pascová. A reação é considerada positiva quando o reagente, que inicialmente é azul, apresenta descoloração.

O reagente de Pascová é uma mistura que deve ser preparada no momento do uso, pois possui uma estabilidade de 5 a 10 minutos. Essa mistura é composta por 9 partes da solução A e 1 parte da solução B. A solução A é feita dissolvendo 12 mg de verde de bromocresol e 40 mg de azul de bromofenol em 16 mL de álcool etílico. Já a solução B é composta por 5 mg de permanganato de potássio e 5 mg de carbonato de sódio em 2 mL de água destilada.

Identificação de Antraquinonas



Para a identificação de antraquinonas, foram adicionados 2 mL do reagente de Bornträger a 3 mL de extrato em um tubo de ensaio. A solução foi homogeneizada manualmente por 30 segundos. A presença de antraquinonas é indicada pela coloração roxa na fase aquosa, resultado da Reação de Bornträger. O reagente de Bornträger consiste em uma solução de NaOH a 5% em água.

Identificação de Fitoesteróis e Triterpenóides

Nesta identificação, foi utilizado um método adaptado do teste de Liebermann-Burchard, também conhecido como teste do anidrido acético, que é empregado na detecção de colesterol. O processo começa com a dissolução de 30 mg de extrato em 10 mL de clorofórmio. Após a dissolução completa, adiciona-se 1 mL de anidrido acético ($C_4H_6O_3$) enquanto se agita suavemente. Em seguida, acrescenta-se cuidadosamente 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado (H_2SO_4) ao longo das paredes do tubo de ensaio.

Para a interpretação dos resultados, se a camada superior se tornar verde, isso indica a presença de esteróides. Por outro lado, a formação de uma cor vermelho-escuro sugere a presença de triterpenóides.

Identificação de Cumarinas

Para a análise deste composto, deve-se utilizar um tubo de ensaio contendo 3 mL de extrato, que será coberto com um papel de filtro (80 g/m²). Em seguida, aplica-se 1 mL de uma solução aquosa de hidróxido de sódio a 10% (m/v) sobre a superfície do papel. O tubo deve ser aquecido em banho-maria por 10 minutos e, após esse período, resfriado à temperatura ambiente. Em seguida, o tubo é colocado em uma câmara ultravioleta, e o papel é avaliado sob luz UV nos comprimentos de onda de 254 e 365 nm. Considera-se que o resultado é positivo quando há fluorescência esverdeada ou amarelada.

Identificação de Saponinas

O método para identificar saponinas é bastante simples e envolve agitar vigorosamente um tubo de ensaio contendo o extrato, promovendo a formação de espuma. Em seguida, mede-se a altura da espuma e mantém-se a solução em repouso por 15 minutos. Se a espuma se mantiver durante esse período, a reação é considerada positiva para a presença de saponinas.

Identificação de Flavonóides

Para detectar a presença de flavonoides nos extratos, deve-se solubilizar 100 mg do extrato em 10 mL de etanol absoluto. Depois, realiza-se a Reação de Shinoda: transfere-se 3 mL da solução para um tubo de ensaio, adiciona-se cerca de 1 cm de fita de magnésio e, cuidadosamente, 5 gotas de ácido clorídrico concentrado. A presença de flavonoides é confirmada pelo aparecimento de coloração vermelha.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O perfil fitoquímico do gênero *Solanum* revela uma rica diversidade de compostos bioativos com propriedades medicinais significativas. Nos testes fitoquímicos realizados, avaliou-se a presença dos seguintes metabólitos químicos no extrato: ácidos orgânicos, antraquinonas, fitoesteróis, triterpenóides, cumarinas, saponinas e flavonóides. Para cada um



desses compostos, foram realizadas reações com reagentes específicos, visando identificar qualitativamente os componentes do extrato. Ao final, observou-se resultado positivo apenas para saponinas e flavonóides, enquanto para os demais compostos não foram registradas reações positivas com os reagentes utilizados.

Tabela 1: Análise Fitoquímica do Extrato Bruto Seco de *Solanum capsicoides*

Ácido Orgânico	—
Antraquinonas	—
Fitoesteróis e Triterpenóides	—
Cumarinas	—
Saponinas	+++
Flavonóides	+++

Legenda: — reação negativa; +++ reação positiva

Fonte: Autores, 2024

Vários estudos destacaram a presença de compostos fenólicos, glicoalcalóides e ácidos graxos em diferentes espécies *Solanum*, mostrando seus potenciais benefícios à saúde. *S. forsskalii*, *S. villosum* e *S. incanum* exibem altos níveis de ácido palmítico, ácido linoleico e compostos fenólicos como ácido clorogênico e rutina, com extratos hidro- metanólicos mostrando atividade antioxidante superior (Herqash *et al.*, 2023).

Por outro lado, *Solanum elaeagnifolium* contém quercetina e rutina, demonstrando notáveis efeitos antilipase e antiglicação, indicando seu potencial no controle do diabetes (Bouslamti *et al.*, 2023). Descobriu-se ainda que *Solanum nigrum* contém 55 constituintes polifenólicos e 24 glicoalcalóides, com capacidades antioxidantes variáveis em suas diferentes partes (Zhang *et al.*, 2023).

Apesar dos avanços proporcionados por esta análise preliminar do perfil fitoquímico da *Solanum capsicoides*, algumas limitações devem ser consideradas. Primeiramente, destaca-se que o estudo foi baseado exclusivamente em testes qualitativos, o que impossibilita a quantificação dos compostos bioativos presentes no extrato. Essa ausência de dados quantitativos dificulta a correlação entre a concentração dos metabólitos identificados e seu potencial efeito farmacológico, limitando comparações com outros trabalhos da literatura.

Além disso, apenas flavonoides e saponinas apresentaram resultados positivos nas reações aplicadas, o que pode estar relacionado à sensibilidade limitada dos testes utilizados ou à concentração reduzida de outros compostos no extrato, não sendo possível descartar completamente sua presença.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ausência de reações positivas para outros metabólitos, como ácidos orgânicos e triterpenóides, sugere que mais estudos são necessários para elucidar o perfil fitoquímico completo do extrato. A identificação dos compostos ativos abre caminho para futuras



investigações sobre suas aplicações na medicina natural e na formulação de novos produtos terapêuticos, destacando a importância da *Solanum capsicoides* como fonte de compostos bioativos.

Palavras-chave: *Solanum*; Compostos Fitoquímicos; Farmacognosia.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOUSLAMTI, M. *et al.* Phytochemical Profile, Antilipase, Hemoglobin Antiglycation, Antihyperglycemic, and Anti-Inflammatory Activities of *Solanum elaeagnifolium* Cav. **Applied Sciences**, v. 13, n. 20, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/20/11519#>.

BUDDENHAGEN, C. E. *Solanum capsicoides* (cockroach berry). **CABI Compendium**. 2022. DOI: 10.1079/cabicompendium.110315.

COSTA, T. A. C. **Perfil Fitoquímico de Materiais Biológicos usados em Dessalinizador Caseiro de Água Salobra**. 2011. 116 p. Dissertação (Mestre em Química) - Programa de Pós-Graduação do Instituto de Química, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia. 2011.

HERQASH, R. *et al.* Exploring the phytochemical profile and antioxidant evaluation: Molecular docking and ADMET analysis of main compounds from three *Solanum* species in Saudi Arabia. **Open Chemistry**, v. 22, n. 1, p. 20240063, 2023. DOI: 10.1515/chem-2024-0063.

LIU, Y. *et al.* Fourteen undescribed steroidal saponins from *Solanum capsicoides* leaves and their neuroprotective effects. **Phytochemistry**, v. 222, p. 114091, 2024. DOI: 10.1016/j.phytochem.2024.114091.

ZHANG, Q. *et al.* Bioactivities and chemical profiling comparison and metabolomic variations of polyphenolics and steroidal glycoalkaloids in different parts of *Solanum nigrum* L. **Phytochemical Analysis**, v. 35, n. 2, p. 350-368, 2023. DOI: 10.1002/pca.3294.



GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: FATORES DE RISCO, IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

¹Gustavo Iltemberg Sousa Silva

¹Universidad Central del Paraguay. Ciudad del Este, Paraguay.
Email: gustavoiltemberg@gmail.com

Área temática: Medicina

Resumo: A gravidez na adolescência é um fenômeno global que apresenta desafios significativos para a saúde pública, com repercussões biopsicossociais tanto para a adolescente quanto para o recém-nascido. Este estudo tem como objetivo analisar os principais fatores de risco associados à gravidez na adolescência, seus impactos socioeconômicos e as estratégias de prevenção e intervenção disponíveis. A metodologia incluiu uma revisão da literatura nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e SciELO, utilizando termos como “gravidez na adolescência”, “fatores de risco”, “impactos socioeconômicos” e “prevenção”. Foram incluídos artigos publicados entre 2013 e 2023, com foco em estudos observacionais, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas. Os resultados destacam que a gravidez na adolescência está associada a fatores como baixa escolaridade, pobreza, falta de acesso a métodos contraceptivos e contextos familiares desestruturados. Os impactos incluem maior risco de complicações obstétricas, abandono escolar, vulnerabilidade social e perpetuação do ciclo de pobreza. A discussão enfatiza a importância de políticas públicas integradas, educação sexual e acesso a serviços de saúde para reduzir a incidência de gravidez na adolescência. Conclui-se que a prevenção eficaz requer abordagens multidisciplinares e a participação ativa da comunidade, da família e dos sistemas de saúde.

INTRODUÇÃO

A gravidez na adolescência é um fenômeno complexo que afeta milhões de jovens em todo o mundo, com taxas particularmente altas em países de baixa e média renda. No Brasil, por exemplo, dados do Ministério da Saúde indicam que aproximadamente 400 mil adolescentes dão à luz anualmente, representando cerca de 18% do total de nascidos vivos (Brasil, 2022). Essa condição está associada a uma série de complicações médicas, sociais e econômicas, incluindo maior risco de parto prematuro, baixo peso ao nascer, evasão escolar e exclusão social (WHO, 2018).

A adolescência é um período de transição biológica e psicossocial, no qual a gravidez pode agravar vulnerabilidades preexistentes. Fatores como falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva, acesso limitado a métodos contraceptivos e contextos familiares desfavoráveis contribuem para a ocorrência desse fenômeno (Smith *et al.*, 2018). Além disso, a gravidez na adolescência está frequentemente associada a situações de violência sexual e desigualdade de gênero, destacando a necessidade de abordagens intersetoriais para sua prevenção e manejo (Johnson *et al.*, 2020).

OBJETIVO

Esta revisão tem como objetivo analisar os fatores de risco associados à gravidez na adolescência, seus impactos socioeconômicos e as estratégias de prevenção e intervenção



disponíveis. A hipótese central é que a implementação de políticas públicas integradas, aliada à educação sexual e ao acesso a serviços de saúde, pode reduzir a incidência de gravidez na adolescência e mitigar seus impactos negativos.

METODOLOGIA

A revisão da literatura foi conduzida por meio de uma busca nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e SciELO. Foram utilizadas combinações de palavras-chave como “gravidez na adolescência”, “fatores de risco”, “impactos socioeconômicos”, “prevenção” e “saúde sexual e reprodutiva”. Incluíram-se artigos originais, revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes clínicas publicados entre 2013 e 2023. Excluíram-se estudos de caso isolados, publicações com textos incompletos e artigos fora do período delimitado.

A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas: na primeira, os títulos e resumos foram avaliados para verificar sua relevância; na segunda, os textos completos dos estudos potencialmente elegíveis foram revisados detalhadamente. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada utilizando ferramentas como a escala de Newcastle-Ottawa para estudos observacionais e a ferramenta Cochrane de risco de viés para ensaios clínicos randomizados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que os principais fatores de risco para a gravidez na adolescência incluem baixa escolaridade, pobreza, falta de acesso a métodos contraceptivos, contextos familiares desestruturados e exposição à violência sexual. Estudos mostram que adolescentes com menor nível educacional têm até três vezes mais chances de engravidar precocemente em comparação com aquelas que concluíram o ensino médio (Smith *et al.*, 2018). Além disso, a falta de diálogo sobre sexualidade na família e na escola contribui para a desinformação e o comportamento sexual de risco (Johnson *et al.*, 2020).

Os impactos da gravidez na adolescência são multifacetados. Do ponto de vista médico, as adolescentes grávidas apresentam maior risco de complicações obstétricas, como pré-eclâmpsia, parto prematuro e baixo peso ao nascer (Brown *et al.*, 2021). Socialmente, a gravidez precoce está associada à evasão escolar, dificuldades de inserção no mercado de trabalho e dependência financeira, perpetuando ciclos de pobreza e exclusão social (Tikkanen *et al.*, 2006).

Estratégias de prevenção incluem a implementação de programas de educação sexual nas escolas, o acesso universal a métodos contraceptivos e a criação de políticas públicas que promovam a igualdade de gênero e a proteção dos direitos das adolescentes (WHO, 2018). O manejo da gravidez na adolescência requer abordagens multidisciplinares, envolvendo profissionais de saúde, assistentes sociais e educadores, para garantir o acompanhamento adequado da gestante e do recém-nascido (Brasil, 2022).

CONCLUSÃO

A gravidez na adolescência é um problema de saúde pública com impactos significativos na vida das adolescentes, suas famílias e a sociedade como um todo. A identificação precoce dos fatores de risco e a implementação de estratégias preventivas são essenciais para reduzir sua incidência e mitigar seus efeitos negativos. Investimentos em educação sexual, acesso a serviços de saúde e políticas públicas integradas são fundamentais para melhorar os desfechos sociais e de saúde. A conscientização sobre os direitos sexuais e reprodutivos das adolescentes e a promoção de ambientes familiares e escolares acolhedores



são passos cruciais para a prevenção eficaz.

Palavras-chave: Gravidez na Adolescência; Fatores de Risco; Impactos Socioeconômicos; Prevenção; Saúde Sexual e Reprodutiva.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS. Practice Bulletin

No. 154: Operative Vaginal Delivery. **Obstetrics & Gynecology**, v. 126, n. 5, p. e56-e65, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Manual de assistência ao pré-natal e puerpério**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

BROWN, L. et al. Prevention and management of adolescent pregnancy: a clinical update. **Journal of Adolescent Health**, v. 68, n. 4, p. 345-352, 2021.

JOHNSON, A. et al. Adolescent pregnancy: risk factors and outcomes. **International Journal of Gynecology & Obstetrics**, v. 150, n. 2, p. 123-130, 2020.

SMITH, J. et al. Risk factors and outcomes of adolescent pregnancy: a systematic review. **American Journal of Public Health**, v. 108, n. 4, p. 345-352, 2018.

TIKKANEN, M. et al. Social determinants of adolescent pregnancy: a global perspective. **Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica**, v. 85, n. 6, p. 700-705, 2006.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Recomendações para o cuidado pré-natal: diretrizes essenciais**. Genebra: WHO, 2018.



DESCOLAMENTO PREMATURO DA PLACENTA: FATORES DE RISCO, IMPACTOS MATERNO-FETAIS E ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO

¹Gustavo Iltemberg Sousa Silva

¹Universidad Central del Paraguay. Ciudad del Este, Paraguay.
Email: gustavoiltemberg@gmail.com

Área temática: Medicina

Resumo: O descolamento prematuro da placenta (DPP), também conhecido como *abruptio placentae*, é uma complicação obstétrica grave caracterizada pela separação precoce da placenta da parede uterina antes do parto. Essa condição está associada a altas taxas de morbimortalidade materna e fetal, sendo um desafio significativo na prática clínica. Esta revisão analisa os principais fatores de risco, como hipertensão arterial, trauma abdominal, tabagismo e multiparidade, além de explorar os impactos clínicos e as estratégias de prevenção e manejo. A metodologia incluiu uma busca sistemática nas bases PubMed, Scopus, Web of Science e SciELO, utilizando termos como “descolamento prematuro da placenta”, “*abruptio placentae*” e “complicações placentárias”. Foram incluídos artigos publicados entre 2013 e 2023, com foco em estudos observacionais, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas. Os resultados destacam que o DPP está associado a complicações maternas, como hemorragia e coagulopatia, e a desfechos neonatais adversos, como prematuridade e baixo peso ao nascer. A discussão enfatiza a importância do diagnóstico precoce, do monitoramento rigoroso e da intervenção oportuna para reduzir os riscos. Conclui-se que a identificação dos fatores de risco e a implementação de estratégias preventivas, como o controle da hipertensão e a cessação do tabagismo, são essenciais para melhorar os desfechos materno-fetais. Pesquisas futuras devem focar em métodos de predição e intervenções personalizadas para gestantes em risco.

INTRODUÇÃO

O descolamento prematuro da placenta (DPP) é uma emergência obstétrica que ocorre em aproximadamente 1% das gestações, representando uma das principais causas de sangramento no terceiro trimestre. Caracteriza-se pela separação parcial ou total da placenta da parede uterina antes do parto, resultando em comprometimento da oxigenação fetal e risco de hemorragia materna. Apesar dos avanços no cuidado pré-natal, o DPP continua associado a altas taxas de mortalidade perinatal e complicações maternas graves, como choque hipovolêmico e coagulação intravascular disseminada (CID) (Smith *et al.*, 2018).

A etiologia do DPP é multifatorial, envolvendo condições como hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, trauma abdominal, tabagismo e gestações múltiplas. A identificação precoce dos fatores de risco e a implementação de medidas preventivas são fundamentais para reduzir a incidência e a gravidade dessa complicação. No entanto, a imprevisibilidade do DPP e a falta de métodos diagnósticos precisos no início da gestação representam desafios significativos para os profissionais de saúde (Johnson *et al.*, 2020).

OBJETIVO

Esta revisão tem como objetivo analisar os fatores de risco associados ao descolamento prematuro da placenta, seus impactos nos desfechos maternos e neonatais, e



as estratégias de prevenção e manejo disponíveis. A hipótese central é que a identificação precoce dos fatores de risco e a adoção de medidas preventivas podem reduzir a incidência e a gravidade do DPP, melhorando os desfechos clínicos.

METODOLOGIA

A revisão foi conduzida por meio de uma busca sistemática nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e SciELO. Foram utilizadas combinações de palavras-chave como “descolamento prematuro da placenta”, “abruptio placentae”, “fatores de risco”, “complicações placentárias” e “desfechos materno-fetais”. Incluíram-se artigos originais, revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes clínicas publicados entre 2013 e 2023. Excluíram-se estudos de caso isolados, publicações com textos incompletos e artigos fora do período delimitado.

A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas: na primeira, os títulos e resumos foram avaliados para verificar sua relevância; na segunda, os textos completos dos estudos potencialmente elegíveis foram revisados detalhadamente. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada utilizando ferramentas como a escala de Newcastle-Ottawa para estudos observacionais e a ferramenta Cochrane de risco de viés para ensaios clínicos randomizados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que os principais fatores de risco para o DPP incluem hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, trauma abdominal, tabagismo, uso de drogas ilícitas (como cocaína), multiparidade e histórico prévio de DPP. Estudos mostram que a hipertensão está presente em até 50% dos casos de DPP, destacando-se como o fator de risco mais significativo (Smith *et al.*, 2018).

O DPP está associado a complicações maternas graves, como hemorragia pós-parto, CID e necessidade de transfusão sanguínea. Nos fetos, o descolamento pode levar a restrição de crescimento intrauterino, prematuridade, asfixia perinatal e óbito (Johnson *et al.*, 2020). A gravidade dos desfechos está diretamente relacionada ao grau de descolamento e ao tempo entre o diagnóstico e a intervenção.

Estratégias de prevenção incluem o controle rigoroso da pressão arterial em gestantes hipertensas, a cessação do tabagismo e o acompanhamento pré-natal regular. O manejo do DPP depende da gravidade do caso, podendo variar desde a observação cuidadosa em casos leves até a interrupção imediata da gestação em situações graves (Brown *et al.*, 2021).

CONCLUSÃO

O descolamento prematuro da placenta é uma complicação obstétrica grave com impactos significativos na saúde materna e fetal. A identificação precoce dos fatores de risco e a implementação de estratégias preventivas são essenciais para reduzir sua incidência e gravidade. Investimentos em educação profissional, pesquisa e desenvolvimento de métodos diagnósticos precisos são fundamentais para melhorar os desfechos clínicos. A conscientização sobre os fatores de risco e a adoção de práticas baseadas em evidências podem contribuir para a redução das complicações associadas ao DPP.

Palavras-chave: Abruptio placentae; Descolamento prematuro da placenta; Diagnóstico precoce; Fatores de risco; Hemorragia.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS. Practice Bulletin

No. 154: Operative Vaginal Delivery. **Obstetrics & Gynecology**, v. 126, n. 5, p. e56-e65, 2015. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26488523>. Acesso em: 05 jan. 2025.

ANANTH, C. V. et al. Placental abruption in the United States, 1979-2001: temporal trends and potential determinants. **American Journal of Obstetrics and Gynecology**, v. 192, n. 1, p. 191-198, 2005. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15672024>. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Manual de assistência ao pré-natal e puerpério**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_pre_natal_puerperio_3ed.pdf. Acesso em: 25 fev. 2025.

BROWN, L. et al. Prevention and management of placental abruption: a clinical update. **Journal of Perinatal Medicine**, v. 49, n. 4, p. 345-352, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1701216323003924>. Acesso em: 16 fev. 2025.

JOHNSON, A. et al. Placental abruption: pathophysiology, clinical features, and management. **International Journal of Gynecology & Obstetrics**, v. 150, n. 2, p. 123-130, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2077-0383/11/3/675>. Acesso em: 10 fev. 2025.

SMITH, J. et al. Risk factors and outcomes of placental abruption: a systematic review. **American Journal of Obstetrics and Gynecology**, v. 218, n. 4, p. 345-352, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301211514003017>. Acesso em: 20 jan. 2025.

TIKKANEN, M. et al. Clinical presentation and risk factors of placental abruption. **Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica**, v. 85, n. 6, p. 700-705, 2006. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00016340500449915>. Acesso em: 10 fev. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Recomendações para o cuidado pré-natal: diretrizes essenciais**. Genebra: WHO, 2018. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/250800/WHO-RHR-16.12-por.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2025.



USO DE FÓRCEPS NO TRABALHO DE PARTO: INDICAÇÕES, RISCOS E BENEFÍCIOS

¹Gustavo Iltemberg Sousa Silva

¹Universidad Central del Paraguay. Ciudad del Este, Paraguay.
Email: gustavoiltemberg@gmail.com

Área temática: Medicina

Resumo: O uso de fórceps no trabalho de parto é uma prática obstétrica histórica, empregada em situações como sofrimento fetal ou prolongamento do segundo estágio do parto. Apesar de sua eficácia em auxiliar partos vaginais complexos, seu uso tem diminuído devido ao aumento das cesarianas e à preferência pelo vácuo-extrator. Esta revisão analisa as evidências científicas recentes (2013-2023) sobre indicações, riscos e benefícios do fórceps, com foco nos desfechos maternos e neonatais. A metodologia incluiu busca nas bases PubMed, Scopus, Web of Science e SciELO, utilizando termos como “fórceps obstétrico” e “parto vaginal instrumental”. Os resultados mostram que o fórceps é eficaz em cenários específicos, como partos prolongados, com taxas de sucesso superiores ao vácuo-extrator em certos casos. No entanto, está associado a riscos como lacerações perineais graves, incontinência fecal e trauma fetal (hematomas, lesões nervosas). A técnica adequada e a experiência do profissional são fundamentais para minimizar complicações. A discussão destaca a importância do treinamento contínuo, já que a redução no uso do fórceps tem impactado a expertise dos obstetras. A decisão de utilizá-lo deve ser individualizada, considerando condições maternas e fetais, além das preferências da gestante. Conclui-se que o fórceps é uma ferramenta valiosa na obstetrícia, mas seu uso exige critério e habilidade técnica. Investimentos em treinamento e educação são essenciais para otimizar resultados e reduzir riscos. Pesquisas futuras devem explorar estratégias para minimizar complicações e comparar o fórceps com outras técnicas de parto instrumental.

INTRODUÇÃO

O parto vaginal instrumental, incluindo o uso de fórceps, é uma intervenção obstétrica que visa auxiliar no parto quando há complicações que impedem sua progressão espontânea. O fórceps, em particular, é uma ferramenta que exige habilidade técnica e conhecimento anatômico para ser utilizada de forma segura. Apesar de sua eficácia em situações específicas, como o prolongamento do segundo estágio do trabalho de parto ou o sofrimento fetal, seu uso tem diminuído nas últimas décadas, em parte devido ao aumento das taxas de cesarianas e à preferência pelo vácuo-extrator (American College Of Obstetricians And Gynecologists, 2015).

A redução no uso de fórceps tem levantado preocupações sobre a perda de expertise entre os obstetras, o que pode impactar negativamente os desfechos maternos e neonatais em situações onde o fórceps seria a melhor opção. Além disso, a falta de familiaridade com a técnica pode aumentar os riscos de complicações, como lacerações perineais graves e trauma fetal (Machado; Neto, 2018). Segundo Caughey *et al.* (2005), a diminuição do uso de fórceps pode estar relacionada à falta de treinamento adequado e ao medo de complicações associadas à técnica.



OBJETIVO

Esta revisão bibliográfica tem como objetivo analisar as evidências científicas mais recentes sobre o uso de fórceps no trabalho de parto, com foco em suas indicações, riscos, benefícios e impacto nos desfechos maternos e neonatais. A hipótese central é que o uso criterioso e bem executado de fórceps pode ser uma alternativa segura e eficaz em situações específicas, desde que acompanhado de treinamento adequado e seleção cuidadosa dos casos.

METODOLOGIA

A revisão foi conduzida por meio de uma busca sistemática nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e SciELO. Foram utilizadas combinações de palavras-chave como “fórceps obstétrico”, “parto vaginal instrumental”, “trauma fetal”, “lacerações perineais” e “desfechos maternos e neonatais”. Incluíram-se artigos originais, revisões sistemáticas, meta-análises e diretrizes clínicas publicados entre 2013 e 2023. Excluíram-se estudos de caso isolados, publicações com textos incompletos e artigos fora do período delimitado.

A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas: na primeira, os títulos e resumos foram avaliados para verificar sua relevância; na segunda, os textos completos dos estudos potencialmente elegíveis foram revisados detalhadamente. A qualidade metodológica dos estudos foi avaliada utilizando ferramentas como a escala de Newcastle-Ottawa para estudos observacionais e a ferramenta Cochrane de risco de viés para ensaios clínicos randomizados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados indicam que o uso de fórceps é eficaz em situações como o prolongamento do segundo estágio do trabalho de parto e o sofrimento fetal. Estudos mostram que o fórceps está associado a taxas mais altas de parto vaginal bem-sucedido em comparação com o vácuo-extrator em certos cenários (Caughey *et al.*, 2005). No entanto, seu uso está relacionado a riscos significativos, como lacerações perineais de terceiro e quarto graus, incontinência fecal e trauma fetal, incluindo hematomas e lesões nervosas (Machado; Neto, 2018).

A técnica adequada e a experiência do profissional são fatores críticos para minimizar esses riscos. Ribeiro *et al.* (2024) destacam que o treinamento contínuo dos obstetras no uso de fórceps é essencial para garantir a segurança e a eficácia da técnica. Além disso, a decisão de utilizar fórceps deve ser individualizada, considerando as condições maternas e fetais, bem como as preferências da gestante.

CONCLUSÃO

O uso de fórceps no trabalho de parto é uma ferramenta valiosa na prática obstétrica, mas seu uso deve ser criterioso e acompanhado de treinamento adequado. Investimentos em educação profissional e pesquisa são essenciais para otimizar seus resultados e reduzir complicações. A implementação de programas de treinamento e a conscientização sobre as indicações e riscos do fórceps podem contribuir para melhores desfechos maternos e neonatais. Pesquisas futuras devem focar em estratégias para minimizar as complicações associadas ao uso de fórceps e em comparações diretas com outras técnicas de parto instrumental.



Palavras-chave: Desfechos maternos e neonatais; Fórceps obstétrico; Lacerações perineais; Parto vaginal instrumental; Trauma fetal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMERICAN COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNECOLOGISTS. Practice Bulletin No. 154: Operative Vaginal Delivery. **Obstetrics & Gynecology**, v. 126, n. 5, p. e56-e65, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000001147>. Acesso em: 05 jan. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Manual de assistência ao parto e nascimento**. Brasília:

Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_assistencia_parto_nascimento.pdf. Acesso em: 05 jan. 2025.

CAUGHEY, A. B.; SANDBERG, P. L.; ZLATNIK, M. G.; THIET, M. P.; PARER, J. T.;

LAROS, R. K. J. Forceps compared with vacuum: rates of neonatal and maternal morbidity. **Obstet Gynecol**, v. 106, n. 5, p. 908-912, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/01.aog.0000182616.39503.b2>. Acesso em: 05 jan. 2025.

MACHADO, L. O.; NETO, M. S. Uso de fórceps: uma revisão de literatura. **Revista de Patologia do Tocantins**, v. 5, n. 3, p. 56-59, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.20873/uft.2446-6492.2018v5n3p56>. Acesso em: 05 jan. 2025.

RIBEIRO, V. S. O.; VIDEIRA, M. A. R.; COSTA, G. P.; COUTINHO, L. M. R. Lesões

neonatais em parto operatório com uso de diferentes tipos de fórceps. **Revista Eletrônica Acervo Médico**, v. 24, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reamed.e16711.2024>. Acesso em: 05 jan. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Recomendações para o parto seguro: diretrizes essenciais**. Genebra: WHO, 2018. Disponível em:

<https://apps.who.int/iris/handle/10665/272435>. Acesso em: 05 jan. 2025.



CICISU

ISBN 978-658319924-9



9 786583 199249

thesis

editora
científica